

HYMENOPTEROLOGISCHE STUDIEN

von

Prof. Dr. ARNOLD FOERSTER,

Oberlehrer an der höheren Bürgerschule zu Aachen,

Mitglied der Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, der entomologischen Gesellschaft zu London, der Société entomologique de France, der Nederlandschen entomologischen Vereeniging to Leiden, der Société Linnéenne de Lyon, der entomologischen Gesellschaft zu Stettin, des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien und des naturwissenschaftlichen Vereins für Rheinland und Westphalen zu Bonn.

II. Heft.

CHALCIDIAE und PROCTOTRUPIL.

AACHEN,

Verlag von **Ernst ter Meer.**

1856.

Synoptische Uebersicht

der

Familien und Gattungen in den beiden Gruppen

der

Chalcidiae Spin. und Proctotrupii Latr.

I. Historische Uebersicht.

Von den ungeheuren Fortschritten, welche die Entomologie seit *Linné* gemacht, kann man sich erst dann einen genügenden Begriff machen, wenn man den speziellen Reichthum einzelner Gruppen oder Familien übersieht. Weniger auffallend würde dieser Fortschritt erscheinen, wenn wir solche Familien in Betracht ziehen, welche durch ansehnlichere Grösse der Individuen leicht in die Augen fallen oder durch Schönheit der Farben und Formen von jeher den Sammler angelockt und angezogen und dadurch auch frühe schon eine sorgfältige Bearbeitung gefunden haben. Werfen wir aber einen Blick auf jene fast mikroskopische Insektenwelt, deren Dasein vor wenigen Jahrzehnten noch ein Geheimniss und auch heute noch selbst tiefer eingeweihten Zoologen eine unbekannte Welt bildet, dann erstaunen wir um so mehr über den Reichthum der Natur, je mehr uns ein klarer Vergleich mit jenen *Linné*'schen Zeiten gestattet ist. Selbst wenn wir die Resultate der Vergleichung auf unseren Welttheil beschränken, werden sie nicht weniger überraschend sein. Es darf nicht befremden, dass *Linné*, wie der Schöpfer der Botanik, auch mit Recht als Begründer der Zoologie angesehen, nur einen flüchtigen Blick in diesen Microcosmus gethan hat, seinen Nachkommen es überlassend, das stolze Gebäude, wozu er den Grundriss entworfen, weiter aufzubauen. Von dem Grösseren ausgehend und allmählig zu dem Kleineren hinabsteigend, hat in neuerer Zeit der geheimnissvolle Reiz, welcher dem schwieriger Zugänglichen inne wohnt, nicht verfehlt, einzelne mit grosser Ausdauer begabte Forscher anzuregen, um die Lücken, welche dem systematisch anordnenden Geiste sich häufig und unangenehm darboten, auszufüllen, und dieses Bestreben ist auf dem ganzen Gebiete der Entomologie mit sehr erfreulichen Erfolgen gekrönt worden. Wenn wir die

systematischen Werke über Hymenopteren, welche im Laufe dieses Jahrhunderts erschienen sind, in Betracht ziehen, dann werden wir bald den gewöhnlichen Verlauf der Studien auf dem entomologischen Gebiete wahrnehmen. Es sind anfangs die weniger schwierigen Familien, welche in Angriff genommen werden, während selbst grosse Abtheilungen des Ganzen, weil man vor den vielen Schwierigkeiten zurückschreckt, brach liegen bleiben; selbst dann, wenn ein ordnender Geist in das Chaos Licht zu bringen versucht, findet er nur geringe Unterstützung. Das ist der Stand der Hymenopterologie seit einer Reihe von Jahren gewesen, und verhältnissmässig nur wenige Naturforscher haben jener interessanten und höchst nützlichen Abtheilung der parasitischen Hymenopteren im Allgemeinen, noch weniger aber den Microhymenopteren, wozu hier die beiden grossen Gruppen der Chalcidiae und Proctotrupii (mit Ausschluss der Cynipseae) gerechnet werden müssen, die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt. Wie unendlich dürftig erscheint der erste Angriff derselben durch *Linné*, welcher nur neun bis zehn Arten beschreibt, die er ein und derselben Gattung *Ichneumon* einverleibt. Sein grosser Schüler und Nachfolger, der Schöpfer der systematischen Entomologie, *Fabricius*, hat allerdings schon ein grösseres Material vor sich, das er in seiner eigenthümlichen Weise beherrscht, indem er nur den grösseren Formen seine Aufmerksamkeit schenkt und an dem Kleinen, Unscheinbaren gerne theilnahmlos vorübergeht. Aber sein unbestreitbares Verdienst wird es für immer bleiben, der Entomologie als Wissenschaft die Bahn gebrochen und sie von dem Felde nutzloser und jugendlicher Spielerei auf das ernste Gebiet des Nachdenkens und strenger wissenschaftlicher Forschung hingelenkt zu haben. Wie gering auch der Fortschritt von *Linné* bis *Fabricius* war, so hat der Letztere doch zwei selbstständige und noch jetzt anerkannte Gattungen gebildet, *Leucaspis* und *Chalcis*, während er unter dem Namen *Diplolepis* die verschiedensten Elemente zusammenwürfelt. Wir finden darunter die Gattungen *Eulophus*, *Cleonymus*, *Perilampus*, *Pteromalus* und selbst *Diapria*. Die Gattung *Eurytoma* wird der Gattung *Cynips* einverleibt. *Linné* hatte nicht einmal eine einzige Gattung geschaffen, sondern die ihm bekannten Arten alle zu *Ichneumon* gestellt, während sie nach dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft fast eben so viele Gattungen repräsentiren. Sein *Ichneumon* *Bedeguaris* und *muscarum* gehören der Gattung *Callimome* an, der *Ichneumon* *coccorum* ist ein *Encyrtus*, *Ichn. Cynipidis* ein *Pteromalus*, *Ichn. gallarum* ist *Olynx gall. m.* (oder *Eulophus gall. Aut.*) *Ichn. gravidator* ist wohl sicher *Proctotrupes gravidator* und *Phalaenarum* dürfte wohl zuverlässig ein *Teleas* sein, obwohl es ohne Ansicht der Original-Exemplare nie mit einiger Gewissheit zu ermitteln sein wird, ob *Teleas Phalaenarum N.* oder *Linnaei N.*

Welch ein Bild liefern uns nun diese wenigen *Linné'schen* Arten von zwei so grossen, an mannigfaltigen Formen so reichen Gruppen? oder vielmehr, wie stimmt das reiche Gemälde beider Gruppen zu diesen einfachen Pinselstrichen, womit *Linné* dasselbe begonnen hat. Diese beiden Gruppen bieten sich jetzt, in Familien getheilt, mit mehr als 3000 Arten, ein Wunder an Form und Farbenschmuck, dem überraschten Auge dar. Der systematische Ausbau hat, obgleich mit grossen Schwierigkeiten kämpfend, begonnen, und wenn er glücklich dem Schicksal einer verwirrten und verwirrenden Synonymie, dieser *Seylla* und *Charybdis* der Entomologie, entgeht und mit sicherer Hand fortgeführt wird, muss diesem interessanten Zweige der Hymenopterologie eine staunenswerthe Entwicklung folgen, reich und überraschend durch die Schönheit der Formen, aber noch anziehender durch den biologischen Charakter.

Mit *Fabricius*, dem einzigen namhaften Schüler *Linne's*, schliesst, so sonderbar es auch scheinen mag, schon die erste Epoche der Entomologie ab, in so fern nämlich die von *Fabricius* eingeführte, künstliche, auf die Fresswerkzeuge allein basirte systematische Grundlage schon in ihrer ersten Entwicklung durch *Latreille*, den grössten Systematiker unseres Jahrhunderts, einen bedeutenden Stoss erhielt. Grade so wie *Linne's* künstliche Eintheilung der Pflanzen von Frankreich aus durch *Jussieu*, wenn auch nicht plötzlich, doch langsam untergraben wurde und jetzt wohl kaum noch einen bedeutenden Anhänger zählen wird, so ist in derselben Weise das System des *Fabricius*, obgleich es noch vor nicht langer Zeit seine Bewunderer, Anhänger und Vertheidiger hatte, allmählig beseitigt worden und hat dem natürlichen System des berühmten Franzosen weichen müssen. Im Jahre 1807, kurz bevor *Latreille* sein klassisches Werk, die „Genera Crustaceorum et Insectorum“, welches bereits 1806 begonnen, aber erst 1809 beendet wurde, herausgab, hatte mit nicht geringem Scharfsinn *Jurine* seine schöne Arbeit: „Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères et les Diptères“ vollendet und in derselben nicht nur im Allgemeinen die ersten Grundzüge über das Flügeladlersystem, welches eine so grosse Rolle in der Systematik der Hymenopteren zu spielen bestimmt war, entwickelt, sondern auch mehrere neue Genera in der Gruppe der Proctotrupii aufgestellt, welche in diesem Augenblick fast eben so viele Familien repräsentiren. Die Gattungen *Belyta*, *Ceraphron*, *Anteon*, *Cinetus* gehören drei verschiedenen Familien an und sind schon in dem Werke *Jurine's* theilweise unverkennbar abgebildet. Obgleich *Jurine* nur die ersten Grundzüge des Flügelgeäders entwickelte, so hat doch die leichte Anwendbarkeit und die unverkennbare Wichtigkeit dieser neuen Phase, wenigstens bei den Hymenopteren, das System des *Fabricius* nicht weniger gelähmt und unwirksam gemacht, wie das natürliche System es im Allgemeinen bei allen Ordnungen bewirkte.

Mit *Latreille's* Werk „Genera Crustaceorum et Insectorum“ beginnt die neue Aera der Entomologie, indem seine Methode der Classification alle vor ihm gemachten Versuche ganz in Schatten stellte. Die Einseitigkeit des Systems von *Fabricius* trat nun um so mehr hervor, je leichter sich nachweisen liess, dass *Fabricius* selbst als Schöpfer desselben grosse und bedeutende Inkonssequenzen begangen und bei Untersuchung der Fresswerkzeuge keineswegs seine eigenen Grundsätze streng befolgte, sondern die heterogensten Dinge ohne nähere Untersuchung zusammen warf. Es liegt nicht im Plane dieser Arbeit, nachzuweisen, dass sein System nothwendig jeden Anfänger derselben Versuchung aussetzt und streng befolgt, eine grössere Uebersicht erschwert, ja fast unmöglich macht. Damit wird dem Scharfsinne des Mannes nicht zu nahe getreten und der Wichtigkeit jener Theile, worauf *Fabricius* sein System dauerhaft gegründet zu haben vermeinte, keineswegs der grosse Werth abgesprochen, den sie heute noch haben. Es scheint mir vielmehr völlig unangemessen, wenn in einseitiger Verfolgung entgegengesetzter Richtungen dem früher Begründeten aller Werth abgesprochen wird, da es für den gründlichen Beobachter fest steht, dass die Fresswerkzeuge der Insekten bei jeder systematischen Eintheilung in erster Linie stehen und als feste Grundlage, in vielen Fällen sogar als einzige Grundlage, betrachtet werden müssen. Dem Scharfsinne *Latreille's* sind jene Vortheile, welche das System des *Fabricius* darboten, keineswegs entgangen und er war vorurtheilsfrei genug, nicht etwas ganz Neues, von allen Vorgängern ganz Verschiedenes aufstellen zu wollen, wie es leider bei der Eitelkeit der Systematiker nur zu oft der Fall ist.

Während er der Wichtigkeit des *Fabricius*'schen Systems alle Gerechtigkeit wiederfahren liess, hat er durch Hinzufügung neuer Gesichtspunkte seiner Eintheilung einen naturgemässeren Charakter eingeprägt und wirklich nicht nur den Grundstein zu einem neuen System gelegt, sondern dieses selbst ausgebaut und der erstaunten entomologischen Welt vorgelegt. Sehen wir nun zu, welchen Stand die oben genannten Gruppen der Chalcidiae und Proctotrupii bei jenem Meister der Entomologie einnehmen, so werden wir auf den ersten Blick schon einen grossen Fortschritt gewahren. Er hat die beiden Gruppen als eigene Familien fast vollständig umgränzt und blos die Gattung *Eucharis* den nahe verwandten Gallwespen einverleibt, welcher leicht entschuldbare Irrthum von den Nachkommen bereits berichtigt worden ist. Wir finden indess für die erste Gruppe einen anderen Namen und zwar denselben, der jetzt allgemein den Gallwespen beigelegt wird. Diese scheinbare Anomalie erklärt er aber selbst und zwar so, dass wir seinen Gründen beipflichten müssen, und wenn nicht andere Rücksichten hier massgebend wären, würden wir nicht einen Augenblick anstehen, diesen Gründen zu folgen und den *Latreille*'schen Namen adoptiren. Es dürfte aber nicht überflüssig, ja sogar lehrreich sein, über diesen Namenwechsel etwas Genaueres zu vernehmen. Wie uns *Latreille* zeigt, hatte *Geoffroy* bereits vor *Fabricius* der Gattung *Cynips* den Namen *Diplolepis* beigelegt, während er den Namen *Cynips* für die Gattung *Callimome* aufstellte. Folgerecht würde daher für die Gallwespen der Name *Diplolepariae*, den *Latreille* gewählt hatte, das Recht der Anciennität für sich haben. *Fabricius* hat aber die Namen *Diplolepis* und *Cynips* in einem anderen und zwar dem von *Geoffroy* ganz entgegengesetzten Sinne gebraucht, worüber *Latreille* nicht mit Unrecht Klage führt. *) So wie aber dieser Letztere die Gallwespen mit Recht *Diplolepariae* nannte, eben so folgerichtig legte er der Gruppe der Chalcidiae den Familiennamen *Cynipsera* bei. Fragen wir uns heute, warum die späteren Autoren hierin nicht dem gallischen Schriftsteller gefolgt sind, so wissen wir keine andere genügende Antwort darauf zu geben, als die, dass man zu blindlings der Autorität des *Fabricius* gefolgt ist. So wichtig aber auch das Prinzip der Autorität ist und so wesentlich dasselbe als Stütze der Wissenschaft in Betracht kommt, so dürfen wir doch nie vergessen, dass eine falsche Autorität eben aufhört, eine solche zu sein und nothwendig mehr zur Verwirrung als Aufklärung dient. Eine andere Frage ist aber die, ob mit der richtigen Erkenntniss des Fehlers derselbe sofort auch beseitigt werden soll und ob wir auf unserem heutigen Standpunkt, ich will nicht fragen, berechtigt seien, die Namen zu ändern, sondern ob wir uns einen Erfolg von der Aenderung des Namens der Chalcidiae in den der *Cynipsera* versprechen dürfen. Diese letztere Frage glaube ich verneinen zu müssen. Es gibt gewisse Fehler in der Wissenschaft, welche nie wieder ausgerottet werden und ich möchte sie in gewisser Hinsicht wohl mit den Ausnahmen von Regeln in der Grammatik vergleichen, die einmal das Bürgerrecht erlangt haben und sich nie wieder unter die allgemeine Regel beugen werden. Die Aenderung dieser Familiennamen könnte nur dann einen Werth haben, wenn sie von allen anderen oder doch der Mehrzahl der Autoren ebenfalls adoptirt würden, aber da nicht einmal der Nomenclator von *Agassiz* in Bezug auf diese Familiennamen das breitgetretene Geleise des Herkommens zu verlassen sich entschliessen konnte, so werde ich ebenfalls an dem faktischen Zustande nichts mehr zu ändern suchen, um so weniger, da diese Aenderung noch andere konse-

*) *Latr. Genera Crustac. et Insect. tom. IV, p. 19. Cynipedes dom. Geoffroi nunc a Fabricio Diplolepes vocantur: nomen haec continua subversio scientiam occidit.*

quenter Weise nach sich ziehen müsste. Es ist also eine blosse Frage der Zweckmässigkeit, dass wir diesen Familienstreit auf sich beruhen lassen, um zu sehen, welchen Zuwachs unsere beiden Gruppen durch *Latreille* erhalten haben. Derselbe ist nicht gering, denn er stellte folgende Gattungen auf: *Eucharis*, *Cleonymus*, *Spalangia*, *Perilampus*, *Encyrtus*, *Platygaster*, *Scelio*, *Teleas*, *Sparasion*, *Diapria*, *Proctotrupes*, *Helorus*, *Dryinus*, also im Ganzen 13. *Fabricius* hatte drei und *Jurine* vier neue Gattungen gebildet, ferner hatte *Geoffroy* im Jahre 1764 *Eulophus*, *Swederus* im Jahre 1795 *Pteromalus* und *Illiger* 1807 seine Gattung *Eurytoma* aufgestellt, so dass *Latreille* im Ganzen zehn Gattungen vorfand, denen er seine neuen Entdeckungen anreihen konnte. Da mit *Latreille* für beide Gruppen ein sehr langer Stillstand eintrat, so kann damit füglich die zweite Periode in der historischen Entwicklung derselben abgeschlossen werden. Die erste Periode hatte gleichsam den *Linné*'schen Kern der Gattung *Ichneumon* loszuschälen übernommen und war bis zur Bildung von zehn Gattungen geschritten, als *Latreille* die zweite Periode mit der Bildung zweier Familien begann und hiermit, so wie mit Vermehrung der Gattungen bis auf 23, einen grossen Fortschritt anbahnte. Die dritte Periode, obgleich sie den grossen Zeitraum von 1809 bis 1833 umschliesst, hat, während andere Familien bedeutend fortschritten, verhältnissmässig nur einen geringen Zuwachs geboten. Es waren hauptsächlich nur zwei Männer, welche in diesem Zeitraum sich eifrig mit dem Studium beider Gruppen beschäftigten, der Marchese *Spinola* in Italien und *Dalmann* in Schweden, der erstere mehr im systematisch ordnenden Geiste, der andere als ein überaus treuer und sorgfältiger Beobachter und Beschreiber. *Spinola* gab der Gruppe der Cynipsera *Latr.* den Namen Chalcidiae, welcher jetzt wohl allgemein adoptirt ist. Dann verdankt ihm aber auch diese Gruppe folgende neue Gattungen: *Smicra*, *Halticella*, *Decatoma*, *Megastigmus*, *Callimome*, *Sphegigaster*, *Elachestus*. *Dalmann*, als monographischer Bearbeiter der ausgezeichneten Gattung *Encyrtus* bekannt, hat nicht nur die Gruppe der Chalcidien mit einer Menge neuer Arten bereichert, sondern auch seinen Namen an die Schöpfung neuer Gattungen geknüpft, obgleich hierin der Kreis seiner Entdeckungen viel beschränkter erscheint. Die Gattungen *Dirrhinus*, *Caratomus*, *Palmon*, *Aphelopus*, *Eupelmus*, *Entedon*, wovon die zwei letzten als Typen besonderer Familien gelten, so wie auch mehrere ausländische Gattungen werden den Namen dieses Mannes für immer mit der Geschichte der Chalcidien verbinden.

Einen neuen und fast unerwarteten Aufschwung zeigte die vierte Periode, welche mit dem Jahre 1833 beginnt. In diesem Jahre erschien in England der erste Band des *Entomological Magazine*, dem bis zum Jahre 1838 noch vier andere gefolgt sind. In diesem Werke haben die Engländer unseren beiden Gruppen der Chalcidien und Proctotrupen, eine in systematischer Hinsicht ganz ausführliche, von den wichtigsten Entdeckungen begleitete Bearbeitung angedeihen lassen; die Zahl der Gattungen wuchs in einem so bedeutenden Grade, dass sie weit über die bereits bekannten sich erstreckte. Auch die spezielle Bearbeitung erhielt einen neuen Aufschwung, da das vorhandene Material sich dermassen gehäuft hatte, dass diese Familien, welche bis dahin gegen andere, z. B. die ächten *Ichneumon*en, zurückstanden, sie nun weit überholten. Der systematische Ausbau erhielt durch Theilung der beiden *Latreille*'schen Familien in eine Menge kleinerer gleichsam seine Vollendung, indem jene beiden nun als höhere Gruppen eine grössere oder geringere Anzahl von Familien umschliessen. Auch diese Familien-Eintheilung ist nach so grosser Vermehrung des Materials als Fortschritt anzuerkennen. So bemerkenswerth, ausgedehnt und umfassend waren die Un-

tersuchungen, dass der französische Schriftsteller *Brullé*, welcher die Fortsetzung und Beendigung des Werkes von *Lepelletier* übernahm, geradezu behaupten konnte, die Kenntniss jener Thiergruppen sei heute fast nur eine englische Wissenschaft. *) Wir dürfen hier um so weniger die Namen jener ausgezeichneten Entomologen übergehen, welche mit rühmlicher Ausdauer und grossem Scharfsinn das Studium der Hymenopterologie gefördert und sehr viel dazu beigetragen haben, die schwierigste Abtheilung der ganzen Ordnung mit den Fortschritten, welche die übrigen Abtheilungen der Hymenopteren gemacht hatten, in Einklang zu setzen, da wir fast auf jedem Schritte ohnehin ihre Namen finden werden. Obgleich auch hier die Zahl gering war, denn nur drei Männer, *Westwood*, *Haliday* und *Walker*, können wir namhaft machen, so ersetzte doch bei ihnen Talent und Liebe zu diesem schönen Studium eine ganze Legion gewöhnlicher Freunde und Sammler, mit welchen andere begünstigtere Ordnungen, z. B. die Lepidopteren und Coleopteren immer beglückt waren. Von jenen ebengenannten ausgezeichneten Männern hat sich *Westwood* fast nur darauf beschränkt, mit scharfem Auge die Typen neuer Gattungen aufzustellen, während *Haliday* und *Walker* zugleich den systematischen Ausbau und die Kenntniss der Spezies im Auge behielten. Denn in Auffindung neuer, höchst interessanter Gattungen wetteiferten sie nicht minder mit dem Ersteren und übertreffen ihn sogar, wenn wir blos die hier besprochenen Gruppen in Betracht ziehen. Ein tieferes Eingehen in die Kenntniss der Spezies ist aber vorzugsweise das Hauptstreben des unermüdlichen *Walker*, welcher nicht nur in jenen fünf Bänden des Ent. Magazine, sondern auch in dem speziellen Werke: „*Monographia Chalciditum*“ eine grosse Menge in den drei vereinigten Königreichen entdeckter Arten beschreibt. Mit demselben unermüdlichen Eifer hat er aber auch alle ihm zugänglichen ausländischen Formen beschrieben, wie es die *Annals of natural history* und andere Zeitschriften bekunden. Haben nun jene englischen Schriftsteller vom Jahre 1833 an in einem verhältnissmässig sehr kurzen Zeitraum so grosse Erfolge erzielt und alle ihre Vorgänger überflügelt, so hatte doch bereits auch in Deutschland ein Mann von eminentem Talent, fast gleichzeitig mit und kurz nach dem Auftreten *Latreille's* dem Studium der Entomologie im ausgedehntesten Sinne huldigend, speziell auch unseren beiden Gruppen seine Aufmerksamkeit geschenkt, die Arbeiten *Latreille's*, *Spinola's* und *Dalman's* zu Grunde legend, seine „*Monographiae Hymenopterorum Ichneumonibus affinium genera europaea et species illustrantes*“ ausgearbeitet, die ein unglücklicher Zufall, weil das Manuscript zu lange von dem Verleger verschleppt und zurückgehalten wurde, erst im Jahre 1833 und 1834 zum Druck gelangen liess. Diese Arbeit hat den berühmten Präsidenten der Leopoldinisch-Karolingischen Akademie der Naturforscher zum Verfasser, einen Mann, dessen Namen in der Botanik seit vielen Jahrzehnten in der ersten Reihe glänzt. In der Entomologie, welche in Deutschland nur mit Bedauern so grosse Talente ihre Kräfte nicht ungetheilt diesem ausgedehnten und fast unerschöpflichen Studium widmen zu sehen, wahrnehmen musste, hat *Nees von Esenbeck* nichts desto weniger den Ruf eines ausgezeichneten und tief eingeweihten Forschers und es dürfte nicht der geringste unter den Beweisen von dem grossen Scharfsinn dieses Mannes, der ja auch auf dem Felde der Botanik seinen Blick gerne in die geheimnissvolle Welt der niedersten Organismen

*) Histoire nat. d. Insect. Hymenopt. par M. le Comte Lepell. de St. Fargeau. tom. IV. par M. Aug. Brullé. p. 556. Cette classification est encore assez peu arrêtée, car les Chalcidites ont à peine été étudiées et leur histoire est aujourd'hui, pour ainsi dire, une science tout anglaise.

versenkte, der sein, dass er in der Entomologie nicht nur die leichteren und gefälligeren Formen, sondern das ganze Gebiet zu beherrschen suchte, dem Kleinsten und Grössten seine Aufmerksamkeit schenkte und dadurch einen so tiefen Blick in den geheimsten Organismus der Natur gethan hat, wie sich dessen nur wenige Männer rühmen können. Obgleich weniger an der Bildung neuer Gattungen Theil nehmend und vielleicht dem Grundsatz huldigend, dass eine zu grosse Vermehrung der Gattungen bei der Armuth der Arten nicht zweckentsprechend, die Uebersicht des Ganzen nur erschweren könnte, hat *Nees* mehr Sorgfalt auf die ausführliche Entwicklung des Familiencharakters, sowohl in künstlicher wie natürlicher Beziehung und ganz unabhängig von den englischen Arbeiten, verwendet. *Nees* hatte zuerst das Bedürfniss empfunden, die beiden Familien *Latreille's*, die Cynipsera und Proctotrupii, zu theilen. Jene erste Familie nennt er Pteromalini und fügt derselben die Mymaroidae, Scelionoidae, Platygasteroidae und Ceraphronoidae hinzu, welche nun alle und zwar mit Recht zu den Proctotrupien gerechnet werden. Die Proctotrupien führen bei ihm den Namen Codrini, die wieder in zwei kleinere Abtheilungen, Psiloti und Proctotrupini abgetheilt werden. Seinen beiden Familien der Pteromalini und Codrini stellt er aber auch noch eine dritte als ebenbürtig zur Seite, nämlich die Dryinei. Was an dieser Eintheilung und insbesondere an der Begränzung jener Familien im Laufe der Zeit geändert worden, werden wir weiterhin sehen, wenn wir den ganzen Schematismus der Familien aufstellen und in Kürze besprechen. Die von *Nees* als neu aufgestellten Gattungen fallen grösstentheils mit bereits früher gebildeten zusammen, so ist *Sphenolepis Nees* = *Choreia Westw.*, *Siphonura Nees* = *Ormyrus Westw.*, *Corynocere Nees* = *Pyrene Hal.*, *Phacostomus Nees* = *Pachylarthrus Westw.*, *Eutriche Nees* = *Polynema Hal.*, *Aneure Nees* = *Elasmus Westw.*, *Calliceras Nees* = *Ceraphron Jur.*, *Polyplanus Nees* = *Embolemus Westw.*, *Heterolepis Nees* = *Aphelopus Dahn*. Seine Gattung *Euphorus* gehört zu der Gruppe der Braconiden und die Gattung *Gonatocerus* lässt sich schwer deuten und dürfte wohl mit *Ooctonus Hal.* in der Familie der Mymaroiden übereinstimmen. In der Beschreibung der Arten hat *Nees* mit grosser Umsicht alles zusammengefasst, was seine Vorgänger geleistet haben, um eine allgemeine Uebersicht zu erlangen. Eine solche Uebersicht erschien um so wünschenswerther, da das Material bis dahin eben so schwer zugänglich war, wie es bei den zerstreuten Arbeiten in einzelnen Zeitschriften auch noch heute der Fall ist.

Mit der vierten Periode in der Entwicklung der Chalcidiae und Proctotrupii sind wir auf den heutigen Standpunkt angelangt. Die beiden Gruppen haben sich, da der Anwuchs an Gattungen und Arten so bedeutend geworden war, fast naturgemäss in kleinere Familien aufgelöst. Ein grosser Zuwachs an solchen Familien steht, in so weit wir die europäische Fauna in Betracht ziehen, nicht in nahe Aussicht, obwohl der Reichthum an Gattungen nicht erschöpft und die Anzahl der Arten fast unerschöpflich erscheint. Dieser gewaltige Reichthum ist leicht erklärlich und hängt mit der biologischen Bedeutung dieser Gruppen innig zusammen. Der parasitische Charakter weist diese kleinen Geschöpfe nicht auf eine bestimmte Familie, ja nicht einmal auf eine bestimmte Ordnung an, sondern alle Ordnungen sind den Angriffen und der Zerstörung durch dieselben mehr oder weniger unterworfen. Ja, es scheint die Behauptung nicht zu kühn, wenn wir annehmen, dass unter den Lepidopteren, Dipteren und sonstigen (d. h. nicht parasitischen) Hymenopteren kaum eine Art existirt, welche nicht unter den parasitischen Hymenopteren einen Feind zählt, der auf ihre Verminderung und theilweise gänzliche Zerstörung unablässig hinarbeitete. So geheim auch die Schlupfwinkel und

die mannigfaltigen Zufluchtsörter sein mögen, so weit auch irgend eine Art in ihrer geographischen Verbreitung nach Nord und Süd vordringen mag, überall folgt der Parasit und heftet sich gleichsam an die Ferse seines Schlachtopfers. In ihrer geographischen Verbreitung scheint gewissen Gattungen, wenigstens in unserem Welttheile, kaum eine Gränze gesteckt, während andere sehr eingeschränkt und fast lokal auftreten. Ein Gleiches gilt auch von den Parasiten. Der höchste Norden contrastirt mit dem tiefsten Süden, wie in der Pflanzenwelt, so nicht minder in der Thierwelt; Farbe und Licht, Luft und Leben, wie mannigfaltig im Süden wechselnd, wie einförmig im Norden! Grade so wirkt die Einförmigkeit der Pflanzen- und Thierwelt im Norden und der Farben- und Formenwechsel im Süden auf unsere Sinne. Dieses überall wirkende Gesetz greift auch tief in die Gestaltung unserer beiden Gruppen ein. Wir kennen von beiden nur die mitteleuropäische und nördliche Seite, daher werden wir in Zukunft die neuen Formen jenseits der Alpen und Pyrenäen suchen müssen. So wie man noch jetzt mit unermüdlichem Eifer die Flora des Mittelmeerbeckens studirt und die ersten Grundzüge zu einer eben so abgeschlossenen und in ihrer Art eigenthümlichen Fauna derselben Küstengegenden aufgesucht hat, so wird man auch mit Grund die Vermuthung aussprechen dürfen, dass eine Menge neuer und eigenthümlicher Formen jenem geschlossenen Kreise angehören. Diese aufzuspüren und dem schon vorhandenen, aber noch nicht geschlossenen Ringe einzuverleiben, überlassen wir aber billig einer kommenden Generation.

II. Systematische Stellung und Charakter beider Gruppen.

Vergleichen wir die Hymenopteren mit anderen Ordnungen, z. B. den Lepidopteren, Coleopteren und Dipteren, so werden wir bald finden, dass es in Bezug auf die systematische Stellung der einzelnen Gruppen noch sehr an allgemein gültigen Grundsätzen mangelt. Drei Wege scheinen in dieser Beziehung offen zu stehen, um zu einem auf vernünftigen Grundsätzen, nicht auf flacher Willkühr fussenden Resultate zu gelangen. Man muss eine systematische Gruppierung entweder nach der äusseren Organisation versuchen oder physiologische und biologische Merkmale zu Hülfe nehmen. Eine strenge Durchführung nach einem dieser Gesichtspunkte thut aber Noth, wenn nicht durch Vermischung zu vieler Elemente alle Gränzen überschritten, die Uebersicht erschwert oder gar unmöglich gemacht wird. Ohne hier die leitenden Grundsätze auf die ganze Ordnung anwenden zu wollen, glaube ich, dass unsere beiden Gruppen die tiefste Stellung einnehmen müssen und dass diese Stellung ganz genügend durch die geringe Entwicklung des Flügelgeäders begründet werden kann. Der physiologische Charakter kann hier aus nahe liegenden Gründen nicht in Betracht kommen, und der biologische scheint dieser Stellung gar nicht entgegen zu stehen. Das Gebundensein des Lebens in seiner Wechselbeziehung auf die zur Nahrung angewiesenen Thiere, welche eben so sehr durch zufällige Vernichtung die Existenz des Parasiten bedrohen, als dieser, ihr natürlicher Feind, auf ihre Zerstörung angewiesen ist, scheint mir eine viel tieferere Stufe in der Entwicklung anzuzeigen, als wir sie bei jenen Hymenopteren antreffen, welche allein von der Pflanzenwelt abhängig

erscheinen. In der Stellung beider Gruppen zu einander würden die Proctotrupii die höhere Stufe einnehmen, da in dieser Gruppe die Heloroiden schon eine bedeutende Entwicklung des Flügelgeädters wahrnehmen lassen.

Schon *Latreille* hat beide Gruppen in ihrem natürlichen Charakter zu bestimmen versucht, aber die Scelionoidae und Platygasteroidae zu den Chalcidien gestellt, obschon sie unstreitig den Proctotrupiis zugerechnet werden müssen. Ebenso hat er die Eucharoidae mit den Diploleparien verbunden, während der geübtere Blick sie nothwendig den Chalcidien einverleiben muss. Im Allgemeinen hat *Latreille* in der abweichenden Bildung des Legebohrers bei den ♀ ein wesentliches Merkmal der Unterscheidung für beide Gruppen aufgefunden, aber er hat nicht bemerkt, dass dieses Merkmal die Scelionoiden und Platygasteroiden von seiner Familie Cynipsera ausschliesst und zu den Proctotrupiis hinweist. Ein ebenso schneidendes Merkmal für die ♂ aufzufinden ist ihm nicht gelungen. Diesem Mangel hat auch *Nees* nicht abgeholfen, obgleich er sich die Scheidung und feste Begründung beider Gruppen sehr eifrig angelegen sein liess. *) Zwar gibt er, wie aus der eben angeführten Note erhellt, einen solchen Unterschied an, indem er behauptet, seine Pteromalinen hätten vollkommen gebrochene Fühler mit einem verhältnissmässig stark entwickelten Schaft, während bei den Codrinen die Fühler nicht völlig gebrochen, sondern gerade seien. Diese Angabe würde richtig sein, wenn die Stellung, welche *Nees* den Platygasteroiden, Scelionoiden und Ceraphronoiden anweist, indem er sie als die zweite grosse Tribus seiner Pteromalinen (unserer Chalcidien) betrachtet, haltbar wäre. Aber die neuere Systematik hat durch die Verweisung jener drei Familien zu den Proctotrupien jenen Charakter illusorisch gemacht. Nach der Ansicht von *Nees* sollten die Pteromalini ambulatorii (i. e. Platygasteroidae, Scelionoidae und Ceraphronoidae) gleichsam das Band bilden zwischen den ächten Pteromalinen und Codrinen, welche so innig mit einander verwandt seien, dass, wer an den einzelnen Organen einen bestimmten Unterschied aufsuche, nur Mühe und Zeit verliere. **) Abgesehen von dieser Mittelstellung, welche *Nees* den Pteromalinis ambulatoriis anweist, hat er seine Pteromalinen und Codrinen auf eine so geistreiche, von der feinsten Beobachtung zeugende Art charakterisirt, dass wir nicht umhin können, diese Schilderung hier wörtlich aufzunehmen. ***) Er sagt: „Es erübrigt noch etwas, leicht zu beobachten, aber schwer mit Worten

*) *Nees ab Esenbeck*, Hymenopt. ichneum. affin. monographiae. Vol. II. pag. 3. ** In distinguendis Pteromalinarum et Codrinorum familiis diu multumque haesitavi, quo tutissimo faciliq[ue] simul uterer caractere; tandem in antennis a scapo magis minusve deflexis, scapo autem ipso adscendente, nec porrecto, acquievi, utpote cujus respectu non solum utraque tribus, sed etiam Leptomerorum tribus stirps secunda, *Pteromalinos ambulatorios*, (d. h. die jetzt sogenannten Familien der Platygasteroiden, Scelionoiden und Ceraphronoiden) complectens, priori apte connectuntur.

**) *Nees* l. c. pag. 4. Nexus autem affinitatum, mediante Ambulatoriorum stirpe, intime conjungit Pteromalinos Codrinosque, atque adeo, ut si quis in singulis partibus summam discriminis quaerat, laborem perdere videatur.

***) *Nees* l. c. p. 4. verba seq. Sed restat aliquid visu facillimum dictu difficillimum, quo Codrinos, cum paucas tantum species cognoveris, statim a Pteromalinis distingues; idque arbitrario illo, uti videri posset, *antennarum fractarum* caractere non tam efficitur, quam proditur. Pteromalini omnes agiles sunt, circumspecti, oculati, astuta quasi facie, semperque antennis nutantes, speculatorii murium instar ad praedam, ad fugam intenti. Contra ea

auszudrücken, wodurch man die Codrinen, wenn man auch nur einige Arten kennt, sogleich von den Pteromalinen unterscheiden kann, und das wird dem Anscheine nach durch jenen entscheidenden Charakter der gebrochenen Fühler nicht sowohl bewirkt als verrathen. Die Pteromalinen sind alle behend, umsichtig, scharfblickend, gleichsam listig scheinend, immer mit den Fühlern nickend, wie Mäuse auf die Beute umherspähend und zur Flucht bereit. Die Codrinen dagegen wandeln träge umher und sitzen ruhig, indem sie den nahenden Feind weder weit genug vorhersehen, noch auf schnelle Flucht bedacht sind. Sie lieben feuchte und schmutzige Orte, jene aber die Sonne und die Schatten grünenden Laubes, wenn sie nicht, von herbstlicher Kälte genöthigt, unter abgefallenen Blättern eine Zuflucht suchen. Endlich sind die Pteromalinen von etwas kürzerem und dickerem Körper, gedrungen, oder, wo ihre Gestalt mehr verschmälert erscheint, sehr zart und zierlich; die Codrinen aber alle von längerem, obschon keineswegs hinfälligem oder schwächlichem Körperbau.

Wenn wir die Eintheilung in die zwei grossen Gruppen, Chalcidiae und Proctotrupii, festhalten, müssen wir uns nach einem Merkmal umsehen, welches in ähnlicher Weise, wie bei den ♀ durch die Verschiedenheit des Legebohrers, auch die ♂ von einander scheidet. Obgleich bei den englischen Schriftstellern beide Gruppen durch den allgemeinen oder natürlichen Charakter deutlich genug geschieden sind, so fehlt es doch auch bei ihnen an einem künstlichen, zugleich allgemeinen und durchgreifenden Merkmal für das männliche Geschlecht. Ich glaube dieses Merkmal in der Bildung der Fühler gefunden zu haben, aber nicht so, wie *Nees* meinte, allein in den gebrochenen oder nicht gebrochenen Fühlern, sondern in der eigenthümlichen Bildung der Geissel. Die Bildung der Fühler, um in Kürze darauf hinzudeuten, ist in beiden Gruppen so beschaffen, dass an einem mehr oder weniger verborgenen Wurzelglied sich ein grösseres der Schaft (*scapus*) anschliesst, diesem folgt wieder ein viel kleineres, das Stielchen (*pedicellus*) genannt, und die folgenden alle zusammen genommen heissen die Geissel (*flagellum*.) Während sich nun bei den Proctotrupien fast immer die Geissel unmittelbar an das Stielchen anschliesst, *) finden wir bei den Chalcidien zwischen dem Stielchen und der Geissel ein oder mehrere sehr kleine, oft nur mikroskopisch erkennbare Zwischenglieder, welche *Haliday* schon früher mit dem Namen *annelli* **) (Ringel) bezeichnet hat. Diese Zwischenglieder habe ich bei vielen Gattungen der Chalcidien bemerkt, bei den Proctotrupien sehr selten wahrgenommen; aber meine Untersuchungen sind nicht umfassend und vollständig genug, um dieses Merkmal als ein positiv allgemeines und durchgreifendes darzustellen, auch fehlt bei den englischen Schriftstellern häufig die Angabe über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein die-

Codrini segnes ambulant sedentque quieti, hostem appropinquantem nec longe praesentiunt, neque celerem fugam moliantur. Loca hi humida sordisque amant, illi solem et frondium vigentium umbras, nisi autumnali frigore coacti, sub foliis dejectis refugium quaerant. Corpore denique Pteromalini sunt vel breviori et crassiori, coacto, vel, ubi magis extenuata statura, tenerimo et gracillimo; Codrini autem omnes longiusculo corpore sunt, neque tamen debili aut extenuato.

*) Nur bei der Gattung *Helorus* ist dieser Anschluss nicht unmittelbar, sondern durch ein kleines Zwischenglied vermittelt.

**) *Entom. Magaz. Vol. I. p. 340. Anmerk. f. The joints of the antennae following the pedicel are sometimes abruptly smaller than the rest, and commonly overlooked in the computation of the joints. It is to such that i apply the distinctive epithet annelli.*

ser kleinen Geisselglieder. Bei *Nees* und *Latreille*, überhaupt bei älteren Schriftstellern ist ohnehin nie davon Rede. Der künstliche Charakter für die Unterscheidung beider Gruppen würde demnach folgender sein:

- Chalcididae.** ♂ Fühler immer gebrochen, mit ein oder mehreren kleinen Ringeln (Zwischengliedern) zwischen Stielchen und Geissel.
 ♀ Der Legebohrer unterhalb (d. h. vor) der Spitze des Hinterleibs entspringend.
- Proctotrupii.** ♂ Fühler gebrochen oder ungebrochen, zwischen dem Stielchen und der Geissel keine Ringel (Zwischenglieder), selten ungebrochen mit einem kleinen Ringel.
 ♀ Der Legebohrer aus der Spitze des Hinterleibs entspringend.
-

III. Natürlicher Charakter und Verwandtschaft mit anderen Gruppen oder Familien.

Der natürliche Charakter beider Gruppen ergibt sich zunächst aus der Betrachtung der einzelnen Körperteile. Indem wir diese zuerst bei den Chalcidien in Betracht ziehen, werden wir zugleich ihre Bedeutung für die Systematik, d. h. für die weitere Abtheilung der Gruppe in einzelne Familien oder Gattungen hervorheben. Wir werden also Kopf, Rumpf (mit seinen Nebentheilen, Flügel und Beine) und Hinterleib etwas ausführlicher und spezieller betrachten müssen:

- a. Der Kopf.* In Bezug auf seine Form ist derselbe sehr mannigfaltig gebildet, bald sehr gross, wie bei *Caratomus*, bald klein, aber nie im Verhältniss zur Breite des Rumpfes sehr klein. Selten hat er eine kubische Form. Das Gesicht hat meist eine mehr oder weniger ausgedehnte, flachere oder tiefere Grube zur Aufnahme des Schafes, doch fehlt dieselbe in einzelnen Gattungen oder Arten auch gänzlich. Die grösste Ausdehnung erhält diese Grube in der Gattung *Perilampus*, bei welcher sogar das mittlere Nebenauge noch innerhalb derselben liegt, gewöhnlich aber reicht sie höchstens bis zum Scheitel, auf welchem immer drei Nebenaugen stehen. Die Netzaugen sind meist gross, seltener rund, meist länglich-eiförmig, nie ausgerandet. Aus der Stellung der Netzaugen lassen sich keine, aus der der Nebenaugen eben so wenig generische Merkmale herleiten. Wichtiger erscheinen die Fühler. In ihrem Bau und der Anzahl der Glieder liegen eine Menge der vortrefflichsten Merkmale für die Unterscheidung ganzer Familien einerseits, so wie andererseits noch mehr für die Gattungen. Meist sind die Fühler in beiden Geschlechtern abweichend, selten übereinstimmend gebildet, oft hat das ♂ sogar auffallend gebildete Glieder, z. B. bei *Eulophus*, oder einzelnen *Encyrus*-Arten. Die Fresswerkzeuge bieten weniger gute Merkmale dar, da sie zum Theil eiförmiger gebildet erscheinen, als in anderen Gruppen der Hymenopteren, und auch bei den sehr kleinen Arten schwer erkennbar, ja meist nur durch Zerstörung des Individuums mit einiger Sicherheit zu bestimmen sind. Mandibeln und Taster aber dürften bei Feststellung des Gattungscharakters nicht ganz zu vernachlässigen sein, da erstere bald zwei-, drei- oder

selbst vierzählig erscheinen, oft sogar der eine Oberkiefer mehr Zähne als der andere hat. Die Maxillar- und Lippentaster haben ebenfalls eine verschiedene Gliederzahl, und oft ist das eine oder andere Glied durch seine Form sehr ausgezeichnet, wie bei den ♂ von *Pachylarthrus*, *Cyrtogaster* und *Sphaeripalpus*.

- b. Der *Rumpf*. Dieser zerfällt in den Pro-, Meso- und Metathorax, alle drei Abschnitte durch deutliche Nähte getrennt. Der Prothorax bietet im Allgemeinen wenige Differenzen dar. In einzelnen Familien tritt er allerdings durch seine Form mehr hervor, z. B. bei den Eurytomoiden und Cleonymoiden; in der ersten Familie erscheint er nämlich stark entwickelt, fast quadratisch, in der letzteren dagegen mehr konisch verlängert, so dass durch diese Entwicklung mehr oder weniger ein eigener Habitus bedingt wird. Diese eigenthümliche Ausbildung kann daher als bezeichnendes Merkmal sogar in den Familiencharakter aufgenommen werden. In der Mehrzahl der Familien und Gattungen ist der Prothorax dagegen ohne Bedeutung, meist sehr kurz und querlinigt. Der Mesothorax bietet im Gegensatz zu dem Prothorax vortreffliche Merkmale dar, sei es, indem wir bloß die Rücken- oder auch die Brustseiten desselben in Betracht ziehen. Die Rückenseite (Mesonotum) ist entweder ungetheilt oder durch zwei mehr oder weniger tiefe Furchen in drei Lappen getheilt; der Mittellappen wird von den englischen Schriftstellern Scutum, die Seitenlappen Parapsides genannt. Das Verhältniss der Länge und Breite bei dem Scutum, seine Wölbung und Abflachung oder selbst Vertiefung ist von grösserer oder geringerer Bedeutung, je nachdem der habituelle Gattungscharakter dadurch bedingt werden kann. Selbst in der Richtung der Furchen, je nachdem dieselben, wie es meist der Fall ist, auf die Achseln (Axillae) oder auf das gleich hinter dem Mesonotum liegende Schildchen (Scutellum) stossen, wie es in seltenen Fällen geschieht, greift bedeutungsvoll in den Gattungscharakter ein. Die Brustseiten des Mesothorax sind entweder durch Furchen und Gruben getheilt oder ungetheilt und schildförmig gewölbt. Diese letztere Form bildet den ausgezeichneten Familiencharakter für die Eucyrtoiden und Eupelmoiden. Das Schildchen, obgleich bedeutungsvoll bei spezieller Unterscheidung, greift bei den europäischen Gattungen selten durch eigenthümliche Form oder Anhängsel in den Gattungscharakter ein. Dasselbe ist auch der Fall bei dem Metathorax, dessen Rücken (Metanotum) so viele und vortreffliche Merkmale, sei es durch besondere Form, Theilung oder Sculptur, er auch darbieten mag, wenige oder gar keine generischen Kennzeichen bietet, da er bei einer und derselben Gattung (z. B. *Pteromalus*) dem mannigfaltigsten Wechsel unterworfen ist. Werfen wir aber einen Gesamtblick auf den ganzen Rumpf, so bietet selbst die Farbe und Sculptur kein unwesentliches Moment dar, wenn es sich davon handelt, mit raschem Blick die Glieder der einen Gruppe von denen der anderen zu unterscheiden. Die Chalcidien haben vorherrschend eine schöne grüne Metallfarbe, die einerseits bis zur herrlichsten Gold- oder Purpurfarbe sich steigert, andererseits aber auch bis zur tiefsten, fast schwarzen Erzfärbung hinuntersteigt; nur selten ist die Färbung schwarz, wie bei den Eurytomoiden, Chalcidoiden und Leucaspoiden, wo höchstens zu der schwarzen noch eine gelbe Färbung hinzutritt. Die Proctotrupien sind dagegen immer schwarz und nur in seltenen Ausnahmefällen mischt sich dieser Farbe ein grüner Erzschrimer bei, wie bei *Thoron*. Die

Sculptur der Chalcidien zeigt sich mehr oder weniger fein oder grob schuppig, oft mit beigemischter feiner Punktirung oder grubenartigen Vertiefungen, wie wir sie so schön ausgeprägt auf dem Scheitel von Encyrtus finden. Selten finden wir eine einfache kräftige Punktirung allein, nur die Familien der Eurytomoiden, Chalcidoiden und Leucaspoiden lassen eine solche wahrnehmen und hier dürfen wir sie allerdings fast mit zu dem Wesen des natürlichen Charakters zählen. Wir sind überhaupt der Meinung, dass, während der noch befangene Blick des Anfängers sich mit Recht an den positiven, und ich möchte sagen, handgreiflichen Merkmalen halten muss, um langsam, aber sicher zu der Kenntniss der einzelnen Gruppen zu gelangen, der geübtere, den ganzen Kreis der Formen überschauende Systematiker sich von minder wichtigen Merkmalen, wenn sie schnell in die Augen fallen, leiten lassen darf, ohne befürchten zu müssen, einen wesentlichen Missgriff zu thun.

- c. Die *Flügel*. Der Bau dieser Organe ist bei den Chalcidien unter allen Gruppen am einfachsten; dieser Bau allein würde mich bestimmen, ihnen die unterste Stufe unter den parasitischen Hymenopteren anzuweisen. Ueberall finden wir nur die einzige Unterrandader und in keiner einzigen Gattung schreitet die Ausbildung des Flügelgeäders bis zu der Bildung eines Randmals fort. Ganz anders verhält es sich schon bei den Proctotrupien, denn wenn hier auch in der Familie der Mymaroiden und Platygasteroiden eine eben so einfache und unvollkommene Ausbildung des Flügelgeäders Statt findet, so entwickelt sich dasselbe doch schon in anderen Familien vollkommener; bei den Ceraphronoiden erscheint schon ein vollkommenes, stark entwickeltes Randmal, bei den Diaprioiden sind mehrere, wenn auch unvollkommen geschlossene Zellen, bei den Belytoiden zeigt sich die Randzelle völlig geschlossen und bei den Heloroiden tritt schon ein entwickeltes Adernetz auf, wie wir es bei der höher entwickelten Gruppe der Braconiden in einzelnen Familien (z. B. bei verschiedenen Gattungen der Flexiliventes) nicht einmal so vollkommen antreffen. Umgekehrt finden wir in ähnlicher Weise auch das Flügelgeäder bei den Leucaspoiden höher entwickelt, als bei den Platygasteroiden, obgleich jene, der Chalcidien-Gruppe angehörig, tiefer auf der systematischen Stufenleiter stehen, als diese. Aber diese Erscheinungen dürfen nicht überraschen, da solche Entwicklungsformen ganz gewöhnlich sind, auch dürfen wir hier nicht auf einen Fall, sondern mehr auf die Totalität der Ausbildung Rücksicht nehmen. Hierin bleiben aber die Chalcidien weit hinter den Proctotrupien zurück. Die Unterrandader hat in dem Flügel der Chalcidien einen sehr einfachen Verlauf; aus der Flügelwurzel entspringend geht sie in das Flügelfeld, immer in der Nähe des Vorderrandes bleibend, um in kurzer Biegung sich mit diesem zu vereinigen. Die Vereinigung bleibt auf eine kürzere oder weitere Strecke und dann sendet sie in schiefer Richtung einen Ast in das Flügelfeld hinaus, während sie selbst oft noch auf eine längere Strecke am Vorderrande sich hinzieht. In ihrem Verlauf erscheint sie auf diese Weise in mehrere einzelne Stücke getheilt, welche von den englischen Schriftstellern verschiedene Namen erhalten haben. So nennt *Haliday* dasjenige Stück, welches von der Flügelwurzel bis zum Vorderrande sich erstreckt, *Humerus*; derjenige Theil, welcher mit dem Vorderrande verbunden, bis zu dem Punkt sich erstreckt, wo der neue Ast sich in das Flügelfeld abzweigt, heisst *Ulna*, der in das Flügelfeld hinabstei-

gende Ast Cubitus, und der hinter dem Cubitus liegende, aber ebenfalls mit dem Vorderrande verbundene Theil Radius. Obgleich die Bezeichnung dieser einzelnen Theile bei der Charakteristik unumgänglich nothwendig erscheint, so habe ich doch von diesen Namen Abstand genommen, zum Theil deshalb, weil sie der Anatomie der höheren Thiere entlehnt, bei den Insekten keineswegs gleiche oder auch nur analoge Theile bezeichnen, dann aber auch aus dem einfachen Grunde, weil ich das Flügelgeäder, selbst auf der untersten Stufe seiner Entwicklung, in einen organischen Zusammenhang mit dem der höher gebildeten Gruppen setzen will. Die Namen Humerus, Ulna, Cubitus und Radius erscheinen bei den englischen Schriftstellern gleichsam selbstständig und unabhängig von einander, sie scheinen somit alle bestimmte Flügeladern bezeichnen zu wollen, was durchaus nicht der Fall sein kann, da sie nur Theile einer und derselben Ader, der Unterrandader nämlich, sind. In den höher entwickelten Gruppen würden diese Namen, neben so vielen anderen Abzweigungen von Hauptadern, die jedenfalls dieselben Ansprüche auf selbstständige Namen machen könnten, nur Verwirrung erzeugen, um so mehr, da das Bild, welches uns diese Adern in der Familie der Chalcidien vor Augen führen, in den höheren Gruppen zum Theil verwischt oder ganz unkenntlich gemacht wird. Ich habe es daher vorgezogen, sie als Theile eines und desselben Ganzen darzustellen, wodurch ihr Zusammenhang mit dem Ganzen immer lebendig erhalten wird. Demnach wird von mir der Humerus als Ramus humeralis, die Ulna als Ramus marginalis, der Cubitus als Ramus stigmaticus und der Radius als Ramus postmarginalis bezeichnet. Der Ramus stigmaticus ist an der Spitze gewöhnlich verdickt, knopfförmig; Walker nennt diese Verdickung Stigma, eine Benennung, welche das Randmal bezeichnen soll. Aber weder ist die Verdickung ein wirkliches Randmal, noch würde auch diese Benennung dann passen, wenn wir es mit dem wirklichen Randmal zu thun hätten, weil der Ausdruck Stigma für die Luftlöcher und für das Randmal fast allgemein der Ausdruck Carpus gebraucht wird.

Die Bedeutung der Unterrandader tritt besonders bei Bildung der Gattungen hervor. Wie einfach erscheint diese einzelne Ader doch in ihrem Verlauf und wie wunderbar in ihrer Bildung! Mit der grössten Aufmerksamkeit, ja mit Erstaunen verfolgt das tiefer in die harmonische Ausbildung des Organismus schauende Auge diese gesetzmässige Ausbildung einer so einfachen Ader. Wie nahe stehen gewisse Gattungen in ihrem Gesamthabitus und dabei wie strenge geschieden durch eine leise, fast unmerklich auftretende Differenz in der Aderbildung! Welch ein geheimnisvolles Gesetz bildet die einfache Ader bei *Platygaster* und gibt derselben als höchst charakterisches Merkmal jenen knopfförmigen Anhang bei *Inostemma*! Welche Mannigfaltigkeit in der Bildung der einzelnen Theile zeigt diese einzige Unterrandader, um es möglich zu machen, mit Zuverlässigkeit eine grosse Menge von Gattungen auf den ersten Blick, abgesehen von allen anderen Merkmalen, zu unterscheiden! Aber dürfen wir uns darüber wundern, da dieselbe wunderbare Hand, welche die ungeheuren Weltkörper erschuf, nicht minder wundervoll die Richtung einer Ader in dem Flügel des winzigsten Insektes nach einem Plane lenkte, der dem blöden Auge des Menschen nur ahnungsvoll vorschweben, aber in seiner wunderbaren Herrlichkeit nie erschaut werden kann? Hier erkennen wir deutlich, dass der Geist, welcher über dem flüchtigen Wechsel der Er-

scheinungen stehend, mit abwägender Umsicht die leitende Hand erkennen will, die das Band knüpft, durch welches alle Geschöpfe zu einem grossen Ganzen verbunden, wodurch jedem Glied in der grossen Kette seine Stelle angewiesen wird, eben so nothwendig bei dem Kleinsten wie bei dem Grössten verweilen muss, um dieses schöne Ziel zu erreichen. Auch auf dem Gebiete der Entomologie wird im kleinsten Massstabe, zwar mühsam genug, aber mit Konsequenz und Beharrlichkeit und nicht ohne grosse Erfolge, dieser organische Zusammenhang erstrebt. Es darf daher nicht auffallen, wenn wir hier etwas weitläufig über eine Ader in dem Insektenflügel geworden und ihr eine Wichtigkeit beigelegt haben, welche jedem Nichtentomologen, ohne jene Andeutung, völlig unverständlich bleiben musste. Die Differenzen in der Aderbildung erscheinen so wichtig, dass sie bei Bildung neuer Gattungen nie ausser Acht gelassen werden dürfen; aber selbst bei einer und derselben Gattung treten noch feinere Unterschiede hervor, welche sogar bei Bestimmung der Spezies bis zu einer gewissen Grenze hin benutzt werden können.

- d. Die *Beine*. Diese Organe bieten uns bei den Chalcidien vorzügliche Merkmale für die Unterscheidung der Familien. Zuerst ist es die verschiedene Zahl der Fussglieder, wodurch die ganze Gruppe in drei Abtheilungen, Pentameren, Tetrameren und Trimeren, zerfällt. Die erste Abtheilung ist die umfassendste und charakterisirt sich noch insbesondere dadurch, dass auch die Anzahl der Fühlerglieder grösser als bei den Tetrameren und Trimeren ist. Weiter finden wir bei einzelnen Familien der Pentameren, nämlich den Leucaspoiden und Chalcidoiden, eine übermässige Verdickung der hintersten Schenkel, eine Entwicklung, welche wohl irgend eine biologische Beziehung haben könnte, die aber bis dahin zu enträthseln noch nicht gelungen. Andere Merkmale, welche wir von diesen Organen entnehmen, haben blos einen generischen oder selbst nur einen speziellen Charakter. So erscheinen beispielsweise die Mitteltibien merkwürdig erweitert bei *Mesopolobus* oder *Prosopton*. u. s. w.
- e. Der *Hinterleib*. Obgleich der Hinterleib für sich allein nicht durchgreifend einen Familiencharakter begründen kann, so ist doch der Bau desselben so mannigfaltig, dass er viele wichtige Merkmale der Unterscheidung darbietet. Nicht nur in der Anzahl der Segmente, sondern auch in der relativen Grösse dieser Segmente zu einander bieten sich manche gute Gattungscharaktere dar. Nicht unwichtig ist auch das Verhältniss des ersten Segments zu dem Metathorax, da dasselbe entweder mit seiner ganzen Breite angewachsen, wie bei *Ormyrus*, oder mehr oder weniger zu einem Stiel verschmälert, einen bald sitzenden, bald gestielten Hinterleib zeigt. In Bezug auf den gestielten Hinterleib ist aber noch darauf aufmerksam zu machen, dass der Stiel häufig so klein ist, dass man in der Definition zwischen dem sitzenden und gestielten Hinterleib kaum mit Sicherheit eine Gränze ziehen kann. Von besonderer Wichtigkeit erscheint aber der Legebohrer, welcher bei den Chalcidien meist innerhalb der Segmente verborgen, in manchen Gattungen aber auch weit hervorragt. Dieser Legebohrer entspringt immer, wenn er hervorragt, etwas vor der Spitze des Hinterleibs auf der Bauchseite und zeigt uns bei der Gattung *Leucaspis* eine merkwürdige Anomalie dadurch, dass er sich auf- und zugleich rückwärts krümmt, um seiner ganzen Länge nach sich auf

den Hinterleibsrücken zu legen. Der Bau des Legebohrers bei den Chalcidien stimmt mit dem der Braconiden und den ächten Ichneumoniden überein, während seine Bildung bei den Proctotrupien, wie wir später sehen werden, abweicht.

Die allgemeine Betrachtung der einzelnen Körpertheile bei den Chalcidien überhebt uns bei den Proctotrupien derselben Weitläufigkeit, es wird hier genügen, bloß auf einzelne Abweichungen zurückzukommen und diese speziell anzuführen. Dem Totalhabitus nach muss der geübtere Blick beide Gruppen gleich unterscheiden können. Die vorherrschend schwarze Färbung oder ein flüchtiger Blick auf das Flügelgeäder reicht meist hin, jeden Zweifel zu heben, aber in einzelnen Fällen nähern sich beide Gruppen auch wieder so, dass erst eine genauere Betrachtung und Abwägung der Merkmale Statt finden muss. Der Kopf hat in dieser Gruppe meist eine rundliche Form, die Netzaugen sind nicht mehr überall so gross, in einzelnen Fällen sogar sehr klein. Nebenaugen fehlen bisweilen, z. B. bei dem ♀ von *Lagynodes m.* (*Microps Hal.*) Das Gesicht entbehrt der tiefen Grube zur Aufnahme des Schaftes. Die Fühler sind entweder gebrochen oder, wie bei den Codrinen im engeren Sinne, fast gerade, die Anzahl der Fühlerglieder aber nicht so tief herabgedrückt, wie bei einigen Gattungen der Chalcidien. Der Thorax bietet wohl im Allgemeinen dieselben Merkmale dar, wie bei der ersten Gruppe, aber in Bezug auf die Entwicklung einzelner Theile treten doch, namentlich bei den Dryinoiden, abweichende und eigenthümliche Bildungen auf, welche von dem Gesamthabitus der Chalcidien sehr abweichen. An den Beinen sind die Tarsen fast immer fünfgliedrig, nur bei den Mymaroiden und Platygasteroiden kommen auch viergliedrige Tarsen vor. Die vordersten Tarsen zeigen bei den Dryinoiden jene sonderbare, man möchte sagen, krebsscheerenartige Ausbildung, welche *Nees* als *Pedes raptatorii* bezeichnet hat. Die Flügel zeigen offenbar eine höhere Bildung, wie die der Chalcidien, denn es tritt hier nicht bloß das Randmal in vollkommener Entwicklung auf, sondern auch die Randzelle zeigt sich vollkommen ausgebildet und völlig geschlossen schon bei den Belytoiden, und bei den Dryinoiden treten sogar Cubital- und Diskoidalzellen auf, von denen bei den Chalcidien bloß leicht übersichtbare Spuren angedeutet sind.

Der Hinterleib ist bei den Proctotrupien eben so mannigfaltig in seiner Bildung, wie bei den Chalcidien, greift jedoch weniger in den Familien- als in den Gattungscharakter ein. In Bezug auf seine Sculptur hat er eine viel grössere Bedeutung, als bei der ersten Gruppe, denn in einzelnen Familien, z. B. den Scelionoiden, bietet die Sculptur einen unendlichen Wechsel dar, der sich vortrefflich eignet, um in den an Arten zahlreicheren Gattungen mit grösserer Sicherheit die spezielle Unterscheidung festzustellen. Bei den Chalcidien finden wir aber grade in den artenreichsten Gattungen, z. B. *Isosoma*, *Callimome*, *Eulophus*, *Tetrastichus*, *Encyrtus* und vor allen bei der Gattung *Pteromalus* eine gewisse Einförmigkeit in der Sculptur, welche den Systematiker auf unangenehme Weise zwingt, dem Hinterleibe eine geringe Bedeutung beizulegen, höchstens die Farben zu berücksichtigen und die Sculptur mit Stillschweigen zu übergehen. Was in Bezug auf die Bildung des ersten Segments und überhaupt von der relativen Form und Grösse der einzelnen unter sich bei den Chalcidien erwähnt wurde, gilt auch von den Proctotrupien; in Bezug auf den Legebohrer findet indess eine merkliche Abweichung Statt. Er entspringt nämlich gradezu aus der Spitze des Hinterleibs. In manchen Gattungen ist er allerdings eingezogen und nicht sichtbar, aber

in anderen, z. B. bei *Proctotrupes*, ragt er mitunter weit hervor. Auch besteht er nicht aus den zwei freien, leicht trennbaren Klappen, welche den Eileiter zu stützen bestimmt sind, sondern die Klappen sind mehr oder weniger zu einer hornartigen, röhrenförmigen Scheide verbunden, in welcher der eigentliche Bohrer verborgen liegt. Diese Scheide haben einige sogar für das letzte Hinterleibs-Segment gehalten. *)

Für die genaue Kenntniss einer Gruppe darf die verwandtschaftliche Beziehung zu anderen Gruppen oder Familien nicht fehlen, denn sie ist nicht bloß lehrreich an sich, sondern auch aus dem Grunde nothwendig, weil dadurch der Zusammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen leichter ermittelt und der Blick sowohl erweitert, als auch geschärft wird. In der Gruppe der Chalcidien haben wir wenige Familien oder Gattungen, welche unverkennbar auf andere Familien oder Gruppen hindeuten, die Eurytomoiden haben zwar eine gewisse Aehnlichkeit im Habitus mit den Figitiden, einer kleinen Familie der Cynipseae, und die Gattung *Dipara* unter den Miscogasteroiden erinnert sehr stark an *Polynema* unter den Mymaroiden. Ja, es könnten solche und ähnliche Analogien hier noch mehrere angeführt werden. Je weniger Verwandtschaften aber zu anderen Gruppen hervortreten, je weniger Uebergänge wahrnehmbar sind, für desto selbstständiger und geschlossener dürfen wir solche Gruppen halten. Unter den Proctotrupien weisen gewisse Formen schon viel bestimmter auf die folgende Gruppe der Cynipseae hin und *Hartig*, der vorzüglichste Bearbeiter derselben, hat diese Beziehung nicht minder erkannt und bestimmt ausgesprochen. **) Während dieser Schriftsteller jedoch der Meinung ist, ***) dass die Codrinen und Proctotrupen sich den Gallwespen anreihen müssten, theile ich die entgegengesetzte Meinung und halte die Cynipseae für die höher entwickelte Gruppe. Diese Ansicht stützt sich auf die durchgreifend höhere Entwicklung des Flügelgeädters bei den Cynipseae, ein gewiss leicht in die Augen fallendes Merkmal, welches bei den Chalcidien und Proctotrupien durch kein anderes eigenthümliches und den Cynipseen fehlendes aufgewogen werden kann. Nach *Haliday* bilden die Dryinoiden eine von den Proctotrupien getrennte Familie, welche, von ihm dem Stamme der Aculeaten beigezählt, durch die Vermittlung der Scoladen in nähere Verwandtschaft mit den Fossorien stehen soll. Wenn ich diese Ansicht auch für die Bethyloidae theile, so halte ich doch dafür, dass die Dryinoiden sich besser den Proctotrupien anschliessen.

*) *Haliday*, Hymenoptera britannica, Oxyura. Fam. 2. Proctotrupidae. London. 1839. pag. 7. 'Terebra abdomine extricata, deflexa, intra vaginam corneam tubulosam latens. Vagina bivalvis, at compacta quasi integra (eujus specie decepti quidam pro segmento ultimo abdominis habuerunt.)

**) *S. Germar*, Zeitschrift für die Entomologie, zweiter Band, 1840. Ueber die Familie der Blattwespen, vom Forstrath und Professor *Hartig* in Braunschweig, Seite 178. Er sagt: „Die Gallwespen bilden daher im natürlichen System einen recht hübschen Uebergang von den pflanzenfressenden zu den parasitischen Hymenopteren, wogegen sie ihrer Körperbildung nach eine ganz andere Stellung einnehmen und meines Erachtens nirgend anders hingestellt werden dürfen, als hinter die Codrinen, und zwar zunächst der Gattung *Belyta*, vielleicht durch *Apophylus apterus* den Uebergang zu den Ameisen andeutend.“

***) *L. c.* .3 Bd. 1841. S. 334. Der Familie der Gallwespen, besonders der Figitiden, reiht sich unmittelbar die Familie der Codrinen und Proctotrupen an.

IV. Eintheilung der beiden Gruppen in Familien.

Bei der Eintheilung beider Gruppen in Familien folgen wir im Allgemeinen den scharfsinnigen und ausgezeichneten Forschungen jener bereits oben rühmlichst erwähnten englischen Schriftsteller. Für beide Gruppen hat *Haliday* im ersten Bande des *Entomological Magazine*, pag. 267—276 die ersten Grundzüge angedeutet, obgleich die Auseinandersetzung der Gattungen hier der Hauptzweck war. Für die Gruppe der Chalcidien hat aber insbesondere *Walker* in demselben Werke schon diejenigen Familien gebildet, welche auch noch jetzt ihre Geltung haben, obgleich sie im Laufe der Zeit mit einigen neuen vermehrt wurden. Eine genaue Beobachtung des Habitus lässt schon die Begränzung einzelner Familien recht deutlich erkennen, in andern ist die Kenntniss schon schwieriger und durch Gattungen, welche gleichsam als Mittelglieder angesehen werden müssen, verwischt, so dass ein tieferes Eindringen in den natürlichen Charakter der Familien, oder die Hervorhebung eines schneidenden Merkmales erforderlich ist, um die an der Grenze stehenden Gattungen der einen oder anderen Familie zuweisen zu können.

Für die Familien der Chalcidien haben wir in der Anzahl der Fussglieder ein höher stehendes Merkmal, wonach wir die ganze Gruppe in drei Abtheilungen übersichtlich darstellen können. Das Schema für diese Gruppe wird daher folgendes sein:

a. Pentameren.

- a. Die Hinterschenkel übermässig verdickt.
 - b. Die Vorderflügel gefaltet. LEUCASPOIDÆ.
 - bb. Die Vorderflügel nicht gefaltet. CHALCIDOIDÆ.
- aa. Die Hinterschenkel nicht übermässig verdickt.
 - b. Mittelbrustseiten nicht durch Furchen oder Gruben getheilt, schildförmig; Mittelschienen an der Spitze mit einem sehr starken Dorn.
 - c. Fühler höchstens achtgliedrig MYINOIDÆ m.
 - cc. Fühler mehr als achtgliedrig.
 - d. Mesonotum vor dem Schildchen eingedrückt; der Scheitel nicht gerandet EUPELMOIDÆ.
 - dd. Mesonotum vor dem Schildchen nicht eingedrückt; der Scheitel hinten scharf gerandet ENCYRTOIDÆ.
- bb. Mittelbrustseiten durch Furchen oder Gruben getheilt; Mittelschienen an der Spitze meist mit gewöhnlichen, nicht starken Dornen.
 - e. Fühler unmittelbar über dem Mundrande eingefügt.
 - f. Fühler kurz, zehngliedrig PYRENOIDÆ.
 - ff. Fühler verlängert, mehr als zehngliedrig. SPALANGOIDÆ.
 - ee. Fühler nicht unmittelbar über dem Mundrande eingefügt.
 - g. Der Mittelleib stark entwickelt und hoch gewölbt.

- h.* Der Ramus stigmaticus nicht entwickelt, das zweite Segment schliesst die folgenden ein EUCHAROIDÆ.
- hh.* Der Ramus stigmaticus deutlich, aber kurz. Das zweite Segment schliesst die folgenden nicht ein PERILAMPOIDÆ m.
- gg.* Der Mittelleib nicht besonders stark entwickelt.
- i.* Der Prothorax stark entwickelt, subquadratisch oder rektangulär, oder mehr zugespitzt und konisch verlängert.
- k.* Der Ramus stigmaticus sehr stark verkürzt.
- l.* Hinterleib mit eigenthümlicher Sculptur, beim ♂ walzig, beim ♀ konisch, ohne vorragenden Legebohrer. ORMYROIDÆ m.
- ll.* Hinterleib ohne eigenthümliche Sculptur, beim ♂ mehr oder weniger zusammengedrückt, beim ♀ mit vorragendem Legebohrer. TORYMOIDÆ.
- kk.* Der Ramus stigmaticus nicht verkürzt.
- m.* Prothorax subquadratisch oder rektangulär, stark entwickelt, Hinterleib von der Seite zusammengedrückt oder walzig, mit gewölbtem Rücken. . . EURYTOMOIDÆ.
- mm.* Prothorax konisch verlängert, stark entwickelt; Mittelschienen mit stärkerem Dorn; der Hinterleib oben flach CLEONYMOIDÆ.
- ii.* Der Prothorax nicht stark entwickelt, kurz, querlinigt.
- n.* Hinterleib gestielt. MISCOGASTEROIDÆ.
- nn.* Hinterleib sitzend.
- o.* Fühler schnurförmig ORMOCEROIDÆ.
- oo.* Fühler faden-, spindel- oder keulförmig PTEROMALOIDÆ.
- β.* Tetrameren.
- p.* Die Unterrandader geht mit sanfter Biegung und ungebrochen zum Vorderrande.
- q.* Die vier hintersten Schenkel ganz flach, zusammengedrückt, sehr stark entwickelt . . ELASMOIDÆ m.
- qq.* Die vier hintersten Schenkel nicht flach.
- r.* Die Parapsiden deutlich getrennt . . . ELACHISTOIDÆ m.
- rr.* Die Parapsiden nicht getrennt EULOPHOIDÆ.
- pp.* Die Unterrandader ist gebrochen, ehe sie den Vorderrand erreicht.
- s.* Der Ramus marginalis geht über die Flügelmitte hinaus. ENTEDONOIDÆ m.
- ss.* Der Ramus marginalis geht nicht über die Flügelmitte hinaus. TETRASTICHOIDÆ m.

γ. Trimeren.

Mit dreigliedrigen Tarsen TRICHOGRAMMATOIDÆ m.

Die Gruppe der Proctotrupien zerfällt nach dem hier aufgestellten Schema in folgende Familien:

- a. Hinterflügel mit einem lappenförmigen Anhang, oder, wo die Flügel beim ♀ fehlen, mit Raubfüssen versehen DRYINOIDÆ.
- aa. Hinterflügel ohne den lappenförmigen Anhang.
 - b. Die vordersten Schienen mit zwei Dornen CERAPHRONOIDÆ.
 - bb. Die vordersten Schienen mit einem Dorn.
 - c. Mandibeln ungezähnt PROCTOTRUPOIDÆ.
 - cc. Mandibeln gezähnt.
 - d. Der Hinterleib seitlich gerandet; Fühler über dem Mundrande eingefügt.
 - e. Flügel mit einem Ramus marginalis und bisweilen auch einem Ramus stigmaticus; die ungeflügelten Gattungen ohne Nebenaugen SCELIONOIDÆ.
 - ee. Flügel ohne Ramus marginalis und stigmaticus, alle Gattungen mit Nebenaugen PLATYGASTEROIDÆ m.
 - dd. Hinterleib seitlich nicht gerandet; die Fühler weit über dem Mundrande eingefügt.
 - f. Hinterflügel ohne Spur einer Mittelader.
 - g. Die Hinterflügel sehr schmal, fast linienförmig . MYMAROIDÆ.
 - gg. Die Hinterflügel breiter, nicht linienförmig . . . DIAPRIOIDÆ.
 - ff. Die Hinterflügel mit einer Mittelader.
 - h. Vorderflügel entweder ohne oder mit einer regelmässigen Grundader; Geissel ohne Ringel (annellus) BELYTOIDÆ m.
 - hh. Vorderflügel mit einer unregelmässigen, die Unterandader nicht erreichenden, gekrümmten Grundader, welche eine unregelmässige Zelle in der vorderen Schulterzelle bildet; Geissel mit einem Ringel HELOROIDÆ m.

Bemerkungen über einzelne Familien.

1. Leucaspoidae Westw.

Fabricius hat die einzige europäische Gattung dieser Familie zuerst aufgestellt und nach ihm haben sich *Klug*, *Spinola*, *Boyer de Fonscolombe*, *Walker* und *Nees von Esenbeck* mit der Beschreibung der einzelnen Arten befasst, zuletzt hat *Westwood* in der Zeitschrift für Entomologie von *Germer*, 1. Band, 2. Hefte, p. 237, die Gattung monographisch behandelt und der europäischen

eine zweite ausländische Gattung, *Polistomorpha*, aus Surinam hinzugefügt. Gefaltete Flügel, welche an die Verwandtschaft mit den *Vespariae* erinnern, eine verlängerte herzförmige Unterlippe und die eigenthümliche Lage des Legebohrers bilden mit den stark verdickten Hinterschenkeln den Hauptcharakter dieser kleinen Familie.

2. *Chalcidoidae* Walk.

Die nicht gefalteten Flügel und die verschiedene Lage des Legebohrers unterscheiden diese Familie auf den ersten Blick hinreichend von der vorhergehenden. Dazu kommt, dass die Oberkiefer bei *Leucaspis* zweizählig, bei dieser Familie aber ungleich gezähnt erscheinen, der eine nämlich zwei-, der andere dreizählig.

3. *Myinoidae* m.

Obgleich diese kleine Familie sich keineswegs in natürlicher Weise an die *Chalcidoidae* anschliesst, so habe ich sie doch hier in derselben Reihenfolge aufgeführt, wie sie in der schematischen Uebersicht folgt. Solche Uebersichten sind nicht geeignet und müssen gänzlich darauf verzichten, eine natürliche Reihenfolge feststellen zu wollen, da die bezeichnenden Merkmale diesem Bestreben oft unübersteigliche Hindernisse in den Weg legen. Auch hindern sie nicht bei einer weiteren Ausarbeitung dieser Gruppe, die Familien im natürlichen Zusammenhange auf einander folgen zu lassen. Ueber die Bildung dieser Familie, deren Gattungen bis dahin zu den Encyrtoiden gerechnet wurden, glaube ich keiner Rechtfertigung zu bedürfen, da sie durch eine geringere Fühlerzahl und gewiss auch durch den Habitus sich leicht kenntlich machen.

4. *Eupelmoidae* Walk.

Diese Familie, welche nur aus der Gattung *Eupelmus* *Dalm.* und *Calosoter* *Walk.* besteht, (vielleicht gehört auch *Metapelma* *Westw.* dazu, die aber in Nordamerika vorkommt!) gränzt auf der einen Seite sehr nahe an die *Cleonymoidae* und auf der anderen an die *Encyrtoidae*. Die *Mesopleurae* *scutatae* trennen sie aber scharf von den *Cleonymoiden*; ich habe daher die Gattung *Cleonymus* *Latr.*, welche *Walker* zu den *Eupelmoiden* zählt, grade wegen dieser Abweichung in der Bildung der Mittelbrustseiten von den *Eupelmoiden* getrennt und die Familie der *Cleonymoiden*, welche *Walker* in neuerer Zeit hatte eingehen lassen, wieder hergestellt. Mit den *Encyrtoiden* ist die Verwandtschaft nicht weniger stark, denn die Uebereinstimmung in der Bildung der Mittelbrustseiten und der Mittelschienen sammt Fersen lässt diese Verwandtschaft auf den ersten Blick erkennen. Das einzige scharftrennende Merkmal ist aber die Kopfbildung, denn bei den *Encyrtoiden* ist der Scheitel von dem Nacken immer durch eine scharfe schneidende Kante getrennt, während bei den *Eupelmoiden* ein sanfter Uebergang vom Scheitel in den Nacken Statt findet. Zu den drei europäischen Gattungen kann ich noch einige neue und sehr charakteristische hinzufügen, nämlich *Halidea*, *Ratzeburgia*, *Polymoria* und *Charitopus*.

5. *Encyrtoidae* Walk.

Eine veränderliche, an Formenreichtum und an Farbenpracht ausgezeichnete Familie, die ganz geeignet scheint, unter den Hymenopterologen die Lieblingsfamilie in der Gruppe der Chalcidien zu bilden. Nach der Veränderlichkeit der Formen zu schliessen erwartet man einen

grossen Reichthum an Gattungen, der bis jetzt noch keineswegs vorhanden ist. Obgleich die Gattung *Encyrtus* selbst noch viele Typen besonderer Gattungen einschliesst, so muss man doch bei Bildung neuer sehr behutsam zu Werke gehen und nur dann die Aufstellung derselben unternehmen, wenn man die beiden Geschlechter genau kennt. Es kommt in der Gattung *Encyrtus* mehr wie bei jeder anderen häufig vor, dass das eine Geschlecht durch besonders charakteristische Merkmale sich auszeichnet, während das andere von dem Haupttypus sich gar nicht entfernt. In solchen Fällen neue Gattungen zu bilden würde man nicht rechtfertigen können. Die *Encyrtoiden* stehen in der Mitte zwischen den *Eupelmoiden* und den *Myinoiden*, aber jenen sich mehr anschliessend, wie den Letzteren.

6. 7. *Pyrenoidae Hal.* und *Spalangoidae Westw.*

Die *Pyrenoiden* bilden mit den *Spalangoiden* eine kleine, gesonderte Abtheilung, die sich durch die Insertion der Fühler in der unmittelbarsten Nähe des Mundes recht gut charakterisiren lässt. Eine Verwechslung mit anderen Familien ist daher nicht zu befürchten. Zwischen beiden Familien entscheidet die Fühlerform nicht blos, sondern auch die Gliederzahl. Beide sind fast gleich arm an Gattungen und ebenfalls nicht reich an Arten.

8. *Eucharoidae Walk.*

So klein diese Familie, so charakteristisch ist der Typus derselben, welcher selbst den scharfsinnigen *Latreille* bewegen konnte, die Gattung *Eucharis* unter die *Cynipseae* zu stellen. In Europa kommt blos die Gattung *Eucharis* vor, aus Amerika und Asien kennen wir aber noch andere Gattungen. *Walker* hat zu dieser Familie noch *Perilampus*, *Caratomus* und *Elatus* gezogen, die ich davon zu trennen und zu einer selbstständigen Familie aufzustellen durch die abweichende Bildung der Unterrandader und des zweiten Hinterleibs-Segments mich veranlasst gefunden habe. Die Gattung *Caratomus* trenne ich aber, gestützt auf die Bildung der Unterrandader und die gänzlich abweichende Sculptur auch von den *Perilampoiden*, um sie den *Miscogasteroiden* zuzuweisen.

9. *Perilampoidae m.*

Wenn man die Bildung der Unterrandader und die bedeutende Entwicklung des zweiten Segments in der vorhergehenden Familie als den Hauptcharakter festhält, dann könnte in dieser Familie noch theilweise die tief grubige Punktirung als eigenthümliches Moment der Unterscheidung aufgefasst werden. Aber dieses Merkmal zeigt sich blos bei *Perilampus*, während die Gattung *Elatus Walk.* diese Punktirung nicht zeigt. Die starke Entwicklung des Schildchens, die vollständig getrennten Parapsiden und der übereinstimmende Verlauf der Unterrandader, worin *Elatus* sich genau an *Perilampus* anschliesst, sind aber eben so viele Hindernisse, die Gattung *Caratomus* in diese neugebildete Familie aufzunehmen, nachdem sie aus ähnlichen Gründen aus der Familie der *Eucharoiden* verwiesen werden musste.

10. *Ormyroidae m.*

Walker hat die einzige Gattung, welche diese Familie bildet, mit den *Torymoiden* verbunden, aber wie mir scheint, mit Unrecht. Der durchgreifende Charakter der *Torymoiden* besteht

in dem vorragenden Legebohrer des ♀, obgleich nicht geleugnet werden soll, dass in einer und derselben Familie ♀ mit und ohne vorragenden Legebohrer vorkommen können. Bei der Gattung *Ormyrus* hat aber der Habitus und die Sculptur des Hinterleibs eine von *Torymus* ganz verschiedene Ausbildung gewonnen, die sich eben so auf das ♂ erstreckt und die Gattung sehr schnell und leicht erkennen lässt.

11. *Torymoidae* Walk.

Die Familie der *Torymoidae* hat ihren Namen von der Gattung *Torymus* (gebildet von *τορέω*, welches durchbohren heisst,) erhalten, obgleich er folgerichtig von der ältesten und vorzüglichsten Gattung *Callimome* *) hergeleitet werden sollte. Auch *Spinola* scheint seine Gattung *Callimome* nicht ganz rein aufgefasst zu haben, sonst würde *Nees von Esenbeck* sie schwerlich beseitigt und dafür den späteren Namen *Torymus* eingeführt haben. Schwedische Schriftsteller, wie unter Andern *Bohemann*, haben den von ihrem Landsmanne aufgestellten Namen *Torymus* adoptirt. Erst *Walker* hat den älteren Namen *Callimome* wieder in sein Recht eingesetzt und den Gattungsnamen *Torymus* nicht mehr in dem Sinne von *Dalman*, *Nees* oder *Bohemann* angewandt, sondern auf eine Spezies aus Südfrankreich bezogen, welche, wie ich beinahe mit Bestimmtheit behaupten kann, auch in hiesiger Gegend vorkommt, mir aber bis jetzt blos im männlichen Geschlecht bekannt geworden ist. Die Uebertragung des Namens *Torymus* auf eine an Arten so arme Gattung, während von *Nees* und *Bohemann* so viele Arten unter diesem Namen bereits beschrieben wurden, dürfte in Zukunft wohl manche Verwirrung erzeugen, es wird daher besser sein, den Namen *Torymus* ganz fallen zu lassen, um so mehr, da seit *Dalman* alle Schriftsteller denselben in einer anderen Begrenzung aufgefasst haben. Als Familienname wird er beibehalten werden müssen, da *Walker* die Familie zuerst unter diesem Namen in dem *Entomological Magazine* **) hingestellt hat. Er verband damit anfangs noch *Ormyrus* und *Perilampus*, aber die letzte Gattung trennte er doch bald wieder ***), um sie den Eucharoiden zuzuweisen. Später traten noch die Gattungen *Monodontomerus* und *Diomorus* hinzu, während *Priomerus* dem früher gebildeten Namen *Palmon* *Dalm.* weichen musste.

12. *Eurytomoidae* Walk.

Arm an Gattungen, aber sehr reich an Arten, finden wir bei den *Eurytomoiden* eine grosse Uebereinstimmung in der Färbung, welche zumeist ganz schwarz und nur selten durch gelbe Punkte oder Flecken in ihrer Einförmigkeit unterbrochen wird. Noch seltener wird die gelbe Farbe vorherrschend. Mit den Chalcidoiden ist zwar eine gewisse Verwandtschaft nicht zu verkennen, aber die übermässig entwickelten Hüften und Schenkel und die stark gebogenen hintersten

*) Die Gattung *Callimome* wurde von *Spinola* im Jahre 1811 gegründet, während *Torymus* erst im Jahre 1820 von *Dalman* aufgestellt worden ist. Mehrere Arten kommen bei *Fabricius* unter dem unbestimmten Gattungsnamen *Diplolepis* vor.

**) Siehe Vol. I, pag. 115, und das Schema der Gattungen siehe pag. 116.

***)) Entom. Magaz. Vol. II, pag. 157, siehe unten die Anmerkung: „The description of the labium of the *Torymidae* in pag. 115, Vol. I, of the Ent. Mag. is erroneous; it is short and undivided, both in this genus and in *Callimome*. *Perilampus* will form another family.“

Schienen fehlen doch in unserer Familie. Dagegen stimmen sie mit den Chalcidoiden in der quadratischen Formbildung des Prothorax überein. Eine Annäherung an die Spalangoiden kann höchstens in der Färbung gefunden werden, da die Kopfbildung und die Insertion der Fühler bei den Letzteren eine strenge Scheidung nothwendig macht. In den beiden Hauptgattungen der Eurytomoiden, Eurytoma und Isosoma haben die Fühler beim ♂ einen typischen Charakter, welcher allein noch bei einzelnen ♂ der Encyrtoiden wiederkehrt, und weil er bei einer anderen Gattung Decatoma gänzlich fehlt, nicht in den Familiencharakter aufgenommen werden konnte.

13. Cleonymoidae Walk.

Sie schliessen sich auf der einen Seite eben so genau an die Pteromaloiden, wie auf der anderen an die Eupelmoiden an, stehen daher naturgemäss zwischen beiden in der Mitte. Mit den Eupelmoiden verknüpft sie die stärkere Entwicklung der Mitteltibien und Mittelfersen, während die getheilten Mittelbrustseiten sie davon ganz bestimmt abgrenzen. Von den Pteromaloiden trennt sie eben die mit den Eupelmoiden übereinstimmende Bildung der Beine und der stark entwickelte, oft konisch vorragende Prothorax. Walker, der diese Familie zuerst aufstellte, löste sie nachher wieder auf, indem er aus den Gattungen Eupelmus, Calosoter und Cleonymus die Familie der Eupelmoiden gründete und dann die übrigen Gattungen wieder den Pteromaloiden zuwies. Ich habe aber hier beide Familien, sowohl die Cleonymoiden, wie die Eupelmoiden aufrecht zu halten versucht, musste aber die Gattung Cleonymus von den Eupelmoiden trennen und zu den Cleonymoiden hinweisen, wohin sie auch offenbar gehört, wenn wir auf die getheilten Mittelbrustseiten Rücksicht nehmen.

14. Miscogasteroidae Walk.

Bereits in dem zweiten Bande des Entom. Magazine, 1835, stellte Walker diese Familie auf, später *) aber vereinigte er sie wieder mit den Ormoceroiden, Pteromaloiden und Cleonymoiden zu der einzigen, vielgestaltigen und schwer fassbaren Familie der Pteromaloiden. Bei dieser Vereinigung häufen sich jedoch so viele heterogene Elemente zusammen, dass ich die alte Trennung der neuen Zusammenziehung weit vorziehe. Die Schwierigkeiten, eine durchgreifende und natürliche Trennung durchzuführen, sind allerdings sehr gross, aber doch nicht unübersteiglich. Der Hauptcharakter liegt bei den Micogasteroiden in der Bildung des gestielten Hinterleibs, er ist, wie sich nicht läugnen lässt, sehr schwach, aber aus Mangel an hinreichenden Untersuchungen für eine bessere Begründung muss ich in diesem Augenblick darauf verzichten, etwas anderes an seine Stelle zu setzen.

15. Ormoceroidae Walk.

Hier soll nach Walker der Hauptcharakter durch die schnurförmigen Fühler bedingt werden, aber auch dieses Merkmal ist eben so schwach, wie bei der vorhergehenden Familie der gestielte Hinterleib. Offenbar wurde Walker hierdurch bewogen, beide Familien wieder eingehen

*) Siehe List of the specimens of Hymenopt. ins. in the collection of the *British Museum*. Part. I and II. Chalcidites. London 1846 und 1848.

zu lassen. Die Gattungen *Micradelus* und *Meromalus* sind mir unbekannt und die übrigen reichen nicht hin, um einen allgemein gültigen Familiencharakter genügend festzustellen.

16. *Pteromaloidae* Walk.

Trotz der Trennung der *Ormoceroiden* und *Miscogastroiden*, und nach Abscheidung der *Cleonymoiden* bleibt dennoch diese Familie der *Pteromaloiden* die zahlreichste, zwar nicht an Gattungen, wohl aber an Arten. Besonders zeigt die Gattung *Pteromalus* einen so grossen Reichthum an Arten, dass das Bedürfniss einer Trennung in mehrere Genera ein immer dringenderes wird. Die Lösung dieser Aufgabe hängt aber von sehr umfassenden und schwierigen Untersuchungen ab, welche dadurch besonders erschwert werden, dass von zu wenigen Arten die zusammengehörigen Geschlechter zuverlässig bekannt sind. Die Untersuchung der Fresswerkzeuge kann hier um so weniger allein massgebend sein, weil sie schwer zu beobachten und zu wenig abweichend gebildet sind.

17. *Elasmoidae* m.

In dem dritten Bande der *Transactions of the Entomological Society* machte *Haliday* seine *Contributions towards the Classification of the Chalcididae* bekannt und beleuchtete unter den *Pentameren* die *Tribus* der *Pyreniani* näher. Aber hauptsächlich ist es die Familie der *Eulophini*, welche er einem genaueren Studium unterworfen hat, indem er die Gattungen derselben genau zu begründen suchte. Eine weitere Abtheilung in Familien scheint nicht in seinem Plane gelegen zu haben, da er keine bestimmte Andeutung dazu gibt. Der Grund hierzu ist offenbar kein anderer, als dass die Anzahl der Gattungen noch gering und ein Bedürfniss der Theilung weniger fühlbar war. Obgleich auch in diesem Augenblick das Bedürfniss nicht dringender erscheint, so habe ich es doch nicht unterlassen wollen, eine Theilung vorzunehmen, weil ich der Meinung bin, dass die neugebildeten Familien sich scharf begrenzen lassen und nicht weniger selbstständig auftreten können, als die übrigen, längst anerkannten und allgemein angenommenen. Die von *Haliday* sogenannten *Eulophini* zerfallen, um hier das Allgemeine anzudeuten, in zwei natürliche Abtheilungen, *Tetrameren* und *Trimeren*. Die letzte Abtheilung bildet blos die kleine Familie der *Trichogrammatoidae* m. Dagegen zerfällt die Abtheilung der *Tetrameren* wiederum in zwei kleinere, je nachdem die *Unterrandader* deutlich und scharf gebrochen oder ungebrochen zum *Vorderrande* hinläuft. Zu der Abtheilung mit ungebrochener *Unterrandader* rechne ich die Familien der *Elasmoidae*, *Elachistoidae* und *Eulophoidae*, zu der anderen Abtheilung mit gebrochener *Unterrandader* die *Entedonoidae* und *Tetrastichoidae*.

Wenn wir hier den allgemeinen Charakter der *Elasmoiden*, einer Familie, die nur aus einer einzigen Gattung besteht, aufstellen, so muss dieser so bestimmt und eigenthümlich hervortreten, dass diese neue Schöpfung dadurch völlig gerechtfertigt erscheint. Die Gattung *Elasmus* (*Aneure* *Nees*) hat unbestreitbar auch einen so eigenthümlichen *Habitus*, dass der scharfblickende *Nees* schon unter den *Dipteren* diejenige Gattung *) bezeichnen konnte, mit welcher sogar eine Verwechslung für möglich gehalten wurde. Die vier ganz flachen und stark entwickelten Hinter-

*) *Nees ab Esenbeck*. *Hymen. ichneum. affin. Monographiae*. Vol. II, p. 195. Adn. Quod ad habitum attinet, primo intuitu *Trineurae* (i. e. *Phorae*) cuidam, e *Dipterorum* ordine, ut ovum ovo similis videtur.

schenkel geben dieser Gattung unter den Eulophinen ein ganz fremdartiges Aussehen. Dazu kommt, dass die Unterrandader fast ganz am Vorderrande hinläuft und der *ramus stigmaticus* völlig fehlt.

18. *Elachistoidae m.*

Die Elachistoiden unterscheiden sich zwar leicht von der vorhergehenden, aber nur wenig von der nachfolgenden Familie. Bloss das scharf getheilte Mesonotum lässt eine Trennung von den Eulophoiden zu.

19. *Eulophoidae m.*

In dieser Familie haben wir eine sehr beschränkte Zahl von Gattungen, aber der Artenreichthum ist gross, eignet sich jedoch wenig zur Bildung neuer Gattungen.

20. *Entedonoidae m.*

Eine Familie, die sich besser durch ihren Gesammthabitus, als durch ein tief einschneidendes Merkmal von der folgenden unterscheidet. Die Anzahl der Gattungen hat sich sehr vermehrt, da die Hauptgattung Entedon, welche durch ihren Artenreichthum so schwierig geworden war, in eine gewisse Anzahl neuer Gattungen so getheilt wurde, dass eine schärfere und leichtere Unterscheidung dadurch ermöglicht wird. Als Hauptcharakter muss ich einstweilen noch den Verlauf der Unterrandader festhalten, bis schärfere Trennungsmerkmale ermittelt werden. Von allen Familien der tetrameren Chalcidien unterscheidet sich die Unterrandader nämlich durch den kurzen *ram. stigmaticus*.

21. *Tetrastichoidae m.*

Dieser Familie können nur wenige Gattungen als fest begründete zugewiesen werden, obschon der Habitus der einzelnen Arten sehr abweichend erscheint. Bei der sehr grossen Anzahl von Arten in der Gattung Tetrastichus (beiläufig erwähnt, die artenreichste Gattung nach Pteromalus in der ganzen Gruppe der Chalcidien) ist der Mangel in der Kenntniss der zusammengehörenden Geschlechter noch sehr fühlbar und legt der Bildung neuer Gattungen grosse Hindernisse in den Weg.

22. *Trichogrammatoidae m.*

Dieser durch dreigliedrige Tarsen scharf begrenzten Familie braucht man andere Familienmerkmale nicht beizugeben, obgleich die Bestimmung nach der Gliederzahl der Tarsen nicht immer leicht ist und zur Vorsicht mahnt.

Die nachfolgenden Familien gehören der Gruppe der Proctotrupien an. Dieselbe bietet manche Uebergänge zu den Chalcidien, welche am klarsten bei Betrachtung der einzelnen Familien hervortreten. Ueber die natürliche Stellung der einzelnen Familien zu einander lässt sich nur in so fern etwas bestimmen, als die am wenigsten entwickelte die Reihenfolge beginnen müsste, wenn sie sich auch nicht als natürliches Bindeglied an die vollkommenste Familie der Chalcidien anschliessen sollte. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass eine fortlaufende Reihe der Entwicklung unter den Familien Statt findet, sondern dass jede Gruppe mehr einen in sich geschlossenen Kreis darstellt, der mit anderen Gruppen (resp. Kreisen) mehr oder weniger Berührungspunkte darbietet. Da wir die Familien aber nur in einer gewissen Reihenfolge betrachten können, so müsste

naturgemäss die unvollkommenste Familie den Anfang machen. Für unseren Zweck der Betrachtung aber genügt es, die oben aufgestellte schematische Reihenfolge beizubehalten, um so mehr, da eine andere, allgemein gültige noch nicht feststeht.

23. Dryinoidae Hal.

Eine abgeschlossene, wenig Uebergänge darbietende und ziemlich hoch entwickelte Familie, deren Gattungen zwar im Habitus etwas abweichen, aber durch ein charakteristisches Merkmal, wie durch ein gemeinsames Band umfasst werden. Die gelappten Hinterflügel bilden dieses Hauptmerkmal, wo diese fehlen, wie bei einigen ♀, da zeigen die sogenannten Raubfüsse ein höchst charakteristisches und sicheres Kennzeichen.

24. Ceraphronoidae Hal.

Haliday hat zuerst diese, sowohl durch ihren Reichthum an Arten, wie durch ihre weite Verbreitung, ausgezeichnete Familie gebildet. Die Zahl der Gattungen ist beschränkt, die Gattungsmerkmale nicht überall leicht in die Augen fallend. Den Hauptfamiliencharakter setzt *Haliday* in den doppelten Schienendorn der vordersten Beine. Ein anderes, obwohl nicht so allgemein charakteristisches Merkmal bilden der durch tiefe Furchen getheilte Rücken des Mesothorax und die stark gebrochenen, im Verhältniss zu ihrer Körpergrösse stark entwickelten Fühler. Doch findet auch bei anderen Familien in Bezug auf letztere eine ähnliche, fast noch stärkere Entwicklung Statt, z. B. bei den Mymaroiden, Scelionoiden u. s. w., so dass das von *Haliday* angegebene Merkmal, obgleich schwer zu beobachten, festgehalten werden muss.

25. Proctotrupoidae Latr.

Der Umfang dieser kleinen Familie beschränkt sich jetzt auf die einzige Gattung *Proctotrupes* Latr. (*Codrus* Jur. Nees). Den künstlichen und natürlichen Charakter dieser Gattung findet man weitläufig und klar entwickelt bei Nees *) und *Haliday*, **) so dass jeder Zusatz überflüssig erscheinen müsste.

26. Scelionoidae Hal.

In Bezug auf den Reichthum an Gattungen steht diese Familie als die am höchsten entwickelte in der ganzen Gruppe da; an Zahl der Arten wetteifert sie mit den Ceraphronoiden. Der Hauptcharakter liegt in dem seitlich gerandeten Hinterleib und der Insertion der Fühler unmittelbar über dem Mundrande. Mit ihr wurde bis jetzt auch die folgende Familie der Platygastroidae vereinigt, aber beide weichen doch in der Bildung des Flügelgeäders zu sehr von einander ab, um länger vereinigt bleiben zu können. Bei den Scelionoiden finden wir an der Unterrandader einen ramus marginalis in allen geflügelten Gattungen, bei einigen sogar einen stark entwickelten ramus stigmaticus. Die ungeflügelte Gattung *Baeus* Hal. charakterisirt sich leicht durch den Mangel der Nebenaugen.

*) V. Nees ab *Esenbeck*. Hymenopt. ichneum. affin. Monographiae p. 351.

**) V. *Haliday*. Hymenoptera britannica, Oxyura. fasc. 1. London 1839. pag. 6. 7.

27. *Platygastridae m.*

Durch den gerandeten Hinterleib und die Insertion der Fühler schliesst sich diese der vorhergehenden Familie an, wird aber durch mangelhafte Ausbildung des Flügelgeäders doch leicht davon unterschieden. Die Unterrandader fehlt entweder gänzlich, oder es ist nur eine unbedeutende Spur derselben vorhanden und selbst da, wo sie deutlich entwickelt auftritt, verbindet sie sich niemals mit dem Vorderrande. Alle Gattungen sind mit Nebenaugen versehen.

28. *Mymaroidae Hal.*

Eine schwierige, durch die winzige Kleinheit einzelner Gattungen oder Individuen schwer zu charakterisirende Familie. *Haliday*, welcher diese Familie zuerst bearbeitete, glaubt in dem Mangel der Taster ein charakteristisches Merkmal gefunden zu haben, aber diesen, bei der Untersuchung so kleiner Geschöpfe, leicht entschuldbaren Irrthum habe ich in meiner Arbeit über dieselbe Familie, *) gestützt auf mikroskopische Untersuchungen, bereits widerlegt. Der Habitus der Gattungen, welche diese Familie bilden, ist sehr veränderlich und ein allgemeines und umfassendes Merkmal als Familiencharakter aufzustellen, noch nicht gelungen. Ich habe ebenfalls in diesem Augenblick nur ein Merkmal von untergeordnetem und zweifelhaftem Werthe auffinden können, nämlich die bedeutende Verschmälerung der Hinterflügel, was einstweilen genügen muss, weil die übrigen Merkmale nicht allgemein sind und daher die ganze Familie nicht umfassen.

29. *Diaprioidae.*

Mit den Diaprioiden waren früher noch die Belytoiden vereinigt, die ich jetzt, gestützt auf die Anwesenheit einer Mittelader im Hinterflügel, davon getrennt habe. Diese Trennung liegt auch wohl in dem Habitus begründet, abgesehen davon, dass ebenfalls in der Fühlerbildung ein beinahe durchgreifendes Unterscheidungs-Merkmal gegeben ist, wenigstens bei den ♂, denn bei den Diaprioiden ist das zweite Geisselglied ausgerandet und bei den Belytoiden immer das erste.

30. *Belytoidae m.*

Eine vielgestaltige Familie, deren abweichende Merkmale von den Diaprioiden in der Flügel- und Fühlerbildung bereits angegeben wurden. Die Gattungen, welche ich als neu aufgestellt habe, sind zwar charakteristisch genug, erschöpfen aber doch nicht ganz den Formenreichtum; der übrig bleibende Stamm ist wohl noch einer weiteren Theilung bedürftig. Für diese fehlt es aber an umfassenderen Untersuchungen. Einstweilen wird durch die neuen Gattungen das vielfach angehäuften Material sich leichter sichten und bestimmen lassen.

31. *Heloroidae m.*

Nur die Gattung *Helorus* allein bildet einstweilen diese neue Familie. Es muss auffallen, dass man sie bis jetzt bei den Diaprioiden stehen liess, da schon *Haliday* den abweichenden Typus mit scharfem Auge erkannt hatte. **) Das kleine Mittelglied (annellus) zwischen dem Stiel-

*) Siehe *Linnaea entomologica*. Bd. II. pag. 195.

**) *V. Hymenoptera britan. Oxyura*. pag. 5 unten: *Helorus autem, trochanteribus et antennarum pedicello sub-biarticulatis, in priorem tribum (Entomotilla) innuit.*

chen und der Geissel, noch mehr aber die Ausbildung des Flügelgeäders stellt sie über den Diaprioiden und Belytoiden als unbezweifeltes Bindeglied zwischen diesen letzteren und den ächten Ichneumoniden. Es erhält mit dieser Gattung die ganze Gruppe der Proctotrupien einen natürlichen Abschluss.

Diejenigen Familien, welche, wie die Pelecinoiden unter den Proctotrupien, oder die Agaonoiden unter den Chalcidien, bloß auf aussereuropäischen oder mir gänzlich unbekannten Gattungen begründet sind, wurden hier absichtlich von einer näheren Besprechung ausgeschlossen, da aus Mangel an Autopsie ein Urtheil darüber nicht zulässig erschien. Ueber die grosse Vermehrung der Familien dürfte bei Manchen die Besorgniß entstehen, dass keine Erleichterung, sondern eine Erschwerung in der Kenntniss dieser beiden Gruppen Statt gefunden habe. Diese Ansicht kann ich nicht theilen, denn obgleich das Ganze dem flüchtigen Blick sich zu verwickeln scheint, sind bei einer in's Einzelne gehenden, genauen Prüfung die zu Grunde liegenden Merkmale und Ursachen dieser Eintheilung einfacher geworden. Ist auch das Studium dieser kleinen Thierwelt mit Anstrengungen verknüpft und fragt der Unberufene häufig: „Wozu?“ so dürfen wir doch nie vergessen, dass ein *blos thierisches Leben*, wie ein grosser Naturforscher *) sich ausdrückt, nicht die *einzig* Beschäftigung des menschlichen Lebens sein darf, dass die Ausbildung seiner geistigen Fähigkeiten, dass ein *aufmerksames Studium der unendlichen Mannigfaltigkeit von lebenden Wesen*, sowie von unbelebten Stoffen, die ihn umgeben, den schönsten Theil seiner Bestimmung ausmachen.

V. Synoptische Uebersicht der Gattungen.

1. Die Leucaspoiden bedürfen keiner weiteren schematischen Eintheilung, weil nur eine einzige europäische Gattung bekannt geworden ist.

2. Bei den Chalcidoiden haben wir nachfolgendes Schema:

- a. Kopf bewaffnet *Dirrhinus Dalm.*
- aa. Kopf unbewaffnet.
 - b. Stiel des Hinterleibs sehr lang *Smicra Spin.*
 - bb. Stiel des Hinterleibs kurz.
 - c. Fühler auf der Mitte der Stirn eingefügt *Chalcis F.*
 - cc. Fühler unmittelbar über dem Mundrande eingefügt *Halticella Spin.*

Anmerkung 1. Von den vier hier aufgeführten Gattungen kenne ich *Dirrhinus* nur aus der Abbildung bei *Jurine*, Tab. 13, fig. 47, wo offenbar das ♂ dargestellt wird. Das ♀ scheint noch unbekannt zu sein und es wäre möglich, dass es sich von der Gattung *Chalcis* generisch nicht trennen liesse. In diesem Falle wäre die eigenthümliche Kopfbildung nur sexuell und die von *Dalman* gegründete Gattung müsste wegfallen.

*) Siehe *Franz Arago's* gesammelte Werke, mit einer Einleitung von *A. von Humboldt*. 1. Bd. Leipzig 1854. S. 134.

Ob die von *Leon Dufour* bei Marseille entdeckte *Chalcis pectinicornis Latr.* ein neues Genus bilden müsse, wage ich nicht zu entscheiden, da hier ebenfalls das ♀ noch unbekannt geblieben ist.

Anmerkung 2. Die Schreibart von *Smiera* und *Halticella* habe ich auf die Autorität des Nomenclator von *Agassiz* hin verbessert. *Walker* schreibt noch in der List of Hym. ins. of the Br. Museum, 1846. *Smiera* und *Halticella*. Die von *Laporte* aufgestellte Gattung *Hockeria* fällt nach *Walker* mit *Halticella* zusammen.

3. Die Familie der Myinoidae ist noch ärmer an Gattungen als die vorhergehende. Die Gattungen werden durch die Flügel- und Fühlerbildung leicht unterschieden, und zwar wie folgt:

- a. Flügel unterhalb des ramus stigmaticus mit einer schiefen haarlosen Linie.
 - b. Die drei dem Endglied der Fühler vorangehenden Geisselglieder sehr ungleich an Grösse { *Agonioneurus Westw.*
Myina Nees.
 - bb. Die drei dem Endglied der Fühler vorangehenden Geisselglieder an Grösse gleich *Mesidia m. *)*
- aa. Flügel unterhalb des ramus stigmaticus ohne haarlose Linie (überall gleichförmig behaart) *Coccophagus Westw.*

Anmerkung. Die neugebildete Gattung *Mesidia* verbindet die beiden anderen Gattungen durch die Vereinigung der Merkmale, welche von der Flügelbildung und Fühlerform hergenommen werden, sie hat also im eigentlichen Sinne eine Mittelstellung. Was die Namen der beiden anderen Gattungen anbetrifft, so herrscht darin eine grosse Verwirrung. *Dalmann* stellte im Jahre 1820 die Gattung *Aphelinus* als eine Unterabtheilung von *Entedon* auf, und in derselben würfelte er viel Ungehöriges zusammen, so dass man mit Recht diesen Namen fallen lassen kann. Wenn nun im Jahre 1833 *Westwood* die beiden Gattungen *Coccophagus* und *Agonioneurus* bildete, von denen die letztere der Gattung *Myina* entspricht, so gebührt diesen, wenn man *Aphelinus* fallen lässt, unstreitig die Priorität. *Walker* fasste indess im Jahre 1839 in seiner *Monographia Chalciditum* jene beiden Gattungen *Westwood's* wieder unter dem Namen *Aphelinus* zusammen, später im Jahre 1846 in der List of the spec. of Hym. ins. etc., part. I, pag 60, trennte er seine Gattung *Aphelinus* in zwei Gattungen, *Aphelinus Dalm.* und *Coccophagus Westw.* Im Jahre 1848 erschien der zweite Theil dieses Werkes und in demselben finden wir die Gattung *Aphelinus* durch *Myina Nees* ersetzt. (S. pag. 135.) Offenbar muss aber statt *Myina* der Name *Agonioneurus* eingeführt werden. Ich habe mich zu dieser Aenderung des Namens hier entschlossen, weil ich nicht beitragen wollte, die Verwirrung noch höher zu steigern. Da indess wegen der Länge des Namens sich nicht passend der Familienname von *Agonioneurus* bilden lässt, so habe ich dazu den *Nees'schen* Namen *Myina* gebraucht.

4. Die kleine, aber an charakteristischen Formen reiche Familien der Eupelmoiden enthält folgende Gattungen:

*) *Mesidia* von μέσδιος, *μεσ* = μέσος in der Mitte. Der Gattungsname bezieht sich auf die Stellung zwischen *Agonioneurus* und *Coccophagus*.

- a. Die hintersten Schienen sammt Fersen zusammengedrückt, breit. . . . **Halidea m.*)**
- aa. Die hintersten Schienen sammt Fersen weder zusammengedrückt noch breit.
- b. Stirne neben der Fühlergrube kammförmig erhaben, das mittlere Nebenaugenauge liegt noch in der Fühlergrube.
- c. Mittelschienen stark verlängert.
- d. Fühler in der Nähe des Mundrandes eingefügt **Stenocera Walk.**
- dd. Fühler weit über dem Mundrande eingefügt **Polymoria m.**)**
- cc. Mittelschienen nicht verlängert **Ratzburgia m.***)**
- bb. Stirne neben der Fühlergrube nicht kammförmig erhaben; das mittlere Nebenaugenauge liegt nicht in der Fühlergrube.
- e. Schildchen mit breiter Basis an das Mesonotum angrenzend . . **Calosoter Walk.**
- ee. Schildchen mit sehr spitzer Basis an das Mesonotum angrenzend.
- f. Mittelferse unten mit starren Borsten besetzt; (der Schild des Mesonotums hinten eingedrückt ♀) **Eupelmus Dalm.**
- ff. Mittelferse unten nicht mit starren Borsten besetzt; (der Schild des Mesonotums hinten nicht eingedrückt ♀). **Charitopus m.†)**

Anmerkung. Die Gattung *Halidea* habe ich nach dem ausgezeichneten Irischen Entomologen *Haliday* gebildet, einem Manne, der sich um die Gruppe der Chalcidien sehr grosse Verdienste erworben hat. Die merkwürdig gebildeten Hinterschienen und Fersen und eine ansehnliche Grösse zeichnet sie vor den übrigen Gattungen gleich aus. Eine andere, eben so schöne Gattung theilte mir Herr Professor *Ratzburg* in beiden Geschlechtern mit, ich habe daraus das Genus *Ratzburgia* gebildet. Es braucht dabei kaum erinnert zu werden, dass die schönen Arbeiten eines so vortrefflichen Entomologen das Andenken an seinen Namen noch sicherer auf die Nachwelt bringen werden, als die Bildung dieser Gattung.

Die hier aufgestellte Gattung *Polymoria* scheint von *Stenocera Walk.* nicht viel abzuweichen, aber die Insertion der Fühler nöthigte zur Trennung von *Stenocera*. Dagegen scheint die neue Gattung *Charitopus* sich durch ihren Habitus am weitesten von den übrigen Gattungen zu entfernen. Wenn man indess die schildförmigen Mittelbrustseiten, den kräftigen Dorn der Mittelschienen, die stark verdickte Mittelferse und den hinten nicht gerandeten Scheitel sammt der übereinstimmenden Bildung der Unterrandader hier bei dieser Gattung wiederfindet, dann unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass sie nothwendig den Eupelmoiden einverleibt werden muss.

5. An die Eupelmoiden schliessen sich die vielgestaltigen Encyrtoiden an. Sie erfordern in Bezug auf ihre generische Eintheilung ein eigenes Studium, welches mehr oder weniger die

*) *Halidea n. pr.* Zur Erinnerung an den mir persönlich befreundeten berühmten irischen Entomologen, welcher durch so viele schöne Entdeckungen seinen Namen verewigt hat.

**) *Polymoria*, gebildet von πολὺς viel und μύριος, α, ον, vom Schicksal verhängt, dann fatalis, tödtlich, verderblich.

***) *Ratzburgia n. pr.* Der Name des Verfassers der Ichneumonien der Forstinsekten verdient es, einer so schönen und seltenen Gattung ertheilt zu werden.

†) *Charitopus*, von χαρις, ιος die Anmuth, Schönheit und πρὸς, πόδος der Fuss.

Lebensweise dieser schönen Thierchen zu berücksichtigen haben wird. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die eigentliche Gattung Encyrtus in ihrer polymorphen Gestaltung die Typen vieler eigenthümlichen Gattungen in sich schliesst und bei der grossen Anzahl von Arten auch eine Theilung, wenn sie auf richtigen Beobachtungen sich stützt, ertragen kann, ich kann aber nicht unterlassen zu wünschen, dass jede unberufene Hand davon fern bleibe. Wenn ich mich in dem hier aufgestellten Schema zur Bildung einiger neuen Gattungen entschlossen habe, so geschah es lediglich, um die Aufmerksamkeit auf diese typische Entwicklung hinzulenken und durch neue Beobachtungen zu einem entscheidenden Resultat zu gelangen. Hätte man den Totaleindruck des Habitus allein entscheiden lassen, dann würde man vielleicht eine grössere Menge solcher Gattungen haben aufstellen können, aber ich habe mir die Mühe nicht verdriessen lassen, nach einem charakteristischen Merkmal zu suchen und dasselbe hervorzuheben, wie die folgende Uebersicht zeigen wird:

- a. Schildchen an der Spitze mit einem Haarbüschel.
 - b. Der ramus marginalis sehr lang, der ramus stigmaticus und postmarginalis sehr kurz **Chiloneurus Westw.**
 - bb. Der ramus marginalis sehr kurz; der ramus stigmaticus und postmarginalis sehr lang **Eucomys m. *)**
- aa. Das Schildchen an der Spitze ohne Haarbüschel.
 - c. Gesicht und Scheitel grossgrubig (blatternarbig) punktirt.
 - d. Der Schaft die Höhe des Scheitels erreichend; der ramus marginalis fehlend oder verschwindend klein **Bothryothorax Ratzb.**
 - dd. Der Schaft die Höhe des Scheitels nicht erreichend; der ramus marginalis ziemlich lang **Discodes m. **)**
 - cc. Gesicht und Scheitel nicht grossgrubig punktirt.
 - e. Schaft und Geissel zugleich sehr breit (stark erweitert).
 - f. Der ganze Körper sehr flach (ungeflügelt) **Anusia m. ***)**
 - ff. Der ganze Körper nicht flach.
 - g. Geissel spindelförmig; der ramus stigmaticus länger als der ramus marginalis, der ramus postmarginalis deutlich ausgebildet **Euryscapus m. †)**
 - gg. Geissel nicht spindelförmig; der ramus stigmaticus nicht länger als der ramus marginalis, der ramus postmarginalis fehlt **Cerapterocerus Westw.**
 - ee. Schaft und Geissel nicht zugleich stark erweitert.

*) Eucomys von εὔ, wohl, gut, und κομῦς, ὕθος, der Bündel, Büschel. Der Name bezieht sich auf das Schildchen, welches an der Spitze den charakteristischen Haarbüschel hat.

**) Discodes von διακοινητός, ἔς, scheibenförmig. Der Kopf zeigt hier eine auffallend scheibenförmige Bildung.

***) Anusia von ἀνούσιος, ον, wesenlos, ohne Substanz. Der ganze Körper ist bei dieser Gattung so stark zusammengedrückt, dass er gleichsam ohne Substanz (d. h. innere Körpertheile) zu sein scheint.

†) Euryscapus von εὐρύς, εἰς, ὕ, weit, und σκαῖνος, ὅ, der Stab (Schaft, lat. scapus.)

- h.* Mesonotum sehr schmal, fast querlinigt.
- i.* Fühler zehngliedrig **Metallon Walk.**
- ii.* Fühler mehr als zehngliedrig.
- k.* Die Achseln zusammenstossend; Kopf und Mittelleib mit der gewöhnlichen Sculptur und Punktirung **Choreia Westw.**
- kk.* Achseln nicht zusammenstossend; Schildchen an der Basis mit zwei Grübchen; Kopf und Mittelleib glatt, ohne Punktirung . **Aglyptus m. *)**
- hh.* Mesonotum nicht sehr schmal und nicht querlinigt.
- l.* Fühler neungliedrig **Cercobelus Walk.**
- ll.* Fühler mehr als neungliedrig.
- m.* Hinterleib mit einem deutlichen und stark vorragenden Bohrer.
- n.* Hinterleib oft stark entwickelt, bisweilen von der Seite zusammen gedrückt; die Geissel sehr lang, fadenförmig . **Copidosoma Ratzb.**
- nn.* Hinterleib nicht stark entwickelt und nicht von der Seite zusammen gedrückt; die Geissel nicht besonders verlängert.
- o.* Der Scheitel sehr eng, die paarigen Nebenaugen stehen hart am inneren Augenrande; die Fühlerkeule schief zugespitzt **Echthroplexis m. **)**
- oo.* Der Scheitel ziemlich breit, die paarigen Nebenaugen stehen nicht am Rande der Augen; die Fühlerkeule breit zugerundet **Cerchysius Westw.**
- mm.* Der Hinterleib ohne stark vorragenden Bohrer.
- p.* Der ramus marginalis, stigmaticus und postmarginalis sehr lang.
- q.* Geisselglieder sehr dicht zusammen gedrängt und in beiden Geschlechtern kurz und anliegend behaart. . **Ericydnus Hal.**
- qq.* Geisselglieder deutlich geschieden, beim ♂ mit langen Wirtelhaaren **Sterrhocoma m. ***)**
- pp.* Der ramus marginalis, stigmaticus und postmarginalis nicht zugleich stark entwickelt.
- r.* Die Achseln weit von einander getrennt **Dinocarsis m. †)**

*) Aglyptus von α und $\gamma\lambda\upsilon\pi\iota\acute{o}\varsigma$, $\acute{\eta}$, $\acute{o}\nu$, eingegraben, ausgeschlitzt. Die Beziehung des Namens ist einfach, da sie auf den ganz glatten, aller Sculptur und Punktirung ermangelnden, Kopf und Thorax sich bezieht; unter den Encyrtoiden eine sehr seltene Erscheinung.

**) Echthroplexis von $\epsilon\chi\theta\rho\acute{o}\varsigma$, $\acute{\eta}$, $\acute{o}\nu$, feindselig und $\pi\lambda\eta\grave{\eta}\xi\iota\varsigma$, $\acute{\eta}$, der Schlag, Stoss, Verwundung. Der vorragende, eine tiefere Wunde veranlassende Bohrer gab zu dieser Benennung Veranlassung.

***) Sterrhocoma von $\sigma\tau\epsilon\rho\rho\acute{o}\varsigma$, $\acute{\alpha}$, $\acute{o}\nu$, starr, hart und $\kappa\acute{o}\mu\eta$, $\acute{\eta}$, das Haar. Diese Benennung nimmt hauptsächlich Bezug auf die starren Wirtelhaare des ♂.

†) Dinocarsis von $\delta\epsilon\iota\nu\acute{o}\varsigma$, $\acute{\eta}$, $\acute{o}\nu$, stark und $\kappa\acute{\alpha}\rho\sigma\iota\varsigma$, $\acute{\eta}$, das Beschneiden, Scheeren, Abschneiden. Eine Andeutung auf die Unterrandader enthaltend, bei welcher der ramus postmarginalis gänzlich fehlt (abgeschnitten ist)

rr. Die Achseln nicht weit von einander getrennt.

- s. Stirn und Scheitel durch eine schwache Wölbung in einander übergehend; Körper flach, nicht metallisch gefärbt **Rhopus m. *)**
- ss. Stirn und Scheitel durch eine mehr oder weniger scharfe Biegung getrennt; Körper nicht flach, metallisch gefärbt.
- t. Geißel besonders lang und dünn **Leptomastix m. **)**
- tt. Geißel nicht besonders lang und dünn.
- u. Nacken und Spitze des Schildchens mit lamellenartigen Schuppen **Habrolepis m. ***)**
- uu. Nacken und Spitze des Schildchens ohne lamellenartige Schuppen.
- v. Das letzte Geißelglied so lang, wie alle vorangehenden zusammen genommen **Sceptrophorus m. †)**
- vv. Das letzte Geißelglied kürzer als die übrigen zusammen **Encyrtus Dalm.**

Anmerkung. Der Typus der Gattung *Eucomys m.* ist der *Encyrtus Swederi* oder *scutellaris Dalm.*, ebenso wird dahin gehören der *Encyrtus obscurus Dalm.* Ich kenne ebenfalls noch zwei Arten, welche dieser Gattung angehören, nämlich *microphagus m.* und *Lecaniorum Koll.* Die letzte Art wird zwar von *Walker* zu *Swederi* gezogen, aber sicherlich mit Unrecht. Obgleich *Eucomys* in der Bildung des Schildchens genau mit *Chiloneurus Westw.* übereinstimmt, so sind doch andere Merkmale vorhanden, um beide Gattungen hinreichend zu trennen und selbstständig zu begründen.

Die Gattung *Bothriothorax* wurde im Jahre 1844 von *Ratzeburg* aufgestellt, als Typus hat man den *Encyrtus clavicornis Dalm.* anzusehen. *Walker* gibt im Ent. Mag. V, pag. 51, eine zweite Art an, welche er *Eupalis* nennt. Diesen beiden Arten kann ich noch vier neue anreihen, nämlich *scotopleuris* aus Oesterreich, *insignis* und *gorgops* von Aachen und *rhenanus* von Boppard am Rhein. Als besonders bezeichnend für diese Gattung ist noch die Fühlerbildung der ♂ anzusehen, welche mit dem ♀ darin übereinstimmt, dass das letzte Fühlerglied dieselbe schief abgestutzte, fast beilförmige Gestalt zeigt.

Die Gattung *Discodes* habe ich auf den *Encyrtus aeneus Dalm.* gegründet, eine ausgezeichnete Form, welche besonders durch die Kopfbildung leicht erkannt und bestimmt werden kann. Zu derselben Gattung gehört auch der *Encyrtus melanopterus Nees*, welcher in hiesiger Gegend stellenweise, obgleich selten vorzukommen pflegt. Neben diesen beiden Arten kann ich noch zwei

*) *Rhopus* von ῥῶπος, ὁ, kleine Waare oder Tand. Der Name bezieht sich auf die Kleinheit und unansehnliche Färbung der Arten dieser Gattung.

**) *Leptomastix* wurde gebildet aus λεπτός, ἡ, ὀν, dünn, fein und μάστιξ, ἡ, die Peitsche. Eine Andeutung auf die lange dünne Geißel.

***) *Habrolepis*, zusammengesetzt aus ἀβρός, ἄ, ὀν, glanzvoll, herrlich und λεπίς, ἡ, die Schuppe.

†) *Sceptrophorus* von σκηπτροφόρος, sceptertragend. Diese Bildung weist hin auf das lange stabförmige Endglied der Geißel.

neue, *cicatricosus* und *exannulatus*, aufstellen, beide aus der Gegend von Aachen. Der *Encyrtus aeneus Dalm.* wurde hier noch nicht aufgefunden.

Eine höchst seltsame Form bildet die Gattung *Anusia*, ein sehr kleines, ganz flach gedrücktes Thierchen ohne Flügel, mit sehr starker Entwicklung der Fühler. Es gehört schon eine gewisse tiefere Einsicht in die Veränderlichkeit der Form bei den Encyrtoiden dazu, um diese Gattung hier einzureihen und wenn nicht die charakteristische Bildung des Mittelfusses hier massgebend wäre, würde man mit der Stellung derselben in Verlegenheit kommen. Seit zwanzig Jahren sind mir nur vier Exemplare dieser seltenen Gattung in die Hände gefallen, in anderen Sammlungen habe ich sie nie gesehen.

Dalman hat zuerst den eben so seltenen als schönen *Encyrtus platycerus* beschrieben, den *Zetterstedt* in einem einzigen und zwar in einem ungeflügelten Exemplar gefangen hatte. Bei Frankfurt fing *von Heyden* ein ähnliches Stück. Ich habe ebenfalls zwei ungeflügelte und ein geflügeltes Exemplar vor mir, (das eine ungeflügelte von Bonn, die beiden anderen von Aachen,) und darauf die neue Gattung *Euryscapus* gegründet, welche sich zwar an *Cerapterocerus* durch übermässig starke Entwicklung der Fühler anschliesst, aber sowohl durch die Form derselben, als auch durch den Adernverlauf sich hinreichend und gut davon unterscheiden lässt. In England scheint dieses Thierchen noch nicht aufgefunden worden zu sein. Die vorliegenden von mir gefangenen Exemplare waren alle ♂, ein Bohrer war aber bei dem Frankfurter Stück, selbst bei oberflächlicher Beobachtung, deutlich sichtbar.

Von der Gattung *Cerapterocerus Westw.*, welche *Walker* mit der Hauptgattung *Encyrtus* vereinigt, die aber meiner Ansicht nach als Typus einer besondern Gattung hinreichend begründet ist, kommen bei Aachen die beiden Arten, *mirabilis Westw.* und *corniger Hal.* vor. Mit der ersten muss der von mir früher beschriebene *Encyrtus mirabilicornis* als identisch vereinigt werden, und eben so muss die von *Ratzeburg* als neu aufgestellte Gattung *Telegraphus* als Synonym zu *Cerapterocerus* gestellt werden. Merkwürdig scheint mir, dass von beiden Arten dieser Gattung bloss 2 bis jetzt gefunden wurden, obgleich ich die erstere in nicht unbeträchtlicher Anzahl bei Aachen gefangen habe. Aber auch in England wurden beide Arten nur im weiblichen Geschlecht gefangen. Es wäre daher wünschenswerth, dass durch Erforschung der Lebensweise das ♂, welches vielleicht von dem ♀ sehr verschieden sein mag, ermittelt werden könnte.

Ueber die Gattung *Metallon*, welche mir in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen ist, muss ich auf das englische Werk: „List of the specimens of Hymenopterous insects in the collection of the British Museum, part. II, pag. 219“ verweisen. Die Hauptcharaktere scheinen mir in der Kürze des Mesothorax-Schildes und den zehngliedrigen Fühlern zu bestehen. Nur das ♀ ist bis jetzt bekannt, welches *Walker* als *Metallon Acacallis* an der eben angeführten Stelle beschreibt.

Mit der vorstehenden Gattung trifft in dem schmalen, kurzen Mesonotum die Gattung *Choreia Vestw.*, welche auf den bekannten und fast über ganz Europa verbreiteten *Encyrtus ineptus Dalm.* gegündet wurde, zusammen und unterscheidet sich hauptsächlich durch die grössere Gliederzahl der Fühler. Mir selbst sowie auch dem ersten Entdecker sind bloss ungeflügelte Individuen zu Gesicht gekommen, *Westwood* führt aber an, dass er während eines sehr warmen Sommers auch geflügelte Exemplare gefangen habe, was gar nicht unwahrscheinlich ist.

Nahe verwandt mit *Choreia*, obgleich unzweifelhaft generisch zu trennen, scheint mir die Gattung *Aglyptus* zu sein, welche auf eine Spezies *Walkers*, den *Encyrtus Lindus*, von mir begründet worden ist. Diese schöne Art, welche ich von *Walker* erhielt, kommt nicht in hiesiger Gegend vor, sie unterscheidet sich gleich von allen mir bekannten Encyrtoiden durch den Mangel jeder Sculptur auf Kopf und Thorax und lässt sich dadurch leicht und sicher erkennen.

Eine sehr auffallend gebildete Form unter den Encyrtoiden erblicken wir in der von *Ratzeburg* aufgestellten Gattung *Copidosoma*. Die Bildung der Fühler erinnert an die von mir aufgestellte Gattung *Leptomastix*, aber die Form des Hinterleibs und die Sculptur des Mittelleibs ist eine durchaus verschiedene. *Ratzeburg*, welcher die einzige bekannte Art unter dem Namen *Cop. Boucheanum* *) beschrieben hatte, führt zwar später **) an, dass nach Aussage *Erichson's* in dem Jahresbericht vom Jahre 1844, pag. 70, die Art bereits unter einem anderen Namen beschrieben worden sei, aber diese Meinung *Erichson's* beruht gewiss auf einem Irrthum, wenn er glaubt, dass der *Encyrtus Cercobelus Walk.* (oder die Gattung *Cercobelus*) mit *Copidosoma* identisch sei. Nicht nur besitze ich *Cercobelus* aus hiesiger Gegend, sondern habe auch ein authentisches Exemplar von *Haliday* erhalten, welches von der *Ratzeburg'schen* Gattung durchaus verschieden ist. Das von *Ratzeburg* beschriebene Thierchen kommt bei Berlin und auch hier bei Aachen, obgleich sehr selten, vor, von Frankfurt erhielt ich ebenfalls ein Stück unter dem Namen *Encyrtus cultriformis v. Heyd.* zur Ansicht. *Ratzeburg* kannte nur ♀, auch mir ist das ♂ noch unbekannt.

Von der schönen Gattung *Echthroplexis* besitze ich nur ♀, die sich gleich durch den stark vorragenden Bohrer auszeichnen, nimmt man dazu noch die Stellung der Nebenaugen, welche hart am inneren Augenrande stehen, so hat man, glaube ich, hinreichend Grund, sie als Typus einer neuen Gattung aufzustellen, obgleich möglicherweise die noch unbekannten ♂ eine andere Deutung zulassen.

Die Gattung *Cerchysius* hat *Westwood* auf den *Encyrtus urocerus Dalm.* gegründet. Ich hatte früher dieselbe Art als *Encyrtus caudatus* beschrieben, ohne jene Gattung *Westwood's* zu kennen. Da mir in diesem Augenblick weder das „*Lond. and Edinb. Phil. Magazine*,“ worin *Westwood* diese Gattung aufstellte, noch auch die „*Kongl. Vet. Acad. Handl.* 1823“, worin *Dalman* den *Encyrtus urocerus* zuerst beschrieb, zu Gebote stehen, so weiss ich nicht, ob jene Autoren auch das ♂ dieser Gattung gekannt haben. Ich besitze mehrere ♂, welche unzweifelhaft als das andere Geschlecht von *Encyrtus urocerus* anzusehen sind, weil sie in Grösse und Färbung mit dem ♀ ganz übereinstimmen; sie wurden auch zugleich mit diesen gefangen. Nur in der Bildung der Fühler weichen sie allein ab, denn der Schaft ist kürzer, als bei dem ♀ und die Geissel gelb gefärbt, die Glieder derselben walzig, fast schwach gesägt, dicht mit langen Wirtelhaaren besetzt, scheinbar siebengliedrig, das letzte Glied doppelt so lang wie das vorhergehende und aus drei dicht zusammengedrängten Gliedern bestehend, so dass die Geissel dennoch eigentlich neungliedrig ist.

Mit der von *Haliday* aufgestellten Gattung *Erieydnus* stimmt im weiblichen Geschlecht die Gattung *Sterrhocoma m.* zwar überein, wenn wir auf den Gesammthabitus und die Flügel Rücksicht nehmen; die Fühler weichen allein in so fern etwas ab, als die Geisselglieder nicht so enge

*) Siehe *Ratzeburg*, die Ichneumoniden der Forstinsekten. Bd. I, S. 157.

**) Ebend. Bd. II, S. 150.

zusammen geschoben sind, wie bei *Eriocydnus*, betrachten wir aber das ♂ in beiden Gattungen, dann wird der Unterschied gleich stark in die Augen fallend, denn bei *Eriocydnus* sind die Geisselglieder beim ♂ genau so, wie bei dem ♀ gebildet, bei *Sterrhocoma* aber sind beim ♂ die Geisselglieder deutlich getrennt und zudem stark wirtelig behaart, während sie bei *Eriocydnus* kurz und anliegend behaart erscheinen. Von *Sterrhocoma* besitze ich nur eine Art, *Sterrhocoma histrio*, die ich in wenigen Exemplaren auf Waldwiesen gefangen habe.

Der bekannte und weit verbreitete *Encyrtus hemipterus Dalm.* bildet die neu aufgestellte und wohl begründete Gattung *Dinocarsis*. Die einzige Art ist meist ungeflügelt und mir nur im weiblichen Geschlecht bekannt. Zwar gibt *Nees* *) an, dass das ♂ sich von dem ♀ durch das Vorhandensein der Flügel unterscheide, da er aber von den Genitalien nicht spricht, so erscheint mir die Sache um so zweifelhafter, weil ich alle geflügelten Individuen, die ich in hiesiger Gegend gefangen habe, nur für ♀ halten kann, was durch den etwas vorragenden Legebohrer ausser Zweifel gestellt ist. *Walker* **) will ebenfalls das ♂ gefunden haben und charakterisirt dasselbe so, dass es sich vom ♀ durch blasse Mittelbeine, an denen blos die Schenkel braun seien, unterscheide, eben so soll der Schaft nicht erweitert und der Hinterleib kürzer als der Thorax sein, Merkmale, welche ich bei keinem einzigen Exemplare meiner Sammlung wahrnehmen konnte. Die Genitalien lässt *Walker* ebenfalls unberücksichtigt. Es bleibt mir daher immer noch in Bezug auf das männliche Geschlecht ein kleiner Zweifel übrig.

Der von *Walker* beschriebene *Encyrtus Piso* ***) bildet meiner Ansicht nach ebenfalls den Typus einer besonderen Gattung. Der vorherrschend flache Körperbau in Verbindung mit der eigenthümlichen Kopfbildung, die graue oder graugelbe, nicht metallische Färbung lassen die Gattung leicht erkennen. Die von *Walker* aufgestellte Art, zu welcher er zwei Varietäten zieht, ist nicht scharf begränzt und fiel deshalb wohl am besten weg. Mir sind bereits neun Arten bekannt, acht aus hiesiger Gegend und eine neue Art von Boppard; einige derselben scheinen sogar nicht selten zu sein. Ueber ihre Lebensweise kann ich nichts mittheilen.

In Bezug auf die sehr starke Entwicklung der Geisselglieder schliesst sich die Gattung *Leptomastix* genau an die Gattung *Coptosoma Rtzb.* an. Der Hauptunterschied, um sie von *Coptosoma* zu unterscheiden, dürfte in dem Grössenverhältniss der drei letzten Glieder zu suchen sein. Bei dieser letzteren Gattung sind nämlich die drei letzten Geisselglieder nicht nur eng mit einander verbunden, sondern auch länger als die beiden vorhergehenden zusammen genommen. Bei *Leptomastix* dagegen erreichen sie nicht die Länge der beiden vorhergehenden. Es kommt aber noch ein anderes Merkmal hinzu, um die Gattung *Leptomastix* zu begründen, nämlich die Sculptur des Mittelleibs und des Schildchens, welche ganz deutlich fein lederartig und mit starken Punkten versehen erscheinen, während in der verwandten Gattung *Coptosoma* die Sculptur entschieden schuppig ist und keine Spur von Punkten wahrnehmen lässt. Ich kenne von dieser schönen Gattung nur die ♀, welche aus Oesterreich stammen.

*) Siehe Hymenopt. ichneum. aff. monogr. Vol. II, pag. 254. „Mas differt a femina, cui quoad antenas simillimus, alis abdomen longitudine fere aequantibus etc.“

**) Siehe Ent. Magaz. IV, pag. 450.

***) Siehe Ent. Magaz. V, pag. 423.

Der von *Walker* in dem „Entom. Magazine, vol. V, p. 113“ beschriebene *Encyrtus nubilipennis* muss meiner Ansicht nach eine neue Gattung bilden, die ich nach einem besonderen und nur dieser Art eigenthümlichen Organ *Habrolepis* genannt habe. Dieses ausgezeichnete Thierchen hat nämlich an dem hinteren Kopfrande zwei feine, schmale und an der Spitze des Schildchens zwei längere, breitere und aufwärts gerichtete Schuppen, welche leicht in die Augen fallen. Zwar erwähnt *Walker* dieser Schuppen mit keiner Silbe, was unstreitig daher rührt, dass dieselben sehr spröde sind und bei so kleinen, nicht leicht zu handhabenden Thierchen gewöhnlich abbrechen. Die hier in der Gegend von Aachen gefangenen Exemplare stimmen mit der Beschreibung *Walkers* genau überein. Er führt bei seiner Art den *Encyrtus Dalmanni Westw.* frageweise an, es wäre möglich, dass *Westwood*, der auch den *Encyrtus Zetterstedtii*, welcher mit *nubilipennis* so grosse Aehnlichkeit in der Flügelzeichnung hat, zuerst entdeckte und beschrieb, unsere Art vor Augen gehabt und als *Encyrtus Dalmanni* beschrieben hätte. Ich kenne von dieser Gattung eben so wie *Walker* nur ♀.

Eine besonders merkwürdige Encyrtiden-Form hat *Dalman* unter dem Namen *Encyrtus paradoxus* beschrieben, welche bis jetzt auf Schweden beschränkt zu sein scheint. Eine durchaus ähnliche, aber durch mehrere Merkmale von *paradoxus* hinreichend verschiedene Art wurde von mir im Jahre 1841 in meinen Beiträgen zur Familie der Pteromalinen unter dem Namen *Encyrtus sceptriger* bekannt gemacht. Beide Arten sehe ich als Typen einer besonderen Gattung, die ich *Sceptrophorus* genannt habe, an. Der Hauptcharakter liegt in der Bildung der drei letzten Geisselglieder, welche so innig mit einander verwachsen sind, dass kaum eine Spur von Trennung wahrzunehmen ist. Dadurch wird das letzte Glied stabförmig und erreicht die Länge aller übrigen Geisselglieder zusammen genommen. Da beide Arten ♂ sind, so wäre es von grossem Interesse, die ♀ zu kennen. Es wäre nicht grade unmöglich, dass die Arten der Gattung *Copidosoma Rtzb.*, zu welcher nicht blos die von *Ratzeburg* beschriebene Art, sondern nach meiner Meinung auch der *Encyrtus flagellaris Dalm.*, *Encyrtus filicornis Dalm.*, *Encyrtus Anceus Walk.* und *splendidus m.* gehören, das andere Geschlecht der Gattung *Sceptrophorus* bildeten, obgleich eben so gewichtige Gründe für wie gegen diese Meinung sprechen. Für diese Meinung liesse sich anführen, dass die drei letzten Geisselglieder bei *Copidosoma* stark verlängert und so enge mit einander verbunden sind, dass sie ebenfalls nur ein einziges stabförmiges Glied zu bilden scheinen. Dagegen weicht aber die Sculptur des Thorax und Schildchens aller Arten von *Copidosoma*, welche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, so bedeutend von *Sceptrophorus*, wo jene Theile deutlich punktirt erscheinen, ab, dass ich mich zu einer Vereinigung beider Gattungen vor der Hand nicht entschliessen kann. Da bei Bildung der Gattung *Sceptrophorus* der Artname *sceptriger* nicht wohl länger bestehen bleiben kann, so möchte derselbe wohl nicht unpassend mit dem Namen *anomalus* vertauscht werden können. Bei der nahen Verwandtschaft beider Arten, des *Sceptrophorus paradoxus Dalm.* und *Sceptrophorus anomalus m. (sceptriger olim!)*, dürfte es nicht überflüssig sein, um das Interesse auf diese merkwürdigen Arten mehr hinzulenken, die Differenzpunkte hier in Kürze anzugeben:

Sceptrophorus	paradoxus Dalm.	anomalus m.
Die Taster sind bei .	schwarz;	bei gelb.
„ Fühler „ „ .	ganz gelb;	„ gelb mit braunem Stielchen.
Der Schaft ist „ .	etwas über die Stirne sich erhebend,	„ nicht über die Stirne sich erhebend,
	lang und schmal;	kurz, etwas erweitert.
Das Stielchen ist „ .	ziemlich lang;	„ kürzer als das erste Geisselglied.
Die Geissel hat „ .	das erste bis sechste Glied allmäh-	„ das erste bis sechste Geisselglied
	lig etwas grösser werdend;	allmählig an Grösse abnehmend.
Die hintersten Schen-		
kel sind bei	gelb;	„ braun, an der Basis und Spitze gelb.

Nach Abscheidung aller vorstehenden Gattungen bleibt in der eigentlichen Gattung Encyrtus noch eine grosse Anzahl heterogener Elemente zurück, deren Sichtung einer späteren Zeit aufbewahrt werden muss. Es wäre leicht gewesen, die Zahl neuer Gattungen noch zu vermehren, wenn man feinere und nicht so leicht in die Augen fallende Unterschiede hätte berücksichtigen wollen. Besonders in Bezug auf die Bildung des Kopfes und namentlich der Fühler würde man die Gattung Encyrtus noch in viele Unterabtheilungen zersplittern können, aber in diesem Augenblick ist das Bedürfniss einer solchen Zersplitterung noch nicht vorhanden. Da aber voraussichtlich bei einem ausgedehnteren Studium dieser schönen Gattung sich die Zahl der Arten noch bedeutend vermehren wird, so wird man schon jetzt darauf angewiesen, bei Beschreibung der Spezies genau und ausführlich zu Werke zu gehen, damit die Auffindung von Gattungscharakteren erleichtert und für genaue Unterabtheilungen das nöthige Material gewonnen werde.

Von den durch die englischen Autoren aufgestellten Gattungen fehlen in hiesiger Gegend blos Metallon Walk., Ectroma Westw., Aglyptus m. und Leptomastix m. Die beiden ersten fehlen auch in meiner Sammlung, während Aglyptus (Encyrtus Lindus Walk.) mir in einem weiblichen Exemplar von Walker mitgetheilt wurde und von Leptomastix mehrere Exemplare aus Oesterreich vorlagen. Die Gattung Ectroma habe ich in dem vorliegenden Schema nicht aufgeführt, weil dieselbe mir allzu zweifelhaft erschien. Diese Weglassung wird sich durch die hier folgende nähere Beleuchtung wohl rechtfertigen lassen. Westwood hat diese Gattung aufgestellt, *) ich kann aber, da mir das Werk, worin jener Autor seine Gattung charakterisirte, nicht zu Gebote steht, mich nur auf die von Nees von Esenbeck **) vermuthlich treu kopirte Diagnose beziehen. Dieser Schriftsteller aber hält die von Westwood beschriebene Art Ectroma fulvescens für identisch mit dem Eupelmus rufescens Dalm., gibt aber zugleich an, dass die von Westwood beschriebene Art ein ♂ sei, während Dalmann unter seinem Eupelmus rufescens ein ♀ beschreibt. Diese Differenz in dem Geschlecht macht das Citat von Nees an und für sich und besonders dann, wenn man beide Thiere nicht wirklich vor Augen hat, sehr zweifelhaft. Dazu kommt noch, dass in „Newman's Entomologist

*) Vide Lond. and Edinb. Ph. Mag. and Journ. of Science. Third Series. III, 344.

**) Vide Nees ab Esenbeck. Hymenopt. ichn. affin. monogr. vol. II, p. 420. Ectroma Westw. „Caput crassum, mandibulis tridentatis. Antennae inter partem inferiorem oculorum insertae, sensim incrassatae, 9-articulatae, articulo secundo tertio majori, nono octavo haud majori. Thorax oblongo-quadratus, collari attenuato. Alae rudimentales.“

(London 1840—42) auf Plate E, Nro. 3, eine Abbildung von *Ectroma* gegeben wird, welche offenbar ein ♀ darstellt; auch deutet der auf derselben Tafel unter Nro. 2, a, dargestellte vergrößerte Fühler das ♀ an. Diese Figur scheint mir zwar nur den *Encyrtus fulvescens* Walk. ♀ *) darzustellen, bei welchem *Walker* allerdings das Genus *Ectroma* citirt und seine Art mit der *Westwood'schen* identifizirt, er gibt aber an dieser Stelle nicht an, ob *Westwood* bei Aufstellung seiner Gattung ein ♂ oder ♀ vor Augen hatte. Es bleibt mir daher sowohl über die Gattung wie über die Art ein nicht zu lösender Zweifel. In Betreff der Gattung würde ich mich zwar nach der Diagnose von *Westwood* und der Beschreibung *Walker's*, welche neungliedrige Fühler angeben, dazu entschliessen können, das fragliche Insekt für generisch begründet zu halten, aber die Abbildung bei *Newman* zeigt ganz deutlich eifgledrige Fühler, da das letzte Glied dreiringelig erscheint; andere Gattungsmerkmale konnte ich aber weder aus den Diagnosen, noch aus der Abbildung erkennen. Dass aber dieser *Encyrtus fulvescens*, wie er von jetzt an mit Recht heissen muss, nicht mit *Eupelmus rufescens* Dalm. Nees. zusammen fallen könne, scheint mir aus manchen Einzelheiten der ziemlich weitläufigen Beschreibung der letzteren Art bei *Nees* **) hervorzugehen. Schon die Angabe bei *Eupelmus rufescens* „scapus verticem multum superans, gracilis, linearis“ passt durchaus nicht, wenn wir die Abbildung damit vergleichen, (natürlich in der Voraussetzung, dass dieselbe unzweifelhaft die *Westwood'sche* Spezies darstelle!) denn in der Abbildung erscheint der Schaft kurz und breit.

6. Pyrenoidae Hal. In dem dritten Bande der „Transactions of the entomological society“ hat *Haliday* diese kleine Familie als eine Tribus der Chalcidien abgegränzt und für die Unterscheidung der Gattungen folgendes Schema aufgestellt:

a. Maxillartaster viergliedrig.

b. Augen in beiden Geschlechtern weit abstehend **Calypso Hal.**

bb. Augen beim ♂ genähert **Macroglenes Westw.**

aa. Maxillartaster zweigliedrig **Pirene Hal.**

Von den drei hier aufgestellten Gattungen kommen *Macroglenes* und *Pirene* in hiesiger Gegend gar nicht selten vor, die erstere habe ich früher in meinen Beiträgen zur Monographie der Pteromalinen unter dem Namen *Stenophrus* beschrieben, die zweite Gattung hat *Nees* unter dem Namen *Corynocere* in seinem bekannten Werke aufgeführt. Die Gattung *Calypso* erscheint in dem vorstehenden Schema nicht vollständig charakterisirt, da nicht angegeben wird, wie das ♀ dieser Gattung sich von dem ♀ der Gattung *Macroglenes* unterscheiden soll. Mir ist die Gattung *Calypso* in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen, auch in keiner anderen Sammlung habe ich sie bis jetzt in Deutschland gefunden.

7. Spalangoidae. So arm und noch ärmer, wie die vorhergehende Familie, erscheint auch diese, da nur zwei Gattungen bis jetzt aufgefunden wurden, welche zudem auch nicht viele Spezies in der europäischen Fauna aufweisen können. Die eine derselben *Spalangia* hat *Latreille*, die andere *Westwood* aufgestellt, und zwar die letztere unter doppeltem Namen, *Cerocephala* und *Theocolax*. Die beiden Gattungen unterscheiden sich, wie folgt:

*) Entom. Mag. V, pag. 115.

**) *Nees ab Esenbeck*. Hym. ich. etc. vol. II, pag. 80.

- a. Fühler unmittelbar über dem Mundrande eingefügt *Spalangia Latr.*
 aa. Fühler weit über dem Mundrande entspringend *Cerocephala Westw.*

Diese beiden Gattungen unterscheiden sich, wie man sieht, durch die Insertion der Fühler sehr gut, aber es gibt noch andere sehr leicht in die Augen fallende Merkmale, die ich hier noch kurz anführen will. Bei *Cerocephala* nämlich ist das Gesicht sehr tief ausgehöhlt und von der Stirne herab senkt sich eine scharfe zugespitzte Schneide gleichsam wie ein Keil in dasselbe hinab, die Backen springen ebenfalls als scharfe Ränder weit vor, so dass der Kopf dieser Gattung und zwar namentlich beim ♂ stärker als beim ♀ ein so scharf ausgeprägtes eigenthümliches Ansehen erlangt, dass man ihn nicht leicht mit einer anderen Gattung verwechseln kann. Weil die Wangen in der Mitte mehr oder weniger zahnartig zugespitzt erscheinen, so bezeichnete *Walker* den Kopf vorne als dreizählig (*Caput antice tridentatum*), was streng genommen nicht auf alle Individuen passt. Die ♂ und ♀ haben in der Flügelbildung noch etwas Charakteristisches, indem der *ramus humeralis* da, wo er sich mit dem Vorderrande verbindet, einen deutlichen Haarbüschel trägt, wie es *Ratzburg* im zweiten Bande der *Ichneumon*en der Forst-Insekten, Tab. III, fig. 1, bei seiner Gattung *Sciatheras* ganz richtig beobachtet und dargestellt hat. (Mit zweifelloser Gewissheit ist die Gattung *Sciatheras* mit *Cerocephala* identisch und als synonym derselben zu betrachten.) *Walker* hat dem Haarbüschel an der Spitze des *ramus humeralis* eine ganz andere Deutung gegeben, *) er sagt, der *ramus marginalis* (*pars ulnaris* nach *Walker*) habe an der Basis einen kurzen, breiten, aufrecht stehenden Dorn. Diese Angabe ist nur dann erklärlich, wenn wir annehmen, *Walker* habe bei der Untersuchung des Flügels ein Exemplar vor Augen gehabt, bei welchem die Haare des Haarbüschels (vielleicht durch Feuchtigkeit veranlasst) zusammen geklebt seien; auf diese Weise könnten sie wohl in der Weise, wie *Walker* es gethan, angesehen und bezeichnet worden sein. Unrichtig ist es aber jedenfalls, wenn der Haarbüschel an die Basis des *ramus marginalis*, statt an die Spitze des *ramus humeralis* verlegt wird.

Walker hat in dem „Ent. Mag.“ **) zwei Arten angeführt, *cornigera Westw.* und *formiciformis Westw.* Beide halte ich für dieselbe Art, die in Bezug auf Färbung und selbst auf die Kopfbildung, sowie nicht minder in der Grösse bedeutend variirt. Oft sind nicht zwei Exemplare völlig gleich gebildet. Der Name *cornigera*, als der ältere, würde beibehalten werden müssen und die Synonymie wäre folgende:

Cerocephala cornigera Westw.

Guérin, Magasin de Zoologie, première Livraison, pl. 4. (1831.) ♂.

Theocolax formiciformis Westw. Lond. and Edin. Phil. Mag. Third Series. Vol. I, Nro. II, pag. 127. (1832.) ♀.

Laesthia vespertina Hal. Ent. Mag. Vol. I, pag. 335. (1833.) ♂. ♀.

Epimacrus rufus Walk. Ent. Mag. Vol. I, pag. 369. (1833.) ♀.

Sciatheras trichotus Ratzb. Ichneum. der Forst-Ins. II. Bd. pag. 209. (1848.) ♀. *alata*.

*) Vide Ent. Mag. Vol. II, pag. 148. „*Alae nunc minimae, nunc amplae: nervi soliti pars humeralis brevis; pars ulnaris longior, basi spinam erectam brevem latam gerens.*“

**) Vide Ent. Mag. Vol. II, pag. 149.

Die ♀ dieser Gattung sind meist ungeflügelt, ich besitze solche ungeflügelte Individuen von Aachen und Köln, und aus der Gegend von Lüttich auch zwei geflügelte, welche von jenen sich durchaus nicht unterscheiden lassen.

8. Eucharoidae. Zu dieser Familie gehört nur eine europäische Gattung.

9. Perilampoidae. Ich kenne hier drei Gattungen, welche sich leicht von einander unterscheiden lassen.

a. Hinterleib nicht gestielt **Perilampus Latr.**

aa. Hinterleib deutlich gestielt.

b. Mesonotum und Schildchen tief grubig punktirt **Lamprostylus m. *)**

bb. Mesonotum und Schildchen nicht grubig punktirt. **Elatus Walk. **)**

Perilampus ist eine allgemein bekannte, über den grössten Theil Europa's verbreitete Gattung; sie scheint nur im höchsten Norden zu fehlen, da sie in der „Fauna Lapponica“ von Zetterstedt nicht aufgeführt wird. Der Hinterleib derselben ist nicht deutlich gestielt, doch auch nicht völlig sitzend, da das erste Segment nach der Basis hin sich bedeutend verschmälert. Die beiden anderen Gattungen lassen sich sehr leicht durch den deutlichen Stiel trennen und unterscheiden, während sie selbst unter einander durch die charakteristische Sculptur des Mesonotums und des Schildchens verschieden sind. Bei Lamprostylus stimmt diese Sculptur genau mit Perilampus überein, bei Elatus weicht sie dagegen bedeutend ab.

Walker hat die Gattung Elatus zuerst aufgestellt, war aber in Zweifel, welcher Familie er sie einverleiben sollte. Während er Perilampus zu den Eucharoiden zählt, führt er sie, obgleich frageweise, gleich hinter Perilampus in derselben Familie auf. Ich habe früher gezeigt, dass die Eucharoiden besser eine für sich abgeschlossene Familie bilden, dass ebenso Perilampus eine eigene Familie bilden muss und mit dieser letzteren muss unzweifelhaft Elatus vereinigt werden, da bis auf die Sculptur und den gestielten Hinterleib eine völlige Uebereinstimmung zwischen beiden Gattungen Statt findet.

10. Ormyroidae. Nur eine Gattung ist bis jetzt bekannt geworden, nämlich die von Westwood im Jahre 1832 aufgestellte Gattung Ormyrus, für welche bereits mehrere Synonyme hier angeführt werden können. Bohemann beschrieb sie im Jahre 1833 unter dem Namen Periglyphus und Nees im folgenden Jahre als Siphonura. Ferris nannte sie Cyrtosoma, wenn das Citat bei Walker ***) richtig ist. Er gibt nämlich Cyrtosoma Papaveris als Synonym von Ormyrus tubulosus (= Cynips tubulosa Fonsc.) an, obgleich Ormyrus tubulosus in Eichengallen vorkommt und eine aus Papaver gezogene Art schwerlich damit identisch sein wird. Ob nun der Gattungsname Ormyrus als der älteste anzusehen und deshalb beizubehalten ist, scheint, wenn wir den Nomenclator

*) Lamprostylus von λαμπρός, ἄ, ὄν, leuchtend, glänzend, dann auch deutlich und στῦλος, ὅ, die Säule, Pfahl, Geissel, auch Stiel. Eine Andeutung auf den deutlich gestielten Hinterleib, das Hauptmerkmal der Unterscheidung von Perilampus.

**) Elatus Walk. n. gen., siehe List of the Spec. of Hym. ins. of the Brit. Museum, part. II. Chalcidites. pag. 104 und Appendix, pag. 153. This genus has a peculiar form, and some what resembles Perilampus and Callimome.

***) List of the Spec. of Hym. ins. Chalcidites. part. I, pag. 20.

von *Agassiz* zur Hand nehmen, nicht ganz gewiss zu sein, denn hier finden wir in der Gruppe der Chalciditen von *Walker* im Jahre 1829 auch eine Gattung *Cyrtosoma* aufgestellt, welche indess wohl schwerlich mit der *Westwood'schen* Gattung identisch ist, weil in diesem Falle *Walker* das Prioritätsrecht in Anspruch genommen hätte.

11. Tormyidae. Die Uebersicht der Gattungen dieser Familie, welche *Walker* in dem „Ent. Mag. vol. I, pag. 116“ bekannt gemacht hat, muss hier, da die beiden dort mit aufgeführten Gattungen *Ormyrus* und *Perilampus* ausgeschieden wurden, in veränderter Form auftreten, um so mehr, da einige neue Gattungen hinzukommen.

- a. Die hintersten Schenkel gezähnt und zugleich gesägt oder gekerbt.
 - b. Die hintersten Schienen stark gekrümmt **Palmon Walk.**
 - bb. Die hintersten Schienen nicht gekrümmt **Cryptopristus m. *)**
- aa. Die hintersten Schenkel nicht zugleich gezähnt und dabei gesägt oder gekerbt.
 - c. Die hintersten Schenkel gezähnt.
 - d. Die hintersten Hüften gezähnt (Mittelleib lederartig-runzlig) **Monodontomerus Westw.**
 - dd. Die hintersten Hüften nicht gezähnt (Mittelleib tief punktirt) **Diomorus Walk.**
 - cc. Die hintersten Schenkel nicht gezähnt.
 - e. Die hintersten Schenkel sehr fein gekerbt **Glyphomerus m. **)**
 - ee. Die hintersten Schenkel gar nicht gekerbt.
 - f. Der ramus postmarginalis so lang wie der ramus marginalis oder länger; der ramus stigmaticus mit einem dicken Knopf **Megastigmus Spin.**
 - ff. Der ramus postmarginalis vielmal kürzer als der ramus marginalis; der ramus stigmaticus ohne dicken Knopf.
 - g. Das Schildchen vor der Spitze durch eine stark vertiefte Querlinie getheilt und hinter derselben ganz glatt **Syntomaspis m. ***)**
 - gg. Das Schildchen nicht durch eine Querlinie getheilt.
 - h. Die Furchen der Parapsiden treffen ganz in der Nähe des Schildchens auf die Achseln . . . **Lochites m. †)**
 - hh. Die Furchen der Parapsiden treffen in einiger Entfernung von dem Schildchen auf die Achseln **Callimome Spin.**

*) *Cryptopristus m.* von *κρυπτός, ή, όν*, versteckt, verborgen und *πριστός, ή, όν*, gesägt.

**) *Glyphomerus m.* von *γλύφω*, aushöhlen, ausgraben, *kerben* und *μηρός, ό*, der Schenkel. Also mit gekerbtem Schenkel.

***) *Syntomaspis* von *σύντομος, ον*, beschnitten, abgekürzt und *ἀσπίς, ἴδος, ή*, der Schild. Durch die Quersfurche wird ein Theil des Schildchens abgeschnitten und das ganze Schildchen dadurch gleichsam verkürzt.

†) *Lochites* von *λοχίτης, ό*, im Hinterhalt liegend, auflauernd, nachstellend. Bezieht sich auf die Lebensweise.

Schon oben wurden bei Beleuchtung des Familiennamens die Gründe angeführt, welche mich bewogen haben, den Gattungsnamen *Torymus* fallen zu lassen, ich habe ihn hier durch *Cryptoprismus* ersetzt und muss die Aufnahme oder Verwerfung desselben von der Billigung oder Missbilligung jener Gründe abwarten. Jedenfalls würde durch die Verwerfung des Gattungsnamens *Torymus* jeder Verwirrung und Zweideutigkeit vorgebeugt werden. Die einzige Spezies, auf welche *Walker* das Genus *Torymus Dalm.* bezogen hat und die nun *Cryptoprismus caliginosus Walk.* heissen muss, ist nicht etwa eine von *Dalman* bereits gekannte und beschriebene, sondern von *Walker* selbst entdeckte Art aus dem südlichen Frankreich, ein Grund mehr, auf die Anwendung des Namens *Torymus* nicht einzugehen. *Walker* kannte von seiner Art nur das ♀, während in hiesiger Gegend ♂ und ♀ vorkommen, aber sehr selten sind.

Die neue Gattung *Glyphomerus* habe ich von *Monodontomerus* getrennt und auf den *Monodontomerus stigma F.* (*Torymus ater Nees*) gegründet, auch bereits eine zweite Art, welche ich *Glyphomerus tibialis* nenne, entdeckt. Durch zwei wesentliche Merkmale unterscheidet sich unsere neue Gattung von *Monodontomerus Westw.* nämlich durch die nicht gezähnten, sondern blos sehr fein gekerbten hintersten Schenkel und dann durch die Unterrandader. *Glyphomerus* hat nämlich einen stark verlängerten, unter sehr spitzem Winkel entspringenden ramus stigmaticus, auch übertrifft der ramus postmarginalis an Länge den ramus stigmaticus, während bei *Monodontomerus* der ramus stigmaticus und postmarginalis kurz sind und der erstere unter einem viel stumpferen Winkel entspringt. Es kann auffallend erscheinen, dass dieses Verhältniss dem Scharfsinn der englischen Autoren bei einer so häufig vorkommenden Art entgangen ist.

Die Gattung *Syntomaspis* habe ich auf den *Torymus chrysis Nees* und *Torymus eurynotus m.* gegründet. Diese beiden Arten zeichnen sich durch einen kurzen gedrungenen Körperbau und insbesondere durch die eigenthümliche Theilung des Schildchens aus.

Von *Callimome* unterscheidet sich die Gattung *Lochites* hauptsächlich durch die Theilung des Mesonotums und die Richtung der Furchen. Die einzige bekannte Art habe ich aus den Fruchtgallen von *Papaver Rhoeas* und *dubium* in der Nähe von Aachen mit vielen anderen Parasiten erzogen. Sie zerstört die Larven von *Aulax Rhoeadis Hart.* Es ist eine sehr selten vorkommende und meist nur durch die Zucht zu erhaltende Art; die ♂ sind viel seltener als die ♀.

12. *Eurytomoidae.* Diese Familie enthält nur wenige Gattungen, ist aber sehr reich an Arten. Der Reichthum der letzteren nimmt mit jedem Jahre zu, aber die Zahl der Gattungen hat sich seit dem Jahre 1833, in welchem *Walker* einen *Conspectus* derselben in dem „Ent. Mag. Vol. I, pag. 13“ veröffentlichte, nicht vermehrt. Ich habe zur Unterscheidung der Gattungen etwas schärfere Merkmale hervorzuheben mich bemüht und glaube, dass man nach dem hier aufgestellten und von dem *Walker'schen* etwas abweichenden Schema die Gattungen mit mehr Sicherheit wird unterscheiden können.

- a. Die hintersten Schienen in beiden Geschlechtern mit einer feinen Borstenreihe ***Decatoma Spin.***
- aa. Die hintersten Schienen ohne Borstenreihe.
- b. Der Rücken des Pro- und Mesothorax sammt dem Schildchen dicht mit tiefen Grübchen versehen ***Eurytoma Ill.***

bb. Der Rücken des Pro- und Mesothorax und das Schildchen nicht zugleich mit tiefen Grübchen versehen.

c. Das Metanotum senkrecht abgestutzt. **Systole Walk.**

cc. Das Metanotum nicht senkrecht abgestutzt. **Isosoma Walk.**

Bei Aufstellung einer schematischen Uebersicht der Gattungen muss vor Allem auf die beiden Geschlechter Rücksicht genommen werden und diejenigen Merkmale sind natürlich die besten, welche dem ♂ und ♀ zugleich zukommen. Aus der Uebersicht bei *Walker* sehen wir die beiden Gattungen *Isosoma* und *Systole* durch den cylindrischen Hinterleib von *Eurytoma* und *Decatoma*, welche einen von der Seite zusammen gedrückten Hinterleib haben, geschieden, obgleich dieses Merkmal, in seiner ganzen Schärfe angewendet, nicht überall stichhaltig erscheint. Ferner ist nicht ersichtlich, wie die ♀ von *Eurytoma* und *Decatoma* sich unterscheiden sollen, da beiden keulförmige Fühler zukommen und ein anderes Merkmal der Unterscheidung nicht angegeben wird. Die Veränderung des *Walker'schen* Schema's scheint mir nach diesen Andeutungen wohl gerechtfertigt.

Betrachten wir nun die einzelnen Gattungen der Reihe nach, so lassen sich hin und wieder auch noch andere Merkmale angeben, wodurch der Gattungscharakter noch deutlicher hervortritt. So zeichnen sich z. B. die ♂ der Gattung *Decatoma* durch die keulförmige, fünfgliedrige, nicht gesägte Form der Geissel von *Eurytoma* und *Isosoma* aus und das letzte Glied ist deutlich dreiringelig; zudem zeigen beide Geschlechter noch einen schönen Charakter in der Flügelbildung. Es ist nämlich der *ramus marginalis* besonders verdickt und unter demselben liegt eine mehr oder weniger verkürzte braune Binde oder ein rundlicher Flecken. Bei *Eurytoma* haben die ♂ eine stark gesägte Fühlergeissel und die beiden letzten Glieder derselben sind so enge mit einander verbunden, dass die Geissel, abgesehen von dem sehr kleinen Grundglied, (Ringel) scheinbar sechsgliedrig zu sein scheint; nur bei genauer Betrachtung erkennt man das sechste Glied als zweiringelig. Sehr selten sind die beiden Endglieder der Geissel deutlich von einander getrennt. Beim ♀ von *Eurytoma* finden wir den Hinterleib von der Seite zusammen gedrückt, oft so stark, dass schon ein flüchtiger Blick sie leicht von den ♀ der übrigen Gattungen dieser Familie unterscheidet. Bei einigen Arten ist aber dieses Merkmal weniger in die Augen fallend, so dass es strenge genommen keinen durchgreifenden Gattungscharakter bildet. Die Untersuchung einer grossen Menge Arten dieser Gattung sowie auch der Gattung *Isosoma* haben mir die Ueberzeugung gegeben, dass die Sculptur des Pro- und Mesonotums sammt dem Schildchen das sicherste Kennzeichen zur Unterscheidung beider Gattungen bildet.

Obgleich die beiden Gattungen *Eurytoma* und *Isosoma* dem ungeübten Auge noch manche Schwierigkeiten darbieten, so ist doch nicht zu verkennen, dass auch *Isosoma* als eine fest begründete Gattung angesehen werden muss. Der mehr in die Länge gezogene, offenbar walzenförmige Körperbau, der nicht von der Seite zusammen gedrückte und auch selten etwas niedergedrückte Hinterleib, die Bildung der Fühler beim ♂, und die eigenthümliche Sculptur unterscheiden sie mehr als genügend von *Eurytoma*. Die männlichen Fühler haben eine siebengliedrige Geissel, es sind also die beiden Endglieder nicht enge mit einander verbunden, wie bei *Eurytoma*, obgleich manchmal doch ziemlich nahe gerückt, auch ist die Geissel nicht gesägt, noch weniger aber keulförmig wie bei *Decatoma*.

Mit der Gattung *Systole* könnte sehr leicht eine Verwechslung Statt finden, wenn wir bloß auf die Fühler Rücksicht nehmen wollten, denn dadurch unterscheidet sich diese Gattung nicht von *Eurytoma* und selbst nicht einmal von *Isosoma*, wenn wir einzelne Spezies der letzteren Gattung in Betracht ziehen. Dagegen weicht *Systole* ganz entschieden durch die Sculptur von *Eurytoma* sowie durch den Bau des Metanotums von *Isosoma* ab. Der Rücken des Metathorax ist nämlich bei *Systole* schon von der Basis aus fast senkrecht abgestutzt, also völlig abschüssig, bei *Isosoma* ist das aber nie der Fall, sondern hier ist er deutlich genug mehr dickwalzig, ja mitunter fast konisch verlängert. Dieses Merkmal des Metathorax-Rückens halte ich bei *Systole* für ein entscheidendes Gattungsmerkmal, viel geeigneter zur sicheren Unterscheidung, als der kurze und gedrungene Körperbau oder die Bildung der Fühler. Vermittelt genauer Untersuchung desselben ist es mir auch gelungen, die ♂ dieser Gattung, welche *Walker* unbekannt geblieben zu sein scheinen, zu entdecken, sie stimmen mit den ♀ nicht nur im Bau des Hinterrückens, sondern auch in der Form und Sculptur des Pro- und Mesonotums, sowie des Schildchens völlig überein, weichen aber in der Fühlerbildung ab, die sich mehr an *Eurytoma* anschliesst, obgleich die Geißel bei *Systole* nicht so scharf gesägt ist wie bei jener Gattung.

14. *Cleonymoidae*. In der Beschränkung, welche ich in dieser Familie für nothwendig erachtete, enthält dieselbe dennoch eine merkwürdige Zusammenstellung von Gattungen, die in ihrem Gesammthabitus zwar eine gewisse verlängerte und gestreckte Körpergestalt zeigen, aber in den einzelnen Gattungstypen so stark von einander abweichen, dass dadurch das ohnehin lockere Familienband sie kaum zusammen hält und später vielleicht eine grosse Zersplitterung Statt finden wird. Die Kenntniss der Gattungen wird allerdings durch den scharf ausgeprägten Typus sehr erleichtert und bietet nur wenige Schwierigkeiten dar; sie werden sich nach dem folgenden Schema wohl leicht bestimmen lassen:

a. Ungeflügelt.

b. Bohrer kaum vorragend *Tricoryphus m.* *)

bb. Bohrer sehr weit vorragend. *Cea Hal.*

aa. Geflügelt.

c. Die vordersten Schenkel sehr stark verdickt *Heydenia m.* ♂ ♀ **)

cc. Die vordersten Schenkel nicht verdickt.

d. Fühler wirtelig behaart *Plutothrix m.* ***)

dd. Fühler nicht wirtelig behaart.

e. Das zweite Segment mit einem Quereindruck *Tetracampe m.*

ee. Das zweite Segment ohne Quereindruck.

*) *Tricoryphus* von *τρικόρυφος*, dreispitzig. Der Name bezieht sich auf die drei Lappen des Mittelbruststückens, welche nach hinten stark zugespitzt sind und am Schildchen fast zusammen stossen.

**) *Heydenia* n. pr. Diese Gattung habe ich nach dem Namen eines um die Entomologie hochverdienten Mannes aufgestellt, des Herrn Senators von *Heyden* in Frankfurt.

***) *Plutothrix* von *πλοῦτος*, ó, der Reichtum oder reich und *θηλή*, ῆ, das Haar. Der Name bezieht sich auf den Reichtum der Wirtelhaare an der Fühlergeißel.

- f. Das Schildchen vor der Spitze mit einer tiefen Querfurche.
- g. Die Furchen der Parapsiden überall deutlich **Trigonoderus Westw.**
- gg. Die Furchen der Parapsiden nach dem Schildchen hin ganz verschwindend. **Caudonia Walk.**
- ff. Das Schildchen vor der Spitze ohne Querfurche.
- h. Mittelschienen nebst Fersen stark verdickt **Prosopon Walk.**
- hh. Mittelschienen nebst Fersen nicht verdickt.
- i. Flügel an der Basis mit einer starken schwielenförmigen Verdickung am Vorderrande **Platynochaetus Westw.**
- ii. Flügel ohne Schwiele.
- k. Fühlerkeule auf der Unterseite schief abgestutzt. **Notanissus Walk.**
- kk. Fühlerkeule auf der Unterseite nicht schief abgestutzt.
- l. Zwischen dem Stielchen und der Geißel zwei Ringel (annelli) **Macroneura Walk.**
- ll. Zwischen dem Stielchen und der Geißel nur ein Ringel.
- m. Fühler zwölfgliedrig ♂ ♀ **Cleonymus Latr.**
- mm. Fühler dreizehngliedrig **Merostenus Walk.**

Von der Gattung *Tricoryphus* habe ich drei ungeflügelte, ganz übereinstimmend gebildete ♀ vor mir, zwei von Aachen und das dritte von Crefeld. Wegen der stärkeren Entwicklung des Prothorax habe ich sie zu den *Cleonymoiden* und nicht zu den *Miscogastroiden* gestellt. Die Fühler sind dreizehngliedrig mit einem Ringel, die Geißel keulförmig, ihre Glieder allmählich an Länge abnehmend, aber an Breite wachsend. Die Bildung des Mesonotums ist besonders dadurch charakteristisch, dass die Furchen der Parapsiden sich in der Nähe des Schildchens so stark nähern, dass sie beinahe zusammen stoßen. Der Hinterleib hat einen zwar kurzen, aber sehr deutlichen dicken Stiel und das darauf folgende Segment nimmt fast die Hälfte des übrigen Hinterleibs ein. Der Bohrer ragt nur sehr wenig vor und hat dicke Klappen. Die hintersten Hüften sind besonders stark entwickelt, sehr lang und konisch zugespitzt.

Die sehr seltene Gattung *Cea* schliesst sich in der Bildung des deutlich gestielten Hinterleibs genau an *Tricoryphus* an, aber der Bohrer ragt weit vor und erreicht nahezu die Länge des ganzen Hinterleibs, während er bei *Tricoryphus* kaum sichtbar wird. In der Bildung des Mesonotums weichen beide Gattungen aber sehr von einander ab, indem sich bei *Cea* die Furchen der Parapsiden in der Nähe des Schildchens nicht bedeutend nähern. Von dieser schönen Gattung hat „*Newman's Entomologist*“ auf Plate O, Nro. 4, eine vortreffliche Abbildung gegeben und unter Nro. 4, a, den Fühler vergrößert dargestellt. Dieser Fühler war aber an dem der Abbildung zu Grunde liegenden Exemplar an der Spitze verstümmelt, übrigens getreu dargestellt, obgleich mit der Angabe *Walker's* im „*Ent. Magazine*“ *) nicht übereinstimmend. Denn hier sagt er, das dritte und die folgenden Fühlerglieder seien gleich, obgleich, wie die Abbildung deutlich zeigt, das sogenannte dritte Fühlerglied in drei kleine Ringel zerfällt. Die Abbildung stimmt auch mit meinen

*) *Ent. Mag.* Vol. IV, pag. 355. Antennae articulus tertius et sequentes breviores, aequales, approximati etc.

Beobachtungen überein, ich habe zwei Exemplare von *Cea pulicaria* Hal. vor Augen, das eine von Frankfurt aus der Sammlung des Herrn von Heyden und das andere von mir selbst bei Cöln am Rheinufer (im Sande) gefangen, beide zeigen deutlich drei Ringel und das letzte Geisselglied löst sich ziemlich deutlich in drei einzelne Glieder auf, so dass der Fühler wirklich dreizehngliedrig ist. Auch die zweite von Walker beschriebene, von Haliday in Irland in der Nähe von Dublin entdeckte Art *Cea Irene* ♀, wird wohl dreizehngliedrige Fühler haben, obgleich Walker sie nur als neungliedrig angibt. Hier wird wohl bei der Zählung der Glieder dieselbe Betrachtungsweise *) geltend gewesen sein, wie bei *Cea pulicaria*, indem die drei Ringel und eben so die drei letzten, enge zusammen geschobenen Glieder der Geissel jedesmal als ein einziges Glied angesehen wurden, wodurch ein Ausfall von vier Gliedern Statt fand und natürlich statt dreizehngliedriger Fühler nur neungliedrige in Betracht kommen konnten. Die *Cea pulicaria* ist bis jetzt nur im ungeflügelten Zustande vorgekommen, während die zweite Art, *Cea Irene*, geflügelt gefunden wurde. Walker vergleicht sie in ihrer Verwandtschaft mit *Gastrancistrus* und glaubt, sie könnte vielleicht als ein Mittelglied im Uebergange zu den Mymaroiden angesehen werden.

Heydenia ist unstreitig die schönste und durch viele charakteristische Merkmale ausgezeichnete Gattung unter den Cleonymoiden. Die Fühler sind dreizehngliedrig, die Geissel fadenförmig, ihre Glieder lang gestreckt, walzig, nach der Spitze hin allmählig an Länge abnehmend, das letzte Glied dreiringelig, aber so, dass die drei einzelnen Glieder noch deutlich, nicht besonders verdickt und so lang sind wie die beiden vorhergehenden zusammen genommen. Es ist nur ein Ringel vorhanden und dieses ist zwar sehr kurz, aber so dick, wie das folgende stark verlängerte und grösste Geisselglied. Beim ♀ haben die Fühler genau dieselbe Bildung, nur sind sie ein wenig kürzer und nach der Spitze hin etwas mehr verdickt, also mehr keulförmig. Der Thorax, welcher sehr stark verlängert ist, erinnert durch seine besondere Form an den *Dryinus formicarius* Latr., oder an die Gattung *Gonatopus* unter den Dryinoiden; der Prothorax ist nämlich sehr lang, eben so lang, wie der Mesothorax und durch eine leichte Einschnürung von demselben geschieden. An dem Mesothorax finden wir die Furchen der Parapsiden anfangs tief und scharf ausgeprägt, später aber, ehe sie das Schildchen oder die Achseln erreichen, spurlos verschwindend. Die Achseln sind nur durch einen kurzen Zwischenraum getrennt. Der Metathorax zeigt sich nicht besonders stark und eben so wenig eigenthümlich entwickelt. Der Hinterleib übertrifft den Mittelleib nicht an Länge, beim ♂ ist er sogar kürzer, hier zeigt er sich auch gestielt, beim ♀ sitzend, mit einem nur wenig vorragenden Bohrer. Auch die Flügel sind charakteristisch. Der ramus humeralis ist deutlich gebrochen, aber ohne rücklaufenden Ast, der ramus marginalis nicht besonders stark verlängert, aber ein wenig verdickt, namentlich an der Stelle, wo der kurze, unter einem sehr spitzen Winkel entspringende ramus stigmaticus sich davon abscheidet; der ramus postmarginalis ist auffallender Weise hier sehr kurz, obgleich immer noch ein wenig länger, als der obengenannte ramus

*) Um aller Verwirrung und allen Zweideutigkeiten bei Angabe der Gliederzahl der Fühler künftig vorzubeugen, wäre es gewiss wünschenswerth, dass in Zukunft auch selbst diese kleinen Glieder an der Basis der Geissel (annelli) und eben so genau die an der Spitze der Geissel mitgezählt würden. Ob diese Glieder klein sind oder nicht, ob mehrere enge zusammen gezogen und scheinbar nur ein einziges Glied bilden, kann doch in Bezug auf die wirklich vorhandene Anzahl gar nicht in Betracht kommen und sie auch nicht verringern.

stigmaticus. Diese geringe Entwicklung des ramus postmarginalis erscheint bei den Cleonymoiden als eine besondere Eigenthümlichkeit. Die Beine zeigen sich stark entwickelt, die Vorderschenkel sind sogar in beiden Geschlechtern sehr stark verdickt und beim ♂ bemerkt man an dem scharfen unteren Rande derselben eine breite Ausrandung in der Mitte, wodurch an beiden Seiten derselben fast eine zahnartige Spitze hervortritt. Auch die Schienen zeigen eine kräftige Ausbildung, ebenso die Vorder- und Hinterhüften, die Tarsen lassen dagegen keinen besonders kräftigen Bau wahrnehmen. Ich kenne von dieser interessanten Gattung nur eine Art, *Heydenia pretiosa*, ♀ ♂, welche Herr von Heyden bei Frankfurt aus altem Holz erzog; wahrscheinlich zerstört sie hier Käferlarven.

Wenn bei der Gattung *Plutothrix* die Fühler nicht die eigenthümliche wirtelige Behaarung zeigten, würde man sie leicht für das ♂ irgend einer *Trigonoderus*-Art halten können; bei der letzteren Gattung sind die Fühler zwar auch mitunter länger behaart, aber die Haare stehen doch nicht so stark und wirtelig ab. Immerhin bleibt aber die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass das ♀ von *Plutothrix*, wenn es einst entdeckt werden sollte, sich als ein ächter *Trigonoderus* auswies, in diesem Falle wäre dann die Gattung natürlich zu unterdrücken.

Für die Gattung *Tetracampe*, welche ich bereits in meinen Beiträgen zur Monographie der Pteromalinen, 1841, aufgestellt habe, weiss ich, wegen der starken Entwicklung des Prothorax keine andere Stellung, als hier unter den Cleonymoiden. In Bezug auf die Fühler ist hier ein Irrthum zu berichtigen; in jener Abhandlung habe ich die Fühler als zehngliedrig angegeben, während sie nach genauerer Untersuchung sich als zwölfgliedrig erweisen. Höchst wahrscheinlich habe ich früher das Endglied der Geissel, welches aus drei sehr enge zusammen geschobenen und fast nicht trennbaren Gliedern besteht, für ein einziges Glied angesehen. Am Grunde der Geissel ist ein Ringel, aber so klein und versteckt, dass man nur unter dem Compositum eine Ansicht und die Ueberzeugung von seinem Dasein gewinnen kann. Die Vorder- sowie die Hinterflügel haben eine rücklaufende Ader; in den Vorderflügeln ist der ramus humeralis deutlich kürzer als der sehr stark entwickelte ramus marginalis, der ramus stigmaticus erscheint sehr kurz und der ramus postmarginalis ist ungefähr dreimal länger als dieser. Diese Gattung hat im ♀-Geschlecht eine sehr grosse Verwandtschaft mit *Epiclerus Hal.*, ist aber leicht davon zu trennen, wenn man die Zahl der Tarsenglieder in Betracht zieht, denn hiernach gehört *Epiclerus* zu den Tetrameren- und *Tetracampe* zu den Pentameren-Gattungen.

Durch den Reichthum an Arten ist in dieser Familie allein die Gattung *Trigonoderus* ausgezeichnet, von allen übrigen sind höchstens zwei oder drei Arten bekannt geworden. *Walker* hat diese Gattung zu den Pteromaloiden gestellt, ich glaubte sie wegen der bedeutenden Entwicklung des Prothorax und der starken Verlängerung des ramus postmarginalis zu dieser Familie bringen zu müssen, sie mag hier als ein natürliches Bindeglied zwischen den Pteromaloiden und Cleonymoiden den Uebergang von der einen zu der anderen Familie vermitteln. Von *Trigonoderus* weiss ich die Gattung *Hetroxys Westw.* (muss wohl *Etroxys* geschrieben werden?) nicht durch ein bestimmtes und scharf trennendes Merkmal zu unterscheiden. Zwar hat *Walker* in dem „Ent. Magazine, Vol. IV, pag. 9 und 15“ von beiden Gattungen den Gattungscharakter weitläufig entwickelt, aber bei der sorgfältigsten Prüfung war es mir unmöglich, zu einem entscheidenden Resultat zu gelangen, denn wenn bei *Etroxys* der Prothorax als kurz und bei *Trigonoderus* als sehr lang

angegeben wird, so trifft das doch nicht bei allen Arten so zu, dass nicht durch allmähliche Uebergänge dieses Merkmal der Unterscheidung allen Werth verlöre. Wichtiger erscheint mir, dass bei gleichem Habitus im Allgemeinen einige Arten von *Etroxys*, z. B. *fuscescens Walk.* und *stenogaster Walk.*, sich durch den Mangel der tiefen Querfurche an der Spitze des Schildchens und die nicht durchgehenden Furchen der Parapsiden von den übrigen Arten leicht abgränzen lassen. Diesen beiden würde ich, da sie auch einen sehr kurzen Prothorax haben, welcher vom Hinterrande unmittelbar nach vorne hin abschüssig ist, den Namen *Etroxys* lassen und diese Gattung mit den *Pteromaloiden* vereinigen, alle anderen Arten aber mit *Trigonoderus* verbinden.

Eine ausgezeichnete Form unter den *Cleonymoiden* bildet auch die Gattung *Platynocheilus Westw.*, mit welcher die von mir in den Beiträgen zur Familie der *Pteromalinen* beschriebene Gattung *Pteroncoma* als Synonym vereinigt werden muss. Das Hauptmerkmal, worauf die Gattung gegründet wurde, nämlich die merkwürdige Verdickung des *ramus humeralis*, welche den Raum bis zum Vorderrande ausfüllt und sich bis zum Ursprung des *ramus stigmaticus* erstreckt, ist zwar nur sexuell, denn es kommt blos dem ♂ zu, welches *Westwood*, der erste Begründer der Gattung, nur allein kannte. Ich besitze aber auch, wie ich fast mit zweifelloser Gewissheit angeben kann, das ♀, welches bereits von *Nees* unter dem Namen *Pteromalus cuprifons* beschrieben wurde. Dieses ♀ stimmt mit den ♂, abgesehen von der Flügelschwellung, in allen Stücken überein, nur der Kopf ist kupferfarbig. Die Fühler sind in dieser Gattung beim ♂ zwölf-, beim ♀ dreizehngliedrig mit zwei Ringeln, die aber sehr enge verbunden und nur schwer sichtbar sind, daher leicht für ein einziges Glied gehalten werden könnten. Die Furchen der Parapsiden gehen deutlich durch. Was aber diese Gattung noch als ein besonderes Merkmal in beiden Geschlechtern auszeichnet, das ist das Verhältniss des Pro- und Mesonotums zu einander, beide sind nämlich so innig mit einander verbunden, dass man sie nur bei der schärfsten Untersuchung als getrennte Theile erkennen kann.

Von der Gattung *Macroneura* sowie auch von *Merostenus* besitze ich nur ♂, die sich, da beide dreizehngliedrige Fühler haben, nicht leicht unterscheiden lassen, weil *Merostenus* ebenso wie *Macroneura* nur ein Ringel besitzt. Von der letzteren Gattung kennt *Walker* auch das ♀, welches sich vom ♂ durch zwei Ringel unterscheiden soll.

Auf den *Ichneumon depressus* hat *Latreille* *) schon im Jahre 1809 die Gattung *Cleonymus* begründet, in späteren Zeiten hat man damit manche Arten verknüpft, welche nur schlecht zusammen passten und daher auch wieder unter besonderen Gattungsnamen davon getrennt wurden. Dieses war der Fall bei *Nees*, **) welcher mit *Cleonymus depressus*, den er selbst nie gesehen, noch fünf andere Arten verbunden hat. Von diesen sind *Cleonymus bimaculatus*, *bicoloratus* und *immaculatus* höchst wahrscheinlich Arten der Gattung *Trigonoderus*, während *Cleonymus quadrum* zur Gattung *Pachychirus* und *Cleonymus elegans* zur Gattung *Chiloneurus* gehört. Die ächte *Latreille'sche* Gattung *Cleonymus* ist durch solche eigenthümliche Merkmale ausgezeichnet, dass man mit leichter Mühe ihre Arten zu entziffern im Stande sein wird. Höchst eigenthümlich erscheint schon die Fühlerbildung. Wir finden eilfgliedrige Fühler mit einem Ringel, das zehnte und eilfte Glied sind aber durch ihre Bildung besonders ausgezeichnet. Das zehnte ist nämlich nicht gänzlich

*) *Latr. Gen. Crustac. et Insect. Tom. IV, pag. 29.*

**) *Nees ab Esenbeck. Hymen. ichn. aff. monogr. Vol. II, pag. 84—89.*

abgestutzt, sondern an einer Seite stark verlängert und zugespitzt, das eilfte Glied sitzt nun auf dem abgestutzten Theile des zehnten auf und wird von der einseitigen Verlängerung desselben nur theilweise bedeckt, indem es noch darüber hinausragt. Höchst wahrscheinlich ist das eilfte Glied dreiringelig, (in diesem Falle wären die Fühler wirklich dreizehngliedrig) aber mit der schärfsten Loupe war eine Trennung nicht bemerklich. Bei dem ♂ sind die Fühler deutlich dreizehngliedrig und das letzte Glied erscheint dreiringelig, obgleich *Walker* *) nur zwölfgliedrige Fühler und nur eine zweiringelige Keule annimmt.

Prosopon, *Caudonia* und *Notanisis* sind Gattungen, die mir unbekannt geblieben und in Deutschland noch nicht aufgefunden wurden. Von der ersteren gibt „*Newman's Entomologist* auf Plate D, Fig. 4,“ eine Abbildung, nach welcher diese Gattung wohl mit Recht zu den *Pteromaloiden* gestellt werden müsste. Die Bildung der Mittelbeine, wodurch sie sich der Gattung *Eupelmus* nähert, **) würde beim Mangel anderer charakteristischer Merkmale, gegen diese Stellung nichts Erhebliches einwenden können. Auch von *Notanisis* gibt der *Entomologist* auf Plate A, fig. 3, eine Abbildung, nach welcher diese Gattung aber unverkennbar zu der Familie der *Cleonymoiden* gehört und durch die merkwürdige Fühlerbildung sich an *Cleonymus* anschliesst. Von *Caudonia* ist mir keine Abbildung bekannt.

14. *Miscogastridae*. Schon in dem ersten Bande des „*Ent. Magaz.*, Seite 371,“ hat *Walker* eine Uebersicht dieser Familie aufgestellt, die aber weder vollständig, noch auch bei Bestimmung einzelner Gattungen die nöthige Bestimmtheit und Sicherheit darbietet. So wie es aber überhaupt sehr schwer ist, bei den Gattungen einzelne charakteristische Merkmale aufzufinden, so wird diese Schwierigkeit auch noch durch die Geschlechtsdifferenzen vergrößert, und wenn daher schon jeder Versuch einer schematischen Darstellung bei so kleinen Thierchen einer nachsichtigen Beurtheilung unterliegt, so wird auch der Versuch, jenen Mängeln abzuweichen, weil eben so schwierig, auf gleiche Nachsicht Anspruch machen dürfen. Ich war genöthigt, durch die Aufnahme neuer Gattungen das Schema *Walker's* vielfach zu ändern und bin fast sicher, dass auch dieser neuen Uebersicht noch Mängel ankleben werden, die dem Scharfsinne späterer Forscher und Beurtheiler nicht entgehen werden. Ich stelle hier die Gattungen dieser Familie in folgender Gliederung auf:

- a. Der Kopf übermässig stark entwickelt; das Gesicht am inneren Augenrande mit zwei scharf vorspringenden Ecken *Caratomus Dalm.*
- aa. Der Kopf nicht übermässig stark entwickelt.
 - b. Der ramus marginalis so stark entwickelt, dass er den grössten Theil des Vorderrandes einnimmt *Dipara Walk. ♂.*
 - bb. Der ramus marginalis nicht besonders stark entwickelt.
 - c. Der ramus marginalis stark verdickt.
 - d. Mesonotum durch tiefe Furchen getheilt *Pachycrepis m.*
 - dd. Mesonotum nicht durch Furchen vollständig getheilt.

*) *Ent. Mag.* Vol. IV, pag. 349. Antennae 12-articulatae etc. 11^{us} et 12^{us} clavam fingentes conicam, acutam, subcavam.

**) *Ent. Mag.* Vol. IV, pag. 353, sagt *Walker* selbst: *Prosopon* resembles *Pteromalus*, but has dilated middle-feet like *Eupelmus*. Trotzdem stellt er sie in die Nähe von *Cea*.

- e. Hinterleib oben flach oder sogar eingedrückt **Pachyneuron Walk.**
- ee. Hinterleib oben convex gewölbt.
- f. Das sechste Segment (der Stiel als das erste gerechnet)
etwas länger als das fünfte, das siebente und achte sehr
klein ♀. **Euneura Walk.**
- ff. Das sechste Segment kaum ein Drittel (♀) oder kaum halb
(♂) so lang wie das fünfte; das siebente sehr klein, das
achte nicht sichtbar (vielleicht ganz fehlend) **Hypsicamara m. *)**
- cc. Der ramus marginalis nicht verdickt.
- g. Das letzte Glied der Maxillartaster stark vergrößert, kugelig
oder spatelförmig.
- h. Das dritte Segment nicht oder kaum kürzer als das zweite **Cyrtogaster Walk. ♂.**
- hh. Das dritte Segment viel kürzer als das zweite.
- i. Der Knopf des ramus stigmaticus stark verdickt . . . **Sphaeripalpus m. ♂.**
- ii. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht verdickt . . . **Pachylarthrus Westw. ♂.**
- gg. Das letzte Glied der Maxillartaster nicht vergrößert.
- k. Die Mitteltibien keulförmig **Spaniopus Walk.**
- kk. Die Mitteltibien nicht keulförmig.
- l. Der Prothorax-Rücken subquadratisch **Syntomopus Walk.**
- ll. Der Prothorax-Rücken vorne gerundet.
- m. Geisselglieder mit langen abstehenden Haaren.
- n. Fühler zwölfgliedrig mit einem Ringel; das
letzte Geisselglied nicht geringelt. **Arthrolysis m. **)**
- nn. Fühler dreizehngliedrig mit zwei Ringeln; das
letzte Geisselglied zweiringelig. **Dichalysis m.**
- mm. Die Geisselglieder nicht mit langen abstehenden
Haaren.
- o. Der ramus marginalis eben so lang wie der
ramus humeralis **Panstenon Walk.**
- oo. Der ramus marginalis kürzer als der ramus
humeralis.
- p. Das dritte Segment schliesst alle folgenden
ein und bedeckt sie **Cryptoprymna m.**
- pp. Das dritte Segment schliesst nicht alle fol-
genden ein.

*) Hypsicamara von ὑψι, hoch und καμάρα, η, das Gewölbe. Der Name bezieht sich auf die Wölbung des Hinterleibrückens.

**) Arthrolysis von ἀρθρον, τό, das Glied und λύσις, η, die Lösung, Auflösung. Der Name bezieht sich auf die Fühlergeissel, bei welcher alle Glieder deutlich getrennt sind, während bei der nächst verwandten Gattung Dichalysis die zwei letzten Glieder enge in einander geschoben sind.

- q. Fühler zwölfgliedrig *Isocyrtus Walk.*
- qq. Fühler dreizehngliedrig.
- r. Das fünfte Fühlerglied klein. *Micromelus Walk.*
- rr. Das fünfte Fühlerglied von mässiger Grösse.
- s. Der Knopf des ramus stigmaticus stark entwickelt . . . *Lamprotatus Westw.*
- ss. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht stark entwickelt.
- t. Der Hinterleibsstiel sehr verlängert *Sphegigaster Spin.*
- tt. Der Hinterleibsstiel kurz.
- u. Der Hinterleib von der Seite mehr oder weniger
zusammen gedrückt *Toxeuma Walk.*
- uu. Der Hinterleib nicht von der Seite zusammen gedrückt.
- v. Hinterleib nicht halb so breit wie der Mittelleib *Tityros Walk.*
- vv. Hinterleib ungefähr so breit wie der Mittelleib.
- w. Drittes Segment fast so gross wie das zweite.
- x. Der Hinterrand des zweiten Segments
weit ausgeschweift *Cyrtogaster Walk. ♀.*
- xx. Der Hinterrand des zweiten Segments
ganz gerade *Isocratus m.*
- ww. Drittes Segment viel kleiner als das zweite.
- y. Die Grösse des zweiten Segments kaum
ein Drittel der Länge aller folgenden
zusammen genommen betragend; Me-
tanotum ungekielt *Merisus Walk.*
- yy. Die Grösse des zweiten Segments be-
trägt mehr als die Hälfte der Länge
aller folgenden Segmente zusammen
genommen.
- z. Der eine Oberkiefer gebogen, der
andere gerade *Dicyclus Walk.*
- zz. Beide Oberkiefer gerade *Pachylarthrus Westw. ♀.*

Mit der Stellung der Gattung *Caratomus* zu den *Miscogastroiden* wird wohl Jeder sich einverstanden erklären müssen, wenn er die bedeutenden Abweichungen in Betracht zieht, welche diese Gattung von den *Perilampoiden* und *Eucharoiden* scheiden. Zuerst ist es die gänzlich verschiedene Sculptur, welche nicht im Entferntesten mit der von *Perilampus* verglichen werden kann; noch mehr aber das Flügelgeäder. *Caratomus* hat einen stark verlängerten *ramus stigmaticus*, er ist so lang, wie der *ramus marginalis*, während bei den Gattungen der *Perilampoiden* und noch mehr bei *Eucharis* der *ramus stigmaticus* viel kürzer erscheint. Die Bildung der Fühler hat wahrscheinlich über die unpassende Stellung bei den englischen Autoren entschieden, aber auch in Bezug auf die Fühler lässt sich nicht in Abrede stellen, dass *Caratomus* weder zu der einen noch der anderen Familie gehört. Eine genauere Vergleichung wird dieses zeigen. Durch die Bildung des Schaftes und des

Stielchens entfernt sich *Caratomus* bedeutend von den *Eucharoiden*, bei welchen beide so kurz sind, dass sie sich hierdurch an die ächten *Ichneumon*en und *Bracon*en anschliessen. Bei *Caratomus* ist der Schaft nun zwar von mässiger Länge, aber das Stielchen ist sehr lang, es erreicht die Länge der vier folgenden Geisselglieder zusammen genommen, und dadurch entfernt sich die Gattung eben so sehr von den *Perilampoiden*, wie durch das folgende erste Geisselglied. Bei den *Perilampoiden* bildet dieses letztere ein kleines unscheinbares Zwischenglied, (*annellus*) bei *Caratomus* aber ist es nicht bloss länger als das zweite Geisselglied, sondern auch verdickt und daher leicht in die Augen springend. So fällt also jeder Grund weg, die Gattung *Caratomus* mit den *Eucharoiden* oder *Perilampoiden* länger zu vereinigen. Der gestielte Hinterleib weist ihr aber unzweideutig ihre Stellung unter den *Miscogastroiden* an. Wenn auch die seltsame Kopfbildung Bedenken erregen könnte, so lässt sich doch fast mit Gewissheit annehmen, dass dieselbe bloss sexueller Natur sei und dem ♀, welches bis dahin noch unbekannt geblieben, fremd sein wird.

Von der Gattung *Dipara*, von welcher bis jetzt nur das ♂ bekannt war, glaube ich auch das ♀ entdeckt zu haben. Die Gattung charakterisirt sich im männlichen Geschlecht leicht dadurch, dass der *ramus marginalis* länger als der *ramus humeralis* ist. Die Geisselglieder sind verlängert, fast spindelförmig, langhaarig und die Fühler sowohl wie auch der ganze Habitus erinnert an die ♂ der Gattung *Ooctonus* oder *Polynema* unter den *Mymaroiden*. Bei dem von mir entdeckten ♀ ist dagegen der *ramus marginalis* deutlich kürzer als der *ramus humeralis*, die Geisselglieder sind sehr kurz, rundlich, aber eben so langhaarig, wie bei dem ♂. Im Habitus sowie auch in den einzelnen Theilen stimmt das ♀ genau mit dem ♂ überein. *Walker* gibt die Fühler von *Dipara petiolata* ♂ als zwölfgliedrig an, ich glaube aber ein kleines Ringelchen bei derselben Art zu sehen, wenn dieses wirklich vorhanden, dann wären die Fühler dreizehngliedrig.

Unter den Gattungen dieser Familie, bei welchen der *ramus marginalis* verdickt ist, zeichnet sich *Pachycrepis* durch die scharf markirten Furchen der *Parapsiden* aus, während bei den drei anderen diese Furchen sehr undeutlich sind und nach dem Schildchen hin bald gänzlich verschwinden. Die Gattung *Pachyneuron* ist durch den flachen, meist eingedrückten Hinterleibsrücken leicht zu erkennen, schwieriger aber wird man *Hypsicamara m.* und *Euneura Walk.* trennen können. Die letztere Gattung wurde im hohen Norden, zu Alten in Finnmarken entdeckt, und die Charakteristik, welche *Walker* *) davon aufstellt, passt, mit Ausnahme der Grössenverhältnisse zwischen den einzelnen Segmenten des Hinterleibs, so genau auf die Gattung *Hypsicamara*, dass ich beinahe Anstand genommen hätte, beide als gesonderte Gattungen aufzustellen. Da aber *Walker* nicht bloss in dem Gattungscharakter, sondern auch bei der Artbeschreibung die relative Grösse der einzelnen Segmente genau angibt, so lässt sich bei sorgfältiger Vergleichung an der Verschiedenheit beider Gattungen nicht länger zweifeln. Ich habe meine Gattung aus einer Blattlaus erzogen und zwar aus einem *Pemphigus*, und bei Frankfurt erzog sie Herr von *Heyden* höchst wahrscheinlich aus derselben Blattlaus von *Pinus sylvestris*.

So wie die Gattungen mit verdicktem *ramus marginalis* eine kleine Tribus in dieser Familie bilden könnten, so würden ebenfalls die Gattungen, bei welchen die ♂ ein stark vergrössertes Endglied der Maxillartaster besitzen, eine ähnliche kleine Abtheilung bilden. Es sind

*) Siehe Ann. of nat. Hist. 1844. pag. 331.

die Gattungen *Cyrtogaster*, *Pachylarthrus* und *Sphaeripalpus*. Die letztere habe ich in den Beiträgen zur Monographie der Pteromalinen, 1841, Seite 38, aufgestellt, hier aber die Fühler als zwölfgliedrig angegeben, während sie wirklich dreizehngliedrig sind, indem zwei Ringel vorhanden und das letzte Glied dreiringelig ist. Damals kannte ich nur eine Art, jetzt aber besitze ich noch drei neue Arten, welche unverkennbar demselben Genus angehören. Es unterscheidet sich die Gattung *Sphaeripalpus* zwar leicht durch die starke Entwicklung des Knopfes des ramus stigmaticus sowie durch die tiefen Furchen der Parapsiden von *Pachylarthrus* und noch leichter durch die Kürze des dritten Segments von *Cyrtogaster*, dagegen ist die Verwandtschaft mit *Lamprotatus* so gross und die Uebereinstimmung aller Körpertheile so in die Augen fallend, dass ich ausser dem stark entwickelten und übermässig verdickten Endglied der Maxillartaster keinen anderen Unterschied auffinden kann. Vielleicht ist auch diese Bildung nur sexuell, und wenn nach Auffindung der ♀ diese keine anderen stichhaltigen Merkmale der Unterscheidung darbieten, dann muss meine Gattung *Sphaeripalpus* mit *Lamprotatus* als synonym zusammen fallen. Die beiden Gattungen *Pachylarthrus* (= *Phacostomus* *Nees*) und *Cyrtogaster* (= *Dicormus* *m.*) lassen sich am besten und sichersten durch die relative Grösse des dritten Segments unterscheiden und zwar in beiden Geschlechtern. Dieses Segment ist bei *Cyrtogaster* sehr stark entwickelt, kaum kürzer als das zweite, bei *Pachylarthrus* aber finden wir dasselbe viel kürzer als das zweite. Alle anderen Merkmale habe ich wenig stichhaltig gefunden. Wenn *Walker* *) in dem Gattungsscharakter von *Cyrtogaster* dem ♂ vierzehngliedrige Fühler zuschreibt, so beruht das sicher auf einem Irrthum, sie sind grade so wie beim ♀ nur dreizehngliedrig, haben zwei Ringel und ein dreiringeliges Endglied. (Als eine besonders merkwürdige Erscheinung muss hier noch hervorgehoben werden, dass das verdickte Endglied der Taster grün gefärbt ist, eine Färbung, die man bei den Tastern sehr selten oder nie wahrnimmt.) Eben so unrichtig habe ich selbst früher die Fühler als eilf- oder zwölfgliedrig angegeben, **) als ich den Gattungsscharakter von *Dicormus* zu einer Zeit aufstellte, wo mir die Arbeiten der englischen Autoren noch ganz unbekannt waren. So leicht sich auch die ♂ der Gattung *Pachylarthrus* erkennen und unterscheiden lassen, so schwer wird es, die ♀ von denen der Gattung *Dicyclus* zu scheiden. Mir ist es nach sorgfältigster Vergleichung der Unterscheidungsmerkmale beider Gattungen ***) bei *Walker* nicht gelungen, einen standhaften Unterschied aufzufinden. Das einzige Merkmal von einigem Gewicht bieten die Oberkiefer, denn *Pachylarthrus* soll beide, *Dicyclus* nur einen gebogenen Oberkiefer haben. Auf dieses Merkmal möchte ich aber nicht zu viel Gewicht legen, ja die Vermuthung dürfte nicht zu gewagt erscheinen, dass die Arten der Gattung *Dicyclus* die ♀ der Gattung *Pachylarthrus* bildeten, um so mehr, da die von *Walker* beschriebenen Arten (mit einer einzigen Ausnahme) alle ♀ sind. Bloss bei *Dicyclus fuscicornis* gibt *Walker* beide Geschlechter an, es wäre aber möglich, dass er in diesem einzigen Falle beim ♂ das vergrösserte Endglied der Maxillartaster, welches oft etwas versteckt ist, übersehen hätte. Ob meine Vermuthung gegründet oder nicht, wird *Walker*, der die Gattung *Dicyclus* aufgestellt hat, durch genaue Vergleichung leicht entscheiden können.

*) Ent. Magaz. I, pag. 381.

**) Siehe Beiträge zur Mon. der Pterom. 1841. pag. 38.

***) Ueber *Dicyclus* siehe Ent. Mag. Vol. I, pag. 455 und über *Pachylarthrus*, pag. 456.

Eine besondere Form unter den Miscogastroiden bildet (durch die nach der Spitze hin verdickten Mitteltibien) eine von *Walker* aufgestellte Gattung *Spaniopus*, welche sich an die Pteromaloiden anschliesst, aber durch den deutlich gestielten Hinterleib nothwendig dieser Familie eingereiht werden musste. Sowohl in ihrem Habitus im Allgemeinen, als auch insbesondere durch die Verbreiterung der Mitteltibien erinnert *Spaniopus* an die Gattung *Platymesopus* unter den Pteromaloiden. Ich besitze zwei neue Arten, nämlich *amoenus* und *elegans*, welche von *Spaniopus dissimilis Walker* sich deutlich und leicht unterscheiden lassen. *Amoenus* hat nämlich die Fühler gelb, aber das dreiringelige Endglied und die zwei demselben vorangehenden Geisselglieder sind schwarz, während bei *dissimilis Walk.* die Fühler braun sein sollen. Bei *elegans* sind die Mitteltibien schwarzbraun mit gelblicher Basis, die Fühler rein gelb, dagegen sollen bei *dissimilis* die Beine strohgelb, die Fühler braun sein. Ich kenne von dieser Gattung eben so wenig wie *Walker* die ♀.

Durch viele eigenthümliche Merkmale scheint mir *Syntomopus Walk.* eine wohlbegründete Gattung zu sein. Dem Gattungscharakter *Walker's* *) möchte ich aber gerne noch einige wesentliche Merkmale hinzufügen, wodurch die Bestimmung derselben erleichtert würde. Abgesehen von den verhältnissmässig sehr kurzen Fühlern bietet der Thorax die besten Unterscheidungsmerkmale dar. Derselbe ist nämlich stark niedergedrückt und fast vollkommen flach zu nennen; das Pronotum ist subquadratisch, breit und ziemlich lang, das Metanotum liegt mit dem Schildchen in gleicher Flucht und ist nicht gekielt, noch weniger gerinnt (*canaliculatum*), wie *Walker* angibt. Auch der Kopf ist eigenthümlich gebildet, zwar breiter als der Mittelleib, aber in der Länge (d. h. in der Richtung von vorne nach hinten) sehr kurz, fast scheibenartig, daher der Scheitel sehr schmal und kurz.

Mit der Gattung *Dichalysis*, **) welche sich durch die wirtelhaarige Geissel auszeichnet, deren Glieder noch zudem durch eine deutliche Brücke getrennt sind, lässt sich einigermassen die neue Gattung *Arthrolysis* wohl vergleichen, obgleich deren Fühler sehr rasch einen deutlichen Unterschied wahrnehmen lassen und dieser ist so gross, dass an eine Vereinigung mit *Dichalysis* wohl nie zu denken ist. Während nämlich bei jener Gattung die Glieder der Geissel deutlich getrennt sind, stossen sie hier enge aneinander; während dort die zwei letzten Geisselglieder enge verbunden, sind sie hier deutlich und eben so scharf getrennt wie die vorangehenden. Von beiden Gattungen kenne ich nur die ♂. Da die von *Ruthe* im Jahre 1831 aufgestellte Dipteren-Gattung *Psilocera* angenommen und auch Bestand gewonnen, so musste der Name *Psilocera Walker* wegfallen und ich habe hier den Namen *Dichalysis* dafür in Vorschlag gebracht.

Von *Cryptoprymna m.* (*Prosodes Walk.*), welche Gattung ich auch in der Nähe von Aachen entdeckte, ist bis jetzt das ♀ noch unbekannt geblieben. Diese Gattung, welche in der starken Entwicklung des dritten Segments zwar mit *Cyrtogaster* übereinstimmt, unterscheidet sich dennoch leicht dadurch, dass dieses dritte Segment die folgenden alle einschliesst und gänzlich bedeckt; auch ist das Endglied der Maxillartaster nicht verdickt wie bei *Cyrtogaster*.

*) Ent. Magaz. Vol. I, pag. 372.

**) *Dichalysis* von *δίχα*, zweifach und *λύσις*, *εως*, *ή*, die Lösung, Auflösung. Der Name bezieht sich auf die Fühlergeissel, deren Glieder nicht bloß einfach gelenkartig von einander getrennt erscheinen, sondern noch obendrein durch kleine Stielchen (Brücken) gleichsam *doppelt* getrennt werden.

Wenn die Angabe in der Gliederzahl der Fühler bei *Isocyrtus Walk.* richtig ist, dann wird sich diese Gattung leicht bestimmen lassen, sie könnte nur mit *Arthrolysis* verwechselt werden, denn die übrigen Gattungen haben alle dreizehngliedrige Fühler. *Isocyrtus* soll aber auch durch die starke Entwicklung des dritten Segments sich auszeichnen, worauf besonders grosses Gewicht zu legen wäre. Mir ist diese Gattung, von welcher *Walker* nur das weibliche Geschlecht vor Augen hatte, gänzlich unbekannt geblieben.

Sehr häufig ist die Gattung *Micromelus*; nicht nur findet sie sich in England, sondern auch hier in der Rheinprovinz und durch ganz Deutschland scheint sie überall vorzukommen. Zwar bilden die Fühler ein gutes Gattungsmerkmal, indem in beiden Geschlechtern drei Ringel vorhanden sind, beim ♀ ist aber auch das dreiringelige Endglied pfriemenförmig zugespitzt und der Metathorax wird durch eine stark konische Verlängerung ausgezeichnet.

Wie in den meisten grösseren Familien, so zeigt sich auch hier eine Gattung besonders zahlreich an Arten und zwar ist es die Gattung *Lamprotatus Westw.* (von *Walker* *Miscogaster* genannt.) Diese schöne Gattung, deren Arten sich mitunter durch eine bedeutendere Grösse auszeichnen, aber trotzdem häufig sehr schwer zu unterscheiden sind, hat zwar in der bedeutenden Verdickung des Knopfes an dem ramus stigmaticus ein charakteristisches, aber nicht ganz durchgreifendes Merkmal. Wenn auch in den meisten Arten dieser Knopf sehr dick erscheint, so findet doch allmählig eine solche Abnahme Statt, dass darauf kein Gewicht mehr gelegt werden darf. Eben so wenig kann auf den Stiel des Hinterleibs eine besondere Wichtigkeit gelegt werden, da derselbe oft so unscheinbar kurz wird, dass sich diese Arten mit so kurzem Hinterleibsstiel nur äusserst schwierig oder gar nicht von der Gattung *Selaoderma Walk.* trennen lassen. Es wird daher hier nöthig sein, solche Merkmale hervorzusuchen, durch welche *Lamprotatus* von den nachfolgenden Gattungen *Sphegigaster*, *Toxeuma*, *Tityros*, *Cyrtogaster* ♀ und *Dicyclus* ♀, sowie von *Pachylarthrus* ♀ und *Merisus* sich mit einiger Sicherheit unterscheiden lässt. Obgleich *Lamprotatus* in der Fassung und Ausdehnung, welche *Walker* dieser Gattung gibt, nicht leicht zu definiren sein möchte, so unterscheidet sie sich von den nachfolgenden Gattungen doch in so weit, dass man in Bestimmung der grössten Anzahl der Arten nicht leicht Missgriffe machen wird. Von *Toxeuma* zeichnet sich *Lamprotatus* durch den nicht von der Seite zusammen gedrückten Hinterleib aus, von *Sphegigaster* und *Cyrtogaster* ♀ durch die relative Kürze des dritten im Verhältniss zu der viel grösseren Länge des zweiten Segments; von *Tityros*, *Dicyclus*, *Pachylarthrus* ♀ und *Merisus* durch die tiefen und bis auf die Achseln deutlich durchgehenden Furchen der Parapsiden.

Die Gattung *Sphegigaster Spin.*, zu welcher *Merismus Walk.* als Synonym gehört, zeichnet sich durch die Grösse des zweiten und dritten Segments aus und stimmt darin wohl mit *Cyrtogaster* überein. Obgleich letztere Gattung im männlichen Geschlecht sehr leicht durch die Taster unterschieden wird, so wird es doch schon schwerer, die ♀ beider Gattungen auseinander zu halten, der kurze Hinterleibsstiel bei *Cyrtogaster*, der meist bestimmt längere bei *Sphegigaster* ist allerdings ein schwaches Merkmal, dann sollen die Mandibeln bei dieser Gattung gerade, bei jener gebogen sein, aber diese Angabe mag wohl nur auf der Untersuchung weniger Arten sich gründen, so dass weitere und schärfere Merkmale zur Unterscheidung der ♀ in beiden Gattungen zu wünschen wären. Ein solches Merkmal dürfte wohl der ausgeschweifte Hinterrand des zweiten Segments bei *Cyrtogaster*.

gaster sein, da dieser bei Sphegigaster gerade ist. Bei Sphegigaster scheint mir, dass diejenigen Arten, welche durch deutlich ausgesprochene Furchen der Parapsiden sich auszeichnen, generisch von den übrigen getrennt werden könnten. Sphegigaster aculeatus und flavicornis z. B. zeigen keine deutliche Trennung des Mesonotums, obgleich sie in den meisten Merkmalen mit den übrigen Arten übereinstimmen. Eine Nöthigung zu dieser Trennung ist aber um so weniger vorhanden, da die Gattung Sphegigaster arm an Arten ist.

Toxeuma scheint mir unter den Miscogastroiden eine weniger scharf ausgeprägte Gattung, denn einestheils schliesst sie sich sehr enge an diejenigen Arten von Lamprotatus an, bei welchen der Knopf des ramus stigmaticus schon kleiner wird, auch die scharfe Theilung des Mesonotums und die relative Grösse der Hinterleibssegmente erinnert an Lamprotatus, dagegen ist der Hinterleib dadurch, dass er von der Seite zusammen gedrückt und ziemlich stark zugespitzt erscheint, in seinem Habitus allerdings von Lamprotatus abweichend. Sehr nahe streift auch die Gattung an Selaoderma, und wenn man den ganz kurzen, leicht zu übersehenden Hinterleibsstiel nicht in Betracht zöge, würde man kaum eine Trennung vorzunehmen im Stande sein.

Tityros Walk. ist eine mir unbekannte Gattung, welche nach dem männlichen Geschlecht aufgestellt wurde*) und sich durch den stark verlängerten Schaft, welcher beinahe die Grösse der ganzen Geissel erreicht und den sehr schmalen, fast konischen Hinterleib auszeichnen soll.

Merisus Walk. schliesst sich durch den Habitus eben so sehr an die Pteromaloiden, wie durch den gestielten Hinterleib an die Miscogastroiden an. Obgleich Walker die Fühler als zwölfgliedrig angibt, so sind sie doch wirklich dreizehngliedrig, wie es auch die Abbildung in Newman's Entomologist auf Plate A, Fig. 1 und 1, a, deutlich genug zeigt. In der vergrösserten Abbildung fehlt blos der Schaft, der also noch hinzugezählt werden muss. Das dreiringelige, sehr scharf zugespitzte Endglied der Fühler, das nicht gekielte Metanotum und die relative Grösse der einzelnen Hinterleibssegmente lassen die Gattung bald erkennen. Während nämlich das zweite Segment doppelt so lang wie das dritte ist, wächst auch das vierte, fünfte und sechste allmählig an Grösse, so dass das sechste fast doppelt so lang wie das zweite wird. Von dieser Gattung habe ich einige Arten in der Nähe von Aachen gefangen, die von Walker beschriebene Art, Merisus splendidus, stammt dagegen aus dem südlichen Frankreich.

Auf Miscogaster Oxylus**) hat Walker seine Gattung Panstenon gegründet, er hat ihr auch die Stellung bei den Miscogastroiden angewiesen, obgleich die ziemlich starke Entwicklung des Prothorax einen Uebergang zu den Cleonymoiden anzubahnen scheint. Die Furchen der Parapsiden gehen nicht völlig durch und der Hinterleib ist deutlich gestielt, aber viel charakteristischer erscheint hier das Flügelgeäder, da der ramus marginalis eben so lang, wenn nicht länger als der ramus humeralis ist.

Den Gattungsnamen Asaphes habe ich mit Isocratus vertauscht, von ἰσος, η, ον, gleich und κρατος, τό, die Stärke, Kraft, Gewalt. Diese Benennung steht in Beziehung zu der Fühlergeissel, welche in beiden Geschlechtern keulförmig, also gleich kräftig gebildet ist. Die Beseitigung des Namens Asaphes wurde durch den älteren Namen Asaphus Brongn. unter den Trilobiten, sowie

*) List of the Spec. of Hym. ins. in the coll. of the Br. Mus. part. II, pag. 164.

**) Walker, Monographia Chalciditum. 1839. pag. 196.

auch durch zwei Pflanzengattungen, *Asaphes Dec.* und *Asaphes Spreng.* bedingt. Die Gattung *Isocratus* steht in der Nähe von *Cyrtogaster*, womit sie grosse Aehnlichkeit hat. Durch ein sehr schönes Merkmal lassen sich jedoch beide Gattungen leicht unterscheiden; bei *Cyrtogaster* ist nämlich der Hinterrand des zweiten Segments in einem weiten Bogen ausgeschweift, bei *Isocratus* aber ganz gerade.

Eine andere Gattung *Megorismus* *) stellte *Walker* auf, indem er zwei unter *Miscogaster* (= *Lamprotatus*) beschriebene Arten, *Nicaea* und *Daiphron*, davon trennte und zu einer eigenen Gattung erhob. Ich habe diese mir gänzlich unbekannte Gattung nicht in dem Schema aufgeführt, weil mir kein charakteristisches Merkmal eine feste Stellung in demselben anzudeuten im Stande war. Der kleine Knopf des *ramus stigmaticus* sowie der Mangel an durchgehenden Furchen der *Parapsiden* haben *Walker* gewiss allein bewogen, jene genannten Arten von *Lamprotatus* zu trennen, aber damit ist noch keineswegs die Gattung begründet; andere sichere Merkmale habe ich aber nicht in der Beschreibung beider Arten entdecken können.

Anmerkung. Der Name *Coruna Walk.*, von *κορυνή*, die Keule, müsste *Coryna* geschrieben werden, wenn diese Umwandlung dadurch nicht überflüssig würde, dass der Name selbst fortfällt, indem eine viel ältere von *Gärtner* aufgestellte Gattung schon seit 1766 existirt. Ich habe den *Walker'schen* Gattungsnamen durch *Pachycrepis* **) substituiert. Eben so musste der Name *Prosodes* durch einen neuen ersetzt werden, da bereits unter den *Coleopteren* derselbe seit 1829 durch *Eschsch.* eingeführt worden ist; ich habe ihn hier durch *Cryptoprymna* ***) ersetzt.

15. *Hormoceroidae*. Diese kleine Familie steht mit Recht zwischen den *Miscogastroiden* und *Pteromaloiden* gleichsam in der Mitte, schliesst sich aber mehr an die letzteren an, so dass einzelne Gattungen offenbar nur Uebergangsformen bilden. *Walker* hat nach Einzichung der Gattung *Glyphe* noch sechs Gattungen, für welche er in dem „*Ent. Mag.*“, vol. 2, pag. 168“, eine synoptische Uebersicht aufgestellt hat, die ich ebenfalls, obgleich mit Hinzufügung einiger neuen Gattungen beibehalten habe.

a. Hinterleib nicht zusammen gedrückt.

b. Fühler dreizehngliedrig.

c. Die *Parapsiden* vollständig getrennt. *Hormocerus Walk.*

cc. Die *Parapsiden* unvollständig getrennt.

d. Fühler mit zwei Ringeln; (♂ ♀) Bohrer beim ♀ nicht vorragend *Urolepis Walk.*

dd. Fühler mit drei Ringeln (♂) oder mit zwei (♀); Bohrer etwas vorragend *Anognus m. †)*

*) Siehe *List of the spec. etc. part. I*, pag. 29 und *Monographia Chalc.*, pag. 197—198.

**) *Pachycrepis* von *παχύς*, dick und *κρημνός*, *ή*, der Rand (*margo*.) Der Name bezieht sich auf den Vorderrand des Flügels, welcher durch den starken *ramus marginalis* gleichsam verdickt erscheint.

***) *Cryptoprymna* von *κρυπτός*, *ή*, *όν*, versteckt, verborgen und *πρύμνα*, *ή*, jeder Hintertheil eines Körpers überhaupt (hier des Hinterleibs). Der Name enthält also die Andeutung auf die in dem dritten Segmente versteckten, die Spitze des Hinterleibs bildenden Theile.

†) *Anognus* von *α*, *priv.* und *ὄγμος*, *ή*, die Furche. Der Name deutet auf die hier fast ganz verschwundenen Furchen der *Parapsiden* hin.

- bb. Fühler zwölfgliedrig.
- e. Fühler mit drei Ringeln **Micradelus Walk.**
 - ee. Fühler mit einem Ringel **Tripedias m. *)**
- aa. Hinterleib zusammen gedrückt.
- f. Der Thorax flach.
 - g. Fühler zwölfgliedrig; die Parapsiden nicht getrennt . . . **Psilonotus Walk.**
 - gg. Fühler dreizehngliedrig; die Parapsiden vollständig getrennt **Isoplata m. **)**
 - ff. Der Thorax konvex.
 - h. Das letzte Fühlerglied mit pfriemenförmiger Spitze . . . **Rhaphidotelus Walk.**
 - hh. Das letzte Fühlerglied ohne pfriemenförmige Spitze.
 - i. Das dreiringelige Endglied der Geissel kürzer als die zwei vorangehenden Glieder **Meromalus Walk.**
 - ii. Das dreiringelige Endglied der Geissel so lang oder länger als die zwei vorangehenden Glieder **Gastrancistrus Westw.**

Die Gattung *Hormocerus*, von welcher *Walker* mehrere Arten beschrieben hat, scheint in Deutschland sehr selten zu sein, ich habe nur eine Spezies bei Boppard am Rhein gefangen, in anderen deutschen Sammlungen sah ich keine einzige Art. Die Fühler sind dreizehngliedrig, mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen Endglied. Bei den ♀ ist auch der Bohrer ein wenig vorragend. Abgesehen von den deutlich ausgeprägten Furchen der Parapsiden hat *Hormocerus* eine grosse Aehnlichkeit mit *Pteromalus*, und zwar mit denjenigen Arten, deren Geisselglieder etwas verkürzt erscheinen. Die frühere Schreibart *Ormocerus* musste dem Geiste der griechischen Sprache gemäss in *Hormocerus* verwandelt werden.

Zu der Gattung *Hormocerus* hat *Walker* früher auch das ♀ einer Art *Hormocerus maritimus* gestellt, für welche er später die eigene Gattung *Urolepis* bildete. Das ♂ beschrieb er in seiner „Mon. Chalc., pag. 201,“ unter dem Namen *Miscogaster Stygne*. Ich habe ein Original-Exemplar seines *Hormocerus maritimus* ♀ vor Augen und ebenfalls ♂ ♀ von *Pteromalus salinus*, welchen Herr von Heyden aus Puppen von *Coenia halophila* erzogen, einer Dipterengattung, über welche er interessante Notizen in der „Stettiner entomol. Zeitung“ (***) mittheilte. Er fand die Larven von *Coenia halophila* in den Soolwassern von Nauheim und Wisselsheim in der Wetterau, und dass der *Pteromalus salinus* ein Parasit dieses Thierchens sei, geht auch aus einer anderen Angabe in der „Stettiner entomol. Zeitung, Jahrgang 1848, pag. 286,“ hervor, nach welcher Herr *Osc. Diruff* dieselbe *Coenia* in den Kissinger Salinen antraf und aus den Puppen derselben ebenfalls den *Pteromalus salinus* v. *Heyd.* erzog. Die Exemplare, welche ich von Herrn von Heyden

*) *Tripedias* von *τρι* (*trís*), dreimal oder dreifach und *πεδιάς*, *ἄσος*, *ῆς*, die Fläche. Durch die tiefen Furchen der Parapsiden wird das Mesonotum in drei scharf getrennte Flächen getheilt, darauf stützt sich die Namenbildung.

**) *Isoplata* von *ἴσος*, *η*, *ον*, gleich und *πλαττα*, *ῆς*, die breite oder platte Oberfläche eines Körpers. Mesonotum und Schildchen sind hier gleich flach und so liegt die Bedeutung des Namens nahe genug.

***). Siehe Jahrgang 1844. Seite 202.

erhielt, stimmten aber in allen Punkten mit der aus England als *Hormocerus maritimus Walk.* erhaltenen Spezies überein. Nur das ♂ weicht von der Beschreibung *Walker's*, *) welche derselbe von *Miscogaster Stygne* gegeben, in Bezug auf den Hinterleib ab. *Walker* gibt das erste Segment nämlich so gross an, dass es fast den ganzen Hinterleibsrücken einnehme, während bei dem mir vorliegenden Exemplar dasselbe kaum die Länge des halben Hinterleibs erreicht. Der Hauptunterschied von *Urolepis* und *Hormocerus* liegt hauptsächlich in den Furchen der Parapsiden, die bei *Urolepis* nicht vollkommen deutlich bis auf die Achseln durchgehen.

Mit *Urolepis* in Bezug auf die Gliederzahl übereinstimmend, aber in vielen anderen Merkmalen ganz abweichend, ist die Gattung *Anogmus m.* Beide Geschlechter erzog ich selbst und ebenso Herr von *Heyden* in Frankfurt aus Tannenzapfen, worin die *Tortrix strobilana* hauste. Der männliche Fühler hat drei Ringel, der weibliche nur zwei. Das Mesonotum und Schildchen ist sehr flach. Beim Weibchen ist der Bohrer sehr deutlich vorragend, wodurch es sich leicht von *Urolepis* ♀ unterscheiden lässt.

Durch zwölfgliedrige, mit drei Ringeln versehene Fühler zeichnet sich *Micradelus Walk.* sehr leicht von den vorhergehenden Gattungen aus, nichts desto weniger ist diese Gattung sehr schwer zu bestimmen. Ich glaube, die einzige bekannte Art, *Micradelus rotundus*, zwar bei Aachen gefunden und richtig bestimmt zu haben, obgleich ich in Vergleichung mit der *Walker's*chen Gattungscharakteristik noch nicht alle Zweifel beseitigen konnte. Ich finde bei meiner Art, dass die Unterrandader einen sehr starken, langen und ungewöhnlich deutlichen, rücklaufenden Ast (Grundader) aussendet, während *Walker* nur von einem kurzen Ast spricht. **) Eben so hat der Knopf (stigma bei *Walker*) des ramus stigmaticus eine sehr grosse und stark ausgeprägte Spitze, die viel stärker als bei den übrigen Gattungen dieser Familie hervortritt und daher schnell in die Augen fällt. Auch diese Spitze nennt *Walker* auffälliger Weise kurz. ***) Uebrigens zeichnet sich diese Gattung *Micradelus* noch durch die tiefen, ganz durchgehenden Furchen der Parapsiden aus.

Mit *Micradelus* lässt sich die neue Gattung *Tripedias* wohl gar nicht verwechseln, wenn wir nur einen flüchtigen Blick auf die Fühler werfen, denn obgleich diese auch zwölfgliedrig sind so haben sie doch nur ein Ringel, während *Micradelus* deren drei hat. Eine entfernte Ähnlichkeit hat unsere Gattung auch wohl mit *Stictonotus m.* (*Semiotus Walk.*), aber die Geisselglieder sind viel kürzer und breiter und *Stictonotus* hat zwei Ringel. Weiter lässt sie sich noch mit *Toxeuma* vergleichen, obgleich diese dreizehngliedrige Fühler mit zwei Ringeln und ganz abweichendem Bau des Hinterleibs besitzt. Ich habe zwei Arten dieser Gattung, davon wurde die eine von *Winnertz* in Crefeld aus den Larven von *Cecidomyia tenebricosa* und *tremulae* erzogen, die andere von mir in der Gegend von Aachen gefangen. Mit besonderer Behutsamkeit wird man diese Gattung von *Gastrancistrus* scheiden müssen. Obgleich ich die Fühler von *Gastrancistrus* im männlichen Geschlecht nicht mit *Walker* für dreizehn-, sondern für zwölfgliedrig halte, so ist doch in dem Endglied beider Gattungen ein Unterschied, denn dieses Endglied ist bei *Tripedias* dreiringelig, während

*) Monogr. Chalcid., pag. 200. „Abdomen brevissimum, planum, laeve, thoracis dimidio vix longius, segmentum primum dorsum fere obtegens.“

**) Ent. Mag., vol. II, pag. 170. „Nervus solitus ante costam attingit nervulum rejiciens brevem.“

***) Ebendasselbst. Stigma nervulum brevem emittens.

es bei *Gastrancistrus* nur aus zwei Gliedern besteht. Die ♀ von *Tripedias* haben im Allgemeinen einen flacheren Hinterleibsrücken.

Unter den Gattungen, deren Hinterleib von der Seite zusammen gedrückt ist, sind zwei, welche einen ganz flachen Thoraxrücken besitzen, nämlich *Pylonotus* Walk. und *Isoplata* m. Beide unterscheiden sich nicht nur durch die Fühler, sondern auch durch die Furchen der Parapsiden. Bei *Pylonotus* sind die Fühler bloß zwölfgliedrig mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen Endglied, dagegen bei *Isoplata* dreizehngliedrig, Ringel und Endglied, wie bei jener Gattung. Die scharf durchgehenden Furchen der Parapsiden, welche bei *Pylonotus* bloß angedeutet sind, dienen ebenfalls als leichtes Unterscheidungsmerkmal. Von *Pylonotus* habe ich in der Gegend von Aachen eine Art gefangen, welche Herr von Heyden auch bei Frankfurt aus Birkenkätzchen erzogen, diese hat mit *Pylonotus* *Hortensia* Hal. sehr grosse Aehnlichkeit in der Färbung aller Körpertheile. Da indessen das ♂ von *Hortensia* einen fast linienförmigen Hinterleib haben soll, bei meiner Art aber der Hinterleib verhältnissmässig breit und flach erscheint, so halte ich sie für neu und benenne sie *Pylonotus* *Catuli*. Das ♀ dieser Art hat einen so stark zusammen gedrückten Hinterleib, dass der Rücken desselben gleichsam wie eine scharfe Messerschneide erscheint. Von *Isoplata* besitze ich auch nur eine Art, welche ich *geniculata* nenne, ich fing beide Geschlechter, obgleich nur sehr selten, in hiesiger Gegend und bei Boppard.

Keine Gattung unter den Hormoceroiden lässt sich leichter bestimmen, als *Rhaphidotelus* Walk. (*Walker* schreibt *Rhaphitelus*.) Ohne die *Walker*'sche Gattung zu kennen beschrieb ich in meinen Beiträgen zur Monographie der Pteromalinen, pag. 30, Nro. 264, den *Pteromalus* *subulifer*, welcher mit *Rhaphidotelus* *maculatus* als Synonym zusammen fällt. *Ratzeburg* hat aus dieser und einer neu entdeckten Art anfangs die Gattung *Stylocerus* *) gebildet und später diesen Namen wieder in *Storthygocerus* **) abgeändert. Beide Namen müssen aber dem älteren Namen *Walker*'s weichen. Da ich von *Rhaphidotelus* *maculatus* (*Pteromalus* *subulifer* m.) eine hinreichende Anzahl aus *Hylesinus* *Spartii* Nörtl. gezogen habe, so konnte ich in beiden Geschlechtern die Zahl der Fühlerglieder mit hinreichender Sicherheit feststellen. Vorab dürfte die Bemerkung nicht überflüssig erscheinen, dass *Walker* ***) das Geschlecht der von ihm untersuchten Spezies verkannt hat. Aus seiner Beschreibung des Fühlers geht unzweideutig hervor, dass er nicht ein ♂, sondern ein ♀ vor Augen hatte, weil er das letzte pfriemenförmige Geisselglied beobachtete und sogar den Gattungsnamen davon herleitete. Die ♂ haben aber dieses pfriemenförmige Glied nicht, mithin konnte das *Walker*'sche Exemplar kein ♂ sein. Uebrigens gibt derselbe den Fühler des ♀ ganz richtig als zwölfgliedrig an, indem er die Pfrieme mitzählt. Auch bei *Pteromalus* *subulifer* m. hatte ich ganz richtig die Gliederzahl auf zwölf angesetzt. *Ratzeburg* †) betrachtet die Fühler dagegen als eifgliedrig, was nur dadurch erklärlich wird, dass er die zwei auf die beiden Ringel folgenden Geisselglieder als ein einziges angesehen und abgebildet hat. Der männliche Fühler weicht nicht bloß durch den Mangel des pfriemenförmigen Endgliedes, sondern auch durch drei-

*) Die Ichneum. der Forstinsekten. Berlin 1844. pag. 207.

**) Desselben Werkes zweiter Band. Berlin 1848. pag. 208.

***) Ent. Mag. Vol. II, pag. 178 und 179.

†) Ichneum. der Forstinsekten. Band 2, Tafel III, fig. 11.

zehngliedrige Fühler ab; es sind zwei Ringel und ein dreiringeliges Endglied vorhanden. An dem letzteren ist das letzte Glied sehr kurz, zugespitzt und so eng mit dem vorhergehenden verbunden, dass es sehr leicht übersehen werden könnte. *Ratzeburg* beschreibt eine zweite Art, *Raphidotelus Ladenbergii*, aus Schlesien, welche vermuthlich die Brut des *Hylesinus Fraxini* zerstört. Ob aber überhaupt die Gattung *Raphidotelus* die Käferlarven zerstört oder auf die Zerstörung anderer Parasiten angewiesen sei, ist durch direkte Beobachtungen noch nicht ermittelt.

Wenn die Gattung *Meromalus*, welche *Walker* auf eine Spezies gegründet hat, die er nur im männlichen Geschlecht besass, wirklich dreizehngliedrige Fühler hat, dann unterscheidet sie sich dadurch schon hinreichend von *Gastrancistrus*, bei welchem die ♂ nur zwölfgliedrige Fühler besitzen. Andere Unterschiede zwischen beiden Gattungen aufzufinden wollte mir nicht gelingen. Ich kann daher für diejenigen, welche sich hierfür besonders bemühen, nur auf die Gattungscharakteristik desselben hinweisen. *) *Gastrancistrus* spielt unter den *Hormoceroideen* genau dieselbe Rolle, welche *Trigonoderus* unter den *Cleonymoiden* hat, denn diese Gattung ist eben so reich an Arten, wie die übrigen Gattungen arm daran sind.

16. *Pteromaloiden*. Unter allen Familien der *Chalcidien*-Gruppe ist diese unstreitig die schwierigste. Die zahllosen Arten der Gattung *Pteromalus* werden noch viele tüchtige Kräfte in Anspruch nehmen, ehe mit einiger Sicherheit eine Bestimmung derselben möglich sein wird. Obgleich der sehr veränderliche Habitus eine grosse Menge von Unterabtheilungen zulässt, ist man doch in Verlegenheit, wenn man neue Gattungen aufstellen will, denn hierfür fehlen in der Regel scharf hervortretende Merkmale. Nicht selten bietet zwar das eine Geschlecht eine charakteristische Eigenthümlichkeit, wie z. B. *Platymesopus* und *Mesopolobus*, aber dann tritt das andere wieder in der gewöhnlichen Form der Hauptgattung *Pteromalus* so entschieden hervor, dass eine Trennung unmöglich wird. *Walker* hat daher auch mehrere von *Pteromalus* getrennte Gattungen wieder damit vereinigt und man kann dieses Verfahren nur billigen. In der Aufstellung der Uebersicht der Gattungen habe ich mich im Ganzen zwar an sein Schema **) gehalten, aber doch einige Veränderungen darin vorgenommen. Die Gattung *Trigonoderus* habe ich von dieser Familie ganz ausgeschieden, dann aber mehrere neue Gattungen eingefügt, auch einige Gattungsnamen von *Walker*, weil früher schon verwendet, ausgeschieden und durch passende neue zu ersetzen gesucht. Mit Ausnahme der einzigen Gattung *Metastenus* habe ich alle hier unten aufgeführten, in Bezug auf die unterscheidenden Gattungsmerkmale selbst untersucht und kann daher die nachfolgende Uebersicht als eine auf eigene Beobachtungen gestützte hinstellen:

- a. Die Furchen der Parapsiden ganz durchgehend und scharf.
 - b. Fühler eiflügliedrig; das erste Segment fast den ganzen Hinterleib bedeckend **Megapelte m. ***)**
 - bb. Fühler mehr als eiflügliedrig.

*) Ent. Mag. Vol. II, pag. 171, *Gastrancistrus* und pag. 178, *Meromalus*.

**) Ent. Mag. II, pag. 288.

***) *Megapelte* (= *Eunotus Walk.*) von μέγας, gross und πέλη, η, der Schild. Eine Andeutung auf das grosse erste Segment, welches fast den ganzen Hinterleibsrücken bedeckt.

- c. Fühler dreizehngliedrig **Tridymus Ratzb.**
- cc. Fühler zwölfgliedrig.
- d. Thorax nicht punktirt; Flügel mit einer Haarlinie, die vom Knopf des ramus stigmaticus ausgeht **Systasis Walk.**
- dd. Thorax punktirt; Flügel ohne Haarlinie.
- e. Fühler des ♂ mit zwei Ringeln und einem zweiringeligen Endglied, Fühler des ♀ mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen Endglied; die Furchen der Parapsiden treffen auf die Achseln; der Knopf des ramus stigmaticus verdickt **Oxyglypta m. *)**
- ee. Fühler mit zwei Ringeln und einem dreiringeligen Endglied; die Furchen der Parapsiden treffen auf das Schildchen; der Knopf des ramus stigmaticus nicht verdickt . **Stictonotus m. **)**
- aa. Die Furchen der Parapsiden nicht durchgehend.
- f. Fühler zwölfgliedrig.
- g. Der Thorax länger als der Hinterleib **Meraporus Walk.**
- gg. Der Thorax kürzer als der Hinterleib **Metastenus Walk.**
- ff. Fühler dreizehngliedrig.
- h. Gesicht stark punktirt; Bohrer beim ♀ weit vorragend . . **Roptrocerus Ratzb.**
- hh. Gesicht nicht oder kaum punktirt; Bohrer beim ♀ nicht oder kaum vorragend.
- i. Fühler mit drei Ringeln.
- k. Geißel nach der Spitze stark verdickt. **Metopum Walk.**
- kk. Geißel nach der Spitze hin mässig verdickt.
- l. Thorax oben flach; Körper enge, sublinearisch . . **Platyterma Walk.**
- ll. Thorax oben konvex; Körper kurz, breit. . . . **Amblymerus Walk.**
- ii. Fühler mit zwei Ringeln.
- m. Der Knopf des ramus stigmaticus sehr dick; (Schenkel nicht verdickt) **Caenacis m. ***)**
- mm. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht dick.
- n. Der ramus marginalis stark verdickt; (Schenkel nicht verdickt) **Xenocrepis m. †)**
- nn. Der ramus marginalis nicht verdickt.

*) *Oxyglypta* von *ὄξύς*, *εἶα*, *ύ*, scharf und *γλυπτός*, *ή*, *όν*, *ausgemeisselt*, geschnitzt, eingegraben. Der Name deutet die scharf eingegrabenen Furchen der Parapsiden an.

**) *Stictonotus* (= *Semiotus Walk.*) von *σικιός*, *ή*, *όν*, punktirt und *νώτος*, *ός*, der Rücken.

***) *Caenacis* von *καίνος*, *ή*, *όν*, fremd, ungewöhnlich und *ἀκίς*, *ή*, die Spitze. — Die bei den Pteromaloiden ganz ungewöhnlich verdickte Spitze des ramus stigmaticus (d. h. der Knopf) liegt der Benennung zu Grunde.

†) *Xenocrepis* von *ξένος*, *η*, *ον*, fremd, ungewöhnlich und *κρηπίς*, *ιδος*, *ή*, der Rand. Die Benennung deutet die scheinbare Verdickung des Randes durch den ramus marginalis an.

- o. Der Kopf mit einer glatten Linie, die von der Wurzel der Mandibeln an der äusseren Orbita bis zum Scheitel sich hinzieht. . . **Peridesmia m. *)**
- oo. Der Kopf ohne glatte Linie.
- p. Die Flügel am Vorderrande mit einer starken Einbiegung . . **Simopterus m.**
- pp. Flügel ohne Einbiegung am Vorderrande.
- q. Der ramus stigmaticus und postmarginalis im Verhältniss zu dem ramus marginalis stark verkürzt **Dibrachys m. **)**
- qq. Der ramus stigmaticus und postmarginalis nicht stark verkürzt.
- r. Die beiden Ringel ganz unmerklich dünner als die folgenden Geisselglieder; (die Wangen sehr breit und das Hinterhaupt stark ausgehöhlt) **Coelopisthia m. ***)**
- rr. Die beiden Ringel sehr klein.
- s. Die Backen stark vorspringend **Diglochis m. †)**
- ss. Die Backen nicht stark vorspringend.
- t. Schenkel kräftig und dick, besonders die Vorder-schenkel.
- u. Der ramus marginalis verdickt.
- v. Der ramus postmarginalis und stigmaticus verkürzt und nur halb so lang wie der ramus marginalis; die beiden Ringel zusammen genommen kürzer als das Stielchen **Metacolus m. ††)**
- vv. Der ramus postmarginalis und stigmaticus mehr als halb so lang wie der ramus marginalis; die beiden Ringel zusammen genommen so lang wie das Stielchen . . **Pandelus m. †††)**
- uu. Der ramus marginalis nicht verdickt.

*) Peridesmia von *περί*, um herum und *δέσμιος*, *ια*, *ιον*, gefesselt, gebunden. Der Name deutet den glatten Streifen an, welcher das Auge nach aussen gleichsam wie eine Fessel umgibt.

**) Dibrachys von *δύς*, zweimal und *βραχύς*, kurz. Eine zweimalige Verkürzung, nämlich die des ramus stigmaticus wie des ramus postmarginalis gab zu dieser Benennung Veranlassung.

***) Coelopisthia von *κοῖλος*, *η*, *ον*, hohl und *ὀπίσθια τέ*, die Hinterseite. Auf das stark ausgehöhlt Hinterhaupt zielend.

†) Diglochis von *δύς*, zweimal, zwei und *γλῶχίς*, *ῆ*, eine vorragende Spitze oder Ecke. Hier gaben die beiden Backen, welche als scharfe Ecken vorspringen, der Gattung diesen Namen.

††) Metacolus von *μετά*, hinten und *κόλος*, *ον*, verstümmelt, abgestutzt. Hinter dem ramus marginalis zeigen sich die beiden Abschnitte der Unterrandader, nämlich der ramus stigmaticus und postmarginalis so kurz, dass sie gleichsam wie abgestutzt oder verstümmelt erscheinen.

†††) Pandelus von *πάνδηλος*, *ον*, ganz sichtbar, ganz deutlich. Die Benennung dieser Gattung nimmt Bezug auf die beiden Ringel, welche hier besonders deutlich hervortreten.

- w.* Der Knopf des ramus stigmaticus abwärts gebogen, rund . . . **Dinotus m. *)**
ww. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht abwärts gebogen.
x. Die Vorderschenkel vor der Spitze ausgerandet; die hintersten Schienen mit einer Reihe feiner Dörnchen . . . **Pachychirus Ag. Nom.**
xx. Die Vorderschenkel an der Spitze nicht ausgerandet; die hintersten Schienen nicht mit einer Reihe feiner Dörnchen.
y. Der ramus stigmaticus an der Spitze regelmässig kolbenförmig . . . **Rhopalicus m. **)**
yy. Der Knopf des ramus stigmaticus nicht kolbenförmig, sondern auf der Innenseite des Flügels stark verdickt . **Acrocormus m. ***)**
tt. Schenkel schlank.
z. Der ramus postmarginalis doppelt so lang wie der ramus stigmaticus **Etroxys Westw.**
zz. Der ramus postmarginalis nicht doppelt so lang wie der ramus stigmaticus . . . **Pteromalus Swed.**

Gleich die erste Gattung in dieser Aufstellung, Megapelte, welche an die Stelle von Eunotus Walk. trat, weil ein Jahr früher der Name von Dejean an eine Käfergattung vergeben worden war, tritt uns auch als eine höchst charakteristische entgegen. Nicht blos die elfgliedrigen Fühler, sondern auch die Kopf- und Hinterleibsbildung geben ihr ein eigenthümliches Gepräge. Der ganze Habitus erinnert nicht undeutlich an Agonioneurus Westw. (= Myina Nees). Der Kopf ist breit und der Scheitel vom Nacken durch eine sehr scharfe Kante getrennt. Die paarigen Nebenaugen sind hart an diese Kante gerückt. Die Fühler sind elfgliedrig mit zwei Ringeln und einem sehr grossen dreiringeligen Endglied. Sehr auffallend ist aber die Bildung des Hinterleibs, denn das erste Segment ist so ungewöhnlich gross, dass es fast den ganzen Hinterleibsrücken einnimmt, für die übrigen Segmente bleibt eben nur so viel Raum, dass man sie mit Mühe noch wahrnehmen kann. Der einzigen bekannten Art, Megapelte cretacea (= Eunotus cretaceus Walk.), die ich aus Coccus vitis erzogen habe, kann ich eine zweite schöne Art hinzufügen: Megapelte nigriclavus m., diese zeichnet sich durch rothgelbe Fühler mit schwarzer Keule, deren Spitze aber wieder röthlich durchscheint, aus und ist im Allgemeinen kleiner als cretacea. Auch das ♂ von Megapelte cretacea, welches Walker unbekannt geblieben ist, habe ich in hiesiger Gegend entdeckt, es weicht von dem ♀ durch die Fühlerbildung allein ab, indem die Geissel nicht keulförmig, sondern durchaus fadenförmig aus gestreckten verlängerten Gliedern besteht. Die drei letzten Glieder sind kaum enger verbunden als die vorhergehenden.

*) Dinotus von *δινωτός*, *ή*, *όν*, im Kreise gedreht, daher *rund*, den Knopf des ramus stigmaticus bezeichnend, welcher eine grosse Aehnlichkeit mit Megastigmus zeigt.

**) Rhopalicus von *ρόπαλικός*, *ή*, *όν*, wie eine Keule beschaffen, die nach oben immer dicker wird. Auch hier liegt der Knopf des ramus stigmaticus wegen seiner besonderen Form der Gattungsbezeichnung zu Grunde.

***) Acrocormus von *ἄκρος*, *η*, *ον*, (summus, extremus), das oberste, höchste oder äusserste Ende eines Dinges und *κορμός*, *ός*, der Klotz. Weil hier das äusserste Ende des ramus stigmaticus, d. h. der Knopf desselben klotzförmig verdickt erscheint, habe ich der Gattung diesen Namen beigelegt.

Statt der Schreibart *Selaoderma* habe ich hier *Selaoderma* gebraucht, wie es schon der Nomenclator zoologicus von *Agassiz* in Vorschlag gebracht hat. Gegen die Selbstständigkeit dieser Gattung habe ich viele und wichtige Bedenken. Die Mehrzahl der Arten derselben, welche nur im weiblichen Geschlecht bekannt geworden zu sein scheinen, gehört gewiss der Gattung *Lamprotatus* an, wenigstens lassen sich die Uebergänge nachweisen. Bei *Lamprotatus* wird erstens der Knopf des ramus stigmaticus, der bei den meisten Arten so auffallend verdickt erscheint, allmählig immer kleiner, dasselbe ist der Fall mit dem Hinterleibsstiel, welcher so klein wird, dass man den Hinterleib für sitzend ansehen muss. Wenn ich nun den Gattungscharakter von *Selaoderma* und *Lamprotatus* bei *Walker* *) vergleiche, dann finde ich ausser dem kleinen Knopf des ramus stigmaticus und dem sitzenden Hinterleib keinen anderen erheblichen Unterschied mehr (abgesehen davon, dass *Walker* bei *Lamprotatus* ♂ die Zahl der Fühlerglieder unrichtig angibt, denn sie sind nicht vierzehn-, sondern dreizehngliedrig.) Was noch weiter für meine Vermuthung spricht, ist der Umstand, dass *Walker* mehrere Arten seiner Gattung *Miscogaster* (= *Lamprotatus* *Westw.*) später in die Gattung *Selaoderma* verwiesen hat, **) und nur von zwei Arten die ♂ angibt, nämlich von *Selaoderma* *Capreae* (= *Cynips* *Capreae* *L.* und *Pteromalus* *Salicis* *Nees*) und *Selaoderma* *Mazares*. Untersuchen wir aber den letzteren Punkt genauer, so werden wir finden, dass *Selaoderma* *Capreae* schon deshalb nicht in seine Gattung *Selaoderma* gehören kann, weil die Fühler hier nicht dreizehn-, sondern nur zwölfgliedrig sind und zwar in beiden Geschlechtern, ferner gibt er bei *Selaoderma* *Mazares* ♂ ***) an, dass der Stiel des Hinterleibs kurz sei und doch soll der Hinterleib bei *Selaoderma* ungestielt sein; er hat also in *Selaoderma* *Mazares* ♂ offenbar einen ächten *Lamprotatus* vor Augen gehabt. Wenn nun alle übrigen Arten bloß im weiblichen Geschlecht bekannt sind, so liegt nicht allein die Vermuthung sehr nahe, sondern dieselbe wird fast zur Gewissheit, dass alle ♀ von *Selaoderma* zu *Lamprotatus* gehören und diese Gattung ausfallen müsse. Leider besitze ich von den *Walker*'schen *Selaodermen* nur eine einzige, nämlich *Selaoderma* *laetum* und diese erhielt ich von *Walker* selbst. Sie ist unbestreitbar, nicht bloß wegen des kurz gestielten Hinterleibs, sondern auch wegen anderer Merkmale ein ächter *Lamprotatus*.

Es bleibt hier nun noch übrig, dem *Selaoderma* *Capreae* seine richtige Stellung und Benennung anzuweisen. Diese Spezies hat nicht nur zwölfgliedrige Fühler (♂ ♀), sondern auch unbestreitbar einen sitzenden Hinterleib, muss also auch generisch von *Lamprotatus* getrennt bleiben. *Walker* hatte sie im Jahre 1848 zu *Selaoderma* gestellt und es würde ihr auch dieser Name nach Ausscheidung aller übrigen Arten wohl verbleiben können, wenn nicht *Ratzeburg* †) in demselben Jahre ihr einen neuen Gattungsnamen verliehen hätte. Er nennt diese Gattung *Tridymus* und diesen Namen muss sie von nun an führen. *Ratzeburg* erzog sie aus *Cecidomyia* *salicina*, woraus ich sie ebenfalls seit vielen Jahren erzogen habe. Ob aber die beiden anderen Arten, näm-

*) Ent. Mag. Vol. I, pag. 458, *Lamprotatus* *Westw.* (= *Miscogaster* *Walk.*) und Vol. II, pag. 288, *Selaoderma*.

**) Siehe List of the Spec. of Hym. ins. part. I, pag. 33.

***) Ann. of nat. hist. XIV. 337 und 338, wo er sagt: pondeon (ein besonderer Ausdruck für petiolus, Hinterleibsstiel) stout, short.

†) Ichneum. der Forstinsekten. 2. Band, Seite 183.

lich *Tridymus Aphidum* und *xylophagorum Ratzb.* auch zu derselben Gattung gehören, wage ich wegen der verschiedenen Lebensweise und ohne Ansicht von Original-Exemplaren nicht zu entscheiden.

Von *Tridymus*, *Oxyglypta* und *Stictonotus* unterscheidet sich *Systasis Walk.* durch mehrere gute Merkmale. Vorerst zeigt schon die Sculptur des Mesonotums und des Schildchens keine Spur einer Punktirung, während doch der Kopf starke Punkte hat. Ein anderes Merkmal, worauf ich ein grosses Gewicht legen möchte, obgleich *Walker* es nicht berührt hat, weisen die Flügel nach. Von dem Knopf des *ramus stigmaticus* geht nämlich in schiefer Richtung eine Haarlinie nach dem Vorderrande des Flügels hin und grenzt ein kleines Feld als Analogon einer Radialzelle ab. Durch diese eigenthümliche Bildung wird man die Gattung *Systasis* von allen übrigen Gattungen dieser Familie leicht unterscheiden können. Auch hier, grade wie in England, kommen nur einige Arten dieser schönen Gattung vor.

Oxyglypta m. ist eine Gattung, welche durch das punktirte Mesonotum sowie durch die tiefen Furchen der Parapsiden der Gattung *Stictonotus* sehr nahe steht; die Zahl der Fühlerglieder stimmt ebenfalls bei beiden überein, aber bei dem ♂ von *Oxyglypta* ist das Endglied der Geissel immer nur zweigliedrig, bei *Stictonotus* dagegen dreigliedrig; die ♀ beider Gattungen unterscheiden sich so, dass nicht nur bei *Oxyglypta* der *ramus stigmaticus* unter einem viel stumpferen Winkel entspringt, sondern auch der Knopf desselben sehr dick ist und fast an *Lamprotatus* erinnert.

Den Gattungsnamen *Semiotus Walk.* habe ich beseitigen und durch *Stictonotus* ersetzen müssen, da er bereits früher für eine Coleopteren-Gattung in Anspruch genommen wurde.

Durch zwölfgliedrige Fühler und den Mangel an deutlich durchgehenden Furchen der Parapsiden hat *Walker* drei Gattungen, *Meraporus*, *Metastenus* und *Metopum*, charakterisirt. Von diesen habe ich *Metastenus* nicht entziffern können, vielleicht kommt sie auch in der hiesigen Gegend gar nicht vor. *Metopum* habe ich genau untersucht und die Fühler derselben dreizehngliedrig gefunden, mit drei Ringeln, wie es *Newman's Entomologist* auf Plate B, fig. 3, ganz richtig dargestellt hat. In der dritten Gattung *Meraporus* finde ich zwar bei einer Art, nämlich bei *Meraporus alatus Walk.* zwölfgliedrige Fühler, aber bei einer anderen, die ich für *graminicola Walk.* halten muss, finde ich ganz bestimmt und nach Untersuchung vieler Exemplare immer dreizehngliedrige Fühler. Diese Art gehört also zu *Pteromalus*.

Unter dem Namen *Roptrocercus* hat *Ratzeburg* im Jahre 1848 eine Gattung eingeführt, *) welche er früher (1844) *Pachyceras* genannt hat. Ueber die Stellung derselben würde kein Zweifel obwalten, wenn nicht das ♀ einen langen Legebohrer führte, wodurch es sich den *Torymoiden* sehr nähert. Das Gesicht ist bei dieser Gattung stark punktirt, Mesonotum und Schildchen ohne Punkte, die Furchen der Parapsiden undeutlich. Die Fühler dreizehngliedrig, beim ♂ mit zwei, beim ♀ mit drei Ringeln, die Vorderflügel ohne, die Hinterflügel mit einer kurzen Grundader. Der Bohrer beim ♀ weit vorragend. Die ♂ lassen sich, wenn man das stark punktirte Gesicht unberücksichtigt lässt, von der Gattung *Pteromalus* kaum unterscheiden. Aus dieser kurzen Charakteristik geht nun deutlich hervor, dass *Roptrocercus* mit Recht nur den *Pteromaloiden* zugezählt werden kann. Von dieser schönen Gattung hat *Ratzeburg* zwei Arten beschrieben, den *Roptrocercus xylophagorum* und

*) Die *Ichneum.* der Forstinsekten, Band 1, Seite 217, *Pachyceras* (= *Roptrocercus*) und Band 2, Seite 209, *Roptrocercus*.

Eccoptogastris. Den letzteren kenne ich nicht, die erstere Art erhielt ich im weiblichen Geschlecht von *Ratzeburg* selbst und beide Geschlechter derselben sah in der Sammlung des Herrn *von Heyden*. Zwei andere neue Arten, welche ich *Roptrocercus xylobius* und *polychromus* nenne, habe ich in hiesiger Gegend entdeckt, die erstere erzog ich aus Tannenrinde, ohne jedoch Borkenkäfer darin zu entdecken, die andere habe ich geschöpft.

Durch dreizehngliedrige Fühler mit drei Ringeln zeichnen sich die Gattungen *Metopum* (= *Metopon Walk.*) *Platyterma* und *Amblymerus* aus. Die beiden letzten Gattungen hat *Walker* wieder mit *Pteromalus* vereinigt, weil ihm die Anzahl der Ringel als Gattungsmerkmal aufzustellen zu geringfügig oder zu unsicher erschien. Ich würde mich für Beibehaltung beider Gattungen erklären, weil dadurch schon eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten von *Pteromalus* getrennt werden. Auch haben die beiden Gattungen in ihrem Habitus etwas Eigenthümliches, was die Trennung wohl rechtfertigen könnte. Der flache Bau des Thorax-Rückens und der schmale Körper trennt *Platyterma* von *Amblymerus*, bei welchem der Mittelleibsrücken konvex und der Hinterleib kurz und breit ist. Von beiden Gattungen wird aber *Metopum* leicht durch die sehr schwere und dicke Fühlerkeule geschieden.

Es folgt nun eine Anzahl neuer Gattungen, deren jede durch ein eigenthümliches und scharf ausgeprägtes Merkmal, wie es schon in der schematischen Uebersicht hervorgehoben worden ist, sich auszeichnet. Nur in Bezug auf die Gattung *Simopterus* muss ich hier hervorheben, dass sie schon früher von mir aufgestellt worden ist und zwar in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins *) der preussischen Rheinlande und Westphalens. In der schematischen Uebersicht habe ich durch ein Versehen dieser Gattung eine unrichtige Stellung angewiesen. Sie schliesst sich durch die deutlich durchgehenden Furchen der Parapsiden, durch elfgliedrige Fühler und überhaupt durch ihren ganzen Körperbau so innig an *Metapelte* (*Eunotus Walk.*) an, dass man sogar versucht werden könnte, sie damit zu vereinigen. Aber der ganze Bau des Flügels und der verdickte *ramus marginalis* rechtfertigen die Trennung, um so mehr, da auch ein kleiner Unterschied in der Bildung des Hinterleibs hervortritt. Das erste Segment ist bei *Simopterus* zwar sehr gross aber auch das zweite hat noch eine merkliche Ausdehnung und mit den folgenden zusammen mag es wohl die Hälfte der Länge des ersten Segments erreichen. Bis jetzt ist mir das ♂ dieser zierlichen Gattung noch unbekannt geblieben.

Eine kleine Abtheilung unter den *Pteromaloiden* bilden diejenigen Gattungen, deren Schenkel und namentlich die Vorderschenkel merklich verdickt erscheinen. Es sind im Ganzen sechs Gattungen, darunter *Cheiopachys Westw.* oder *Pachychirus*, wie der *Nomenclator zoologicus* von *Agassiz* als richtige Schreibart verlangt. Die fünf anderen sind neu und stehen durch das oben angeführte Merkmal der verdickten Schenkel mit *Pachychirus* in ein näheres verwandtschaftliches Verhältniss. Auch andere gemeinschaftliche Merkmale zeichnen sie aus, so die verlängerte Form des Hinterleibs bei den ♀, selbst die gefleckten Flügel dürften nicht zufällig, sondern mehr wesentlich dieser kleinen Tribus zukommen. Auch leben alle diese Gattungen parasitisch in den Larven von Käfern, welche Holz zerstören, blos von der Gattung *Pandelus* weiss ich es nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Dagegen habe ich *Rhopalicus* aus Tannenrinde erzogen und *Acrocormus*

*) Siehe achter Jahrgang. 1851. Seite 22.

aus dünnen Apfelzweigen, worin die Larven von *Saperda praecusta*, von einem *Thamnophilus* und einer kleinen *Scolytus*-Art lebten. *Metacolus* und *Dinotus* wurden aus altem dürrer Holz erzogen. Eine neue Art von *Pachychirus* erhielt ich mit *Acrocormus* zugleich aus jenen Apfelzweigen. Diese Uebereinstimmung in der Lebensweise ist gewiss nicht zufällig und vielleicht wird es durch die Zucht gelingen, noch mehrere neue Gattungen zu entdecken, welche auf andere Weise selten oder nie in die Hände eines Sammlers gelangen. Von den sechs Gattungen trennen sich *Metacolus* und *Pandelus* leicht ab durch die Verdickung des *ramus marginalis* und zwischen Beiden entscheidet wieder das Grössenverhältniss des *ramus stigmaticus* und des *ramus postmarginalis* zu dem *ramus marginalis* und nicht minder das Grössenverhältniss der Ringel. Das erste Ringel ist bei *Pandelus* besonders stark entwickelt und sogar doppelt so gross wie das zweite, beide zusammen erreichen die Länge des Stielchens. Die einzige Art dieser Gattung, den *Pandelus flavipes*, habe ich bereits früher unter dem Namen *Cleonymus flavipes* *) beschrieben. Das ♂ ist mir bis jetzt noch unbekannt geblieben. Bei *Metacolus* bieten die beiden Ringel keinen Unterschied in der Grösse dar. Ich kenne nur eine Art, *Metacolus 1-fasciatus* m. ♂ ♀. Mit nicht verdicktem Vorderrande treten die vier folgenden Gattungen auf und zwar unterscheidet sich *Pachychirus* durch die Ausrandung vor der Spitze der vordersten Schenkel und bei sorgfältiger Untersuchung auch durch die Reihe feiner Dörnchen an den hintersten Schienen. Den bekannten Arten, *Pachychirus quadrum* F. und *tutela* Walk., kann ich noch eine neue Art hinzufügen, welche sich durch dunkler gefärbte Beine von *quadrum* F. und durch zwei Flecken in jedem Vorderflügel von *tutela* unterscheidet; ich nenne sie *Pachychirus intermedius*. Die drei anderen Gattungen unterscheiden sich sehr leicht durch den *ramus stigmaticus*, welcher bei *Rhopalicus* sehr regelmässig keulförmig verdickt erscheint, so dass ein besonderer Knopf, wie bei den beiden folgenden Gattungen, sich nicht absetzt. Auch nähert sich der Hinterleib der ♀ in dieser Gattung mehr der allgemeinen Form, wie sie bei der Gattung *Pteromalus* gewöhnlich auftritt, dagegen ist der Hinterleib von *Acrocormus* und *Dinotus* ♀ nicht nur stark verlängert, sondern auch von der Seite stark zusammen gedrückt. Von *Rhopalicus* habe ich beide Geschlechter in grösserer Anzahl erzogen und daraus ersehen, dass ich das ♀ davon ebenfalls früher als *Cleonymus maculifer* **) beschrieben hatte. Die ♂ unterscheiden sich wesentlich von den ♀ durch einen gelblichen durchscheinenden Flecken an der Basis des Hinterleibs und durch die grosse braune Makel an der Spitze des *ramus stigmaticus*.

Obgleich nun die beiden Gattungen *Dinotus* und *Acrocormus* eine so grosse Uebereinstimmung im ganzen Habitus zeigen, dass eine Trennung beider fast auf unüberwindliche Schwierigkeiten stossen wird, so liegt doch ein scharfes und schneidendes Merkmal in der verschiedenen Bildung des Knopfes am *ramus stigmaticus* vor. Ich erachte dieses Merkmal für ganz genügend, eine Trennung zu rechtfertigen, wenn man weiss, dass selbst ein grosser Kreis von Arten einer Gattung, wenn auch in etwa variierend, doch im grossen Ganzen immer eine übereinstimmende Bildung zeigt. Dem Systematiker kann und darf aber die Uebersicht über das ganze Gebiet der Erscheinungen und ihres mannigfaltigen Wechsels in einzelnen Gruppen auch ein sicheres Kriterium an die Hand geben, welche Merkmale standhaft, welche veränderlich und deshalb unbrauchbar zur Feststellung des Gat-

*) Siehe Beiträge zur Familie der Pteromalinen. 1. Heft, Seite 33, Nro. 1.

**) Ebend. Seite 34, Nro. 11.

tungstypus erscheinen. Auf viele und langjährige Beobachtungen gestützt trage ich daher nicht das geringste Bedenken, die abweichende Form des Knopfes an dem ramus stigmaticus hier in den Gattungscharakter aufzunehmen. Bei *Dinotus* ist der Knopf rundlich, herabgebogen oder hängend und erinnert sogleich an *Megastismus* unter den *Torymoiden*. Hiervon weicht die Form bei *Acrocormus* ganz ab, da der ramus stigmaticus bei dieser Gattung genau die Form, wie bei *Lamprotatus* zeigt, nämlich eine starke und etwas unförmliche Verdickung nach der Innenseite des Flügels hin. Von *Acrocormus* besitze ich beide Geschlechter und zwei Arten, von *Dinotus* nur eine Art im weiblichen Geschlecht.

Mit der Gattung *Pteromalus* ist zwar *Etroxys Westw.* in der Beschränkung, die ich schon früher angegeben habe, (nämlich die beiden Arten *Walker's fuscescens* und *stenogaster* umfassend,) sehr nahe verwandt, wird aber doch noch mit Sicherheit durch die starke Ausbildung des ramus postmarginalis erkannt und bestimmt. Die Gattung *Pteromalus* enthält aber unverkennbar, grade so wie *Encyrtus*, in ihrem vielgestaltigen Formwechsel die Typen besonderer Gattungen, deren Begründung aber noch in weiter Ferne liegt. Die Aufstellung neuer Gattungen wird hier durch den ungeheuren Artreichtum mehr erschwert als gefördert und wenn auch selbst in dem einen Geschlecht Charaktere auftreten, welche zu einer Trennung genügende Veranlassung geben könnten, so bleibt das andere Geschlecht fast in der Regel dem allgemeinen Charakter treu und vereitelt jeden Versuch einer Lostrennung. Beispielsweise führe ich hier die Gattungen *Platymesopus* und *Mesopolobus Westw.* an, deren ♂ in der eigenthümlichen Gestaltung der Mitteltibien die Bildung neuer Gattungen wohl rechtfertigen würden, wenn nicht die ♀ durch den Typus der Gattung *Pteromalus* jenes sexuelle Merkmal der ♂ illusorisch machten. Diese beiden Gattungen sowie auch *Eutelus* hat daher *Walker* nicht mit Unrecht wieder eingezogen und mit *Pteromalus* vereinigt.

Die *Pteromaloiden* bilden den Schluss der pentameren Familien unter den *Chalcidien*. Die *Tetrameren* und *Trimeren* sind weder so zahlreich an Familien, noch an Gattungen und Arten, obgleich auch dieses Gebiet sich von Jahr zu Jahr erweitert. *Haliday* hat alle *Tetrameren*-Gattungen in die Familie der *Eulophini* zusammen gedrängt und damit auch die *Trimeren* verbunden. Diesem Beispiele folgte ich hauptsächlich aus dem Grunde nicht, weil mir die ungleiche Anzahl der Fussglieder eine Theilung unabweislich nothwendig erscheinen liess. Nicht minder erschien mir die Bildung neuer Familien nach dem Vorgange unter den *Pentameren* in konsequenter Weise geboten zu sein, wenn überhaupt das vorliegende Material dazu ungezwungen sich darbot. Werfen wir auch nur einen flüchtigen Blick auf die nachfolgenden Familien, dann wird man den Versuch zur Aufstellung und Begründung derselben nicht mehr so gewagt oder gar ungerechtfertigt finden.

17. *Elasmoidae*. Diese kleine Familie enthält nur die einzige Gattung *Elasmus*, worüber oben Seite 25 bereits einige Andeutungen gegeben wurden. Diese will ich hier noch durch einige andere Merkmale vervollständigen. Die Fühler sind neungliedrig, mit einem sehr versteckten Ringel und einem dreiringeligen Endglied, beim ♂ kammstrahlig, grade so wie bei *Eulophus*. Der Scheitel ist von dem Nacken durch eine scharfe Kante getrennt und die paarigen Nebenaugen liegen hart an dieser Kante. Das Mesonotum zeigt keine Spur von Theilung durch Furchen; das Schildchen hat an der Spitze einen häutigen, dreieckigen, ziemlich scharf zugespitzten, lamellenartigen Anhang. Die Hinterbrustseiten sind sehr stark erweitert, sie erstrecken sich bis zum Hinter-

leibe und schliessen dessen Basis von beiden Seiten ein. In den Flügeln ist der ramus humeralis sehr kurz, der ramus marginalis fast mehr als doppelt so lang wie jener, während der ramus stigmaticus verschwindend klein wird, so dass der Knopf fast mit dem Vorderrand verbunden erscheint. Die Schienen haben zwei Dornen und die vier hinteren Schenkel sind stark zusammen gedrückt, breit und flach.

Nees hat die Gattung *Elasmus* unter dem Namen *Aneure* in seinem bekannten Werke aufgeführt und davon zwei Arten beschrieben, *nuda* und *scutellaris*. Von der ersteren behauptet er, dass der häutige Fortsatz an der Spitze des Schildchens fehle, was indess nicht der Fall ist. Der Fortsatz ist blos dunkel gefärbt, nicht weiss, wie bei der zweiten Art, und wird deshalb leicht übersehen. Ueber die Lebensweise kann ich mittheilen, dass ich *nuda* *Nees* aus *Tinea padella* gezogen habe.

18. Elachistoidae. Die nicht gebrochene Unterrandader unterscheidet diese Familie von den Entedoniden und Tetrastichiden, sowie die durchgehenden Furchen der Parapsiden sie von den ächten Eulophiden trennt. Die Zahl der bekannten Gattungen beschränkte sich bis jetzt blos auf zwei, aber ich bin in den Stand gesetzt, noch drei neue hinzufügen zu können.

a. Die hintersten Tibien mit zwei langen Dornen **Euplectrus** *Westw.*

aa. Die hintersten Tibien nicht mit zwei langen Dornen.

b. Der Hinterleib kurz gestielt **Elachistus** *Spin.*

bb. Der Hinterleib sitzend.

c. Die Furchen der Parapsiden stossen auf das Schildchen; die Fühler mit zwei Ringeln **Aulogymnus** *m.*

cc. Die Furchen der Parapsiden stossen weit vom Schildchen ab auf die Achseln; Fühler mit einem Ringel.

d. Fühler achtgliedrig, das Endglied zweiringelig (♀) oder nicht geringelt (♂) **Olynx** *m. *)*

dd. Fühler neungliedrig, das Endglied zweiringelig (♀) . . . **Teleogmus** *m. **)*

Auf den *Pteromalus bicolor* *Swed.*, welcher mit *Elachistus albiventris* *Spin.* ein und dasselbe Thierchen bezeichnet, ist die Gattung *Euplectrus* *Westw.* begründet worden, welche sich von den übrigen Gattungen sehr leicht durch die zwei langen Dorne der hintersten Schienen unterscheiden lässt. Der eine dieser Dorne ist länger als das erste Fussglied. Die Fühler sind neungliedrig mit einem Ringel und einem zweiringeligen Endglied. Das neunte oder letzte Fühlerglied hat noch ein kurzes griffelförmiges Stielchen, welches aber nicht zu den Fühlergliedern gezählt wird. Die Achseln nähern sich sehr stark, ohne sich zu berühren, sie sind vom Schildchen durch tiefere Furchen getrennt, wie von den Parapsiden. Das Schildchen hat keine Seitenfurchen. Der Hinterleib ist deutlich gestielt, der Stiel bei dem ♂ etwas länger als bei dem ♀. Von *Euplectrus*

*) *Olynx* von ὀλίγξ, ὄγξος, ἦ, die Furche. Der Name steht in Beziehung zu den tiefen Furchen der Parapsiden.

**) *Teleogmus* von τελέε, in der Ferne, weit, fern und ὄγμος, ὄ, die Furche. Eine Andeutung auf die Furchen der Parapsiden, welche fern von dem Schildchen auf die Achseln stossen.

bicolor sind ♂ und ♀ nicht grade selten. Eine zweite Art *Euplectrus* (*Elachistus*) *chlorocephalus* hat *Nees* *) beschrieben.

Mit *Euplectrus* lässt sich *Elachistus* gar nicht verwechseln. Der Mangel der langen Schienendorne würde sie gleich unterscheiden. Einige Arten haben in ihrem Habitus allerdings einige Aehnlichkeit mit *Euplectrus*, z. B. *Elachistus rufescens Rossi*, *fenestratus Nees* und *Artaeus Walk.*, die anderen Arten entfernen sich aber schon sichtlich von dem Typus der Gattung *Euplectrus*. Die Fühler haben bei *Elachistus* genau dieselbe Gliederzahl und Bildung, wie bei *Euplectrus*, auch ist der Hinterleib mehr oder weniger deutlich gestielt, das Schildchen zeigt aber eine ganz abweichende Bildung, indem es zwei Seitenfurchen hat, welche nach vorn auf die Achseln stossen. Die Zahl der Arten ist schon beträchtlich, ich besitze deren achtzehn, aber nur von einer Art *inunctus Nees* (= *Argissa Walk.*) ist mir die Lebensweise bekannt, indem ich sie aus abgefallenen Fichtenzapfen erzog, worin *Tortrix strobilana* lebte. Auch bei Frankfurt erzog Herr von Heyden dieselbe Art.

Die beiden neuen Gattungen *Aulogymnus* und *Olynx* unterscheiden sich schon auf den ersten Blick von den beiden vorhergehenden durch den sitzenden Hinterleib, noch mehr aber durch die Fühler. Bei *Aulogymnus* sind die Fühler zwar neungliedrig, aber mit zwei Ringeln und einem zweiringeligen Endglied. Die beiden Ringel sind schon mit einer recht scharfen Loupe, noch deutlicher aber unter dem Mikroskop zu erkennen. Weiter zeichnet sich diese Gattung noch von *Olynx* durch die starke Entwicklung des Prothorax aus. Das Schildchen hat eben so wenig wie *Olynx* die beiden Seitenfurchen, welche die Gattung *Elachistus* augenblicklich kenntlich machen. Ich habe diese Gattung bereits im Jahre 1851 aufgestellt und die einzige mir bekannte Art als *Aulogymnus Aceris* **) beschrieben. Damals hatte ich diese Art noch nicht selbst erzogen, aber einige Jahre später gelang es mir, bei Aachen auf *Acer platanoides* die Gallen in grosser Menge zu entdecken, worin die Larven einer Gallwespe, welche wahrscheinlich der Gattung *Pediaspis Tischb.* angehören, lebten. Ich erzog daraus den *Aulogymnus* in zahlreichen Exemplaren, aber nur ♀, kein einziges ♂ war darunter und bis auf den heutigen Tag sind mir die ♂ noch unbekannt geblieben. Bei der früheren Charakteristik der Gattung habe ich irrthümlicher Weise das Endglied der Fühler als dreiringelig, den ganzen Fühler daher als zehngliedrig angegeben, diesen Irrthum muss ich jetzt nach genauerer Prüfung hier berichtigen.

Mit der Fühlerbildung von *Aulogymnus* stimmt die der Gattung *Olynx* in so fern überein, als der einzige Unterschied blos in der Zahl der Ringel besteht. Bei *Olynx* kann ich nämlich nur achtgliedrige Fühler mit einem Ringel annehmen. Zwar schien es mir, als sei dieses Ringel aus zwei eng verwachsenen Theilen zusammen gesetzt, die vielleicht bei frischen Exemplaren (ich habe nur trockene untersucht) deutlicher hervortreten, in diesem Falle würden die Fühler neungliedrig sein. Der Prothorax ist viel weniger entwickelt, als bei *Aulogymnus* und die Furchen der Parapsiden stossen schon in beträchtlicher Entfernung von dem Schildchen auf die Achseln. Das Schildchen hat auch keine Seitenfurchen. Ein besonderes Unterscheidungsmerkmal weisen aber

*) *Nees ab Esenbeck*, Hym. Ichn. aff. monogr. Vol. II, pag. 146, 16.

**) Siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. 8. Jahrgang 1851, Seite 25.

noch die Flügel nach. Der ramus stigmaticus ist nämlich ganz allmählig und sehr regelmässig keulförmig verdickt, mit einer sehr kleinen, nach dem Vorderrande hin gerichteten Spitze. Ich habe die Gattung *Olynx* auf den *Ichneumon gallarum* L. (= *Pteromalus gallarum* Latr. oder *Eulophus gallarum* Nees) gegründet; *Walker* führt diese Art zwar noch bei der Gattung *Eulophus* auf, es ist aber einleuchtend, dass sie davon generisch verschieden sein muss, weil das ♂ keine kammstrahligen Fühler besitzt. Ich habe in hiesiger Gegend eine zweite Art entdeckt, welche ich *Olynx striata* nenne. Die Lebensweise von *Olynx gallarum* L. ist bekannt, sie lebt parasitisch auf den Larven von *Teras terminalis* Hart., ich habe sie aus den Schwammgallen desselben oft erzogen.

Von *Olynx* kann die Gattung *Teleogmus* leicht durch die Zahl der Fühlerglieder unterschieden werden, eben so ist die eigenthümliche Verdickung des ramus stigmaticus bei *Olynx* ein gutes Unterscheidungsmerkmal. Bei *Teleogmus* ist auch der Schild des Mesonotums sowie das Schildchen flach, bei *Olynx* schwach gewölbt. Nur die ♀ wurden in hiesiger Gegend von einer einzigen Art *Teleogmus orbitalis* m. entdeckt.

19. Eulophoidae. In der Begränzung, wie ich diese Familie hier aufstelle, enthält sie nur wenige Gattungen. Durch die nicht vollständig getrennten Parapsiden weicht sie von den Elachistoiden, durch die nicht gebrochene Unterrandader von den zwei folgenden Familien ab. Die Gattungen werden nach dem folgenden Schema wohl ohne besondere Schwierigkeit sich unterscheiden lassen:

a. Das Schildchen mit zwei Furchen.

b. Fühler achtgliedrig; die Schildfurchen treffen auf die Achseln . . . **Cirrospilus** Westw.

bb. Fühler neungliedrig; die Schildfurchen treffen auf das Mesonotum.

c. Fühler über dem Mundrande eingefügt; Hinterschildchen kaum sichtbar ♀ (♂ ohne Netzaugen) **Melittobia** Westw.

cc. Fühler weit über dem Mundrande eingefügt; das Hinterschildchen sehr gross ♀ **Solenotus** m. *)

aa. Das Schildchen ohne Furchen.

d. Die Geissel des ♂ kammstrahlig, beim ♀ mit zwei- oder dreiringeligem Endglied **Eulophus** Geoffr.

dd. Die Geissel des ♂ nicht kammstrahlig **Sympiesis** m. **)

Die Gattungen dieser Familie zerfallen nach der An- oder Abwesenheit der Schildseitenfurchen in zwei Abtheilungen. Mit solchen Furchen versehen haben wir drei Gattungen vor uns, *Cirrospilus*, *Melittobia* und *Solenotus*. *Cirrospilus* hat bloß achtgliedrige Fühler mit einem Ringel und dreiringeligem Endglied. Diese Gattung ist zahlreich an Arten, obgleich verhältnissmässig doch nicht so reich wie *Eulophus*. Die beiden anderen Gattungen haben neungliedrige Fühler mit Einschluss eines Ringels. Von diesen ist unstreitig durch die seltsame Form der Fühler das ♂ Geschlecht von *Melittobia*, einer Gattung, die bis dahin bloß in England und Frankreich entdeckt

*) *Solenotus* von *σοληνωτός*, ἡ, όν, wie eine Rinne gemacht. Auf das Schildchen deutet der Gattungsname hin, weil an demselben beiderseits zwei schwache Furchen wie eine Rinne verlaufen.

**) *Sympiesis* von *συμπιέσις*, ἡ, das Zusammendrücken. Bezieht sich auf die stark zusammen gedrückten Geisselglieder.

worden ist, äusserst merkwürdig. Das ♂ hat nämlich einen stark entwickelten, nach der Spitze erbreiterten und auf der Unterseite ausgehöhlten Schaft. Die Spitze desselben ist stark ausgerandet und dadurch entstehen gleichsam zwei vorspringende Ecken. An der einen Ecke ist das Stielchen befestigt, welches breiter als lang und nach innen in eine längere Spitze ausgezogen erscheint. Diesem schliesst sich ein sehr stark verdicktes Glied an, welches die Stelle des Ringels zu vertreten scheint, es ist breiter als lang. Die drei folgenden Glieder sind klein, sehr kurz und doppelt so breit wie lang. Das Endglied bildet einen verdickten, eiförmigen, dreiringeligen Knopf, der etwas länger erscheint, als die drei vorhergehenden Glieder zusammen genommen. Die drei Glieder des Knopfes sind so enge zusammen geschoben, dass sie nur schwer trennbar sind und daher selten deutlich sichtbar werden. Eine andere noch grössere Eigenthümlichkeit zeigen die Augen. Statt eines Netzauges zeigt das ♂ ein äusserst schwaches, mit der stärksten Loupe kaum wahrnehmbares, einfaches Punktauge, während die drei Ocellen an der gewöhnlichen Stelle auf dem Scheitel stehen und viel deutlicher hervortreten. Trotzdem dass *Newport* *) nur ein Nebenaugen annimmt, habe ich an vier Exemplaren jedesmal drei Nebenaugen gesehen. Ein Irrthum ist also nicht wohl möglich. Die Flügel sind verkümmert und erreichen kaum die Basis des Hinterleibs. Beim ♀ sind grosse Netzaugen vorhanden und auf dem Scheitel drei Punktaugen. Die Fühler haben zwar dieselbe Gliederzahl, aber eine ganz andere Form. Auf das Stielchen folgt ein äusserst kleines, ganz verstecktes Ringel, dann drei gleich grosse walzenförmige Geisselglieder, welche kaum länger als breit sein dürften und endlich ein dreiringeliges Endglied. Die Schildfurchen sind schwach, beim ♂ fehlen sie sogar.

Von *Melittobia Westw.* ist nur eine einzige Art entdeckt worden, über welche mehrere englische Schriftsteller unter verschiedenen Namen Notizen mitgetheilt haben. Zuletzt hat *F. Smith* **) die einzelnen Beobachtungen und Mittheilungen gesammelt, verglichen und durch eigene Untersuchungen die nöthige Klarheit in diesen verwickelten Gegenstand gebracht. Aus seiner Darstellung geht hervor, dass diese merkwürdige Gattung den Namen *Melittobia Acasta Walk.* führen und die hier folgende Synonymie hinzugefügt werden muss:

Cirrospilus Acasta Walk. Mon. Chalc. Add. pag. 328. ♀. (1839.)

Melittobia Audouinii Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. V. pag. 45. ♂. (1849.)

Anthophorabia retusa Newp. Trans. Linn. Soc. XXI. pag. 63. ♂ ♀. (1852.)

Durch die ausgezeichnete Liberalität von *F. Smith* wurde ich mit Exemplaren beiderlei Geschlechts (ein ♂ wurde mir sogar von London aus noch lebend zugesandt) versehen, ich habe daher die vorhergehende Auseinandersetzung der Fühler und Augen nicht den englischen Autoren blos entlehnt, sondern an den vorliegenden Exemplaren selbst alles so beobachtet, wie ich es dargestellt habe. Mit *F. Smith* und *Newport* stimme ich nun in Bezug auf die Anwesenheit der einfachen Augen beim ♂ überein, obgleich *Westwood* gar keine Augen gefunden haben will. In Bezug auf

*) Transact. of the Ent. Soc. Vol. II. N. S. Part. VIII. XXVIII. Notes on the Habits of a Bee-parasite *Melittobia Acasta*, by *Frederic Smith*, Esq.

**) Siehe Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiet der Entomologie während des Jahres 1852 von Dr. *Hermann Schaum*, Seite 40. Ich muss auf die Angabe dieses Berichtes fussen, da mir die Abhandlung *Newport's* in den Trans. of the Linn. Soc. Vol. XXI. P. I, Seite 61, nicht zu Gebote steht.

die Fühler hat *Smith* sich nicht ausgesprochen, er scheint die Angabe *Westwood's* für richtig zu halten, wonach das ♂ neun-, das ♀ aber achtgliedrige Fühler haben soll. Diese Angabe *Westwood's* ist auch richtig, wenn man annimmt, dass er das sehr kleine und versteckte Ringel beim ♀ nicht mitgezählt habe. In der Wirklichkeit sind also auch die Fühler des ♀ neungliedrig. Wären die Fühler wirklich nur achtgliedrig, dann würde man gar keinen Grund haben, diese Gattung generisch von *Cirropilus* zu trennen. Die Darstellung der Fühlergliederzahl bei *Newport* in der Charakteristik von *Anthophorabia retusa* ist ganz unrichtig, namentlich beim ♂.

Es dürfte nicht unerwünscht sein, hier auch in der Kürze die Lebensweise von *Melittobia* zu erwähnen. Die englischen Autoren haben sie in den Nestern von *Anthophora retusa* zugleich mit einer *Monodontomerus*-Art gefunden, während *Audouin* sie in Frankreich in den Nestern von *Anthophora*, *Osmia* und *Odynerus* entdeckte. *F. Smith* wirft hier die nicht unwesentliche Frage auf, ist *Melittobia* der Parasit von *Anthophora*, *Osmia* u. s. w. oder von *Monodontomerus*? d. h. mit anderen Worten, ist *Melittobia* vielleicht der Parasit eines Parasiten? Er hat sich, auf eigene Beobachtungen gestützt, für die letztere Ansicht ausgesprochen. Es wäre wünschenswerth, dass auch in Deutschland Nachforschungen über dieses interessante Insekt angestellt würden, denn da *Anthophora*, *Osmia* und *Odynerus* gewiss über ganz Deutschland verbreitet sind, so wird auch wohl der sie in Schranken haltende Parasit als unzertrennlicher Begleiter nicht fehlen.

Vergleichen wir die Gattung *Solenotus* und *Cirropilus*, so ist eine Differenz schnell in der ungleichen Fühlergliederzahl gefunden, weit schwieriger aber stellt sich der Vergleich mit *Melittobia* ♀ heraus. Die Fühler stehen zwar bei *Solenotus* weiter vom Mundrande entfernt, wie bei *Melittobia*, aber dieses Merkmal allein würde mich nicht bestimmt haben, eine Trennung beider vorzunehmen. In dem ganzen Bau des Mittelleibs finde ich aber noch andere und erhebliche Unterschiede. Bei *Solenotus* ist das Pronotum kürzer als das Mesonotum und die Furchen, welche die Achseln von dem Mesonotum trennen, erstrecken sich nicht bis zu dem Pronotum hin. Auch ist das Hinterschildchen sehr gross. Bei *Melittobia* ♀ sehen wir genau das Gegentheil, das Pronotum erreicht die Länge des Mesonotums, die Furchen, welche die Achseln von dem letzteren scheiden, gehen bis zu dem Pronotum hinauf und das Hinterschildchen ist kaum sichtbar. Von entscheidender Wichtigkeit ist aber das ♂ von *Melittobia* mit seinen vielen eigenthümlichen Merkmalen, welche bereits oben weitläufig entwickelt wurden. Wenn auch zur Zeit das ♂ von *Solenotus* noch nicht bekannt ist, so lässt sich doch mit aller Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass es von jenem der Gattung *Melittobia* unendlich weit verschieden sein wird. Von *Solenotus* kenne ich nur eine Art, *Solenotus viridis*, sie ist grün, die Fühler sind schwarzbraun, die Beine gelb mit grünen Hüften und Schenkeln, das letzte Fussglied braun. Ich fand sie in der Nähe von Aachen.

Eine scharf ausgeprägte Gattung muss der *Eulophus sericeicornis* *Nees* *) bilden, ich habe sie *Sympiesis* genannt. Durch den Mangel der Schildfurchen schliesst sie sich zunächst an *Eulophus* an, aber die Fühlerbildung ist ganz und gar abweichend. Die Fühler des ♂ sind nicht kammstrahlig, wie bei *Eulophus*, neungliedrig mit einem Ringel, das Endglied nicht geringelt, alle Glieder der Geissel vollständig getrennt und stark zusammen gedrückt, die drei letzteren noch dazu viel länger als die drei vorhergehenden. Ueber das ♀ weiss ich keine Auskunft zu

*) *Nees*, Hym. Ichn. aff. monogr. Vol. II, pag. 168, 21.

geben, ich vermuthe, dass der *Eulophus Eneugamus Walk.* dazu gehört, obgleich *Nees* ein ♀ beschreibt, welches von dem ♂ sich nur durch die Färbung des Thorax, einen spitzeren Hinterleib und an der Spitze weniger ausgedehnte braune Färbung der Tibien unterscheiden soll. Mir scheint nach dieser geringen Differenz beider Geschlechter der Schluss nahe zu liegen, dass *Nees* bei der Beschreibung des ♀ ebenfalls ein ♂ vor Augen gehabt habe. In dieser Meinung bestärkt mich noch besonders die Darstellung des *Entedon laticornis Ratzb.*, den ich für dieselbe Art wie *Eulophus sericeicornis* halte, denn die Darstellung des männlichen Fühlers bei *Ratzeburg* *) stellt unzweideutig den hier in Rede stehenden *Eulophus sericeicornis Nees* dar, obgleich *Ratzeburg* die Geissel als siebengliedrig angibt und die vier ersten Geisselglieder als kürzer bezeichnet wie die drei folgenden. Offenbar hat er das Stielchen mit zu den Geisselgliedern gezählt, was gegen den gewöhnlichen Gebrauch verstösst. Die Geissel ist allerdings siebengliedrig, aber nur wenn das unscheinbare Ringel mitgezählt wird. Die Schilderung des ♀ von *Entedon laticornis Ratzb.* scheint mir ferner ganz auf *Eulophus Eneugamus Walk.* zu passen und somit würden obige Vermuthungen über die Verwechslung des Geschlechtes bei *Nees* hierin ihre Bestätigung finden.

Eine eben so schöne als artenreiche, dabei aber schwierige Gattung in dieser Familie haben wir in der Gattung *Eulophus* vor uns. Dadurch, dass die ♂ alle ohne Ausnahme kammstrahlige Fühler haben, ist eine Verwechslung für dieses Geschlecht mit den übrigen Gattungen nicht möglich. Solcher Kammstrahlen hat das ♂ gewöhnlich drei, viel seltener nur zwei. Diese Differenz hat *Westwood* Veranlassung zu der Aufstellung einer neuen Gattung *Dicladocerus* **) gegeben, die aber mit Recht von *Walker* wieder unterdrückt wurde. Eine andere Gattung *Westwood's*, nämlich *Hemiptarsenus*, ***) hat kein besseres Schicksal gehabt. Nur in dem Falle, dass *Dicladocerus* ♂ und *Hemiptarsenus* ♀ als die beiden Geschlechter zusammen gehörten, dürfte eine Trennung von *Eulophus* unter dem einen oder dem anderen Namen als gerechtfertigt erscheinen. Aber dieser Eventualität steht bis jetzt noch keine einzige Beobachtung zur Seite. An diesen beiden wieder eingegangenen Gattungen zeigt es sich aber auch klar genug, dass selbst bei dem grossen Artreichthum von *Eulophus* noch keine Zersplitterung möglich geworden ist. Nur bei den ♀ habe ich bemerkt, dass das Endglied der Geissel bald zwei- und bald wieder ganz entschieden dreiringelig ist, ohne dass in der Fühlergliederzahl im Allgemeinen etwas geändert würde. In Bezug auf den Habitus zeigt sich ebenfalls etwas Schwankendes bei den ♀ und zwar mehr als bei den ♂. Dann scheinen mir auch einzelne Arten, z. B. *Eulophus ramicornis Nees*, *fuliginosus Nees*, *dimidiatus Nees* durch die gerundete Spitze des Hinterleibs beim ♀ und den breiten Thorax des ♂ eine ganz gesonderte kleine Tribus bilden zu müssen, aber auf diese geringen Andeutungen eine eigene Gattung zu bilden halte ich nicht für thunlich. Voraussichtlich wird es noch in langer Zeit nicht gelingen, generische Scheidungen

*) Die Ichn. der Forstinsekten, zweiter Band, Seite 162, Tab. III, Fig. 24. — Hier ist in der Abbildung das Endglied der Fühler zwar noch geringelt dargestellt, was nur auf einem übrigens leicht entschuldbaren Irrthum beruhen kann. Sehr häufig glaubt man nämlich noch da eine Ringelung wahrzunehmen, wo in Wahrheit keine ist. Hier helfen Analogien oft mehr, als halbklare und noch schwankende Beobachtungen.

**) Phil. Journ. I. 1852.

***) Mag. of Nat. Hist. VI. 1833.

in dieser Gattung vorzunehmen aber um so mehr wird eine sorgfältige Gruppierung der Arten Noth thun und wünschenswerth erscheinen.

Die beiden nachfolgenden Familien, die Entedonoiden und Tetrastichoiden, gränzen sich von den beiden vorhergehenden durch die Unterrandader ab, welche, ehe sie den Vorderrand des Flügels erreicht, deutlich gebrochen erscheint. Im Allgemeinen wird ein geübter Blick sie schnell und sicher bestimmen können.

20. Entedonoidae. Mit dem Gesamtnamen Entedon wurde von *Walker* die ganze Familie umfasst, welche nun in eine Anzahl natürlicher Gattungen getheilt wird, die zum Theil selbst schon von den englischen Schriftstellern aufgestellt worden sind. Ich habe einige neue Gattungen hinzugefügt, deren Merkmale mir eben so standhaft erschienen, deren Abtrennung aber, wie ich hoffen darf, das Studium der grossen Gattung Entedon wesentlich erleichtern wird. Von den früher gebildeten sowie von den neuen Gattungen habe ich folgendes Schema entworfen:

- a. Fühler zwölfgliedrig (blos ein Ringel vorhanden) **Epiclerus Hal.**
- aa. Fühler weniger als zwölfgliedrig.
 - b. Fühler keulförmig **Rhopalotus m. *)**
 - bb. Fühler nicht keulförmig.
 - c. Fühlergeissel beim ♂ stark gesägt und wirtelhaarig, beim ♀ bloss geringelt **Astichus m. **)**
 - cc. Fühlergeissel beim ♂ nicht gesägt, beim ♀ nicht bloss geringelt.
 - d. Das Schildchen mit einer Mittelfurche **Holcopelte m. ***)**
 - dd. Das Schildchen ohne Mittelfurche.
 - e. Flügel mit mehreren Haarreihen **Euderus Walk.**
 - ee. Flügel nicht mit mehreren Haarreihen.
 - f. Flügel mit einer unvollkommenen, bloss von einer Haarreihe begränzten Randzelle **Secodes m. †)**
 - ff. Flügel ohne Randzelle.
 - g. Der ramus postmarginalis gleich hinter dem ramus stigmaticus abgebrochen.
 - h. Die Unterrandader stark verdickt **Pleuropachys Westw.**
 - hh. Die Unterrandader nicht stark verdickt.
 - i. Das Metanotum mit Seitenkielen **Pleurotropis m. ††)**

*) Rhopalotus von *ῥοπαλιωτός*, in Keulenform gebildet.

**) Astichus von *ἄστις* priv. und *στίχος*, *ὁ*, die Reihe. — Der Flügel hat keine Haarreihen wie Euderus, daher diese Benennung.

***) Holcopelte von *ὄλκος*, die Furche und *πέλις*, *ἡ*, der Schild.

†) Secodes von *σηκώδης* (*σηκός* *εἶδος*), einem eingefriedigten Orte ähnlich. Die Andeutung zu dieser Benennung fand ich in der Haarreihe, welche scheinbar diejenige Stelle des Flügels abgränzt (einfriedigt), welche gewöhnlich die Radialzelle einnimmt.

††) Pleurotropis von *πλευρά*, *ἡ*, die Seite und *ῥόπισ*, *ἡ*, der Kiel, Schiffskiel. Die scharfen Seitenkiel des Metanotums bedingten den Namen dieser Gattung.

- ii. Das Metanotum ohne Seitenkiele.
- k. Das Schildchen stark schuppig **Entedon Dalm.**
- kk. Das Schildchen glatt **Asecodes m. *)**
- gg. Der ramus postmarginalis nicht gleich hinter dem ramus stigmaticus
abgebrochen.
- l. Der Hinterleib stark zugespitzt **Omphale Hal.**
- ll. Der Hinterleib nicht stark zugespitzt.
- m. Fühler achthgliedrig **Chrysocharis m. **)**
- mm. Fühler neungliedrig **Derostenus Westw.**

Bei erneuerter und sorgfältiger Untersuchung glaube ich hier einen Irrthum berichtigen zu müssen, welcher die Stellung von *Tetracampe* betrifft. Mit fast vollkommener Gewissheit kann ich nun die Behauptung wagen, dass die tetramere Gattung *Epiclerus Hal.* mit meiner Gattung *Tetracampe* ganz übereinstimmt und als Synonym dazu gehört. Die ♂ haben nämlich viergliedrige Tarsen, (ich habe vier ♂ von *Tetracampe impressa m.* untersucht und immer dieselbe Zahl gefunden!) die ♀ aber fünfgliedrige. Bei einer neuen noch unbeschriebenen Art, von welcher ich beide Geschlechter besitze, bleibt dieses Verhältniss der Tarsen dasselbe. Von *Tetracampe flavipes m.* habe ich nur ♂ und alle sind mit viergliedrigen Tarsen versehen. Auch von *Entedon Temenus Walk.* glaube ich das ♂ zu besitzen, es hat ebenfalls nur viergliedrige Tarsen. Somit ist also merkwürdiger Weise *Tetracampe* eine heteromere Gattung und die erste und einzige, welche meines Wissens bis jetzt in der Chalciden-Gruppe entdeckt worden ist. Da sie nun weder unter den Pentameren noch unter den Tetrameren füglich eingereiht werden kann, so wird sie naturgemäss ihre Stellung zwischen beiden einnehmen müssen und zwar eine durchaus selbstständige in einer eigenen Familie. Diese nenne ich hier vorläufig *Tetracampoidae*.

In Bezug auf die ♂ der Gattung *Tetracampe* muss ich noch bemerken, dass die Fühler eine dreifache Formverschiedenheit wahrnehmen lassen, welche bei entsprechenden Differenzen unter den ♀ wohl zur Aufstellung neuer Gattungen geeignet wäre. Bei *Tetracampe flavipes m.* ist nämlich der Schaft ganz ungewöhnlich erweitert und bei einer anderen Art, die ich für *Temenus Walk.* halte, sind die Glieder der Geissel flach gedrückt und zwar so, dass vom ersten Gliede ab die Breite derselben nach der Spitze hin allmählig abnimmt. Dagegen zeigt die Geissel von *Tetracampe impressa* ♂ eine genaue Uebereinstimmung mit dem ♀, bei welchem alle Glieder walzenförmig und das letzte keulförmig verdickt erscheint. Von *Tetracampe flavipes* besitze ich keine ♀, ich vermuthe aber, dass sie von dem allgemeinen Typus des ♀ von *Tetracampe impressa* nicht abweichen und daher halte ich hier nicht für zweckmässig, neue Gattungen aufzustellen.

Obgleich in der eben erfolgten Darstellung für mich selbst nicht die geringste Bedenklichkeit mehr über die Identität von *Tetracampe* und *Epiclerus* herrscht und der letztere Name des-

*) *Asecodes* von *α* priv. und *σηκώδης*, einem eingefriedigten Orte ähnlich. Diese Benennung zeigt grade das Gegentheil von *Secodes* an.

**) *Chrysocharis* von *χρύσος*, *εη*, *εον*, golden, auch *kostbar*, *herrlich* und *χάρις*, *ή*, die Anmuth, Schönheit, Pracht. Es wird durch diese Benennung annäherungsweise die schöne grüne oder goldgrüne Färbung auszudrücken gesucht.

halb, weil jener der ältere, folgerichtig unterdrückt werden muss, so mag doch zur weiteren Aufklärung und Bestätigung meiner Ansicht *Tetracampe* ♀ unter den *Cleonymoiden* und *Epiclerus* ♂ unter den *Entedonoiden* stehen bleiben, wo man sie bei sorgfältiger Untersuchung der Tarsenglieder leicht auffinden kann. Hoffentlich wird *Walker* oder *Haliday* meine Ansicht bald bestätigen oder widerlegen, in beiden Fällen wird jedenfalls der Wissenschaft ein Dienst geleistet.

Auf den *Elachistus cothurnatus* und *gradualis* *Nees* *) habe ich die Gattung *Rhopalotus* gegründet. Sie schliesst sich zunächst an *Entedon* an, lässt sich aber leicht durch die an der Spitze ungewöhnlich verdickten, stark keulförmigen Fühler und den kurzen, sehr dicken Hinterleibsstiel davon unterscheiden. Der letztere erinnert zwar an *Pleurotropis*, aber der Bau des Metanotums lässt eine Vereinigung mit dieser Gattung nicht zu.

Die zierlichste Gattung in dieser Familie ist unstreitig *Astichus*. Unter dem Namen *Euderus arithmeticus* **) habe ich früher das ♀ beschrieben, muss aber jetzt, nachdem ich das ♂ kennen gelernt habe, eine Trennung von *Euderus* eintreten lassen und ein neues Genus dafür aufstellen. Für das ♂ liegt in den stark gesägten Fühlern, die an *Eurytoma* erinnern, ein treffliches Merkmal, welches keiner anderen Gattung der *Entedonoiden* zukommt; die ♀ haben die Fühlergeissel bloss geringelt, zwar kein generisches Merkmal, aber doch in dieser Familie eine ungewöhnliche und ganz vereinzelte Erscheinung. Mit *Euderus* ♀ ist eine sehr grosse Verwandtschaft zwar nicht zu verkennen, denn *Astichus* ♀ hat dieselben tiefen Furchen der Parapsiden und zehngliedrige Fühler mit einem Ringel und dreiringeligem Endglied. (Die Theilung des Endgliedes ist zwar mit der Loupe kaum zu erkennen, weil die Behaarung die schwachen Näthe kaum durchscheinen lassen, man muss das Compositum zu Hilfe nehmen.) Der einzige standhafte Unterschied liegt daher in den eigenthümlich geordneten Haarreihen der Flügel bei der Gattung *Euderus*.

Von *Astichus arithmeticus* habe ich seit 1850, wo ich das erste Stück auf einem *Polyporus versicolor* gefangen, eine grosse Menge Exemplare erzogen und zwar drei Jahre lang in wiederholten Generationen. Höchst merkwürdig erschien mir dabei, dass ich niemals ein ♂, sondern immer nur ♀ erzog und diese zu Hunderten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Gattung ein Parasit von *Cis* ist, denn diese allein lebten in grosser Masse in jenen Schwämmen. Herr *von Heyden* erzog in Frankfurt eine zweite Art ebenfalls aus Schwämmen und zwar in beiden Geschlechtern, ich habe sie *Astichus solutus* genannt, weil die merkwürdige Zeichnung des Flügels, wie wir sie bei *arithmeticus* finden, sich bei *solutus* in einzelne, nicht zusammenhängende Flecken auflöst.

In der näheren Beleuchtung von *Astichus* ist schon auf die Uebereinstimmung mit *Euderus* hingewiesen worden. Diese letztere Gattung ist von *Haliday* auf *Entedon Amphis* *Walk.* ***) gegründet worden und später wurde ebenso der *Entedon Mithras* *Walk.* derselben einverleibt. Der Gattungscharakter, wie er von *Haliday* †) aufgestellt worden, bedarf einer Erweiterung, weil die

*) *Nees ab Esenbeck*. Hym. ichn. affin. monogr. Vol. II, pag. 141 und 142.

**) Siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Achter Jahrgang, 1851. Seite 18 und Tab. I, fig. 7, der Flügel.

***) *Entedon Amphis* *Walk.*, siehe Monogr. Chalcid. I, pag. 106 und *Entedon Mithras*, pag. 93.

†) Contributions towards the classification of the Chalcididae from the Transact. of the entomol. Soc. Vol. III, pag. 295.

vorhergehende Gattung alle Merkmale von *Euderus Hal.* hat und doch generisch davon getrennt werden muss. Den weiter gehenden Unterschied zwischen beiden Gattungen finde ich in der Flügelbildung bei *Euderus*. Die Haare des Flügels sind nämlich theilweise in scharf ausgeprägten Linien geordnet; eine solche Linie geht von der Spitze des Knopfes am *ramus stigmaticus* aus und indem sie bald den Vorderrand erreicht, wird durch dieselbe gleichsam eine Radialzelle abgegränzt. Eine andere Linie geht von dem Knopfe selbst aus und erstreckt sich in einem weiten Bogen bis zur Flügelspitze. Andere Haarlinien treten weniger scharf hervor und haben deshalb auch eine geringere Bedeutung. Von diesen Haarlinien zeigt der Flügel der Gattung *Astichus* keine Spur. Von *Euderus* sind mir bei Aachen nur ♀ vorgekommen, von *Euderus Amphis* und *Mithras* ist ebenfalls nur das ♀ bekannt und beschrieben worden.

Unter dem Namen *Elachistus obscurus* *) habe ich früher eine Entedonoiden-Form beschrieben, welche nothwendig ein neues Genus bilden muss. Es zeichnet sich diese neue Gattung, welche ich *Holcopelte* nenne, durch achtgliedrige Fühler mit einem Ringel aus; das Endglied ist nicht geringelt. Das grosse Schildchen ist seiner ganzen Länge nach von einer tiefen Mittelfurche durchschnitten; diese Furche erstreckt sich noch weiter nach vorn auf den Schild des Mesonotums, welcher ebenfalls dadurch getheilt wird. Die Furchen der Parapsiden sind deutlich, nach hinten sogar tief und breit. Der Hinterleib ist kurz gestielt, der Rücken desselben gewölbt, wie bei *Pleurotropis*, das erste Segment völlig so lang wie die drei folgenden zusammen genommen. Ich kenne nur die eine schon früher beschriebene Art und zwar nun in beiden Geschlechtern.

In der Zahl und Bildung der Fühlerglieder stimmt die Gattung *Secodes* ganz mit *Holcopelte* überein, aber durch den Mangel der Schildfurche wird die Unterscheidung leicht. Schwieriger dürfte eine Unterscheidung von *Omphale* und *Asecodes* sein, aber die Flügel haben bei *Secodes* eine von der Spitze des Knopfes des *ramus stigmaticus* ausgehende Haarreihe, welche eine kleine haarlose Radialzelle abgränzt. Die einzige Art von *Secodes*, welche ich kenne, habe ich aus den kegelförmigen Gallen von Buchenblättern erzogen. Der Urheber dieser Gallen ist bekanntlich *Cecidomyia Fagi*. Unser *Secodes Fagi* ist höchst wahrscheinlich ein Parasit dieser *Cecidomyia*, obgleich keineswegs der einzige, denn ich habe auch den *Hyperteles clongatus* (*Eulophus elongatus m.*) **) aus denselben Gallen erzogen.

Die Gattung *Pleuropachys* ***) wurde von *Westwood* auf *Entedon costalis Dalm.* gegründet. Merkwürdiger Weise wurde zu dem Gattungscharakter die Abbildung von *Platynoeilus* und umgekehrt zu der Beschreibung der Gattung *Platynoeilus* die Abbildung von *Pleuropachys* hinzugefügt, ein Irrthum, auf welchen bereits früher *Erichson* in den Jahresberichten aufmerksam machte. Diese von *Westwood* aufgestellte Gattung entfernt sich von der eigentlichen Gattung *Entedon*, wie ich sie im engeren Sinne auffasse, einzig und allein durch den verdickten *ramus marginalis*. Ich kenne eben so wie *Dalman* nur das ♂, auch die Abbildung von *Westwood* stellt ein ♂ dar und es scheint mir, dass das noch unbekannte ♀ ein echter *Entedon* ist. Mir sind drei weibliche Arten von *Entedon* bekannt, nämlich *validus m.*, *martialis m.* und *Pharnus Walk.*, von welchen

*) Siehe Beiträge zur Monographie der Pteromalinen. 1. Heft, Seite 40, 15.

**) Ebend. Seite 41, 11.

***) Ent. Mag. Vol. IV, pag. 437, der Text und pag. 436, die Abbildung.

möglicher Weise die eine oder andere das ♀ von *Pleuropachys* sein könnte. So lange aber das ♀ noch unbekannt ist, dürfte die Gattung wohl beibehalten werden können.

Die beiden in der Uebersicht folgenden Gattungen *Pleurotropis m.* und *Entedon Dalm.* waren bis jetzt unter dem letzteren Namen vereinigt, ich habe aber so viele standhafte und gute Unterscheidungsmerkmale für *Pleurotropis* aufgefunden, dass die Trennung gewiss gebilligt werden wird. Um so mehr dürfte die Aufstellung dieser neuen Gattung gerechtfertigt erscheinen, weil in der Gattung *Entedon* im engeren Sinne noch eine grosse Menge von Arten übrig bleiben. Selbst nachdem noch eine zweite neue Gattung *Chrysocharis m.* und die Gattung *Omphale Hal.* von *Entedon* getrennt wurden, weist meine Sammlung noch sechszig Arten auf. Von *Pleurotropis* besitze ich ein und zwanzig, von *Chrysocharis* vier und sechzig, von *Omphale* sieben Arten, diese alle in einer einzigen Gattung vereinigt mussten nothwendig das Studium und eine sichere Unterscheidung der Art bedeutend erschweren. Eine Theilung aber, wenn sie auf sicherem Grunde ruht, trägt nicht allein zur Erleichterung des Studiums, sondern auch zur Annehmlichkeit wesentlich bei. Die Gattung *Pleurotropis* zeigt uns in dem Auftreten zweier Seitenkiele am Metanotum den ersten standhaften Unterschied von *Entedon*; dann ist der Hinterleib deutlich, manchmal sogar lang gestielt und der Hinterleibsrücken ist immer gewölbt, während er bei *Entedon* flach und meist tief eingedrückt erscheint. Die Fühler sind in beiden Gattungen achtgliedrig oder wenn man den Griffel an der Spitze des letzten Gliedes mitzählen will, neungliedrig, beim ♀ mit zweiringeligem, beim ♂ mit nicht geringeltem Endglied.

Von der Gattung *Entedon* hat *Westwood* noch zwei Arten, *formosus* und *trifasciatus*, getrennt und für diese das Genus *Closterocerus* *) geschaffen. Der Name bezieht sich auf die spindelförmige Gestalt der Geissel. Dieses Merkmal ist allerdings etwas schwach. Eine andere Eigenthümlichkeit aber zeigen beide Arten noch im Flügelschnitt, indem der Flügel sich nach der Spitze hin ganz regelmässig keilförmig erweitert. Beide Merkmale vereinigt, dürften dieser Gattung vielleicht ihre Selbstständigkeit wahren. Ich habe sie hier nicht in die Uebersicht der Gattungen aufgenommen, weil mir zu wenige Exemplare zu Gebote standen, um eine genaue Untersuchung vornehmen zu können.

Mit *Pleurotropis* und *Entedon* stimmt durch die starke Verkürzung des *ramus postmarginalis* auch noch die Gattung *Asecodes* überein, aber durch ihre Sculptur unterscheidet sie sich auf den ersten Blick. Das Schildchen ist nämlich glatt und auch das Mesonotum hat eine äusserst feine, von jenen beiden Gattungen ganz abweichende Sculptur. Mit *Secodes* ist zwar eine gewisse Aehnlichkeit nicht zu verkennen, aber es fehlt dem Flügel die Randzelle, welche bei *Secodes* durch eine Haarreihe abgegränzt ist.

Zu den Gattungen, welche den *ramus postmarginalis* nicht gleich hinter dem *ramus stigmaticus* abbrechen, gehört *Omphale Hal.*, eine Gattung, welche in demselben Jahre auch von *Westwood* unter dem Namen *Smaragdites* **) aufgestellt worden ist. Da der Name *Westwood's* eine Anspielung auf die schöne grüne Farbe einer einzigen Art enthält, andere Arten aber auch nicht grün gefärbt erscheinen, so habe ich lieber den Namen *Omphale Hal.* adoptirt und beibehalten.

*) Siehe *Loudon's Mag. Nat. Hist.* VI, 420. *Closterocerus formosus* und *trifasciatus*.

**) Siehe *Mag. Nat. Hist.* VI, 35, 418. *Smaragdites admirabilis Westw.*

Diese Gattung zeichnet sich vor Allem durch den scharf zugespitzten, unten kantig hervortretenden Hinterleib aus.

Es bleiben nun noch zwei Gattungen übrig, *Chrysocharis m.* und *Derostenus Westw.* Beide lassen sich durch den etwas verlängerten *ramus postmarginalis* leicht von *Entedon* und *Pleurotropis* unterscheiden, auch scheint mir nicht unwichtig, hier als eine besondere Eigenthümlichkeit hervorzuheben, dass bei *Entedon* und *Pleurotropis* der Schaft immer metallisch grün gefärbt erscheint, was bei *Chrysocharis* und *Derostenus* nie der Fall ist. Die beiden letzten Gattungen unterscheiden sich sehr leicht durch die verschiedene Zahl der Fühlerglieder, bei *Chrysocharis* finden wir nur acht, bei *Derostenus* aber neun Glieder (die Borsten nicht mitgerechnet.) Bei *Derostenus* finde ich ferner den Hinterrand des Scheitels in der Mitte ausgerandet und den hinteren Augenrand stark punktirt und mit langen Haaren bekleidet; der Hinterleib ist lang gestielt. *Westwood* hat seine Gattung *Derostenus* *) auf das ♂ einer Art gegründet, welches er *gemmeus* genannt hat; es findet sich auch in hiesiger Gegend und wahrscheinlich gehört der *Elachistus albiscapus Nees* als ♀ dazu oder er bildet eine selbstständige Art von *Derostenus*. Vielleicht ist auch *Derostenus* (*Entedon*) *Amyclas Walk.* von *albiscapus Nees* nicht verschieden.

Ueber die Gattung *Diglyphus Hal.* kann ich keine Auskunft geben, da ich sie nur aus dem Katalog des britischen Museums kenne. Hier sind aber in dem Appendix zu Part. II, Seite 235 und 236 bloß zwei Arten ohne alle Gattungscharakteristik beschrieben. Ob *Haliday* an einem anderen Orte die Gattungscharaktere aufgestellt, habe ich nicht ermitteln können.

21. Tetrastichoidae. Die wenigen Gattungen, welche uns diese kleine Familie darbietet, zeichnen sich alle durch den Mangel des *ramus postmarginalis* aus. Die allzu gleichförmige Bildung aller Körpertheile erschwert die Aufstellung vieler und namentlich neuer Gattungen, obgleich der Haupttypus der Familie, die Gattung *Tetrastichus*, gleichsam an einer Ueberfülle von Arten leidet und daher sehr schwierig zu behandeln ist. Ich habe nach einer Untersuchung von beinahe hundert fünfzig Arten in tausenden von Exemplaren die Ueberzeugung gewonnen, dass eine erspriessliche Theilung in grössere Abtheilungen resp. Gattungen nicht möglich ist; wenn daher auch die grosse Masse von Arten in dieser Gattung sich noch fortwährend vermehren wird, so wird die Abgränzung neuer Gattungen von derselben zwar nicht gradezu unmöglich, aber doch immer auf einige wenige Arten beschränkt bleiben. Für die wenigen hier folgenden Gattungen wird das Vorhandensein oder der Mangel der Schildfurchen, die Fühlerbildung und selbst der Flügel die Mittel an die Hand geben, eine klare und verständliche Uebersicht aufzustellen.

a. Das Schildchen ohne Furchen.

b. Fühler scheinbar dreigliedrig *Triphasius m.* *)

bb. Fühler deutlich mehrgliedrig.

*) Siehe Loudon's Mag. Nat. Hist. VI, 495. *Derostenus gemmeus Westw.*

**) List of the Spec. of Hym. ins. of the brit. Mus. Part. II, pag. 145 und Appendix, pag. 235—236.

***) *Triphasius* von τριφάσιος, ια, ιον, dreifach. Eine Andeutung auf die Fühler, welche nur dreigliedrig scheinen.

- c. Flügel ohne ramus stigmaticus **Anozus m. *)**
cc. Flügel mit einem ramus stigmaticus.
d. Der ganze Flügelrand mit langen Wimperhaaren besetzt . . **Pterothrix Westw.**
dd. Der Vorderrand des Flügels ohne längere Wimperhaare . . **Trichaporus m. **)**
aa. Das Schildchen mit Furchen versehen.
e. Der Schaft übermässig verdickt (♂).
f. Die Vorderflügel ringsum lang gewimpert **Ceraniscus Walk.**
ff. Die Vorderflügel am Vorderrande nicht lang gewimpert, sondern bloß auf dem ramus marginalis mit langen Wimperborsten **Baryscapus m. ***)**
ee. Der Schaft nicht übermässig verdickt.
g. Fühler zehngliedrig (das Ringel fehlend und durch ein grösseres Geisselglied ersetzt) **Hyperteles m. †)**
gg. Fühler beim ♂ neungliedrig, ohne Ringel, beim ♀ zehngliedrig mit zwei Ringel und dreigliedrigem Endglied **Tetrastichus Hal.**

Die Gattung *Triphasius*, ein höchst merkwürdiges Thierchen in Bezug auf seine Fühlerbildung, wurde von *Walker* unter dem Namen *Thysanus* ††) aufgestellt, ohne dass er sich über die Stellung derselben näher ausgesprochen hätte. *Newman's Entomologist* gab auf Plate K, fig. 3, eine gute und gelungene Abbildung, unter 3, a und 3, b, finden wir den vergrösserten Fühler, unter 3, c, die vergrösserten Tarsen dargestellt. Nach der Abbildung sowohl, wie nach den vergrösserten Tarsen würde diese Gattung zu den Pentameren gehören, was mit meinen Beobachtungen nicht übereinstimmt. Ich besitze zwar nur ein Exemplar, aber an diesem habe ich mit Bestimmtheit viergliedrige Tarsen gefunden. Die Untersuchung der Tarsen wird dadurch sehr erschwert, dass die einzelnen Glieder nicht bloß an der Spitze, sondern der ganzen Länge nach in unbestimmten Zwischenräumen feine Borsten von gleicher Grösse und Beschaffenheit tragen, so dass die Gliederung nur mit Mühe und bei sehr günstiger Lage und Beleuchtung unter dem Mikroskop erkannt werden kann. Die viergliedrigen Tarsen in Verbindung mit der Fühlerbildung sichern dieser Gattung unzweifelhaft ihre Stellung unter den Tetrastichoiden. Die merkwürdige Bildung der Fühler macht sie überdies leicht kenntlich; scheinbar sind die Fühler nämlich bloß dreigliedrig, aus Schaft,

*) *Anozus* von *α priv.* und *ὄξος, ὅ*, der Zweig. Der Mangel des ramus stigmaticus wird durch den Namen angedeutet.

**) *Trichaporus* von *τριξ, τριχός, ἡ* und *ἀπορος, ον*, arm, dürftig. Im Vergleich zu *Pterothrix* erscheint der Flügel arm an Wimperhaaren.

***) *Baryscapus* von *βαρύς, εἶα, ὅ*, schwer und *σκάπος, ὅ*, (lateinisch *scapus*, Schaft) Stock, Stab, Schaft.

†) *Hyperteles* von *ὑπερτελής, ες*, über das Ziel oder Maass hinaus. In dem Namen soll die Andeutung auf das erste Glied der Geissel liegen, welches bei fast allen Gattungen der Chalcidien sehr klein ist und als Ringel, anellus, bezeichnet wird, hier aber *über alles Maass hinaus* vergrössert erscheint.

††) *Ann. of nat. Hist.* 1839, pag. 234. Den Gattungsnamen *Thysanus* habe ich ändern müssen, da derselbe schon längst vergriffen war. *João de Loureiro* stellte in seiner *Flora cochinchinensis*, die im Jahre 1790 zu Lissabon und in einer zweiten Auflage 1793—95 (von *Willdenow* besorgt) zu Berlin erschien, eine Pflanzen-Gattung unter diesem Namen auf.

Stielchen und einem sehr langen Geisselglied bestehend. Zwischen dem Stielchen und dem Geisselglied soll das ♂ ein, das Weibchen aber drei Ringel haben. Ob diese Angabe richtig sei, kann ich weder bestätigen noch verneinen, da an dem einzigen Exemplar meiner Sammlung die Fühler nicht in der Lage waren, um eine hierauf bezügliche Untersuchung vornehmen zu können. Ich glaube aber an dem sehr langen Geisselglied schwache Spuren einer mehrgliedrigen Theilung wahrgenommen zu haben.

In dem Mangel der Schildfurchen stimmt *Pterothrix Westw.* zwar mit der vorhergehenden Gattung überein, aber im Bau der Fühler ist ein auffallender Unterschied vorhanden. Viel schwieriger wird aber die Scheidung dieser Gattung von der nachfolgenden Familie der Trichogrammatoiden. Nur die Zahl der Tarsenglieder stellt einen zwar standhaften, aber bei der Schwierigkeit der Beobachtung und Feststellung nicht immer zuverlässigen Unterschied dar. Bei der minutiösen Kleinheit der Arten wird man, wenn sich die Fussgliederzahl nicht ganz sicher ermitteln lässt, immer wohl thun, die Individuen unbestimmt zu lassen, statt die Verwirrung zu vermehren. *Walker* hat in seiner Monogr. Chalciditum, pag. 13—20, im Ganzen zehn Arten beschrieben und dieselben in neun Sektionen getheilt, aber schon die erste Sektion muss ausfallen, weil sie dreigliedrige Tarsen bei der einzigen Art, *Pterothrix evanescens*, ausweist. Da *Westwood* auf diese Art früher seine Gattung *Trichogramma* gründete, so wird diese nun wieder in ihr Recht treten. Von den übrigen Sektionen sollen die zweite, dritte, sechste und neunte achtgliedrige Fühler, die vierte, fünfte, siebente und achte aber bloß sechsgliedrige Fühler besitzen. Diese Verschiedenheit der Fühlergliederzahl in Verbindung mit anderen Abweichungen schien sich für eine Trennung der Gattung *Pterothrix* zu eignen. Daher habe ich noch die Gattung *Anozus* und *Trichaporus* davon abgesondert.

Die Gattung *Anozus* zeichnet sich vorerst durch siebengliedrige Fühler beim ♀ aus, (das Vorhandensein oder der Mangel eines Ringels bleibt dabei einstweilen ausser Frage!) während *Pterothrix* nur sechsgliedrige hat. Dieses ist aber nicht die einzige Differenz. Während der Flügel bei *Pterothrix* ringsum mit langen Wimperhaaren besetzt ist, hat die neue Gattung von dem Punkt des Vorderrandes, wo der ramus marginalis abbricht, bis zur Spitze nur einen kurzen Haarsaum. Ein noch viel wichtigeres Unterscheidungsmerkmal finde ich aber bei *Anozus* auch in dem gänzlichen Mangel des ramus stigmaticus. Da, wo der ramus marginalis endigt, ist derselbe merklich verdickt und deutet ganz unmerklich eine Trennung oder Lossagung vom Vorderrande an, ohne jedoch zur Ausbildung eines ramus stigmaticus zu schreiten, der doch bei *Pterothrix*, wenn auch noch so kurz, gleich in die Augen fällt. Es unterliegt nach diesen Andeutungen wohl keinem Zweifel, dass *Anozus* mit Recht von *Pterothrix* generisch getrennt worden ist.

Eine gleiche Bewandniss hat es mit der Gattung *Trichaporus*. Von *Pterothrix* wird sie in gleicher Weise durch achtgliedrige Fühler beim ♂ und ♀ geschieden. Dazu kommt, dass die siebengliedrigen Fühler des ♂ von *Pterothrix* mit langen Haaren bekleidet sind, grade so wie bei den ♂ von *Tetrastichus*, bei *Trichaporus* aber sind sie ganz kurz und gleichförmig behaart. Der Flügel weicht ebenfalls von *Pterothrix* ab, indem er gleich *Anozus* am Vorderrande nur einen kurzen Haarsaum hat. Der deutliche ramus stigmaticus gibt aber auf der anderen Seite wieder ein gutes Unterscheidungsmerkmal der Gattung *Anozus* gegenüber ab.

Wie es schon in der Bedeutung des Gattungsnamens liegt, wird die Gattung *Pterothrix* sich nun allein auf diejenigen Arten beschränken, welche im männlichen Geschlecht sieben-, im weiblichen nur sechsgliedrige Fühler (die Ringel werden hier, wenn überhaupt vorhanden, nicht mitgezählt!) haben und deren Flügel, was hier besonders hervorgehoben werden muss, ringsum mit langen Wimperhaaren besetzt sind. Wenn diese Wimperhaare beim ♀ auch etwas kürzer sind als beim ♂, so wird man doch, die Fühlergliederzahl mit in Betracht gezogen, im Stande sein, die betreffenden ♀ unter die richtige Gattung zu stellen, obgleich einige Umsicht hierbei nicht fehlen darf.

Von *Triphasius* und *Pterothrix* unterscheiden sich die folgenden Gattungen alle durch die Anwesenheit der Schildfurchen. Zwei haben einen ungewöhnlich dicken Schaft, sind aber blos im männlichen Geschlecht bekannt. Es wäre möglich, dass die ♀ sich von dem Typus der Gattung *Tetrastichus* nicht entfernten, in diesem Falle wären beide Gattungen einzuziehen. *Walker* hat dieses bereits bei seiner Gattung *Ceraniscus* gethan, indem er sie mit *Cirrospilus* vereinigt, ich weiss nicht, auf welchen Grund hin, denn *Cirrospilus* hat nicht so viele Fühlerglieder wie *Ceraniscus*, bei welcher Gattung eben so wie bei *Baryscapus* neungliedrige Fühler angetroffen werden und auch noch dazu der *ramus postmarginalis* gänzlich fehlt. Mir scheint *Ceraniscus* ferner durch ein besonderes Merkmal ausgezeichnet, welches dem Scharfsinn des englischen Entomologen zwar nicht entgangen ist, aber schwerlich als Gattungsmerkmal hervorgehoben wurde, nämlich die ringsum lang gewimperten Flügel, wodurch sich diese Gattung nicht nur von *Tetrastichus*, sondern auch wesentlich von *Baryscapus* unterscheidet.

Durch zehngliedrige Fühler in beiden Geschlechtern zeichnet sich die Gattung *Hyperteles* aus, die ich auf eine ausgezeichnete Art gründe, welche von mir bereits früher unter dem Namen *Eulophus elongatus* beschrieben worden ist. Diese Art, welche an Grösse wohl alle bekannten europäischen Arten in dieser Familie übertrifft, lebt parasitisch in den kegelförmigen Gallen auf den Blättern von *Fagus sylvatica*. Die Fühler zeichnen sich durch den Mangel eines Ringels aus, (bei zwei hundert vierzigmaliger Vergrösserung konnte ich dasselbe nicht finden) oder da wir konsequenter Weise in der Gruppe der Chalcidien ein solches Ringel überall annehmen, so darf hier die Behauptung nicht zu gewagt erscheinen, dass das Ringel durch eine übermässig starke Entwicklung den übrigen Geisselgliedern gleich kommt, wie wir bereits früher eine Andeutung dazu bei einer Gattung der *Pteromaloiden* gegeben haben.

Bei der Gattung *Tetrastichus* nehme ich mit *Haliday* die Fühler des ♂ als neungliedrig an, das Ringel fehlt; (wird auch hier durch das erste Geisselglied repräsentirt!) beim ♀ nehme ich zehngliedrige, *Haliday* dagegen nur achteigliedrige Fühler an. Dieser Unterschied rührt aber einfach daher, weil *Haliday* die beiden Ringel nicht mitzählt. Obgleich bei *Tetrastichus* überhaupt die Ringel nur sehr schwer, meist nur mikroskopisch zu erkennen sind, so kann man sie doch bei *Tetrastichus Armaeus* alle beide mit einer guten Loupe sehen und um so eher, da sie nicht behaart und glänzend erscheinen.

Die Gattung *Aprostocetus* *Westw.* hat *Walker*, wie mir scheint, mit Recht wieder mit *Tetrastichus* verbunden, ich glaube hier bei *Aprostocetus caudatus* *Westw.* und *Emesa* *Walk.* ebenfalls zwei Ringel wahrzunehmen. Die *Westwood'sche* Art habe ich in meinen Beiträgen zur Familie

der *Pteromalinen longicaudatus* genannt und darauf hat *Ratzeburg* im dritten Bande der *Ichneumonen* der Forstinsekten die Gattung *Lonchentedon* gegründet, die aber natürlich eingehen muss, oder wenn die Arten von *Tetrastichus* mit langem Bohrer eine eigene Gattung in Zukunft bilden sollten, so können sie nur den Namen *Aprostocetus Westw.* führen.

21. *Trichogrammatoidae*. Diese kleine Familie, welche sich durch dreigliedrige Tarsen auszeichnet, enthält äusserst zierliche, aber auch sehr kleine Thierchen, welche nach dem Tode oft sehr stark einschrumpfen und einer genauen Untersuchung unübersteigliche Hindernisse in den Weg legen. *Walker* hat eine Synopsis dieser Familie aufgestellt, welche er *Trichogrammini* nannte. Er charakterisirt sie durch dreigliedrige Tarsen und den Schienendorn des vordersten Fusspaares, welcher an der Spitze eingeschnitten sein soll. Zu den vier Gattungen, welche *Walker* in seinem *Conspectus* aufführt und welche alle auch in hiesiger Gegend vorkommen, kann ich noch vier neue hinzufügen, von denen eine durch ihre Lebensweise von nicht geringem Interesse ist. Indem ich hier den *Conspectus* von *Walker* beibehalte, habe ich blos die neuen Gattungen einzureihen, was in der folgenden Uebersicht geschehen ist:

- a. Vorderflügel reihenweise behaart.
 - b. Die Unterrandader verbindet sich nicht mit dem Vorderrand . *Poropoea m.*
 - bb. Die Unterrandader verbindet sich mit dem Vorderrand.
 - c. Die Unterrandader bildet, indem sie an den Vorderrand geht und als ramus stigmaticus wieder in das Flügelfeld hinabsteigt, einen Bogen; Fühler achtgliedrig *Trichogramma Westw.*
 - cc. Die Unterrandader bildet keinen Bogen; Fühler mit weniger als acht Gliedern.
 - d. Flügel ringsum mit langen Wimperhaaren bekleidet . . *Chaetosticha Walk.*
 - dd. Flügel hinter dem ramus marginalis bis zur Spitze nur mit einem kurzen Haarsaum bekleidet.
 - e. Fühler siebengliedrig, mit einem Ringel und viergliedrigem Endglied *Lathromeris m. *)*
 - ee. Fühler sechsgliedrig, ohne Ringel und mit dreigliedrigem Endglied *Centrobia m. **)*
 - aa. Flügel nicht reihenweise behaart.
 - f. Fühler siebengliedrig *Asynacta m. ***)*
 - ff. Fühler sechsgliedrig.

*) *Lathromeris* von *λάθρος*, *α*, *ον*, heimlich, *verborgen*, und *μερίς*, *ἴδιος*, *ή*, der Theil. Der Name bezieht sich auf die Fühlergeissel, in welcher die einzelnen Glieder enge vereinigt, gleichsam verborgen erscheinen.

**) *Centrobia* von *κεντρον*, *τό*, Stachel, Spitze, überhaupt alles, womit man sticht, also hier *der Bohrer* und *βία*, *ή*, die Stärke. Der Name bezieht sich also hier auf den bei einem so kleinen Thierchen ungewöhnlich langen und starken *Legebohrer*.

***) *Asynacta* von *ἀσύνακτος*, *ον*, unverbunden, unzusammenhängend. In dieser Benennung liegt ein Hinweis auf die Unterrandader, welche sich mit dem Vorderrande nicht verbindet.

g. Vorderflügel breit, am Rande mit zartem Haarsaum . . . **Brachysticha m. *)**

gg. Vorderflügel schmal, lang gewimpert. **Oligosita Hal.**

Die Gattung *Poropoea* ist wohl die einzige in dieser kleinen, aber durch dreigliedrige Tarsen scharf begränzten Familie, deren Lebensweise vollständig bekannt geworden ist. Ich habe sie bereits im Jahre 1851 in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens **) weitläufig beschrieben und zwar nach beiden Geschlechtern. Die einzige Art, *Poropoea Stollwerckii*, lebt parasitisch in den Eiern des *Attelabus curculionoides*, aus welchen mein scharfsinniger Freund, Herr *Stollwerck*, bereits am 1. Mai 1846 das erste Exemplar erzog. Seit dieser Zeit hat er unausgesetzt seine Beobachtungen über dieses schöne Thierchen fortgesetzt, dessen ganze Verwandlungs-Geschichte er vollständig mitzuthemen beabsichtigt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass *Ratzeburg* in seiner Gattung *Ophioneurus*, ***) die er im Jahre 1852 aufstellte und nach seiner Angabe ebenfalls aus *Attelabus curculionoides* erzogen wurde, dasselbe Thierchen vor Augen gehabt hat. Sein *Ophioneurus simplex* wird deshalb als Synonym zu *Poropoea Stollwerckii* gezogen werden müssen, dagegen hat er noch eine neue Art, *Poropoea signata* (= *Ophioneurus signatus Ratzb.*) aus den Blattwickelungen von *Rhynchites Betulae* erhalten. Der Hauptcharakter der Gattung liegt in der Bildung der Unterrandader, welche sich nicht mit dem Vorderrande verbindet. Das ♀ stimmt in dem sehr langen Bohrer des Hinterleibs mit der Gattung *Centrobia* überein. Beide Gattungen, so nahe verwandt sie auch zu sein scheinen, weichen aber auch, neben der Differenz in der Bildung der Unterrandader, ganz entschieden durch die Zahl der Fühlerglieder von einander ab; *Poropoea* hat sieben- und *Centrobia* nur sechsgliedrige Fühler.

Mit der vorangehenden Gattung hat in der Flügelbildung eine grosse Aehnlichkeit die von *Westwood* aufgestellte Gattung *Trichogramma*, †) wovon *Newman's Entomologist* auf Plate K, fig. 4, a, b, c, d, eine recht gute Abbildung gegeben hat. Auf den ersten Blick sieht man aber leicht, dass hier die Unterrandader sich mit dem Vorderrande vereinigt. Der ziemlich stark verdickte ramus marginalis bildet mit dem ramus stigmaticus ebenfalls eine bogenförmige Linie, wenn gleich nicht so deutlich in die Augen fallend, wie bei *Poropoea*. Die Fühler sind nach der vergrößerten Abbildung 4, a, deutlich achtgliedrig, wenn man den in der Zeichnung ausgelassenen Schaft und das dreiringelige Endglied in Betracht zieht. Ich besitze von dieser seltenen Gattung drei Arten, aber von jeder Art nur eine Spezies, an welcher die Fühler stark eingeschrumpft waren, so dass sie sich zu einer genauen Untersuchung, ohne das ganze Individuum zu zerstören, wenig eigneten, deshalb habe ich mich hier in Betreff der Angabe der Fühlerglieder auf die Gattungsdiagnose *Westwood's* und die Abbildung in dem *Entomologist* beschränken müssen. Wenn die Fühlergliederzahl richtig angegeben worden ist, woran ich nicht zweifle, dann liegt darin schon ein gutes Unterscheidungsmerkmal von allen übrigen Gattungen dieser Familie.

*) *Brachysticha* (= *Brachista Walk.*) von βραχύς, εἶς, ὅ, klein, kurz, und στίχην, ἡ, die Reihe; also mit einer kurzen Reihe, was sich auf den Haarsaum der Flügel bezieht, welcher dicht gedrängte kürzere Haare, aber keine langen Wimperhaare zeigt.

**) Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Achter Jahrgang. Seite 28, Tab. I, fig. 10, a—c.

***) Die Ichm. der Forstinsekten, dritter Band.

†) Vide Phil. Mag. III. Ser. May. 1833. pag. 444.

Die Gattung *Chaetosticha* Walk. unterscheidet sich von *Poropoea* und *Trichogramma* sehr leicht durch die sechsgliedrigen Fühler, obgleich diese nicht einmal das einzige Unterscheidungsmerkmal bilden. An den Fühlern ist das Stielchen besonders stark entwickelt; auf das Stielchen folgt nur ein freies Geisselglied und hierauf das dreiringelige Endglied. Die Unterrandader ist nicht bogenförmig, der ramus marginalis viel länger als bei *Trichogramma* und der ganze Flügelrand mit langen Wimperhaaren besetzt. Durch das letztere Merkmal unterscheidet sich die Walker'sche Gattung wieder wesentlich von den beiden folgenden, *Lathromeris* und *Centrobia*. Ich habe die Schreibart *Walker's* *Chaetosticha* in *Chaetosticha* abgeändert, weil ich glaube, dass dieses Wort aus *χαίτη*, das lange, fliegende Haar oder überhaupt Haar und *στίχος* oder *στίχη*, die Reihe, zusammen gesetzt ist. Wäre statt *στίχος* das Wort *στίγξ*, welches auch die Reihe oder Zeile heisst, gebraucht worden, dann müsste der Gattungsname ganz einfach *Chaetostrix* heissen.

Auf eine einzige, aber höchst charakteristische Spezies habe ich die Gattung *Lathromeris* gegründet. Der Hauptcharakter liegt in der Fühlerbildung. Die Fühler sind siebengliedrig, das Stielchen verhältnissmässig sehr gross, dick und kegelförmig; auf dasselbe folgt ein sehr kleines rundes Ringel und hierauf gleich die viergliedrige, dicht geschlossene, spindelförmige Keule, welche an der Spitze noch ein kleines griffelförmiges Endglied zu haben scheint, daher auch wohl als fünfgliedrig angesehen werden könnte. In diesem Falle wären dann die Fühler sogar achtgliedrig. Der ramus marginalis ist ziemlich lang, kräftig, der ramus stigmaticus hat an dem Knopf eine deutliche, aufwärts gerichtete Spitze. An dem Mesonotum sind die Furchen der Parapsiden sehr deutlich und tief. Ich kenne nur das ♂, welches ich wegen der gelben Färbung des Schildchens *Lathromeris scutellaris* nenne.

Eine andere schöne und ausgezeichnete Gattung, welche ich wegen des sehr langen Legebohrers *Centrobia* nenne, hatte ich im Jahre 1851 unter dem Namen *Calleptiles Walkeri* *) beschrieben; ich habe mich jetzt vollständig überzeugt, dass dieses Thierchen mit *Calleptiles Hal.* oder *Trichogramma Westw.*, wie die Gattung jetzt heissen muss, gar nicht vereinigt bleiben kann. *Trichogramma* hat achtgliedrige und unsere *Centrobia* in beiden Geschlechtern nur sechsgliedrige Fühler. Die Unterrandader bildet keinen Bogen und der ramus marginalis ist sehr lang, dazu kommt beim ♀ ein hervorragender Bohrer, der fast die ganze Körperlänge erreicht. Diese Unterschiede sind völlig zureichend, eine neue Gattung sicher zu begründen.

Die folgenden Gattungen dieser Familie sind zwar durch die Behaarung der Flügel leicht von den vorhergehenden, aber schwerer unter sich zu trennen und zu unterscheiden. Die Gattung *Asynacta m.* ist wohl durch die siebengliedrigen Fühler (mit dreiringeligem Endglied) leicht von den zwei folgenden zu scheiden, auch erinnert sie an *Poropoea* durch den Verlauf der Unterrandader, welche, genau wie bei jener Gattung, den Vorderrand nicht völlig berührt, obgleich sie demselben äusserst nahe tritt. Der Haupt- und einzige Unterschied von *Poropoea* liegt aber in der Behaarung des Flügels; während bei *Poropoea* sich die Haare alle in sehr regelmässige, scharf ausgeprägte Linien reihen, finden wir bei *Asynacta* nur zwei ziemlich deutlich gebildete Reihen, die von dem Knopf des ramus stigmaticus ausgehen, die übrigen Haare stehen ziemlich regellos

*) Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Achter Jahrgang 1851, Seite 26, Tab. I, fig. 9, a, b, c.

und gedrängt zusammen. Ich besitze von dieser Gattung blos ♀, die keinen hervorragenden Bohrer wie die ♀ von *Poropoea* besitzen. Diese Merkmale dürften wohl eine standhafte Trennung von *Poropoea* rechtfertigen.

Brachysticha m. (= *Brachista Walk.*) und *Oligosita Hal.* lassen sich, da in beiden Gattungen sechsgliedrige Fühler vorhanden, einzig und allein durch die Flügel unterscheiden. *Walker* hat in seiner „Synopsis of the Trichogrammini“ auch nur diesen und keinen anderen Unterschied hervorgehoben. Bei *Brachysticha* sind die Vorderflügel breit und von dem Punkt an, wo der ramus marginalis endigt bis zur Flügelspitze mit einem kurzen Haarsaum bekleidet, welcher nach dem Innenrande hin allmählig etwas länger wird, bei *Oligosita* aber treten an die Stelle des kurzen Haarsaumes sehr lange Wimperhaare, auch sind die Flügel im Allgemeinen schmaler. Andere standhafte Unterschiede vermochte ich zwischen beiden Gattungen nicht aufzufinden. Zu der Aenderung des *Walker*'schen Gattungsnamens war ich genöthigt, weil die gleichgebildete Gattung *Brachistes Wesm.* das Recht der Anciennität hatte, ich habe daher für *Brachista Walk.* den Namen *Brachysticha*, welcher ungefähr denselben Gedanken oder dieselbe Eigenschaft ausdrückt, eingeführt.

Mit der Familie der Trichogrammatoiden schliesst die Gruppe der Chalcidien ab. Dieser Abschluss ist ein so vollständiger, dass ein ungezwungener Uebergang zu den Proctotrupen blos in einzelnen Gattungen der Mymaroiden gefunden werden kann. Es sollten mithin naturgemäss die Mymaroiden an die Spitze der Proctotrupen gestellt und mit diesen die Reihe der Familien eröffnet werden, welche wir hier noch zu erörtern und zu besprechen uns vorgesetzt haben. Da es aber mehr unser Zweck ist, jede einzelne Familie zu beleuchten, statt eine natürliche Reihenfolge festzusetzen, so werden wir auch die Proctotrupen in derselben Weise aufeinander folgen lassen, wie es der früher mitgetheilte Conspectus thut. Demgemäss werden hier zuerst die Dryinoiden folgen.

23. Dryinoidae. Gegen die Stellung dieser Familie unter den Proctotrupen haben wir schon oben das Nöthige bemerkt. Es ist nicht zu verkennen, dass die Verwandtschaft mit den Bethyloiden sehr gross und durch die Gattung *Epyris* hauptsächlich vermittelt wird. Unter den Proctotrupen bezeichnen sie unverkennbar eine sehr hohe, wenn auch nicht die höchste Stufe der Entwicklung, so wie die Mymaroiden andererseits in ihrem Anschluss an die Chalcidien unverkennbar die niedrigste andeuten.

Die Gattungen der Dryinoiden sind von *Haliday* im fünften Bande des „Ent. Magazine, pag. 518,“ so zusammen gestellt worden, dass ich dieselbe Uebersicht mit einigen kleinen Abänderungen auch hier aufzustellen keinen Anstand nehme. Ich kann aber den dort angegebenen Gattungen noch eine neue hinzufügen, scheide aber zugleich auch die Gattung *Embolemus* aus, weil sie nach meiner Ansicht den Typus einer besonderen Familie darstellt. Eben so muss meiner Ansicht nach die Gattung *Dicondylus Hal.* der älteren Gattung *Gonatopus Ljungh.* weichen.

a. Der Scheitel tief eingedrückt.

b. Geflügelt *Dryinus Latr.*

bb. Ungeflügelt *Gonatopus Ljungh.*

aa. Der Scheitel konvex, nicht eingedrückt.

c. Hinterhaupt tief ausgehöhlt, Scheitel und Nacken durch eine scharfe

Kante geschieden *Labeo Hal.*

cc. Hinterhaupt schwach koncav, Scheitel und Nacken nicht durch eine scharfe Kante getrennt.

d. Die vordersten Tarsen mit scheeren- oder zangenförmigen Klauen ♀ (Raubfüsse); Pronotum oben deutlich sichtbar, aber nicht länger als das Mesonotum ♂.

e. Das vierte Tarsenglied der Vorderfüsse viel länger als das dritte ♀; das Pronotum so lang oder fast so lang wie das Mesonotum ♂ ♀ **Chelogynus Hal.**

ee. Das vierte Tarsenglied der Vorderfüsse so lang oder kaum länger als das dritte ♀; das Pronotum viel kürzer als das Mesonotum ♂ ♀ **Anteon Jur.**

dd. Die vordersten Tarsen nicht scheeren- oder zangenförmig ♀; das Pronotum von oben nicht sichtbar oder länger als das Mesonotum ♂.

f. Das Pronotum viel länger als das Mesonotum, das letztere ohne Spur von Furchen; Flügel kurz, löffelförmig **Mystrophorus m. *)**

ff. Das Pronotum oben nicht oder kaum sichtbar, das Mesonotum sehr stark entwickelt mit deutlichen Furchen; Flügel vollkommen entwickelt ♂ ♀ **Aphelopus Dalm.**

Die Gattung *Dryinus*, welche *Latreille* im Jahre 1804 aufgestellt, hat mit Recht, als die älteste, dieser Familie den Namen gegeben. In späteren Zeiten hat sich an *Dryinus formicarius*, die einzige Art, welche *Latreille* als Typus hinstellte, manches Fremdartige angesetzt, was natürlich auch wieder ausgeschieden werden musste. Die Spezies, welche der Charakteristik *Latreille's* **) zu Grunde liegt, ist so ausserordentlich selten, dass sie auch bis auf den heutigen Tag selbst in den bedeutendsten Sammlungen nicht angetroffen wird. Es darf daher nicht auffallen, wenn sie so häufig verkannt oder gar nicht entziffert werden konnte. Ueber die Gattung *Dryinus* hat nach *Latreille* zuerst *Dalman* ***) geschrieben und mehrere neue Arten bekannt gemacht, darunter auch einen *Dryinus formicarius*, der aber nicht die *Latreille's*che Art oder Gattung, sondern *Gonatopus pedestris Dalm.* ist. Ja, alle Arten, welche *Dalman* beschrieben, gehören nicht zur Gattung *Dryinus* im Sinne von *Latreille*. Auf *Dalman* folgte *Nees*, welcher eben so wenig wie sein Vorgänger über die *Latreille's*che Gattung im Klaren war. †) Er liess daher den *Dalman's*chen Arten den Namen *Dryinus*, trennte aber die ungeflügelten unter dem Gattungsnamen *Gonatopus Ljungh.* ab. Freilich hat er damit noch Arten einer anderen Gattung verknüpft, nämlich von *Methoca*, die sogar

*) *Mystrophorus* von *μύστρον* oder *μύστρος*, Löffel und *φέρω*, tragen. Die kurzen, auffallend regelmässig löffelförmigen Flügel haben zu diesem Namen Veranlassung gegeben.

**) *Gen. Crust. et Ins. Tom. IV, pag. 39—40.*

***) *Dalman. Analecta entomologica und Kongl. Vetens. Acad. Handl. for år 1818.*

†) *Nees ab Esenbeck. Hym. ichn. affin. monogr. Vol. II, pag. 385. Adnot. — „Dryinus ille formicarius Latr. a reliquis hujus generis nimis differt, ut vix ulli speciei cuidam vere attribui possit. Exemplum mutilum se primum vidisse et adumbrasse ipse Latreilleus l. c. fatetur, neque omnino constat, utrum ea exempla, quibus postea in corrigendo caractere generico usus est, ejusdem speciei, an alius cujusdam fuerint.“*

einer ganz anderen Familie angehören und wenn ich nicht irre, ♀ der Gattung *Tengyra* sind. Dieses hindert natürlich aber nicht, den *Ljungh'schen* Namen zu restituieren. Von den *Nees'schen* Arten der Gattung *Gonatopus* müssen *mutillarius Jur.*, *erythrocephalus* und *thoracicus Nees* ausscheiden und der Gattung *Methoca* zugewiesen werden. Im Jahre 1837 finden wir einen *Conspectus* der *Drynoiden* von *Walker* im „Ent. Mag., vol. IV, pag. 411.“ Derselbe zerfällt in drei Sectionen, von denen die dritte die *Drynoiden* im engeren Sinne umfasst. Hier stoßen wir auf die Gattung *Dicondylus Hal.*, welche an die Stelle von *Gonatopus* getreten ist, obgleich kein hinreichender Grund für diese Aenderung angegeben wird. Die Gattung *Dryinus* ist in demselben *Conspectus* in dem Sinne von *Dalmann* und *Nees* beibehalten worden, dann sind noch *Aphelopus Dalm.* und *Labeo Hal.* hinzugetreten. Aber bereits im folgenden Jahre hat *Haliday* in dem „Entom. Mag., vol. V, pag. 518,“ den *Walker'schen* *Conspectus* bedeutend umgeändert, die dritte Sektion mit der Gattung *Epyris* beseitigt, die Gattung *Dryinus* im Sinne *Latreille's* wieder hergestellt, dagegen die zahlreichen Arten der Gattung *Dryinus Dalm.* und *Nees* unter zwei Genera vertheilt, wovon das eine, *Anteon*, bereits von *Jurine* im Jahre 1807 begründet wurde, das andere, *Chelogynus*, aber als neu erscheint. In Bezug auf diesen *Conspectus* habe ich Folgendes zu bemerken: Zuvörderst ist aus demselben nicht ersichtlich, ob *Haliday* die Gattung *Dryinus Latr.* bloß nach der Gattungscharakteristik *Latreille's* oder auf autoptische Beobachtungen gestützt wieder hergestellt hat. Diese Frage ist nicht ohne Interesse, denn in dem letzteren Falle würde jeder Zweifel, den *Nees* früher ausgesprochen, damit beseitigt, im anderen Falle bliebe die alte Ungewissheit bestehen. Wie aber auch die Sache sich verhalten mag, jedenfalls müssen wir in der Restituierung der Gattung *Dryinus* im Sinne von *Latreille* den Scharfsinn *Haliday's* rühmend anerkennen. Er hat in dem einen wie in dem anderen Falle das Rechte getroffen. Ich habe von der äusserst seltenen Gattung zwei ♀ Exemplare vor Augen, auf welche Wort für Wort die weitläufige Gattungsdiagnose *Latreille's* passt; von der Gattung *Gonatopus* unterscheidet sie sich nicht bloß durch das Vorhandensein der Flügel, sondern auch durch die übermässige Verlängerung der drei ersten Geisselglieder. Will man diese Merkmale nicht als generische gelten lassen, dann muss man allerdings die Gattung *Gonatopus* aufheben und ihre Arten mit *Dryinus* vereinigen. *Latreille* hat auch wirklich eine Art *) der Gattung *Gonatopus* seiner Gattung *Dryinus* einverleibt, da er den Mangel der Flügel für eine generische Trennung nicht hinreichend hielt. Eine weitere Bemerkung zu dem *Conspectus* von *Haliday* betrifft die Gattung *Anteon Jur.* Diese Gattung ist von dem berühmten Genfer Entomologen auf die Untersuchung zweier ♂ so flüchtig skizzirt worden, **) dass ich bloß auf die Fühler hin einen Anhaltspunkt für die Meinung finde, dass *Haliday* den Namen *Chelogynus* besser mit dem Namen *Anteon* vertauscht hätte. *Jurine* nennt den Schaft von *Anteon* gekrümmt, die Länge der übrigen Glieder kaum übertreffend, woraus hervorzugehen scheint, dass er ♂ der Gattung *Chelogynus* vor Augen hatte; *Haliday* aber sagt: Der Schaft beim ♀ verlängert, verhältnissmässig, aber weniger auch beim ♂. Aber selbst diese Verwechslung angenommen und zugegeben würde ich doch für die Beibehaltung der Namen, wie *Hali-*

*) *Latreille*. Gen. Crust. et Ins. Tom. IV, pag. 40. — „Feminae nonnullae apterae, ex illis unam a Dom. Klug accepi; eandem Parisiis observavi.“

**) *Jurine*. Nouv. Méth. de clas. les Hym. et les Dipt., pag. 302. — Antennae filiformes, decem articulis compositae, primo arcuato, vix longitudinem ceterorum superante.

day sie gebraucht, stimmen, weil die ganze Charakteristik der Gattung Anteon in der That das Werk Haliday's bleibt, während blos der Name dem Jurine zugeschrieben werden kann. Den Unterschied beider Gattungen hat Haliday nicht blos weitläufig auseinander gesetzt, sondern auch die in England aufgefundenen und früher unter dem Namen Dryinus beschriebenen Arten nach beiden Gattungen gruppirt. Dem allgemeinen Habitus nach sind beide Gattungen schwer zu trennen und namentlich bieten die ♂ nur geringe und wenige Anhaltspunkte zu einer sicheren Unterscheidung dar. Obgleich ich die unterscheidenden Merkmale nach der Angabe Haliday's *) alle einer genauen Prüfung unterworfen habe, glaube ich doch die Ueberzeugung aussprechen zu müssen, dass mehrere derselben nicht standhaft und beständig genug erscheinen, um grosses Gewicht darauf zu legen, so das Verhältniss der Grösse zwischen dem Schaft und dem ersten Geisselglied und die Form des Metanotum's. Beide Gattungen würden sich wie folgt unterscheiden lassen:

Chelogynus. Pronotum so lang oder fast so lang wie das Mesonotum ♂ ♀.

Das vierte Tarsenglied der Vorderfüsse viel länger als das fünfte, dieses mit der inneren Klaue verwachsen ♀.

Der Schaft nicht länger, meist kürzer als das erste Geisselglied ♂ ♀.

Anteon. Pronotum bestimmt und deutlich kürzer als das Mesonotum ♂ ♀.

Das vierte Tarsenglied der Vorderfüsse nicht oder kaum länger als das fünfte und beide (?) mit der inneren Klaue verwachsen ♀.

Der Schaft völlig so lang, meist länger als das erste Geisselglied.

Das Verhältniss der Länge zwischen dem dritten und vierten Tarsenglied der Vorderfüsse scheint mir von grösserem Gewichte zu sein wie die Verwachsung. Ich habe selbst unter dem Mikroskop nicht vollständig die Ueberzeugung gewinnen können, dass die innere Klaue bei Anteon auch mit dem vierten Fussglied verwachsen sei. Meiner Ansicht nach liegt sie nur ganz fest an dieses Glied an und zwar in Folge der Richtung, welche die Klaue durch die Verwachsung mit dem fünften Fussglied erhält. Hoffentlich werden weitere Untersuchungen diese Sache völlig aufklären; da diese Aufklärung aber nicht so leicht ist, so wird sich die Verschiedenheit der Grösse zwischen dem dritten und vierten Tarsenglied besser zur Unterscheidung beider Gattungen eignen und beide würden als fest begründet angesehen werden können, wenn die ♂ sich schärfer auseinander halten liessen.

Die Gattung Labeo Hal. ist schon durch das tief ausgehöhlte Hinterhaupt sehr gut charakterisirt, auch die Gattung Aphelopus lässt sich von Chelogynus und Anteon im weiblichen Geschlecht leicht durch den Mangel der grossen Klauen an den vordersten Tarsen unterscheiden, das ♂ dürfte blos durch das sehr schwach entwickelte Pronotum von den ♂ jener beiden Gattungen standhaft verschieden sein.

Die neue Gattung Mystrophorus ist durch viele gute Merkmale ausgezeichnet. Die starke Entwicklung des Pronotum's, welches hier viel länger als das Mesonotum, der Mangel der Furchen auf dem letzteren und die schwachen Flügelstummel, die an der Spitze löffelförmig erweitert sind, geben dieser Gattung einen fest ausgeprägten Charakter.

*) Ent. Mag. Vol. V, pag. 518.

Anmerkung 1. Die Gattung *Embolemus* muss wegen der Insertion der Fühler und der ungleichen Gliederzahl beim ♂ und ♀ eine besondere Familie, die *Embolemoidae*, bilden. Man kann sie ihrem ganzen Habitus nach gleichsam als Mittelglied der *Diaprioiden* und *Dryinoiden* betrachten. Die Gattung *Embolemus* hat beim ♂ zehn-, beim ♀ aber dreizehngliedrige Fühler und dieselben stehen so weit wie möglich vom Mundrande entfernt. Bei den *Dryinoiden* haben beide Geschlechter immer nur zehngliedrige Fühler. Eine zweite Gattung, welche ich *Pedinomma* *) nenne, schliesst sich an *Embolemus* in Bezug auf den Habitus ganz genau an, lässt aber mehrere wesentliche, sehr abweichende Merkmale erkennen, welche die Aufstellung einer neuen Gattung nothwendig machten. Bei *Pedinomma* sind nämlich die Netzaugen ganz flach und erheben sich über die Kopffläche nicht im Geringsten, die Punktaugen sind dabei so klein, dass sie nur mit der stärksten Loupe aufgefunden werden können. Ferner ist an den Fühlern der Schaft länger als die beiden folgenden Glieder zusammen genommen. Bei *Embolemus* sehen wir von diesem Allem das Gegentheil. Die Netzaugen erheben sich deutlich, wenn auch nicht sehr stark über die Oberfläche des Kopfes, die Punktaugen sind verhältnissmässig sehr gross und das erste Geisselglied ist sogar länger als Schaft und Stielchen zusammen genommen.

Höchst wahrscheinlich fällt mit unserer Gattung *Pedinomma* die *Westwood'sche* Gattung *Myrmecomorphus* zusammen. Ich kenne die Diagnose dieser Gattung nur aus dem vierten Bande der „*Histoire naturelle des insectes Hyménoptères*,“ durch welchen *Aug. Brullé* dem Werke *Lepelletier's* einen zu raschen Abschluss gegeben hat. Hier wird auf Seite 616 **) eine Charakteristik gegeben, aus welcher eine fast gänzliche Uebereinstimmung mit unserer Gattung erhellt. Selbst die bestimmte Angabe *Westwood's*, dass die Ocellen fehlen, spricht nicht dagegen, denn sie sind wegen der ausserordentlichen Kleinheit wohl leicht zu übersehen. Wenn ferner die flachen Netzaugen und die Länge des Schaftes im Hinblick auf und im Vergleich mit der Gattung *Embolemus* übergangen werden, so fällt das schon mehr in's Gewicht. Die Beseitigung der *Westwood'schen* Gattung und resp. Aufstellung einer neuen von meiner Seite hat ihren Grund darin, dass im Jahre 1833, in welchem *Westwood* seine Gattung bekannt machte, von *Leon Dufour* eine Dipterengattung unter derselben Benennung, wenn auch in fehlerhafter Wortbildung *** (Myrmemorpha!) aufgestellt worden ist. Da nun die Beseitigung von Namen mit absolut gleicher Bedeutung und Schreibart ein wahrhaftes Bedürfniss ist, so habe ich um so eher geglaubt, von beiden Gattungen die eine eingehen lassen und durch *Pedinomma* ersetzen zu müssen, als auch noch nicht über allen Zweifel die Identität meiner neuen Gattung mit *Myrmecomorphus Westw.* fessteht.

Die beiden Gattungen der *Embolemoiden* unterscheiden sich nun wie folgt:

a. Netzaugen gewölbt, Nebenaugen gross; der Schaft kürzer als das erste

Geisselglied; Flügel vollkommen ***Embolemus Westw.***

*) *Pedinomma* von *πεννός*, ἡ, *όν*, flach und *ὄμμα*, *ατος*, *τό*, das Auge.

**) *Hist. nat. des insect. Hymén. Tom. IV, pag. 616. Myrmecomorphus Westw.* — Die Diagnose lautet hier: „Les antennes sont aussi longues que le corps, de dix articles. La tête est arrondie et un peu oblongue, *sans ocelles*. Le thorax est deux fois aussi long que la tête avec le dos du prothorax presque carré. Les ailes sont très rudimentaires et les tarses antérieurs simples.“

*** *Agassiz Nomencl. zool. Ind. univ. pag. 243. Myrmemorpha L. Duf. Dipt. 1833.* (richtig geschrieben *Myrmecomorpha*.)

aa. Netzaugen ganz flach, Nebenaugen sehr klein; der Schaft viel länger

als das erste Geisselglied; Flügel rudimentär **Pedinomma m.**

Mit *Embolemus* ist die Gattung *Polyplanus Nees* synonym. Der letztere Schriftsteller kennt und beschreibt nur das ♀. Die Abbildung in dem „Ent. Mag., vol. IV, pag. 411 und pl. XVI, fig. 1“ stellt das ♂ dar.

Anmerkung 2. Von der Familie der Dryinoiden habe ich nach dem Vorgange *Haliday's* die Gattung *Epyris* getrennt. Sie gehört offenbar zur Familie der Bethyloiden. Trotz der früher Seite 17 geäußerten Ansicht glaube ich nun, gestützt auf erneuerte Untersuchungen, dass diese Familie sich so enge an die Dryinoiden anschliesst, dass sie nicht davon getrennt werden kann, dass also folgerecht beide in die Gruppe der Proctotrupen aufgenommen oder davon ausgeschlossen werden müssen. Das Letztere hat *Haliday* gethan, ich entscheide mich für das Erstere, indem ich dafür halte, dass die kleine Familie der Embolemoiden einen naturgemässen Uebergang von den Diaprioiden und Belytoiden einerseits, zu den Dryinoiden und Bethyloiden andererseits bilden. Ich habe, von dieser Ansicht ausgehend, deshalb hier die Familie der Bethyloiden einer kurzen Betrachtung unterworfen und deren Gattungen ganz kurz skizziren wollen.

Die alte bekannte Gattung *Bethylus Latr.* ist nicht reich an Arten, *Haliday* vermuthet sogar, dass alle zu einer und derselben Art *) wohl gehören könnten. Ich kann diese Meinung nicht theilen und habe bereits in den Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens im achten Jahrgange, pag. 5 u. s. w., mehrere neue Arten beschrieben, welche ich jetzt sogar nach der stark abweichenden Bildung der Flügeladern in verschiedene Genera aufzulösen keinen Anstand nehme.

Der Conspectus der Bethyloiden wird sich demnach wie folgt gestalten:

- a. Kopf ohne Nebenaugen **Sclerochroa m.**
- aa. Kopf mit Nebenaugen.
 - b. Flügel ohne Randmal.
 - c. Flügel mit einem ramus marginalis und stigmaticus **Bethylus Latr.**
 - cc. Flügel ohne ramus marginalis und stigmaticus.
 - d. Die Fühler dreizehngliedrig **Ateleopterus m. **)**
 - dd. Die Fühler zwölfgliedrig **Holopedina m.**
 - bb. Flügel mit einem Randmal.
 - e. Die Grundader mit einem abwärts gerichteten Ast.
 - f. Fühler zwölfgliedrig ♂ ♀ **Perisemus m. ***)**

*) Ent. Mag. Vol. II, pag. 221 a. The Bethyli. vary exceedingly in size, the smaller individuals have the head narrower, and the wings usually very imperfect (*Bethylus Syngenesiae n.*); but the varieties are so indefinite, that i am disposed to refer them all to one species, *Bethylus punctatus Latr.*

**) *Ateleopterus* von ἀτελής, ες, unausgeführt, unvollendet und πτερόν, τό, der Flügel. Der fehlende ramus marginalis und stigmaticus lässt den Flügel unvollkommener als bei den anderen Gattungen dieser Familie erscheinen.

***) *Perisemus* von περίσφημος, ον, sehr ausgezeichnet. Sowohl durch die sichtbare Unterrandzelle wie durch zwölfgliedrige Fühler ist diese Gattung sehr ausgezeichnet.

ff. Fühler dreizehngliedrig **Goniozus m. *)**
 ee. Die Grundader ohne Ast.

g. Die Furchen der Parapsiden deutlich; Hinterleibssegmente fast von gleicher Länge **Epyris Westw.**

gg. Die Furchen der Parapsiden fehlend; Hinterleibssegmente von ungleicher Grösse **Isobrachium m. **)**

Die Gattung *Ateleopterus* habe ich auf meinen *Bethylus ateleopterus* gegründet, (siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens, achter Jahrgang, 1851, Seite 5, Tab. I, fig. 1. ala.) Die Gattung *Perisemus* auf *Bethylus triareolatus* (ebend. Seite 10, Tab. I, fig. 5.) Die Gattung *Goniozus* auf *Bethylus claripennis m.* (ebend. Seite 7, Tab. I, fig. 3) und *Bethylus fuscipennis* (Seite 10, Tab. I, fig. 4.) Die Gattung *Isobrachium* endlich auf *Bethylus dichotomus m.* (Seite 13, Tab. I, fig. 6.) Zu dieser letzteren Art gehört *Omalus fuscicornis Nees* als ♂ und *Omalus nigricornis Nees* als ♀. Der Gattungsname *Bethylus* verbleibt ganz natürlich dem *Bethylus cenopterus Latr.* als derjenigen Art, worauf die Gattung ursprünglich gegründet wurde.

Von der Gattung *Epyris* kommt in hiesiger Gegend blos *Epyris niger* in beiden Geschlechtern vor, die ♂ haben einen kleineren Kopf und an der Spitze des Hinterleibs zwei kurze flache Anhängsel, die den ♀ fehlen.

Die beiden in diesem Conspectus der Bethyloiden eingeführten Gattungen *Sclerochroa* und *Holopedina* bedürfen noch einer besonderen Erwähnung. Die erstere Gattung ist von mir bereits im Jahre 1850 ***) an die Stelle von *Scleroderma Kl.* aufgestellt worden, weil letztere bereits im Jahre 1801 an eine Pilzgattung von *Person* vergeben wurde. Von *Holopedina* wird man ebenfalls an der eben zitierten Stelle derselben Zeitschrift †) eine ausführliche Auseinandersetzung finden. Ueber die Gattung *Sclerochroa* hat *Westwood* zuerst eine ausführliche Monographie ††) mitgetheilt, in welcher zugleich über die Stellung derselben ganz richtige Fingerzeige gegeben werden. Diese sind meiner Meinung nach so wichtig, dass ich sie trotz ihrer Weitläufigkeit hier wörtlich mittheilen will. †††)

*) *Goniozus* von γωνία, ῆ, der Winkel und ὄξος, ὅ, der Zweig, Ast. Der Name wurde gewählt, weil die Grundader in dem Winkel einen rücklaufenden Ast hat.

**) *Isobrachium* von ἴσος, η, ον, gleich und βραχίον, ῆ, der Arm. Die Mittelader theilt sich hier an der Spitze in zwei gleiche Adern (Arme), daher die Benennung.

***) Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Siebenter Jahrgang, 1850, Seite 501.

†) Ebend. Seite 502.

††) Transact. of the Ent. Soc. Vol II, part. 3, pag. 164. Monograph upon the Hymenopterous Genus *Scleroderma* (*Sclerochroa m.*), by J. O. *Westwood*.

†††) L. c. pag. 165. The external characters of this genus appear, it is true, at the first sight, to be almost identical with those of *Myrmecodes* and *Methoca*, amongst the *Mutillidae*: but it appears to me that *Scleroderma* (*Sclerochroa m.*) is much more nearly allied to some of the genera of *Proctotrupidae*, especially *Omalus Jur.*, *Epyris Westw.*, *Cephalonomia Westw.*, *Ceraphron* etc., in which the females of some of the species are apterous, and in some of which we find the joints in the maxillary palpi fewer than the typical number; the structure of the an-

24. Ceraphronoidae. Diese kleine Familie ist eben so arm an Gattungen wie reich an Arten. Nur drei Gattungen, *Megaspilus*, *Ceraphron* und *Microps Hal.*, waren bis jetzt bekannt, denn *Calliceras Nees* fällt mit *Ceraphron* zusammen. Eine gute und sorgfältige Zusammenstellung dieser Gattungen fehlte bis dahin und um so schwieriger erschien die klare Scheidung derselben, weil durch *Latreille* und später durch *Nees* eine gänzliche Verwirrung eingetreten war. In der nachfolgenden Uebersicht und den darauf folgenden Erläuterungen wird aber hoffentlich die gewünschte Klarheit in diesen Gegenstand gebracht, die um so nöthiger erscheint, da zwei neue Gattungen eingeführt und der Name *Microps* durch einen anderen ersetzt werden musste.

- a. Ohne Nebenaugen **Lagynodes m. ♀**,
 aa. Mit deutlichen Nebenaugen.
 b. Flügel ohne deutliches Randmal oder genauer, mit einem lineari-
 schen Randmal.
 c. Die Stirn zwischen der Fühlerwurzel mit einem scharfen Zahn. **Lagynodes m. ♂**.
 cc. Die Stirn zwischen der Fühlerwurzel ohne Zahn **Ceraphron Jur.**
 bb. Flügel mit einem breiten Randmal.
 d. Flügel völlig haarlos. **Trichosteresis m. *)**
 dd. Flügel behaart.
 e. Fühler gesägt ♂; die Augen fast kahl ♀ **Lygocerus m. **)**
 ee. Fühler fadenförmig ♂; Augen behaart ♀. **Megaspilus Westw.**

tennae and ovipositor have not the appearance of those of a strictly aculeate Hymenopterous insect, as *Myrmecodes* or *Methoca*, whilst the generally small size of the insects is in favour of their relation with the *Proctotrupidae*.

That these genera depart indeed from the general character of that family, and approach the *Mutillidae*, is evident. Thus *Nees von Esenbeck* asks, „Whether the genus *Meria* does not belong to the family or subfamily *Dryineae*?“ adding, „Habitus maxime convenit, sed alarum nervi magis completi, areolas plures distinctioresque construunt. Certo certius, hoc genere intercedente, *Dryineae* *Mutillariis* arctissime connectuntur. Hym. Monogr. Vol. II, pag. 397. Mr. *Holiday* also observes, „*Bethylorum* genus abnorme, inter *Oxyuros* jam diutius exulat, quippe cui locum (et familiae gradum) inter *Hymenoptera* *Fossoria* vindicant trophi, aculeus (venenatus, acris) habitus et mores. Conferendae generis *Stigmi* species abdomine subscissili, ex. gr. *Stigmus Troglodytes*, *Van der Lind*.“ (Ent. Mag. I. 276.)

I cannot, however, agree with Mr. *Holiday* in regarding *Bethylus* as a fossorial genus, much less in associating it with the family to which *Stigmus* belongs. The connexion between *Bethylus* and *Ceraphron*, *Gonatopus* etc. being so clearly established by means of various fine exotic insects in the Royal Museum at Berlin (of which I purpose hereafter laying descriptions and figures before this Society), that I feel convinced of the propriety of regarding *Bethylus*, *Scleroderma* (*Sclerochroa*!) *Gonatopus* etc. as belonging to the family *Proctotrupiens* of *Latreille*.

Dieser klaren und anschaulichen Entwicklung der verwandtschaftlichen Verhältnisse von *Sclerochroa* muss ich noch hinzufügen, dass die von *Westwood* in derselben Monographie, pag. 172, als muthmassliche ♂ von *Sclerochroa* aufgestellten beiden Arten, *Sclerochroa fuscicornis* und *fulvicornis*, ganz zuverlässig ♂ der Gattung *Holopedina m.* sind. Dieses habe ich bereits bei Kreirung der Gattung *Holopedina* ausgesprochen (siehe Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westphalen. Siebenter Jahrgang, 1850, Seite 505.)

*) *Trichosteresis* von $\sigma\rho\acute{\iota}\xi$, η , das Haar und $\sigma\tau\acute{\epsilon}\rho\eta\sigma\iota\varsigma$, η , die Beraubung. Auf die haarlosen Flügel anspielend.

**) *Lygocerus* von $\lambda\upsilon\gamma\acute{\omega}\omega$, biegen, schmiegen und $\kappa\acute{\epsilon}\rho\alpha\varsigma$, $\tau\acute{o}$, Horn, Fühler. Also mit geschmeidigen, leicht beweglichen Fühlern.

Die Gattung *Lagynodes*, welche ich in meinen Beiträgen zur Familie der Pteromalinen beschrieb, musste, obgleich mit *Microps Hal.* identisch, hier beibehalten werden, weil *Holiday* erst im Jahre 1833 seine Gattung *Microps* aufgestellt hat, während bereits im Jahre 1828 von *Wagler* eine Reptiliengattung und noch früher im Jahre 1823 eine Coleopterengattung von *Megerle* unter demselben Namen in die Wissenschaft eingeführt wurde. Das ♀ der Gattung *Lagynodes* ist ungeflügelt und entbehrt ganz und gar der Nebenaugen, wodurch es sich gleich von den ungeflügelten Arten der Gattung *Ceraphron* und *Megaspilus* unterscheiden lässt. Das ♂ stimmt mit dem von *Ceraphron* in vielen Stücken überein und wird auf eine ganz sichere Weise bloß durch die scharfe, zahnförmige, von der Seite stark zusammen gedrückte, lamellenartige Schneide zwischen der Fühlerwurzel unterschieden. Bei den meisten ♂ unserer Gattung ist das Mesonotum durch Seitenfurchen getheilt, (die den ♂ der Gattung *Ceraphron* immer fehlen,) da aber einige ♂ diese Seitenfurchen nicht haben und doch ganz bestimmt zu der Gattung *Lagynodes* gehören, so eignet sich auch die Theilung des Mesonotums zur Unterscheidung beider Gattungen im männlichen Geschlecht nicht, obgleich in den meisten Fällen dieses Merkmal zur sicheren Erkenntniß von *Lagynodes* ♂ ein ganz vortreffliches Mittel ist und bleiben wird.

Die Gattung *Ceraphron Jur.* darf nicht als identisch mit *Ceraphron Latr.* und *Nees* aufgefasst werden. Um diese Behauptung unumstößlich festzustellen, müssen wir auf das bekannte Werk von *Jurine* zurückgehen. Unter dem Namen *Ceraphron* hat dieser Schriftsteller dort zwei ganz verschiedene Gattungen abgebildet. Auf der Tafel 13, Gen. 44, hat er den *Ceraphron cornutus* dargestellt und auf diese Art hat *Latreille* sein Genus *Sparasion* gegründet. Es ist nun einleuchtend, dass die zweite Figur *Jurine's* auf der Tafel 14, die er als *Ceraphron sulcatus* bezeichnet, den Gattungsnamen *Ceraphron* behalten muss. Betrachten wir aber diesen *Ceraphron sulcatus* genauer, dann finden wir zwei höchst wichtige Merkmale, welche diese Gattung so vortrefflich charakterisiren, dass wir sie mit keiner anderen derselben Familie (*Lagynodes* allein ausgenommen!) vergleichen können. Diese Merkmale sind ein linienförmiges (oder vielleicht besser gesagt, ein *mangelndes*) Randmal und die Theilung des Mesonotums durch eine einzige Furche, die Mittelfurche nämlich. Sehen wir nun zu, ob bei *Latreille* und *Nees* diese Merkmale für die von ihnen aufgestellte Gattung *Ceraphron* eintreffen, so werden wir bald inne werden, dass der erstere Schriftsteller die Arten zweier Gattungen zusammen gewürfelt, nämlich solche, welche mit einem linienförmigen, und andere Arten, welche mit einem sehr breiten Randmal versehen sind. *Westwood* hat zuerst diesen Irrthum bemerkt und auf diejenigen Arten, welche ein sehr breites Randmal haben, mit vollem Rechte die Gattung *Megaspilus* gegründet. Auch *Nees* hatte etwas später die *Latreille'sche* Gattung *Ceraphron* getheilt, aber merkwürdiger Weise lässt er den Arten mit breitem Randmal den Namen *Ceraphron* und bildet für diejenigen Arten, für welche durch das linienförmige Randmal der *Jurine'sche* *Ceraphron sulcatus* als Gattungstypus dienen muss, die neue Gattung *Calliceras*. Es erhellt daraus aber klar, dass dieser letztere Name wegfallen muss, dass alle Arten, welche *Nees* unter dem Gattungsnamen *Calliceras* beschrieben hat, den Namen *Ceraphron* annehmen und dass umgekehrt die von *Nees* als *Ceraphron* beschriebenen Spezies den Gattungsnamen *Megaspilus Westw.* in Zukunft führen müssen. Ehe ich die englischen Arbeiten kannte, hatte ich den *Nees'schen* Gattungsnamen *Calliceras* in meinen Beiträgen zur Familie der Pteromalinen durch einen neuen, *Hadro-*

ceras, ersetzt, weil schon in älterer Zeit von *Meigen* eine Dipterengattung den Namen *Callicera* erhalten hatte. Diese Umänderung erweist sich natürlich mit dem Ausfall des Namens *Calliceras* als ganz überflüssig.

Von der Gattung *Megaspilus* *Westw.*, welche sehr zahlreich an Arten ist, habe ich zwei neue Gattungen abgetrennt, nämlich *Lygocerus* und *Trichosteresis*. Diese werden sich leicht von *Megaspilus* unterscheiden lassen, denn *Lygocerus* hat im männlichen Geschlecht immer gesägte Fühler (wie wir sie so ausgezeichnet schön bei *Eurytoma* antreffen), während bei *Megaspilus* und auch bei *Trichosteresis* immer fadenförmige Fühler vorkommen. Im ♀ Geschlecht hat *Lygocerus* fast kahle und *Megaspilus* stark behaarte Augen. Ein Hauptunterschied liegt aber auch noch in dem abweichenden Bau des Mesothorax. In beiden Gattungen finden wir das Mesonotum durch drei Furchen getheilt, zwei Seiten- und eine Mittelfurche. Bei *Lygocerus* ist nun der Vorderrand des Mesonotums querüber ganz grade abgeschnitten, so dass zu beiden Seiten zwei scharf winklige Vorderecken vorspringen, während bei *Megaspilus* das Mesonotum vorne in einen weiten Bogen zugerundet erscheint, die scharfen Ecken mithin fehlen. Zudem sind die Seitenfurchen des Mesonotums bei *Lygocerus*, bevor sie in die Vorderecken treffen, winklig gebrochen, bei *Megaspilus* aber nur leicht gebogen. Diese Differenzen in der Bildung des Mesonotums sind ganz durchgreifend und daher von nicht geringem Gewicht.

Die zweite Gattung *Trichosteresis*, welche ich von *Megaspilus* abgetrennt habe, charakterisirt sich sehr leicht durch die nicht behaarten Flügel; das ♂ ist ausserdem durch fadenförmige Fühler von *Lygocerus* und durch den Bau des Mesonotums, (welcher wieder mit *Lygocerus* übereinstimmt,) von *Megaspilus* verschieden. Diese Gattung wurde von mir auf den *Ceraphron clandestinus* *Nees* (= *Ceraphron glaber* *Boh.*) gegründet.

25. Proctotrupoidae. Diese Familie enthielt bis jetzt nur eine einzige Gattung, *Proctotrupes* *Latr.*, welche derselbe im Jahre 1796 aufgestellt hat; später gab *Jurine* im Jahre 1807 ihr den Namen *Codrus* und diesen Namen hat *Nees* gewählt, (obgleich ihm der ältere von *Latreille* nicht unbekannt geblieben,) ohne uns den Grund dieser Wahl mitzuthellen. So viel ich weiss, ist *Haliday* der erste gewesen, welcher darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Gattung schon von *Schrank* unter dem Namen *Serphus* *) in die Wissenschaft eingeführt worden sei. *Haliday* hat sich aber nicht bequemt, diesem Namen sein Recht wiederfahren zu lassen, und ich zweifle auch daran, dass eine so späte Umwandlung, nachdem der Name *Serphus* gänzlich in Vergessenheit gerathen, noch thunlich ist, oder gar Nachahmer finden würde.

Von *Proctotrupes* trenne ich eine von *Haliday* zuerst beschriebene Art, den *Proctotrupes areolator*, als besondere Gattung unter dem Namen *Disogmus* **) ab. Wir finden bei dieser Gattung das Mesonotum durch zwei tiefe, stark ausgeprägte Furchen getheilt, das Randmal mehr linearisch als dreieckig oder halb kreisförmig, die Luftlöcher des Metathorax stark vorspringend und rund, endlich die Hinterleibssegmente geringer an Zahl und auf dem Rücken ganz undeutlich getrennt, fast verwachsen. Auch sind die Geisselglieder im Allgemeinen länger behaart als bei *Proc-*

*) Schrift. d. Berl. Naturf. Fr. 1, 1780.

**) *Disogmus* von *δύς*, zweimal, doppelt und *ὄγμος*, *ὄ*, die Furche. Diese Benennung weist natürlich auf die beiden Furchen des Mesonotums hin.

totrupes. Ich besitze nicht nur die von *Haliday* beschriebene, sondern noch drei neue Arten, welche sich auf folgende Weise leicht unterscheiden lassen:

- a. Das vierte bis sechste Geisselglied mit einer zahnartig vorspringenden Leiste.
 - b. Das Leistchen des vierten bis sechsten Geisselgliedes springt in der Nähe der Spitze zahnartig vor.
 - c. Das erste Geisselglied deutlich länger als das zweite **discrepator m.**
 - cc. Das erste Geisselglied eben so lang wie das zweite **aequator m.**
 - bb. Das Leistchen des vierten bis sechsten Geisselgliedes springt in der Mitte vor **areolator Hal.**
- aa. Das vierte bis sechste Geisselglied ohne Leiste **piceicornis m.**

Alle vorbenannten Arten scheinen mir ♂ zu sein, die ♀ kenne ich nicht.

26. Scelionidae. Da die Scelioniden durch *Walker* eine weitläufige Bearbeitung in dem „Ent. Mag. Vol. III, pag. 341,“ gefunden haben und die Gattungen derselben ebendasselbst durch die vortrefflichen Zeichnungen *Haliday's* sehr kenntlich dargestellt wurden, so ist das Studium dadurch bedeutend erleichtert worden. Ich habe diese Familie ebenfalls einer langjährigen Untersuchung unterworfen und war so glücklich, nicht nur die europäischen Gattungen fast alle, sondern auch mehrere neue in hiesiger Gegend zu entdecken. Mit Ausnahme der Gattung *Hemisius Westw.*, welche mir allein unbekannt geblieben ist, wird man alle anderen durch die nachfolgende Uebersicht leicht bestimmen können:

- a. Die Fühlerkeule nicht gegliedert.
 - b. Geflügelt **Thoron Hal. ♀.**
 - bb. Ungeflügelt oder mit kurzen Flügelstummeln.
 - c. Das Schildchen fehlt **Baeus Hal.**
 - cc. Das Schildchen deutlich vorhanden **Acolus m. *)**
- aa. Die Fühlerkeule gegliedert.
 - d. Unterrandader verkürzt, den Flügelrand nicht erreichend **Baeoneura m. **)**
 - dd. Unterrandader nicht verkürzt, den Flügelrand erreichend.
 - e. Der ramus marginalis sehr lang, wenigstens vier- bis fünfmal so lang wie der ramus stigmaticus.
 - f. Mesonotum mit zwei scharf ausgeprägten durchgehenden Furchen; Fühler des ♂ lang, wirtelhaarig, (des ♀ keulförmig) . **Xenomereus Walk.**
 - ff. Mesonotum ohne scharf ausgeprägte durchgehende Furchen; Fühler des ♂ nicht wirtelhaarig.
 - g. Die hinterste Ferse verdickt; Mittelschienen mit schwachen Dörnchen **Teleas Latr.**

*) *Acolus* von ἀκωλος, ὄν, ungegliedert. Ein Hinweis auf die Fühlerkeule.

**) *Baeoneura* von βαιός, ἄ, ὄν, klein, gering, unbedeutend und νευρόν, τό, die Sehne, Schnur, der Nerv, hier die Ader. Die Beziehung zu der schwachen Entwicklung der Unterrandader ist leicht verständlich.

- gg. Die hinterste Ferse nicht verdickt; Mittelschienen ohne Dörnchen . **Prosacantha Nees.**
- ee. Der ramus marginalis sehr kurz und meist kürzer als der ramus stigmaticus.
- h. Das erste Segment schmal, der Hinterleib daher nicht mit breiter Basis sitzend.
- i. Das zweite Segment am grössten **Telenomus Hal.**
- ii. Das dritte Segment am grössten.
- k. Der ramus stigmaticus an der Basis verdickt, fast einem Randmal ähnlich.
- kk. Der ramus stigmaticus an der Basis nicht verdickt.
- l. Die Furchen der Parapsiden sehr deutlich; Flügel ohne ramus postmarginalis **Anteris m. *)**
- ll. Die Furchen der Parapsiden ganz fehlend; das erste Segment an der Basis mit einem konischen Zapfen ♀; Flügel mit einem langen ramus postmarginalis ♂ ♀ **Baryconus m. **)**
- hh. Das erste Segment breit, daher der Hinterleib mit breiter Basis sitzend.
- m. Die Stirn mit einer scharfen aufgeworfenen Leiste **Sparasion Latr.**
- mm. Die Stirn ohne Leiste.
- n. Der ramus postmarginalis sehr stark ausgebildet und länger als der ramus stigmaticus.
- o. Das Hinterschildchen mit einem Dörnchen **Trimorus m. ***)**
- oo. Das Hinterschildchen ohne Dorn.
- p. Die Fühler fadenförmig ♀ **Apegus m. †)**
- pp. Die Fühler keulförmig ♀, oder fadenförmig ♂.
- q. Der ramus marginalis punktförmig, das letzte Glied der Fühlerkeule doppelt so lang wie das vorletzte ♂ ♀ **Gryon Hal.**
- qq. Der ramus marginalis halb so lang wie der Stiel des ramus stigmaticus; das letzte Glied der Fühlerkeule kaum länger als das vorletzte; Körper kurz, gedrungen **Hadronotus m. ††)**

*) Anteris von ἀντηρίς, ἰδος, ἦ, die Stütze, der Tragbalken. Eine Andeutung auf den ramus marginalis, welcher zwischen dem ramus humeralis und stigmaticus gleichsam wie ein Trag- oder Wagebalken erscheint.

**) Baryconus von βαρύς, εἶα, ὅ, schwer und κώνος, ὅ, der Kegel, Zapfen. Der Name bezieht sich auf den kegelförmigen Zapfen auf dem ersten Hinterleibssegment.

***) Trimorus von τρίμορος, ον, (= τρίμοιρος, ον,) dreitheilig, dreifach. Durch die Furchen der Parapsiden wird das Mesonotum in drei Theile getheilt. Auf dieses Merkmal deutet der Name hin.

†) Apegus von ἀ priv. und πηγός, ἦ, ὄν, fest, derb, gedrungen, also nicht derb, nicht gedrungen, ein Merkmal, welches der Fühlergeissel zukommt, welche in dieser Gattung beim ♀ fadenförmig, nicht keulförmig ist, deren Glieder also auch nicht fest oder gedrungen erscheinen.

††) Hadronotus von ἀδρός, ἄ, ὄν, gross, dick, derb, stark und ῥώτος, ὅ, der Rücken. Hier den derben breiten Rücken des Mesothorax bezeichnend.

nn. Der ramus postmarginalis fehlt gänzlich oder er ist kürzer als der ramus stigmaticus.

r. Der ramus postmarginalis fehlt gänzlich. **Scelio Latr.**

rr. Der ramus postmarginalis viel kürzer als der ramus stigmaticus . **Idris m. *)**

Die Gattung *Thoron Hal.* ist im weiblichen Geschlecht durch die nicht gegliederte Fühlerkeule leicht kenntlich, da aber das ♂ fadenförmige Fühler hat, so musste ein anderes Unterscheidungsmerkmal bei diesem hervorgehoben werden. Ich finde dieses Merkmal an der Basis des ramus stigmaticus, wo der ramus marginalis mit der Wurzel des ramus stigmaticus zusammen einen randmalartigen dunklen Flecken bildet, der sogar beiden Geschlechtern zukommt. *Walker* nennt in seinem *Conspectus* den Hinterleib gestielt; diesen Ausdruck kann ich nicht gelten lassen, denn wenn das erste Segment auch verhältnissmässig schmaler ist als bei den übrigen Gattungen dieser Familie, so ist es doch deshalb noch kein Stiel. *Nees* hat das ♂ unter dem Namen *Teleas fornicatus*, das ♀ als *Teleas solidus* beschrieben.

Wegen der minutiösen Kleinheit ist die Gattung *Baeus* bisher gewiss vielfach übersehen worden. Das erste Exemplar, welches ich gesehen, fand sich in der Sammlung des Herrn *von Heyden* in Frankfurt. Lange Jahre suchte ich vergebens in hiesiger Gegend, nachdem ich aber erst einige Stücke gefangen, fielen mir in jedem Jahre einige in die Hände. Alle waren ♀, das ♂ ist auch bis jetzt noch nicht aufgefunden worden. Drei Merkmale zeichnen diese winzige Form aus, die nicht geringelte Fühlerkeule, der Mangel des Schildchens und der Flügel. Von letzteren ist auch keine Spur vorhanden.

Eine andere sehr kleine Form schliesst sich enge an *Baeus* an, nämlich *Acolus*. Auch hier finden wir die ungegliederte Keule, aber das Schildchen ist vollständig entwickelt, auch die Flügel sind vorhanden, obgleich nur rudimentär und die Basis des Hinterleibs nicht weit überschreitend. Von dieser Gattung kenne ich ebenfalls nur ♀.

Nicht viel grösser als *Baeus*, obgleich verhältnissmässig etwas gestreckter und schmaler stellt sich die Gattung *Baoneura* dar. Bei dieser Gattung treffen wir aber bereits auf eine gegliederte Keule. Durch die geringe Entwicklung der Unterrandader, welche hier von der Wurzel aus zwar eine kleine Strecke weit in das Flügelfeld hineingeht, aber sich nicht mit dem Vorderrande vereinigt, sondern plötzlich abbricht, kann man sie leicht von allen nachfolgenden Gattungen unterscheiden. Sie bildet daher in Bezug auf die Flügel einen schönen Uebergang zu den *Platygastriden* dar.

Durch die wirtelhaarigen Fühler macht sich die schöne Gattung *Xenomerus* gleich kenntlich. *Walker* kannte nur das ♂, ich habe aber in hiesiger Gegend auch das ♀ entdeckt, welches sich von dem ♂ durch die Fühler unterscheidet, diese sind zwölfgliedrig mit sechsgliedriger Keule.

Die Gattung *Teleas* wurde im Jahre 1809 von *Latreille* in seinem berühmten Werke „Gen. Crust. et Ins.“ begründet und sein *Teleas clavicornis* als Typus aufgestellt. Spätere Schriftsteller und namentlich *Nees von Esenbeck* haben den Charakter dieser Gattung verkannt, denn seine Gattung *Teleas* ist der Gattung *Telenomus Hal.* identisch, und seine Gattung *Prosacantha* stimmt in

*) *Idris* von ἰδρύς, ἰδρύς, geschickt, klug.

Bezug auf die Flügelbildung zwar mit Teleas Latr. überein, weicht aber in andern Punkten wieder davon ab.

Zur Wiederherstellung der Gattung Teleas im Sinne von Latreille ist es nöthig, die Charakteristik der Gattung bei diesem Schriftsteller genau und sorgfältig in Betracht zu ziehen. Latreille hat in dem eben angeführten Werke zuerst das ♂ besprochen. *) Aber alles, was er an jener Stelle anführt hat auf den generischen Charakter gar keinen Bezug, nur der Ausdruck „femoribus posticis crassis“ ist von grossem Gewicht. Ausführlicher jedoch und hinreichend deutlich wird das ♀ bezeichnet. **) Die stark verdickten Hinterschenkel, die kräftigen Schienen und die kurze breite Ferse der hintersten Beine lassen keinen Zweifel mehr übrig, welche Arten der Latreille'schen Gattung angehören. Haliday hat eine ganz vortreffliche Abbildung von Teleas clavicornis Latr. ***) gegeben, die uns jene Merkmale klar vor Augen führt. Auf die Angabe Latreille's, dass die Vorderflügel mit der Gattung Scelio übereinstimmen ist nur wenig Gewicht zu legen, denn sie weichen dadurch von Scelio, so wie auch von Telenomus Hal. (Teleas Nees) geradezu ab, dass der ramus stigmaticus gleichsam bis auf ein Minimum verkürzt erscheint. Walker hat alle Arten, welche einen derart verkürzten ramus stigmaticus haben und bei welchen das dritte Segment des Hinterleibs grösser als die übrigen erscheint zur Gattung Teleas Latr., Nees aber zu seiner neuen Gattung Prosacantha gezogen. Ich will aber hier die Gattung Teleas im Sinne Latreille's und mit den von ihm angegebenen Charakteren herstellen, also mit folgenden Merkmalen: *Verdickte Hinterschenkel, eine kurze und breite Hinterferse und mit schwachen Dörnchen besetzte Mittelschienen.* Das Merkmal an den Mittelschienen habe ich den Latreille'schen noch hinzugefügt. Alles, was diese Merkmale nicht aufweisen kann, scheide ich von der Gattung Teleas aus. Es fragt sich nun, soll für die ausscheidenden Arten eine neue Gattung gegründet werden, oder ist eine solche vorhanden, welche sie ohne Weiteres aufnehmen kann? Das letztere ist wirklich der Fall, da die Gattung Prosacantha Nees alle Merkmale vereinigt, um die grosse Anzahl der ausscheidenden Arten in sich aufzunehmen. Die Gattung Prosacantha Nees wird also einfach so zu charakterisiren sein: *Hinterschenkel nicht besonders verdickt; die Hinterferse verlängert, schmal; die Mittelschienen ohne Dörnchen.* Diese Gattung, von welcher Nees nur drei Arten beschreibt, ist ausserordentlich artenreich, da nicht nur der bei Weitem grösste Theil der Arten der Gattung Teleas Walk. dazu gehören sondern auch eine beträchtliche Anzahl neuer von mir in hiesiger Gegend entdeckt worden sind.

Von der Gattung Prosacantha, wie ich sie nach der vorangehenden Auseinandersetzung auffasse, trenne ich einige Arten, welche sich durch den abweichenden Verlauf der Unterrandader auszeichnen, um darauf die Gattung Anteris zu gründen. Die Unterrandader derselben hat ungefähr den gleichen Verlauf wie bei Scelio, sie vereinigt sich ein wenig vor der Mitte des Flügels mit dem Vorderrande, bildet dann einen kurzen etwas verdickten ramus marginalis und einen

*) Gen. Crust. et Ins. Tom. IV, pag. 33. — „Scelione ruguloso paulo minor, etc. femoribus posticis crassis.....“

**) Ebendasselbst, pag. 33, sagt er: Pedes postici feminae femoribus magis incrassatis, subtus denticulatis, tibiis validis, tarsorumque articulo basilari magno. Antennae pro sexu variant, ut in scelione ruguloso, at in feminis abrupto-clavatae.

***) Ent. Mag. Vol. III, Tab. XIII, fig. 8.

ramus stigmaticus, welcher jenen an Grösse noch etwas übertrifft. Von der Gattung *Baryconus* unterscheidet sich das ♂ von *Anteris* einmal durch den fehlenden ramus postmarginalis und dann durch den Mangel des konischen Zapfens an der Basis des Hinterleibs.

In der Gattung *Baryconus* haben wir eine sehr schöne und ausgezeichnete Gattung vor uns. Das ♂ ♀ hat einen verlängerten ramus postmarginalis und an der Basis des ersten Segments hat das ♀ einen konischen Zapfen, ist also durch beide Merkmale hinreichend von *Anteris* ♀ verschieden. Das ♂ hat wie *Anteris* ebenfalls zwölfgliedrige, aber fadenförmige Fühler, während sie bei *Anteris* mehr schnurförmig erscheinen. Uebrigens zeichnet diese Gattung sich auch noch durch die Stellung der paarigen Nebenaugen aus. Sie stehen hier dem innern Augenrande ganz nahe, bei *Anteris* aber von demselben weit ab.

Bei *Sparasion* finden wir auf der Stirn eine scharfe Leiste, welche von dem innern Augenrande der einen Seite des Kopfes sich bogenförmig nach der andern hinzieht. Die paarigen Nebenaugen stehen nicht weit vom innern Augenrande ab. Die Fühlergeissel besteht beim ♂ aus walzenförmigen Gliedern, welche wenigstens doppelt so lang sind wie breit. Beim ♀ finden wir diese Glieder mehr verkürzt, fast breiter als lang. Die Unterrandzelle ist breit und deutlich. Der ramus marginalis wird hier nur durch einen dicken, etwas unförmlichen Punkt angedeutet, der ramus stigmaticus dagegen ist lang und der ramus postmarginalis fehlt gänzlich. Die weitere Charakteristik findet man bei *Latreille*, *) *Nees von Esenbeck* **) und *Walker*. ***) Ausser der bekannten Art *Sparasion frontale Latr.* besitze ich noch zwei neue Arten, die ich hier kurz charakterisiren will:

- a. Fühlergeissel anliegend beharrt ***Sparasion frontale Latr.* ♂ ♀.**
- aa. Fühlergeissel nicht anliegend behaart, sondern mit abstehenden Haaren.
 - b. Kopf schwach, Mesonotum und Schildchen stark erzgrün, glänzend „ ***aenescens m.* ♂.**
 - bb. Kopf, Mesonotum und Schildchen einfarbig schwarz, Körper schmaler „ ***lepidum m.* ♂.**

Die Gattung *Trimorus* ist von mir auf diejenigen Arten der Gattung *Gryon* begründet worden, welche sich durch deutliche Furchen der Parapsiden und die Bewaffnung des Hinterschildchens mittelst eines kurzen aber starken Dorns auszeichnen. Es ist dieses *Gryon Nanna Walk.* ♂ und *Gryon Phlias Walk.* ♀. *) Beide Arten machen sich noch ausserdem durch einen verlängerten Hinterleib bemerklich.

Die schöne Gattung *Apegus* unterscheidet sich gleich durch die fadenförmigen Fühler im weiblichen Geschlecht, deren Glieder nach der Spitze ganz unmerklich und nur sehr wenig sich verdicken. Sie sind zwölfgliedrig, alle Geisselglieder lang gestreckt, walzig. Die paarigen Nebenaugen stehen vom innern Augenrande etwas entfernt. Die Furchen der Parapsiden sind zwar tief

*) L. c. pag. 34.

**) L. c. pag. 259.

***) Ent. Mag. Vol. III, pag. 369.

†) Ent. Mag. Vol. III, pag. 343 und 344.

und deutlich, gehen aber nicht bis zum Pronotum durch. Der Hinterleib ist stark verlängert, länger als Kopf und Mittelleib zusammen. Alle Segmente sind verlängert, das zweite und dritte aber am meisten. Die Flügel erreichen nicht ganz die Spitze des Hinterleibs. Der ramus marginalis derselben ist kurz und von ihm geht der ramus stigmaticus fast unter rechtem Winkel ab. Der ramus postmarginalis ist stark verlängert. Ich kenne nur eine Art, *Apepus leptocerus m.*

Für die Gattung *Gryon* nehme ich *Gryon misellus Hal.*, von welchem durch *Haliday's* Meisterhand auf Pl. XIII. fig. 5 eine Abbildung des ♂ geliefert wurde, als Typus an. Die überall gleich breite, nicht sehr gedrungene Körpergestalt zeichnet diese Gattung gleich vor der Gattung *Hadronotus* aus. Ausser den in der vorangehenden Uebersicht aufgeführten Unterscheidungsmerkmalen, dürfte hier noch angeführt werden, dass bei *Hadronotus* die Unterrandzelle ziemlich breit ist und deutlich in die Augen fällt, was bei *Gryon* nicht der Fall ist. Mir sind nur zwei Arten von *Hadronotus* in hiesiger Gegend vorgekommen: *Hadronotus laticeps* und *stygius*.

Durch ungleiche Gliederzahl der Fühler in beiden Geschlechtern zeichnet sich die bekannte Gattung *Scelio Latr.* aus. Beim ♂ sind sie zehngliedrig, schnurförmig, beim ♀ zwölfgliedrig mit starker Keule. Die paarigen Nebenaugen haben dieselbe Stellung wie bei *Sparasion*. Die Unterrandzelle ist an der Spitze ziemlich breit; der ramus marginalis kurz aber sehr breit, der ramus stigmaticus kurz und der ramus postmarginalis ganz fehlend. Die bekannte Art *Scelio rugulosus Latr.* ist über den grössten Theil von Europa verbreitet. Ich habe in der Gegend von Aachen, eine zweite Art entdeckt, die ich *Scelio fulvipes* nenne, sie unterscheidet sich von *rugulosus* dadurch, dass die Beine mit Einschluss der Hüften rein rothgelb, die Fühler dagegen schwarz sind und einen rothgelben Schaft haben. Ich kenne bis jetzt aber nur das ♂.

Nicht weniger ausgezeichnet und charakteristisch wie *Apepus* erweist sich die neue Gattung *Idris*. Bei dieser seltenen Form finden wir die paarigen Nebenaugen gradezu am inneren Augenrande stehend. Die Fühler sind zwölfgliedrig, schnurförmig, das letzte Glied fast doppelt so lang wie das vorletzte. Die Furchen der Parapsiden sind sehr schwach und nur in der Nähe des Schildchens sieht man eine schwache Spur derselben, die sich aber nach vorne bald wieder verliert. Das dritte Segment ist sehr gross. Nur eine einzige Art, *Idris flavicornis* konnte ich bis jetzt und nur in wenigen Exemplaren auffinden.

Westwood führt in der „Mod. Class.“ noch eine Gattung *Hemisius* auf, die ich nicht kenne und daher auch nicht mit der gehörigen Sicherheit in die allgemeine Uebersicht der Gattungen aufnehmen konnte. Sie zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: eiförmige Fühler, bei welchen das erste Geisselglied kürzer als das Stielchen und die Keule nur viergliedrig sein soll; Flügel kaum länger als der Mittelleib, der ramus stigmaticus lang, verdickt, schief; das zweite Segment des Hinterleibs sehr gross.

Eben so wenig wie die vorstehende kenne ich die Gattung *Macrotelia Westw.* (Siehe *Macrotelia*, *Proced. zool. soc.* 1835, p. 5.) Als distinctive Merkmale werden angegeben: zwölfgliedrige Fühler, beim ♂ fast schnurförmig, beim ♀ mit sechsgliedriger Keule. Flügel viel kürzer als der Hinterleib, der Verlauf der Unterrandader wie bei *Pteromalus*. Das Schildchen wehrlos. Hinterleib fast sitzend, sehr lang, gestreift, niedergedrückt, die vier ersten Segmente fast gleich, beim ♀ aber länger als beim ♂ und hinten mehr verschmälert.

Ob die Gattung *Macrotelia* eine Europäische ist, kann ich augenblicklich nicht angeben, da mir die *Proceed. zool. soc.* nicht zu Gebote stehen. Es leuchtet aber bald ein, dass diese, so wie auch die Gattung *Hemisius*, von allen in der Uebersicht angeführten Gattungen abweichen und sich gehörig und bestimmt davon unterscheiden.

Wir finden aber noch eine andere Gattung in dieser Familie, welche *Westwood* im Bernstein entdeckte, *Calotelea*, (siehe *Transact of the Ent. Soc. II*, pag. 55, Pl. VII, fig. 10), die wir hier nicht übergehen dürfen, weil sie an unsere Gattung *Baryconus* erinnert. Beim ♀ soll sich nämlich an der Basis des Hinterleibs ein mehr oder weniger verlängertes, grades, über das Metanotum emporsteigendes Horn befinden, wofür wir grade bei *Baryconus* ♀ ein, wenn auch schwaches Analogon haben, während ein solches Horn in der Familie der *Platygastriden* bei *Inostemma* vollständig entwickelt auftritt.

27. *Platygastridae*. Diese Familie war bis jetzt auf drei Gattungen, *Iphitrachelus*, *Inostemma* und *Platygastr* beschränkt. Eine vierte Gattung, *Epimeces Westw.*, wurde von *Walker* wieder mit *Platygastr* vereinigt. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass der grosse Reichthum an Arten in der Gattung *Platygastr* eine weitere Eintheilung wohl ertragen könnte und schon jetzt Bedürfniss geworden ist. Glücklicherweise ist die Bildung neuer Gattungen hier nicht blos möglich, sondern viel leichter als bei der Gattung *Pteromalus*. Ob der Versuch, den ich hier mache, Anerkennung finden wird, weiss ich nicht, möchte es aber um so zuversichtlicher bejahen, weil ich selbst dadurch in Bestimmung der Arten die grösste Erleichterung gefunden habe.

Der *Conspectus* der Gattungen ist folgender:

- a. Die Unterrandader an der Spitze mit einem Knöpfchen.
- b. Tarsen viergliedrig. ***Iphitrachelus Hal.***
- bb. Tarsen fünfgliedrig.
- c. Fühler neungliedrig, beim ♂ gesägt. ***Allotropa m. *)***
- cc. Fühler zehngliedrig, beim ♂ nicht gesägt.
- d. Flügel mit einer Grund- und Mittelader.
- e. Die drei letzten Geisselglieder viel grösser als die vorhergehenden, eine Keule bildend ***Metaclisis m. **)***
- ee. Das letzte Glied allein grösser als die vorhergehenden ***Monocrita m. ***)***
- dd. Flügel ohne Grund- und Mittelader.
- f. Die paarigen Nebenaugen stehen dem unpaarigen näher als dem inneren Augenrande ***Isostasius m. †)***
- ff. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren Augenrande näher als dem unpaarigen.

*) *Allotropa* von *ἀλλότροπος, ον*, anders geartet, veränderlich. Der Name hat eine Beziehung auf die männlichen Fühler, welche durch ihre gesägte Form eine abweichende Bildung zeigen.

**) *Metaclisis* von *μετάκλισις, ή*, das Umbiegen, *Zurückbiegen*. Der Name spielt auf die Grundader an, welche sich von der Unterrandader gleichsam zurückbiegt.

***) *Monocrita* von *μόνος, ή, όν*, einer, allein und *κριτός, ή, όν*, abgesondert, geschieden. Auf die Fühlergeissel hindeutend, bei welcher blos ein Glied allein als Keule abgesondert ist.

†) *Isostasius* von *ισοστάσιος, όν*, gleichstehend, überhaupt gleich.

- g. Das ♀ mit einem Horn auf dem ersten Segment **Inostemma Hal.**
 gg. Das ♀ ohne Horn auf dem ersten Segment **Acerota m. *)**
 aa. Die Unterrandader an der Spitze ohne Knöpfchen.
 h. Das Schildchen mehr oder weniger verlängert, nicht halbkreisig, oder wenn verkürzt, dann immer von der Seite zusammengedrückt, mit einer pfriemen- oder warzenförmigen Spitze versehen.
 i. Der Mittelleib von der Seite auffallend zusammengedrückt . **Catillus m. **)**
 ii. Der Mittelleib nicht von der Seite zusammengedrückt.
 k. Das Schildchen verlängert, ohne dorn-, pfriemen- oder warzenförmige Spitze.
 l. Die Furchen der Parapsiden tief, nach der Spitze hin parallel; eine Fühlerkeule beim ♀ nicht abgesetzt, die zwei letzten Geißelglieder getrennt **Xestonotus m. ***)**
 ll. Furchen der Parapsiden ganz undeutlich oder fehlend; beim Weibchen mit viergliedriger Keule, die zwei letzten Geißelglieder eng verbunden **Amblyaspis m. †)**
 kk. Das Schildchen verlängert, mit einer dorn-, pfriemen- oder warzenförmigen Spitze.
 m. Das Schildchen geht in einen mehr oder weniger starken Dorn aus.
 n. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren Augenrande näher als dem unpaarigen; Keule beim ♀ viergliedrig **Leptacis m. ††)**
 nn. Die paarigen Nebenaugen stehen dem inneren Augenrande nicht näher als dem unpaarigen; Keule beim ♀ dreigliedrig; Kopf von vorne gesehen rautenförmig **Isorhombus m. †††)**
 mm. Das Schildchen geht in eine pfriemen- oder warzenförmige Spitze aus, ist etwas verkürzt und von der Seite zusammengedrückt.

*) *Acerota* von ἀκέρωτος, ον, ungehörnt, ohne Horn.

**) *Catillus* nom. pr. Da *Walker* einer Art von *Platygaster* diesen Speziesnamen gab, so habe ich denselben als Gattungsnamen hier aufgestellt.

***) *Xestonotus* von ξεστός, ή, όν, geglättet, polirt und νώτος, ό, der Rücken. Nicht nur das Mesonotum, sondern auch das Schildchen ist hier ganz glatt, ohne alle Sculptur, worauf diese Benennung hindeutet.

†) *Amblyaspis* von ἀμβλύς, stumpf und εσπίς, ή, der Schild.

††) *Leptacis* von λεπτός, ή, όν, dünn und άκίς, ή, die Spitze. Den dünnen scharfen Dorn des Schildchens bezeichnend.

†††) *Isorhombus* von ίσος, η, ον, gleich und όόμβος, ό, die Raute. Wegen des hohen Scheitels erscheint der Kopf dieser Gattung, von vorne gesehen, sehr bestimmt rautenförmig.

- o. Der Hinterleib sehr stark verlängert **Ectadius m. *)**
 oo. Der Hinterleib nicht besonders verlängert.
 p. Das zweite Bauchsegment beim ♀ stark zusammengedrückt,
 sackartig **Sactogaster m. **)**
 pp. Das zweite Bauchsegment beim ♀ nicht sackartig **Synopeas m. ***)**
 hh. Das Schildchen nicht verlängert, sondern halbkreisig; entweder flach,
 konvex oder polsterförmig.
 q. Das Schildchen ganz flach **Anopedias m. ****)**
 qq. Das Schildchen nicht flach.
 r. Der Kopf kubisch **Isocybus m. †)**
 rr. Der Kopf nicht kubisch.
 s. Das Schildchen an der Spitze mit einem Haarbüschel . **Trichacis m. ††)**
 ss. Das Schildchen an der Spitze ohne Haarbüschel.
 t. Der Hinterleibsrand sehr breit umgeschlagen . . . **Hypocampsis m. †††)**
 tt. Der Hinterleibsrand nicht breit umgeschlagen.
 u. Das Schildchen vollkommen polsterförmig, an der
 Basis durch eine tiefe Rinne vom Mesonotum ge-
 schieden; Schläfen sehr breit **Polygnotus m. ††††)**
 uu. Schildchen an der Basis nicht durch eine tiefe
 Rinne vom Mesonotum geschieden; Schläfen nicht
 sehr breit **Platygaster Latr.**

Man kann die Platygastriden auf doppelte Weise in zwei natürliche Tribus theilen, einmal indem man die Anzahl der Tarsenglieder, oder indem man die Bildung und Form der Unterrandader zu Grunde legt. Ich ziehe die letztere Eintheilung vor, weil durch die Tarsen sich von der ganzen Familie nur eine einzige Gattung mit einer Art, vermittelst der Bildung der Unterrandader aber mehrere Gattungen und eine grössere Anzahl von Arten abtrennen lassen. Je nachdem die Unterrandader an der Spitze einen kleinen Knopf trägt oder nicht, erhalten wir also zwei Abtheilungen.

*) Ectadius von *ἐκτάδιος*, *ή, όν*, ausgestreckt, ausgedehnt.

**) Sactogaster von *σακτός*, *ή, όν*, angefüllt, vollgestopft und *γαστήρ*, *ή*, der Bauch. Das zweite Segment beim ♀ ist dick, sackförmig, gleichsam mit einem besonderen Inhalt angefüllt.

***) Synopeas von *σύν*, mit und *ὀπείας, τό*, die Pfieme. Da das Schildchen meist eine pfriementförmige Spitze hat, so enthält der Gattungsname eine Andeutung auf dieses Organ.

****) Anopedias von *ἄνω*, oben und *πεδιάς*, flach. Bezieht sich also auf das ganz flache Schildchen.

†) Isocybus von *ἴσος*, *ή, όν* und *κύβος*, *ός*, der Würfel. Auf den kubischen Kopf sich beziehend.

††) Trichacis von *τριξ*, *ή*, Haar und *ἀκίς*, *ή*, die Spitze. Den dünnen, scharfen Dorn des Schildchens bezeichnend.

†††) Hypocampsis von *ὑποκάμπω*, umbiegen und intrans. sich umbiegen. Dieser Name weist auf die stark und breit umgebogenen Ränder des Hinterleibs hin.

††††) Polygnotus von *πολύς*, viel und *γνώσις*, *ή, όν*, bekannt, *verwandt*. Wegen der grossen Verwandtschaft mit Isocybus so genannt.

Aus der ersten Tribus mit geknopfter Unterrandader sondert sich durch ihre viergliedrigen Tarsen die Gattung *Iphitrachelus* *) ab, eine der schönsten Entdeckungen des berühmten irischen Entomologen, des so oft genannten *Haliday*. Das ♂ hat zehngliedrige Fühler mit wirtelhaariger gesägter Geissel, ungefähr wie bei *Eurytoma*, das ♀ hat nur achtegliedrige Fühler, das letzte Glied einen starken aber nicht deutlich geringelten Knopf darstellend. Die Furchen der Parapsiden sind sehr deutlich. Was aber diese Gattung noch besonders auszeichnet, ist der Metathorax-Rücken, welcher häutige Streifen hat, die gleichsam drei Gruben bilden. Das erste Hinterleibssegment ist kurz und mit einer Haut bedeckt, das zweite ist sehr gross und bedeckt fast den ganzen Rücken. Von dieser seltenen Gattung, welche bis dahin nur in Irland gefunden worden, habe ich in hiesiger Gegend das ♀ entdeckt.

Durch fünfgliedrige Tarsen unterscheiden sich die folgenden Gattungen dieser Tribus von *Iphitrachelus*. Von diesen scheidet die Gattung *Allotropa* von den anderen nicht nur durch neungliedrige Fühler beim ♂, sondern auch noch dadurch aus, dass die Geissel dieselbe Bildung zeigt wie bei *Iphitrachelus*. Die Furchen der Parapsiden sind kaum sichtbar. Es ist nur von einer Art das ♂ bekannt, *Allotropa Mecrida* Walk. **) (= *Inostemma Mecrida*), von dieser habe ich ein Originalexemplar vor Augen.

Auf *Inostemma areolata* Hal. ***), von welcher ich ebenfalls ein Originalexemplar aus *Haliday's* Hand erhalten, habe ich die Gattung *Metaclisis* gegründet, welche sich durch zehngliedrige Fühler in beiden Geschlechtern, und durch nicht gesägte Fühler beim ♂ von der vorhergehenden Gattung *Allotropa*, so wie durch das Auftreten einer Grundader im Flügel von *Isostasius* und *Inostemma* unterscheidet. Beim ♀ haben wir eine dreigliedrige Keule, indem die drei letzten Glieder der Geissel bedeutend grösser sind wie die vorangehenden. Das Schildchen ist flach. ♂ ♀. Das von *Haliday* erhaltene ♀ zeigte an der Basis des zweiten Segments einen schwachen, konischen Vorsprung.

Von *Metaclisis* unterscheidet sich *Monocrita* hauptsächlich durch die eingliedrige Keule der Geissel, durch kaum sichtbare Furchen der Parapsiden und ein konvexes tuberkelartiges Schildchen, während sie sich durch die vorhandene Grundader bloss an diese Gattung allein anschliesst. Auch von dieser Gattung ist nur das ♀ einer Art bekannt geworden, welches unter dem Namen *Inostemma Atinas* von *Walker* beschrieben worden ist. †)

Nees von Esenbeck hat zwei Arten von *Platygaster* beschrieben, deren Unterrandader mit einem kleinen Knopf an der Spitze versehen ist, nämlich *Platygaster Boscii* und *Platygaster punctiger*. ††) Beide bilden, und zwar jede für sich, eine besondere Gattung; *Platygaster Boscii* gehört der Gattung *Inostemma* Hal. und *Platygaster punctiger* einem neuen Genus an, welches ich *Isostasius* nenne. Der Charakter dieser Gattung ist in vielen Stücken ausgezeichnet und eine Tren-

*) Ent. Mag. Vol. III, pag. 273, Pl. XII, fig. 1. *Iphitrachelus* Lar. ♂. Später wurde auch das ♀ entdeckt.

**) L. c. pag. 273.

***) L. c. pag. 272.

†) Ent. Mag. Vol. III, pag. 272.

††) *Nees ab Esenbeck*. Hym. ichn. aff. Mon. Vol. II, pag. 306 und 307.

nung von *Inostemma* durchaus nothwendig. Vorerst muss bemerkt werden, dass die paarigen Nebenaugen dem unpaarigen näher stehen als dem innern Augenrande, was bei *Inostemma* grade umgekehrt ist. Die Fühler beim ♂ sind fast keulförmig, etwas abstehend behaart, zehngliedrig; das erste Glied der Geissel sehr klein, rundlich, die beiden folgenden zwar dicker aber von derselben rundlichen Form, kurz, das vierte etwas grösser als das dritte, breiter als lang, die drei folgenden unter sich gleich, dicker als das vierte Glied, aber ebenfalls noch etwas breiter als lang, das zehnte Glied konisch und von der Länge der beiden vorhergehenden. Die Furchen der Parapsiden sind sehr deutlich, das Schildchen konvex. Das erste Segment ist kurz, das zweite sehr gross, fast den ganzen Hinterleibsrücken einnehmend; die beiden folgenden Segmente und die obere Afterdecke sehr kurz, und zusammen kaum so lang wie das erste Segment. Die Näthe der letzten Segmente sehr undeutlich und kaum sichtbar. Beim ♀ sind die Fühler ebenfalls zehngliedrig, mit einer starken viergliedrigen Keule, an welcher das erste Glied viel kleiner ist als die stufenweise immer grösser werdenden folgenden Glieder. Das Endglied der Keule als das grösste, ist ziemlich breit und ganz stumpf zugerundet. Der Hinterleib beim ♀ besteht aus drei Segmenten, das zweite ist so gross, dass es auf der Rückenseite das dritte ganz einschliesst, man kann daher dieses dritte Segment bloss auf der Bauchseite wahrnehmen. Auf der Rückenseite finden wir kurz vor der Spitze einen schwachen Eindruck, welcher leicht als Einschnitt eines Segments gedeutet werden könnte. In diesen Irrthum scheint *Walker* verfallen zu sein. Seine *Inostemma scrutator* ist nämlich, wie ich zuversichtlich glaube, Synonym von *Isostasius punctiger*; er glaubt bei dieser seiner Art noch hinter dem zweiten sehr grossen Segment kleinere und kürzere zu erblicken. *) Wenn er richtig gesehen, dann hätte er allerdings nicht nur eine andere Art, sondern sogar ein ganz anderes Genus vor Augen gehabt. Unser *Isostasius punctiger* hat sich in der neuesten Zeit als ein sehr nützliches Thierchen erwiesen, denn er ist der zerstörende Parasit der sehr gefürchteten und schädlichen *Cecidomyia Triticii Latr.*, über welche *M. C. Bazin* so schöne und interessante Beobachtungen mittheilt. **)

Auf den *Platygaster Boscii Jur.* hat *Haliday* seine Gattung *Inostemma* gegründet, welche im weiblichen Geschlecht durch einen schönen Charakter ausgezeichnet ist, nämlich durch das Horn auf dem ersten Segment, welches sich über den Thorax bis zum Kopfe hin erstreckt. Das ♂ unterscheidet sich von *Isostasius* nicht nur durch die abweichende Stellung der Nebenaugen, sondern noch mehr durch den Hinterleib. Das zweite Segment nimmt hier höchstens die Hälfte des ganzen Rückens ein, die folgenden Segmenten treten also sehr deutlich und klar hervor. Von *Inostemma* lässt sich weiter noch die Gattung *Acerota* durch den Mangel des Horns auf dem ersten Segment des Hinterleibs ganz einfach und leicht unterscheiden.

Die Gattung *Platygaster Latr.*, welche, so sehr zahlreich an Arten, bereits in diesem Augenblick bei Bestimmung einzelner Spezies unübersteigliche Schwierigkeiten darbot, wird hoffentlich durch eine feste Begründung der hier aufgestellten neuen Gattungen leichter zugänglich und da-

*) Ent. Mag. Vol. II, pag. 270. Div. 2a. — Er sagt hier: „Segmentum primum breve, sublineare, secundum maximum, sequentia breviora.“

**) Notice sur un Insecte qui a causé les plus grands ravages dans nos dernières récoltes de blé sur pied, *Cecidomyie* du froment et quelques-uns de ses parasites, par *M. C. Bazin*. Paris 1856, pag. 28—30, fig. 5, a, b, c.

durch manchen Uebelständen einigermaassen abgeholfen werden. So viel wie möglich habe ich mich in dieser vielgestaltigen Gattung grade so wie bei *Inostemma*, an die von *Walker* bereits aufgestellten Sectionen gehalten, aber gestützt auf eigene, mehrjährige Untersuchungen und Beobachtungen und über ein kaum zu bewältigendes Material verfügend, habe ich mir vielfache Abweichungen erlaubt, so weit es unumgänglich nothwendig erschien. Vor allen Dingen schien es mir nöthig diejenigen leitenden Grundsätze festzustellen, welche bei Begründung der neuen Gattungen maassgebend sein mussten. In dieser Beziehung bot das Schildchen einen guten Charakter dar, um die neuen Gattungen in zwei kleinere Tribus zu scheiden, denn bald ist dasselbe verlängert, entweder in einen langen Dorn ausgezogen, oder es zeigt eine warzen- oder pfriemenförmige Spitze, manchmal endet es auch stumpf. Bald ist es halbkreisförmig zugerundet, und dann gewöhnlich mehr oder weniger konvex, sehr selten ganz flach. Ferner bot der Kopf in seiner Form ein nicht unwesentliches Merkmal, da er bei einer Gattung eine kubische, bei einer andern, von vorne gesehen, eine rautenförmige Gestalt zeigt. Die Art und Weise wie Scheitel und Nacken getrennt sind oder in einander übergehen, die Stellung der paarigen Nebenaugen in Bezug auf den innern Augenrand durfte ebenfalls nicht ausser Acht gelassen werden, aber die Charaktere, die von denselben hergeleitet, waren nur mit Vorsicht zu gebrauchen. Am Mittelleib schien uns die Theilung des Mesonotums durch Furchen nicht unwesentlich, selbst der Verlauf derselben, ob sie nämlich nach dem Schildchen hin deutlich konvergiren oder ob sie parallel verlaufen, kann unter Umständen in den Gattungscharakter aufgenommen werden. Die Sculptur, in allen Fällen ein untergeordnetes Merkmal, ist bloss bei einigen Gattungen am Kopfe eigenthümlich und dann mehr zu berücksichtigen. Der Hinterleib ist so vielgestaltig, dass man sich durch viele und genaue Beobachtungen erst vergewissern muss, welche Merkmale als standhaft in die Gattungsdiagnose Aufnahme finden können. Die eigenthümliche Bildung des zweiten Segments bei *Sactogaster*, der sehr breit umgeschlagene Seitenrand bei *Hypocampsis* bilden solche standhafte Gattungsmerkmale. Die starke Verlängerung aller Segmente dagegen, darf nur bei *Ectadius*, wo zugleich das Schildchen eine pfriemenförmige Spitze hat, als Gattungsmerkmal betrachtet werden, bei *Platygaster* haben jedoch die stark verlängerten Hinterleibssegmente vieler Arten, (worauf *Westwood* seine Gattung *Epimeces* gründete) diese Bedeutung nicht, weil sich allmählig solche Uebergänge zeigen, die den Hinterleib auf die gewöhnlichen Längenverhältnisse zurückführen. Flügel und Beine zeigen durchaus keine eigenthümlichen Gattungsmerkmale.

Nach diesen Andeutungen können wir bei Betrachtung der einzelnen Gattungen uns hier nun kürzer fassen. Die Gattung *Catillus* begreift diejenige Art, welche *Walker* *Platygaster Catillus* *) genannt hat. Ich habe diesen Artnamen als Gattungsnamen hier angewendet. *Walker* kannte nur das ♀, während ich in hiesiger Gegend auch das ♂ entdeckte. Beide Geschlechter zeichnen sich durch den sehr stark zusammengedrückten Mittelleib aus, dessen Rücken dadurch hochgewölbt erscheint. Die paarigen Nebenaugen stehen in der Nähe des innern Augenrandes. Die Fühler beim ♀ haben eine viergliedrige lockere Keule, beim ♂ ist das erste und dritte Geisselglied von mässiger Grösse, ungefähr wie das Stielchen, das zweite ist dagegen länger als die zwei vorhergehenden zusammen, spindelförmig, nicht besonders stark verdickt, die fünf letzten Glieder

*) Ent. Mag. Vol. III, pag. 219.

sind langwalzig, durch eine kleine Brücke getrennt, langhaarig. Mesonotum mit schwachen Spuren von Furchen; Schildchen in ein kurzes grades Dörnchen auslaufend. Hinterleib beim ♂ sieben-gliedrig, beim ♀ mit sechs Segmenten. Den *Platygaster Catillus* nenne ich jetzt *Catillus Walkeri*.

Zur leichteren Bestimmung der Gattung *Xestonotus* hat man auf den Verlauf der Furchen der Parapsiden in der Richtung zu dem Schildchen hin zuerst seine Aufmerksamkeit zu richten. Da diese Furchen nicht in der angegebenen Richtung hin convergiren, sondern fast vollkommen parallel sind, so erhalten wir dadurch schon den ersten festen Anhaltspunkt zur Bestimmung dieser Gattung. Wir finden ferner die paarigen Nebenaugen dem innern Augenrande deutlich näher gerückt als dem unpaarigen. Beim ♂ ist das erste Glied der Geissel sehr klein, das zweite verhältnissmässig sehr gross, das dritte von der Länge und Dicke des Stielchens, die fünf folgenden walzig und durch eine kleine Brücke verbunden. Das letzte Glied ist ziemlich stumpf zugespitzt. Die Behaarung der Geissel ist nicht besonders lang. Beim ♀ sind alle Geisselglieder gestreckt, nach der Spitze hin allmählig dicker werdend, ohne jedoch eine deutlich abgesetzte Keule zu bilden. Das erste Geisselglied ist auch hier sehr klein, rundlich und schliesst sich nahe an das zweite an. Die beiden letzten Geisselglieder sind sehr deutlich getrennt, wodurch gleich der Unterschied von *Amblyaspis* in die Augen springt. Kopf, Mesonotum und Schildchen sind in beiden Geschlechtern völlig glatt, stark spiegelnd, wie polirt. Das Schildchen ist noch durch seine besondere Form ausgezeichnet. Es ist flach gewölbt, an der Spitze nicht halbkreisig zugerundet, sondern stumpf eiförmig, mässig verlängert. Der Hinterleib beim ♂ ist nicht länger als beim ♀, an der Spitze breit zugerundet, das zweite Segment sehr gross, die folgenden sehr schmal. Beim ♀ ist derselbe viel schmaler, lang eiförmig, das dritte und sechste Segment ziemlich breit, zusammen wenigstens zwei Drittel des zweiten betragend.

Bei der Gattung *Amblyaspis* haben wir in der Form des Schildchens ebenfalls einen guten und standhaften Charakter. Dasselbe ist gleichsam konisch verlängert und mit dem Mesonotum so innig vereinigt, dass es blos durch eine sehr feine, manchmal undeutliche Naht davon getrennt ist. Der Kopf ist von vorn nach hinten verkürzt, die paarigen Nebenaugen stehen vom innern Augenrande wenigstens eben so weit entfernt, wie von dem unpaarigen. Der Scheitel wird vom Nacken durch eine Leiste getrennt. Die Fühler sind in beiden Geschlechtern zehngliedrig, beim ♀ die zwei ersten Geisselglieder langwalzig, die zwei folgenden klein, die vier letzten bilden eine deutlich abgesetzte Keule, bei welcher das neunte und zehnte Glied innig mit einander verbunden sind. Diese Verbindung scheint mir für die Gattung *Amblyaspis* charakteristisch. Beim ♂ ist das erste Geisselglied etwas kleiner als das zweite, dieses erscheint ziemlich dick, die folgenden alle walzig. Das Mesonotum hat keine oder ganz undeutliche Furchen. Es umfasst diese Gattung die Sect. XIV. von *Walker*. *)

Sehr leicht wird die Gattung *Leptacis* durch den kürzeren oder längeren Dorn des Schildchens, worin sie allein noch mit *Isorhombus* verglichen werden könnte, unterschieden. Nimmt man aber noch die Stellung der paarigen Nebenaugen dazu, die hier dem innern Augenrande näher stehen als dem unpaarigen, ferner die mehr oder weniger feine Leiste, wodurch Scheitel und Nacken getrennt werden und die viergliedrige Keule beim ♀, dann dürfen wir diese Gattung als hinlänglich

*) Ent. Mag. Vol. III, pag. 233. Spec. 25—27.

begründet ansehen. Unsere Gattung entspricht der Sectio II von *Walker*, *) welche vier Spezies enthält: *Tipulae Kirb.* *Nydia*, *Laodice* und *Nice Walk.*

Auf den ersten Anblick könnte man, verleitet durch den Dorn des Schildchens, die Gattung *Isorhombus* mit *Leptacis* verwechseln, aber die Kopfbildung ist so charakteristisch und abweichend, dass schon hierin ein standhaftes Unterscheidungsmerkmal liegt. Sieht man nämlich den Kopf von vorn, so erscheint der Scheitel in der Mitte ganz ungewöhnlich erhöht und zieht man in Gedanken grade Linien von dem Mittelpunkt des Scheitels nach dem äussersten Seitenrande der Netzaugen und von da nach dem Munde, so erhält man eine im höchsten Grade regelmässige Raute. In der Stellung der paarigen Nebenaugen ist ausserdem eine Abweichung von *Leptacis* nicht zu verkennen. Zwischen Nacken und Scheitel fehlt ebenfalls die scharfe Leiste. Ein anderer eben so entscheidender Unterschied liegt noch in der Bildung der Fühlerkeule beim ♀, denn diese ist ganz bestimmt nur dreigliedrig, bei *Leptacis* aber viergliedrig.

Unter den Gattungen, deren Schildchen mit einer pfriemenförmigen Spitze versehen ist, zeichnet sich *Ectadius* durch den sehr stark verlängerten Hinterleib aus. Die paarigen Nebenaugen stehen dem unpaarigen eben so nahe wie dem innern Augenrande. Scheitel und Nacken sind durch eine scharfe Leiste getrennt. An den Fühlern ist das erste und zweite Geisselglied verlängert, walzenförmig, die zwei folgenden ziemlich verkürzt, nicht schmaler als die vorhergehenden, fast rundlich; die vier letzten bilden eine stark abgesetzte Keule. Das Mesonotum hat ziemlich deutliche Furchen. *Ectadius* entspricht der Section V nach *Walker*, **) und enthält nur eine Spezies, *Ectadius Craterus Walk.*

Eine der ausgezeichnetsten Formen unter den *Platygastriden* bildet unstreitig die Gattung *Sactogaster* durch die seltsame Form des Hinterleibs bei den ♀. Das zweite Segment ist nämlich von oben gesehen nicht breit, aber von der Seite so stark zusammengedrückt, dass es gleichsam wie ein Sack herunterhängt, die folgenden Segmente sind alle sehr schmal und bilden gleichsam einen Schwanz zu dem zweiten. Von dieser schönen Gattung beschreibt *Walker* in seiner Sectio III. nur zwei Arten, *ventralis Westw.* und *Osaces Walk.*, beide aber nur im weiblichen Geschlecht. Ich besitze diese Arten aus hiesiger Gegend und dazu noch vier neue, von denen eine in beiden Geschlechtern von Herrn *Winnertz* in Crefeld aus Larven von *Cecidomyia Pisi* ***) erzogen wurde. Das ♂ zeichnet sich dadurch aus, dass das erste Geisselglied sehr klein und mit dem zweiten innig verwachsen ist, die Geissel also wirklich unter der schärfsten Loupe nur siebengliedrig erscheint. Bei den ♀ dieser Gattung ist das erste, dritte und vierte Geisselglied sehr klein, das zweite doppelt so lang wie das vorhergehende, die vier letzten bilden eine starke dichte Keule. In beiden Geschlechtern hat das Schildchen eine pfriemenförmige Spitze.

Da diese Gattung wegen ihrer eigenthümlichen Form ein grosses Interesse erregt, so will ich hier die mir bekannten Arten kurz auseinander setzen:

*) Ent. Mag. Vol. III, pag. 220. Spec. 2—5.

**) Ebendasselbst, pag. 224. Spec. 8.

***) *Linnaea* entom. Achter Band, 1853. Beitrag zu einer Monographie der Gallmücken, von *J. Winnertz*. Auf Seite 156 führt *Winnertz* an, dass die Larve von *Cecidomyia Pisi* bereits von *Réaumur* erwähnt, das vollkommene Insekt aber noch nicht beschrieben worden sei.

- a.* Das dritte und die folgenden Segmente stark verkürzt und zusammen nicht viel länger als das zweite **Osaces Walk.** ♀.
- aa.* Das dritte und die folgenden Segmente viel länger als das zweite.
 - b.* Das dritte bis sechste Segment stark gekrümmt **curvicauda m.** ♀.
 - bb.* Das dritte bis sechste Segment fast gerade.
 - c.* Der Scheitel durch eine scharfe Linie vom Nacken getrennt.
 - d.* Das fünfte Segment kaum etwas kürzer als das sechste . . **subaequalis m.** ♀.
 - dd.* Das fünfte Segment um ein Drittel kürzer als das sechste . **Pisi m.** ♂ ♀.
 - cc.* Der Scheitel allmählig in den Nacken übergehend.
 - e.* Das zweite Segment von der Seite gesehen fast scheibenförmig rund **longicauda m.** ♀.
 - ee.* Das zweite Segment von der Seite gesehen nicht rund . . **ventralis Westw.** ♀.

Von *Leptacis* und *Isorhombus* unterscheidet sich unsere Gattung *Synopeas* sehr scharf durch das Schildchen. Dasselbe ist an der Basis sehr breit und nach der Spitze hin kurz zugerundet, so dass es fast halbkreisig erscheint. Die eigentliche Spitze lässt eine dreifache Form wahrnehmen, denn entweder tritt dieselbe nicht ganz deutlich hervor, oder sie ist pfriemenförmig vorgestreckt, mehr oder weniger verlängert, oder zuweilen tuberkelartig in die Höhe gerichtet (pyramidal!). Der Hinterrand des Mesonotums zeigt, hart an der Basis des Schildchens, eine rundliche, mehr oder weniger hervortretende, glatte Schwiele, welche dann besonders deutlich hervortritt, wenn sie rötlichbraun gefärbt ist. Manchmal ist sie schwarz, mit feinen Härchen bedeckt, wenig oder doch nicht ganz deutlich sichtbar. Der Bauch ist bei den meisten Arten stark konvex. Bisweilen tritt am Hinterleibe ein siebentes Segment deutlich hervor. Um *Synopeas* von der Gattung *Ectadius* zu unterscheiden, liegt in der geringen Entwicklung des Hinterleibs ein augenfälliges, leichtes Unterscheidungsmerkmal vor. Die Arten von *Synopeas* scheinen der sechsten bis dreizehnten Section *Walker's* anzugehören. Diese Sectionen alle in besondere Gattungen aufzulösen, schien mir, aus Mangel an standhaften und gewichtigen Unterscheidungsmerkmalen, nicht thunlich.

Anopodias ist eine charakteristische Gattung und zwar durch das ganz flache, stumpfe Schildchen, welches sich nicht im Geringsten über die Oberfläche des Metanotums erhebt. Die paarigen Nebenaugen stehen vom innern Augenrande weit ab. Der männliche Fühler hat das erste Geißelglied sehr klein, die zwei folgenden Glieder sind aber ungefähr gleich dick, die vier folgenden walzig, etwas länger als breit, das letzte fast doppelt so lang, wie das vorletzte. Alle Geißelglieder sind mit abstehenden kurzen Härchen bekleidet. Der weibliche Fühler weicht vom ♂ wenig ab: das erste Geißelglied ist klein, rundlich, das zweite und dritte etwas dicker, walzig, nur wenig länger als breit, das folgende etwas dicker, länger und becherförmig, die vier letzten eine Keule bildend. Die Behaarung fällt kaum in die Augen. Das Mesonotum ist beim ♂ ♀ nach hinten flach und ohne Spuren von Furchen; der Hinterleib kaum länger als der Mittelleib, sechsgliedrig, beim ♂ an der Spitze breit zugerundet, beim ♀ eiförmig zugespitzt.

Die Gattung *Isocybus* habe ich auf die sechszehnte Section *Walker's* gegründet, welche den *Platygaster ruficornis Latr.* *Erato*, *Matuta* und *Cotta Walk.* enthält. Durch folgende Merkmale zeichnet sich diese Gattung aus: Kopf mehr oder weniger kubisch; die paarigen Nebenaugen vom

innern Augenrande entfernt; die Fühler haben beim ♂ das erste Geisselglied klein, schief abgestutzt, das zweite gross, schwach ausgeschweift, die sechs folgenden walzig; beim ♀ sind auch die zwei ersten Geisselglieder walzig. Scheitel ohne Leiste, allmählig und unmerklich in den Nacken übergehend. Mesonotum mit Furchen. Schildchen an der Spitze gerundet, konvex und beiderseits grubig, in den Gruben dicht aber kurz behaart. Hinterleib beim ♀ sechs-, beim ♂ siebengliedrig. Von allen übrigen Gattungen auch noch durch ansehnlichere Grösse unterschieden.

Trichacis unterscheidet sich von der vorhergehenden Gattung leicht durch den nicht kubischen Kopf, bei welchem überdies Scheitel und Nacken durch eine mehr oder weniger scharfe Leiste getrennt sind. Die paarigen Nebenaugen stehen dem unpaarigen wenigstens eben so nahe wie dem innern Augenrande, und von denselben zieht sich eine schwache Rinne bis zum Augenrande hin. Der ♀ Fühler hat eine ziemlich deutliche fünfgliedrige Keule, beim ♂ Fühler ist das erste Geisselglied etwas kleiner als das dritte, das zweite etwas verdickt, schief gebogen, die folgenden walzig, durch eine kurze Brücke verbunden, kurz behaart. Mesonotum mit deutlichen Furchen. Einen besonderen schönen Charakter zeigt das Schildchen, dasselbe hat nämlich an der Spitze einen kurzen, etwas aufgerichteten, dichten Haarbüschel. Hinterleib kaum etwas länger als der Mittel-leib, beim ♂ stumpf zugerundet, beim ♀ breit eiförmig zugespitzt. Diese Gattung bildet die fünfzehnte Section *Walker's* und enthält drei Arten: *Pisis*, *Remulus* und *Didas Walk.*

Von den meisten Gattungen dieser Familie lässt sich *Hypocampsis* auf den ersten Blick durch den breiten und sehr flachen Hinterleib, dessen Ränder sehr breit umgeschlagen sind, unterscheiden. Beim ♀ ist der Fühler nicht keul- sondern fadenförmig; alle Glieder der Geissel sind nämlich langwalzig. Das erste kaum halb so lang wie das zweite, aber mit demselben innig verbunden, die paarigen Nebenaugen stehen dem unpaarigen näher als dem innern Augenrande. Das Mesonotum hat deutliche, convergirende Furchen. Der Hinterleib ist fast elliptisch, nach der Spitze hin aber etwas stärker verschmälert, als nach der Basis; die vier letzten Segmente breit und zusammen genommen fast so lang als das zweite; der umgeschlagene Seitenrand so breit, dass der grössere Theil der Bauchsegmente dadurch bedeckt wird. Das ♂ weicht in der Fühlerform ab, indem das erste Geisselglied kurz, becherförmig und mit dem zweiten, sehr stark verdeckten, ziemlich eng verbunden erscheint. Die sechs letzten Glieder sind walzig, kurz behaart, fast von gleicher Länge, das letzte etwas länger als das vorletzte und dabei stumpf zugespitzt. Der Hinterleib ist nach der Spitze hin erweitert und breit zugerundet. Beide Geschlechter hat Herr *von Heyden* bei Frankfurt, Herr *Stollwerk* bei Uerdingen und ich selbst bei Aachen aus den Fruchtzapfen von *Abies* erzogen; hier leben sie parasitisch in den Larven von *Cecidomyia Strobi Kalt.* *)

Für die Gattung *Polygnotus* liegt in dem ziemlich dicken Kopf mit seinen breiten Schläfen, und in der gleichförmigen dichten und starken Sculptur etwas Charakteristisches, welches gleich an die Gattung *Isocybus* erinnert. Scheitel und Nacken sind nicht getrennt. Die paarigen Nebenaugen stehen eben so weit von dem unpaarigen wie von dem innern Augenrande. Die Furchen des Mesonotums sind ganz durchgehend, sehr tief, bisweilen zeigen auch die Parapsiden selbst solche Längsfurchen. Das Schildchen ist halbkreisig, an der Basis von dem Mesonotum durch eine

*) *Linnaea* entom. Achter Band, 1853. Beitrag zu einer Monographie der Gallmücken, von *J. Winternitz*. Seite 234.

tief einschneidende Rinne getrennt, so dass es sich von allen Seiten ganz frei polsterförmig erheben kann. Von der Seite gesehen ist die Trennung vom Mesonotum wie durch eine Spalte ganz deutlich und die Spitze von dem Schild des Mesonotums tritt scheinbar zahnartig vor. Der Hinterleib erscheint nicht viel länger als der Mittelleib, das dritte bis sechste Segment ist deutlich und ziemlich breit. In der Form der Fühler schliesst sich Polygnotus ganz an Hypocampsis an, aber die einzelnen Geisselglieder sind nicht so stark gestreckt. Als Typus kann man den *Platygaster striolatus* Nees ansehen.

Die Gattung *Platygaster* bleibt trotz der Abtrennung aller hier aufgeführten Gattungen noch so zahlreich an Arten und so vielgestaltig in der Form, dass die Schwierigkeiten durch die Theilung zwar vermindert, aber noch nicht als gänzlich gehoben betrachtet werden können. Nur durch die Zucht dieser Thierchen werden wir dahin gelangen, die vielfach abweichenden Geschlechter zusammen stellen zu können, da es auf andere Weise fast unmöglich sein dürfte, zu den ♀ mit stark verlängertem Hinterleib die ♂, welche einen kurzen Hinterleib (gewöhnlich von der Länge des Mittelleibs) haben, herauszufinden. Grösse und Färbung sind ganz unzuverlässige Führer; die Sculptur von Kopf und Mittelleib ist meist nicht scharf genug ausgeprägt und so bleibt fast nichts übrig, um selbst auf Analogien weitere Schlüsse zu bauen. Die Geschlechter müssen eben scharf gesondert gehalten und so viel thunlich, genau beschrieben werden.

28. *Mymaroidae*. Die mir bekannten Gattungen lassen sich nicht alle, ohne die ♂ und ♀ zu trennen, in eine einfache und klare Uebersicht bringen. Das nachfolgende Schema wird daher einige Gattungen doppelt aufführen:

a. Die Tarsen fünfgliedrig.

b. Der Hinterleib deutlich gestielt.

c. Die Fühler beim ♂ zehn-, beim ♀ neungliedrig *Camptoptera* m. *)

cc. Die Fühler beim ♂ dreizehn-, beim ♀ eifgliedrig *Ooctonus* Hal.

bb. Der Hinterleib sitzend oder fast sitzend.

d. Die ♂.

e. Der ramus marginalis erstreckt sich bis zur Mitte des Vorderrandes *Limacis* m. ♂.

ee. Der ramus marginalis erstreckt sich nicht bis zur Mitte des Vorderrandes.

f. Fühler dreizehngliedrig *Gonatocerus* Nees. ♂.

ff. Fühler zehngliedrig *Alaptus* Walk. ♂.

dd. Die ♀.

g. Fühler eifgliedrig *Gonatocerus* Nees. ♀.

gg. Fühler mit weniger als elf Gliedern.

h. Fühler neungliedrig *Litus* Hal.

hh. Fühler achtgliedrig.

*) *Camptoptera* von *καμπτός*, ἡ, όν, gekrümmt, gebogen und *πτερόν*, τό, der Flügel. Die Vorderflügel sind in dieser Gattung ziemlich stark gebogen.

- i. Der ramus marginalis erstreckt sich bis zur Mitte des Vorderrandes *Limacis m. ♀*.
- ii. Der ramus marginalis erstreckt sich nicht bis zur Mitte des Vorderrandes *Alaptus Walk. ♀*.
- aa. Die Tarsen viergliedrig.
- k. Der Fühlerknopf zweiringelig.
 - l. Der ramus marginalis sehr lang; die vier Hintertarsen kürzer als ihre Schienen *Eustochus Hal.*
 - ll. Der ramus marginalis sehr kurz; die vier Hintertarsen länger als ihre Schienen *Doriclytus m.*
- kk. Fühlerknopf nicht geringelt.
- m. Der Hinterleib deutlich gestielt.
 - n. Die Vorderflügel blos an der Spitze erweitert *Mymar Hal.*
 - nn. Die Vorderflügel nicht blos an der Spitze erweitert.
 - o. Der ramus marginalis punktförmig *Cosmocoma m. *)*
 - oo. Der ramus marginalis verlängert.
 - p. Der Metathorax mit zwei Kielen; Fühler beim ♀ neungliedrig (♂ unbekannt) *Caraphractus Walk.*
 - pp. Der Metathorax ungekielt; Fühler beim ♂ zeh-, beim ♀ neungliedrig *Stichothrix m. **)*
- mm. Hinterleib sitzend oder fast sitzend.
 - q. Fühler beim ♂ zwölfgliedrig (beim ♀ neungliedrig); der ramus marginalis verlängert, nach der Spitze hin etwas verdickt *Anaphes Hal.*
 - qq. Fühler beim ♂ dreizehngliedrig (beim ♀ neungliedrig); der ramus marginalis linienartig, nach der Spitze hin nicht verdickt *Anagrus Hal.*

Haliday hat zuerst die Mymaroiden zu einer eigenen Tribus erhoben und die Gattungen derselben sammt den damals bekannten Arten einem genaueren Studium unterworfen. ***) Ein Jahr später beschrieb *Nees von Esenbeck* †) zwei Gattungen, *Gonatocerus* und *Eutriche*. Bei der ersten Gattung gibt er die Fühler des ♂ als vierzehn-, die des ♀ als zwölfgliedrig an. Der Hinterleib soll ungestielt sein. Die Zahl der Tarsenglieder wird nicht angegeben. Rechnen wir die radicula bei den Fühlern ab, dann bleiben noch dreizehn Glieder für das ♂ und zwölf für das ♀. Wenn nun die Tarsen fünfgliedrig wären, dann könnte es zufolge des *Walker'schen* Conspectus nur *Lymaenon* sein, wären sie aber viergliedrig, dann müsste *Gonatocerus* zu *Anagrus Hal.* gezogen werden. Was *Nees* über die radicula sagt, scheint mir aber die Gattung *Lymaenon* ohne allen Zweifel zu bezeichnen. *Nees* zieht zu diesem ♂ ein ♀ Weibchen mit hervorragendem geradem Boh-

*) *Cosmocoma* von κόσμος, ὅς, der Schmuck, die Zierde und κόμη, ἡ, das Haar.

**) *Stichothrix* von στήθος, ὅς, die Reihe und τρίξ, ἡ, das Haar.

***) Ent. Mag. Vol. I, pag. 341—350. — (1833.)

†) Hym. ichn. aff. Monogr. Vol. II, pag. 192 und 196. — (1834.)

rer und das kann ebenfalls nur der Gattung *Lymaenon* angehören, weil die ♀ dieser Gattung zwar nicht alle, aber doch einzelne, einen ziemlich stark hervorragenden Bohrer und dabei eifgliedrige Fühler, gerade wie die *Nees'sche* Art, besitzen. Ich habe eine Art, *Gonatocerus oxypygus*, welcher, von *longicornis* *Nees* durch bräunliche Beine abweichend, einen hervorragenden Bohrer hat, der fast ein Drittel des Hinterleibs beträgt. Es kommt noch dazu, dass *Nees* einen Charakter der Fühler angibt, der nur den *Mymaroiden* eigenthümlich ist und deshalb auch jeden Gedanken ausschliesst, dass *Gonatocerus* einer anderen Familie angehören könne. Von den Fühlern des ♀ gibt er an, *) dass das erste Geisselglied mit dem Stielchen in einem rechten Winkel vom Schafte abwärts gerichtet, das zweite Geisselglied aber mit dem folgenden wieder in einem rechten Winkel von dem ersten aufwärts gerichtet sei. Grade so finde ich es bei meinem *Gonatocerus oxypygus* und bei *Lymaenon litoralis* und *pictus* *Hal.* Nach dieser Auseinandersetzung glaube ich mit grösster Bestimmtheit die Identität von *Gonatocerus* *Nees* und *Lymaenon* *Hal. Walk.* aussprechen zu dürfen und den älteren *Nees'schen* Namen wieder in diese Familie einführen zu können.

In Betreff der Gattung *Eutriche* *Nees*, welche einen gestielten Hinterleib und neungliedrige (nach Abzug der *radicula*) Fühler hat, scheint mir ohne Widerspruch festzustehen, dass sie nur allein auf die Gattung *Polynema* *Hal.* passt, also zu der Abtheilung mit viergliedrigen Tarsen gehört. Unter den Pentameren mit gestieltem Hinterleib finden wir in der Uebersicht blos die Gattungen *Camptoptera* *m.* mit neun- und *Ooetonus* *Hal.* mit eifgliedrigen Fühlern. Die erstere Gattung weicht aber von *Eutriche* sehr bedeutend ab. Eben so stehen in der Abtheilung mit viergliedrigen Tarsen die Gattungen *Caraphractus* und *Stichothrix* der Gattung *Eutriche* zu fern. Den Namen *Polynema* *Hal.*, zu welchem also *Eutriche* als Synonym gehört, habe ich wegen des älteren Namens *Polynemus* beseitigen müssen, denn schon im Jahre 1754 wurde unter den Fischen die Gattung *Polynemus* *Gronov.* aufgestellt und von *Bonaparte* im Jahre 1831 die Familie der *Polynemoidae* darauf gegründet. Folgerecht müsste nun *Eutriche* *Nees* an die Stelle von *Polynema* *Hal.* treten, aber die *Nees'sche* Gattung theilt dasselbe Schicksal, indem sie ebenfalls der älteren Gattung *Eutricha* *Steph.* unter den *Lepidopteren* weichen muss. Unter diesen Verhältnissen blieb nur übrig, eine neue Gattung zu bilden, daher habe ich den Namen *Cosmocoma* aufgestellt, zu welchem *Polynema* *Hal.* und *Eutriche* *Nees* fortan als Synonyma gezogen werden müssen.

Als ich im Jahre 1841 meine Beiträge zur Monographie der Familie der *Pteromalinen* herausgab, war mir die Arbeit *Haliday's* im *Ent. Mag.* noch unbekannt, ich kannte nur das *Nees'sche* Werk. Obgleich es nicht leicht war, habe ich damals doch die *Nees'sche* Gattung *Gonatocerus* richtig erkannt und ein ♀ derselben abgebildet, **) wie die Zeichnung des Fühlers unwiderleglich darthut. Ich habe aber alle mir damals bekannten Arten mit sitzendem Hinterleibe zu derselben Gattung gezogen, weil ich die Tarsenglieder nicht in Betracht zog und die Abweichung in der

*) L. c. pag. 192. — Ich führe die Stelle hier ganz an: Flagellum 9-articulatum, primo articulo (quarto antennae, d. h. wenn die *radicula* mitgezählt wird!) forma et magnitudine pedicelli et cum eodem, cum animal quiescit, a scapo ad angulum rectum deflexo, tum secundo ad sextum usque flagelli articulum singulis filiformibus, non discretis, longis, a secundo articulo, (qui quintus totius antennae! auch hier die *radicula* mitgerechnet *Fr.*!) sursum rursus angulo recto reflexis, u. s. w.

**) Beiträge zur Monographie der *Pteromalinen*. 1841, Seite 45, Taf. 1. fig. 15, c. (antenna!)

Zahl der Fühlerglieder zur Aufstellung neuer Gattungen bedenklich fand. In gleicher Weise bestimmte ich auch die Gattung *Eutriche* Nees ganz richtig und vereinigte damit die Arten der Gattung *Ooctonus* Hal., weil sie ebenfalls einen gestielten Hinterleib haben, da ich auch hier die Tarsen nicht weiter berücksichtigte. Als später ein tieferes Eindringen in die Familie der Mymaroiden von meiner Seite Statt fand, mussten diese Bestimmungen natürlich rektifizirt werden.

Im Jahre 1846 fanden die Mymaroiden einen weiteren Bearbeiter an *Walker*, *) welcher eine Uebersicht über die Gattungen und Arten fast ganz nach handschriftlichen Mittheilungen von *Haliday* mittheilte. In demselben Jahre war ich ebenfalls mit dem erneuerten Studium derselben Familie beschäftigt, die Ergebnisse desselben konnten aber erst im Jahre 1847 in der *Linnaea* entom. **) mitgetheilt werden. Das Resultat war die Aufstellung dreier neuer Gattungen, *Rachistus*, *Leimacis* und *Dorielytus*, wovon die erstre mit *Gonatocerus* Nees (*Lymaenon* Walk. Hal.) und die zweite mit *Arescon* zusammenfällt. Zugleich wurden mehrere neue Arten beschrieben, deren Charakteristik man in der betreffenden Abhandlung auch jetzt noch als ausreichend betrachten kann. Ich wende mich daher jetzt zur Betrachtung der einzelnen Gattungen.

Unter dem Namen *Camptoptera* habe ich eine pentamere Gattung aufgestellt, welche durch ihre winzige Form sich nur mikroskopisch bestimmen lässt. Da ich dieses Thierchen erzogen habe und lebend untersuchen konnte, so will ich mich hier etwas weitläufiger darüber verbreiten. Der Gattungsscharakter lautet:

Tarsen fünfgliedrig; Fühler beim ♂ zehn-, beim ♀ neungliedrig; Hinterleib kurz gestielt; Flügel schmal, mit einem breiteren Absatz nahe an der Basis und hinter demselben gebogen.

Bräunlich, der Schaft mit dem Stielchen, der Hinterleibsstiel und die Beine gelb; die Füße fast unmerklich dunkler als die übrigen Theile der Beine. Das ♂ hat die Geisselglieder alle ungefähr gleich lang, jedoch so, dass die vier bis fünf ersten Glieder fast unmerklich länger erscheinen, als die folgenden; das letzte ist mit einer sehr feinen pfriemenförmigen Spitze versehen. Die Fühler stehen hart am innern Augenrande. Beim ♀ ist das erste Geisselglied etwas länger als das Stielchen, das zweite viel länger als das erste, das dritte etwas kürzer als das erste und das vierte sogar kürzer als das dritte. Die beiden folgenden unter sich genau von gleicher Länge, einzeln genommen wenig, aber doch merklich kürzer als das dritte. Das letzte Glied bildet eine ziemlich stark verlängerte, fast elliptische Keule von der Länge der drei vorangehenden Glieder. Die beiden der Keule vorhergehenden Glieder sind auch ein wenig dicker als die übrigen Geisselglieder.

Camptoptera *Papaveris* m. ♂ ♀, die einzige Art dieser Gattung, erzog ich vom 12. bis 18. August 1851 aus Mohnkapseln von *Papaver Rhoeas* und *dubium*, worin die Gallen von *Aulax Rhoeadis* sich befanden. Aus denselben Kapseln und zu derselben Zeit erzog ich ferner: *Pteromalus* *Papaveris* m. ♂ ♀. *Cecidomyia* *Papaveris* Winn. **) *Pezomachus* *Papaveris* m. ♂ ♀ (das

*) Ann. of nat. hist. XVIII, pag. 49—54. (1846.) Descriptions of the Mymaridae, communicated by Francis Walker, Esq.

**) Siehe *Linnaea* entomologica, Zeitschrift, herausgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin. Zweiter Band, 1847, Seite 195—233.

***) *Linnaea* entom. Achter Band. Berlin 1853, Seite 229.

♂ ungeflügelt!!!) *Lochites Papaveris m.* ♂ ♀ (worüber bereits oben Seite 44 berichtet wurde!) und ein kleiner *Encyrtus*.

Ob nun die Larven der Gattung *Camptoptera* an den Larven oder in den Eiern der Gallerzeuger, hier des *Aulax Rhoeadis Hart.* parasitisch leben oder die *Cecidomyia* angreifen, oder gar die übrigen Parasiten vernichten, darüber habe ich mir keinen Aufschluss verschaffen können, wird aber jedenfalls von Interesse sein und hoffentlich auch von anderer Seite nicht ohne Beachtung bleiben.

Die Gattung *Ooctonus Hal.* unterscheidet sich von der vorangehenden sehr leicht durch die Gliederzahl der Fühler. *Haliday* hatte im Ent. Mag. noch diejenigen Arten mit sitzendem Hinterleib zu dieser Gattung gezogen, welche, wie ich oben unzweifelhaft nachgewiesen zu haben glaube, der Gattung *Gonatocerus Nees* angehören; später errichtete er dafür die Gattung *Lymaenon*, und ein Jahr nach Errichtung dieser Gattung stellte ich dafür die Gattung *Rachistus* auf. Beide Gattungen aber, *Lymaenon* sowohl wie *Rachistus* müssen nun als Synonyma zu *Gonatocerus Nees* gezogen werden.

Die Gattung *Limacis* (früher *Leimacis* geschrieben!) habe ich im Jahre 1847 bekannt gemacht. *) Ich halte sie für identisch mit der im Jahre 1846 von *Walker* aufgestellten Gattung *Arescon*, muss aber diesen Namen, obgleich von beiden der ältere, beseitigen, weil *Perty* eine Coleopteren-Gattung schon im Jahre 1830 unter dem Namen *Arescus* eingeführt hat.

Von der Gattung *Litus* ist bis jetzt nur das ♀ bekannt geworden, welches sich durch sitzenden Hinterleib von *Camptoptera* und durch neungliedrige Fühler von *Gonatocerus*, *Limacis* und *Alaptus* gleich unterscheidet. Ich habe diese Gattung jetzt auch in hiesiger Gegend entdeckt.

Das Genus *Alaptus* hat im männlichen Geschlecht zehn-, im weiblichen nur achtgliedrige Fühler; die ♂ stimmen also mit *Camptoptera* überein, die ♀ mit *Limacis*; der sitzende Hinterleib ist aber für das ♂ und der verkürzte ramus marginalis für das ♀ von *Alaptus* charakteristisch. Von dieser Gattung habe ich eine neue Art, *Alaptus pallidornis m.* in hiesiger Gegend gefangen, sie ist kaum halb so lang wie *Alaptus minimus* und hat fast weisslichgelbe Fühler.

Unter den tetrameren Gattungen zeichnen sich *Eustochus* und *Doriclytus* durch den zweiringeligen Fühlerknopf aus. Die Unterschiede beider Gattungen habe ich weitläufig in der *Linnaea entom.* auseinandergesetzt. Von beiden sind mir bis jetzt die ♂ unbekannt geblieben.

Von dem Haupttypus dieser Familie, der Gattung *Mymar* habe ich in hiesiger Gegend, in der Gegend von Eupen und zu Boppard am Rhein beide Geschlechter gefangen. Ich besitze auch ein ♂, welches sich von *Mymar pulchellus* durch ansehnlichere Grösse unterscheidet, und dabei ein schwarzbraunes Schildchen hat; Fühler und Vorderflügel sind an der Spitze ebenfalls dunkler als bei *Mymar pulchellus*; ich nenne diese neue Art *Mymar spectabilis*.

Cosmocoma m. (= *Polynema Hal.* = *Eutriche Nees*) ist die artenreichste Gattung dieser Familie, obgleich diese Ansicht von *Walker* und *Haliday* nicht geteilt zu werden scheint. **) In einer Bemerkung zur Gattung *Polynema* sagt *Walker*: *Haliday* hat bemerkt, dass die Charakteristik der Arten, welche unter Nro. 1 bis 4 aufgestellt wurden, ihm nicht zureichend erscheine, dass viel-

*) *Linnaea entom.* Zweiter Band. Stettin 1847, Seite 218.

**) *Ann. of nat. Hist.* XVIII, pag. 52 (letzte Zeile unten!)

mehr alle vier wohl zu einer und derselben Art gehören könnten. Die Arten unter Nro. 5 und 6 hält er für hinreichend sicher begründet. Wenn diese Ansicht richtig wäre, dann würden in England und Irland nur drei Arten vorkommen. Dem widerspricht aber meine Sammlung, welche sechszechn Arten aufweist. Ich habe bereits oben den Grund angeführt, weshalb die Namen *Polynema* und *Eutriche* ausfallen und durch einen neuen Gattungsnamen ersetzt werden mussten.

Die von *Haliday* auf hohem Grase an Abzugskanälen entdeckte Gattung *Caraphractus* ist die einzige in dieser Familie, welche ich in der Gegend von Aachen noch nicht auffinden konnte, aber sehr nahe verwandt damit wird wohl meine neue Gattung *Stichothrix* sein, welche in der Zahl der Fühlerglieder beim ♀ übereinstimmt, aber der Metathorax entbehrt der beiden Kiele, welche *Walker* bei der Gattung *Caraphractus* anführt. Das ♂ dieser letzteren Gattung ist nicht bekannt, dagegen habe ich von der Gattung *Stichothrix* beide Geschlechter aus Distelköpfen erzogen, worin die Larven von *Trypeta Cardui* lebten. Das ♂ hat zehngliedrige Fühler. Nach ihrem Wohnort nenne ich die einzige mir bekannte Art *Stichothrix Cardui*.

Ueber die Unterschiede der beiden Gattungen *Anaphes* und *Anagrus* kann man in meiner Abhandlung, *Linnaea entom.* pag. 210 und 213 das nöthige nachsehen. *Walker* unterscheidet von der Gattung *Anagrus* noch die Gattung *Panthus*, die sich durch einen fast sitzenden Hinterleib auszeichnen soll. Dass dieses Merkmal zur Unterscheidung beider Gattungen allein nicht hinreichen kann, ist einleuchtend. Ich habe die beiden von *Walker* angeführten Arten *crassicornis* ♂, und *flavovarius* ♂ ♀, von seiner eigenen Hand bestimmt, vor mir und so viel sich an aufgeklebten Exemplaren überhaupt noch beobachten lässt, halte ich die erstere Art für ein ♂ der Gattung *Gonato-cerus*, die letztere kann ich von *Anagrus* durch kein positives Merkmal unterscheiden, ja selbst der Hinterleib scheint mir eher sitzend als *fast* gestielt zu sein. Aus diesen Gründen muss ich *Panthus* als Synonym zu *Anagrus* ziehen.

29. *Diaprioidae*. Obgleich mit der Hauptgattung *Diapria* in früherer Zeit die Gattung *Belyta* vereinigt war und derselben Familie einverleibt wurde, so hat sich jetzt das Bedürfniss herausgestellt, beide zu trennen. Sie bilden jetzt die Typen einer besonderen Familie, die sich durch den Habitus im Allgemeinen leicht auffassen lässt; bei einiger Uebung im Untersuchen wird man auch in Unterscheidung der Gattungen beider Familien wohl selten einen Missgriff thun. Neben den bereits bekannten Gattungen wird man in dem folgenden *Conspectus* mehrere neue finden:

- a. Flügel an der Spitze herzförmig eingeschnitten. *Entomacis m.**)
- aa. Flügel an der Spitze nicht herzförmig eingeschnitten.
 - b. Der Schaft übermässig entwickelt (Mesonotum ohne Furchen) . *Platymischus Westw.*
 - bb. Der Schaft nicht übermässig entwickelt.
 - c. Der Schaft in der Mitte mit einem Absatz und das Gesicht stark verlängert *Galesus Curt.*
 - cc. Der Schaft in der Mitte ohne Absatz und das Gesicht nicht stark verlängert.
 - d. Die Unterrandader geht nicht an den Flügelrand.

*) *Entomacis* von *ἐντομος*, *ον*, eingeschnitten und *ἀκρίς*, *ἰδος*, *ῆ*, die Spitze. Diese Gattungsbenennung hebt ein besonders auffallendes Merkmal in dieser Familie, den Einschnitt an der Flügelspitze, hervor.

- e. Die Unterrandader mit einem ramus stigmaticus an der Spitze . **Aneurhynchus Westw.**
 ee. Die Unterrandader ganz einfach, ohne ramus stigmaticus an der Spitze ♀ **Labolips Hal.**
 dd. Die Unterrandader geht an den Flügelrand.
 f. Die ♂.
 g. Fühler zwölfgliedrig **Cephalonomia Westw. ♂.**
 gg. Fühler dreizehn- bis vierzehngliedrig.
 h. Fühler dreizehngliedrig.
 i. Das erste Geisselglied kaum halb so lang wie das zweite **Paramesius Westw. ♂.**
 ii. Das erste Geisselglied so lang oder länger als das zweite.
 k. Das zweite Segment mit einer oder mehreren Gruben an der Basis.
 l. Die Flügel mit einer Randader **Idiotype m. *) ♂.**
 ll. Die Flügel ohne Randader **Hemilexis m. ♂.**
 kk. Das zweite Segment ohne Gruben an der Basis . **Spilomicrus Westw. ♂.**
 hh. Fühler vierzehngliedrig.
 m. Flügel ohne Grundader **Diapria Latr. ♂.**
 mm. Flügel mit einer Grundader.
 n. Das erste Geisselglied deutlich kürzer als das zweite **Basalys Westw. ♂.**
 nn. Das erste Geisselglied nicht deutlich kürzer als das zweite **Loxotropa m. ♂. **)**
 ff. Die ♀.
 o. Fühler zwölfgliedrig.
 p. Kopf gross und flach **Cephalonomia Westw. ♀.**
 pp. Kopf nicht gross und flach.
 q. Flügel ohne Grundader.
 r. Mesonotum mit deutlichen Furchen **Glyptonota m. ***)**
 rr. Mesonotum ohne Furchen **Diapria Latr. ♀.**
 qq. Flügel mit einer Grundader.
 s. Mesonotum mit Furchen; Keule fünfgliedrig . . **Idiotype m. ♀.**

*) Idiotype von *ἰδιοτύπος*, *ον*, von besonderer Form. Damit werden die Fühler bezeichnet, welche beim ♀ an die Gattung *Loxotropa*, beim ♂ an *Spilomicrus* erinnern.

**) *Loxotropa* von *λοξός*, *ή, όν*, schief, krumm, quer und *τροπός*, *ός*, der Balken. Eine Anspielung auf die stark entwickelte, deutliche Grundader, welche wie ein Querbalken im Flügelstreckfeld dasteht.

***) *Glyptonota* von *γλυπτός*, *ή, όν*, ausgegraben, ausgeschnitten und *νωτός*, *ός*, der Rücken. Die Furchen des Mesonotums gaben zu dieser Benennung Veranlassung.

- ss. Mesonotum ohne Furchen; Keule höchstens viergliedrig . . . *Loxotropa m. ♀*.
- oo. Fühler dreizehn- bis vierzehngliedrig.
- t. Fühler dreizehngliedrig.
- u. Die Fühlerkeule nur aus einem Glied bestehend. *Monelata m. ♀. *)*
- uu. Die Fühlerkeule aus mehreren Gliedern bestehend.
- v. Hinterleib konisch zugespitzt *Paramesius Westw. ♀*.
- vv. Hinterleib hinten abgestutzt.
- w. Flügel ohne ramus marginalis. *Hemilexis m. ♀. **)*
- ww. Flügel mit einem ramus marginalis. *Spilomicrus Westw. ♀*.
- tt. Fühler vierzehngliedrig (Mesonotum mit Furchen). *Polypeza m. ♀. ***)*

Aus der Gattung *Diapria*, welche *Latreille* bereits im Jahre 1796 aufgestellt, hat sich nach und nach so viel ausgeschieden, dass eine nicht unbeträchtliche Zahl von Gattungen gebildet werden konnte, die nun zusammen eine eigne Familie bilden. Im Jahr 1833 nannte *Haliday* diese Familie *Diapriæ* †) und *Westwood* in seiner *Intr. Class. Ins.* 1840 bezeichnete sie mit dem Namen *Diapriides*. Der Erstere zählte dazu die Gattungen *Helorus*, *Cinetus*, *Spilomicrus*, *Galesus*, *Aneurhynchus* und *Psilus*. Der Letztere hat noch die Gattungen *Platymischus*, *Cephalonomia*, *Basalys*, *Belyta* und *Ismarus* hinzugefügt. Nach Ausschluss der Gattung *Helorus* und der Trennung, die ich vorgenommen, indem ich die eine Familie in drei theilte, *Diaprioidæ*, *Belytoidæ* und *Heloroidæ*, vertheilen sich die Gattungen so, dass auf die *Diaprioidæ* die grösste Anzahl der vorgenannten fallen.

Durch ein schönes und leicht in die Augen fallendes Merkmal zeichnet sich die Gattung *Entomacis* vor allen anderen aus, nämlich durch die an der Spitze herzförmig eingeschnittenen Flügel. Diese Form erinnert an viele Arten der Gattung *Eucoila Westw.* (*Cothonaspis Hart.*) Die Fühler sind in beiden Geschlechtern dreizehngliedrig, beim ♂ faden- beim ♀ schwach keulförmig und zwar bilden die sieben letzten Geisselglieder, indem sie allmählig nach der Spitze hin dicker werden, eine verlängerte nicht abgesetzte Keule. Die Furchen des Mesonotums sind besonders in der Nähe des Schildchens deutlich. Der Hinterleib ist deutlich gestielt. Die Unterrandader erreicht vor der Mitte des Flügels den Vorderrand, bildet hier einen kurzen ramus marginalis und einen eben so kurzen, unter rechtem Winkel in das Flügelfeld hinabsteigenden, ramus stigmaticus. Von dieser Gattung kenne ich drei Arten, eine derselben erzog ich aus einem Spinnennest.

Eben so leicht kenntlich wie die vorhergehende ist die Gattung *Platymischus Westw.* ††) durch den übermässig entwickelten breiten Schaft. Die Fühler sind vierzehngliedrig, das erste Geisselglied verlängert, schief, nach der Spitze etwas erweitert; das zweite etwas dicker als das dritte.

*) *Monelata* von *μονήλατος, ον*, aus einem Stück gearbeitet. Der Name weist auf die Keule der Fühler hin, welche nur aus einem einzigen Glied besteht.

**) *Hemilexis* von *ἡμί*, halb und *λήξις, ῆς*, der Schluss (also mit halbem Schluss!). Diese Zusammensetzung deutet auf die Unterrandzelle, welche durch den Mangel einer Randader nach aussen nicht geschlossen ist.

***) *Polypeza* von *πολύς, πολλή, πολύ*, viel, *πεζός, ῆς, όν*, zu Lande oder zu Fuss gehend. Der Name deutet die Art der Fortbewegung wegen mangelnder Flügel an.

†) *Ent. Mag.* Vol. I, pag. 274.

††) *Westw.*, *Mod. Class.* II, App. 75.

Vom zweiten Geisselgliede ab zeigt sich die Geissel vollkommen schnurförmig. Das Mesonotum hat keine Furchen. Die Flügel fehlen. Es ist nur das ♂ einer Art bekannt, nämlich von *Platymischus dilatatus* Westw.

Auch mit der Gattung *Galesus* Curt. *) wird man schnell zurechtkommen, da sie durch zwei Merkmale sich von den übrigen Gattungen absondert. Der Schaft hat nämlich in der Mitte einen Absatz und das Gesicht ist stark verlängert. Die nach abwärts gerichteten Kiefer bilden zu dem Gesicht gleichsam einen schnabelartigen Fortsatz. Der männliche Fühler ist vierzehngliedrig, das erste Geisselglied klein, rundlich, die folgenden alle langwalzig. Beim ♀ finden wir zwölfgliedrige Fühler, die Glieder der Geissel werden nach der Spitze allmählig dicker und etwas kürzer, so dass keine deutlich ausgeprägte Keule entsteht; auch ist hier das erste Geisselglied nicht kürzer, sondern länger als das zweite. Das Mesonotum zeigt deutliche Furchen. Die Flügel haben eine Unterrandader, welche bis zu einem Drittel der Flügellänge in das Flügelfeld geht und hier, ohne vorab an den Vorderrand zu gehen, sich nach innen etwas umbiegt, gleichsam einen kurzen ramus stigmaticus bildend. Als Synonym zu *Galesus* muss der *Psilus cornutus* Pz. **) gezogen werden.

In dem eigenthümlichen Verlauf der Unterrandader, welche den Vorderrand nicht erreicht, wird man die beiden folgenden Gattungen *Aneurhynchus* und *Labolips* bald erkennen. Bei der ersteren erstreckt sich die Unterrandader fast bis zur Flügelmitte in grader Richtung, dann macht sie eine leichte Krümmung nach innen, gleichsam einen ramus stigmaticus bildend, der an der Spitze ein sehr kleines, schmales Knöpfchen trägt. Da wo die Krümmung Statt findet, liegt nach aussen eine Anschwellung oder Verdickung, die gleichsam auf- oder rückwärts nach dem Vorderrande hinstrebt, ohne ihn jedoch zu erreichen. An der Spitze des ramus stigmaticus zieht sich, gleichsam eine erloschene Ader bildend, eine dunkle Linie hin, welche eine langgestreckte Radialzelle deutlich abgrenzt. Nur an der Spitze ist diese Zelle nicht vollkommen geschlossen. Die dunkle Linie setzt sich über den Knopf des ramus stigmaticus auch nach der Flügelwurzel hin, aber etwas nach innen gekrümmt, fort. Durch ähnliche dunkel gefärbte Linien finden wir auch hier die Mittel- und Grundader angedeutet. Die Fühler beim ♂ sind vierzehngliedrig, die Geisselglieder alle langwalzig, das Stielchen kurz, rundlich, kaum halb so lang wie das erste Geisselglied, dieses immer kürzer als das zweite. Beim ♀ sind die Fühler zwölfgliedrig, die Geissel von derselben Form wie bei der Gattung *Galesus*, aber nach der Spitze mehr keulförmig verdickt; der Schaft hat aber nicht den Absatz, der bei *Galesus* so charakteristisch erscheint. Der Kopf ist rundlich, das Gesicht nach unten nicht verlängert. Die Furchen der Parapsiden sehr deutlich und tief.

Die Gattung *Labolips* Hal. hat mit *Aneurhynchus* eine grosse Aehnlichkeit in Bezug auf den ganzen Habitus; zwar sind die Fühler weniger deutlich keulförmig, und das zweite Segment, welches bei jener Gattung an der Basis drei längliche, starke Eindrücke hat, besitzt bei *Labolips* nur einen einzigen mehr rundlichen. Aber diese Unterschiede würden zu einer generischen Scheidung nicht hinreichen, wenn nicht in der Flügelbildung eine scharfe Differenz sich kund gäbe. Bei *Labolips* geht die Unterrandader in grader Richtung bis zu der Stelle, wo am Vorderrande sich eine schwache Einbiegung zeigt und bricht hier vollständig ab, ohne sich mit dem Vorder-

*) British Ent. Nro. 341.

**) Fauna Ins. germ. LXXXIII. 11.

rande zu verbinden, ohne eine Spur vom ramus stigmaticus und ohne jene dunkle Linie zu bilden, welche bei *Aneurhynchus* eine Radialzelle abscheidet. Wo *Haliday* diese Gattung näher charakterisirt hat, ist mir nicht bekannt, ich habe zwei ♀ von ihm vor mehreren Jahren erhalten, kann also mit Zuverlässigkeit die hier angeführten Gattungsmerkmale aufstellen. Sie findet sich ebenfalls in hiesiger Gegend, mir sind aber auch nur ♀ vorgekommen.

Die nun folgenden Gattungen zeichnen sich alle dadurch aus, dass die Unterrandader an den Flügelrand geht. Es schien mir zur leichteren und sicheren Bestimmung nothwendig in dem *Conspectus* die ♂ und ♀ zu trennen, auf diese Weise gelingt es, oft durch ein einziges, scharf durchgreifendes Merkmal die Gattung hinreichend zu kennzeichnen.

Bei der Gattung *Cephalonomia* *) *Westw.* muss ich mich auf die Gattungsdiagnose dieses Schriftstellers beziehen, da mir dieses Genus in hiesiger Gegend noch nicht vorgekommen ist. Im männlichen Geschlecht charakterisirt sie sich vor allen Gattungen dieser Familie durch zwölfgliedrige Fühler, beim ♀ ist der Fühler ebenfalls zwölfgliedrig, der Kopf flach und verlängert, fast rechteckig.

Dreizehngliedrige Fühler beim ♂ ♀ finden wir in der Gattung *Paramesius* und eine gleiche Zahl nur noch in beiden Geschlechtern bei *Spilomicrus*. Beide Gattungen müssen daher sorgfältig von einander geschieden werden. Bei den ♂ beider Gattungen liegt ein scharfer Unterschied in dem Grössenverhältniss des ersten und zweiten Geisselgliedes. Bei *Paramesius* ist nämlich das erste Glied auffallend kleiner und bei *Spilomicrus* grösser oder wenigstens so gross als das zweite. Beim ♀ haben wir allein in der Form des Hinterleibs ein durchgreifendes Merkmal, denn derselbe ist bei *Paramesius* nach hinten scharf zugespitzt, bei *Spilomicrus* mehr zugerundet; bei *Paramesius* ist ferner das erste (Stiel) und zweite Segment nur durch eine gewöhnliche Naht von einander getrennt, bei *Spilomicrus* aber erhebt sich der Basalrand des zweiten Segments ganz frei und hoch über den Stiel, welcher somit in dem zweiten Segment, gleichwie in einem Tubus, steckt. Diese eigenthümliche Einlenkung beider Segmente bei *Spilomicrus* ist so charakteristisch, dass sie gleichsam alle andern Merkmale überflüssig macht. Uebrigens ist auch das Metanotum in beiden Gattungen verschieden, indem bei *Paramesius* sich in der Mitte ein schärferer oder stumpferer Zahn, gleichsam pyramidal erhebt, während wir bei *Spilomicrus* nur einen einfachen Mittelkiel finden. In Bezug auf das Flügelgeäder stimmen beide Gattungen darin überein, dass eine deutlich ausgeprägte Randader vorhanden ist, ebenso bildet die Unterrandader nach ihrer Vereinigung mit dem Vorderrande einen längeren (*Paramesius*) oder kürzeren (*Spilomicrus*) ramus marginalis und einen kurzen ramus stigmaticus.

Unter den Gattungen, deren ♂ sich durch dreizehngliedrige Fühler auszeichnen und die Unterrandader den Vorderrand erreicht, haben wir noch die Gattung *Idiotypa* zu bezeichnen. Von *Paramesius* und *Spilomicrus* ♂ unterscheidet sie sich auf der Stelle durch die scharf ausgeprägte und vollkommen entwickelte Grundader, welche in jenen beiden Gattungen höchstens durch eine bräunliche Linie angedeutet wird. Von *Paramesius* ausserdem durch das erste Geisselglied, welches so lang oder etwas länger als das zweite erscheint, von *Spilomicrus* durch die Einlenkung des ersten und zweiten Segments, die mit *Paramesius* übereinstimmt, ferner durch die Gruben an der

*) *Mag. Nat. Hist.* 1833.

Basis des zweiten Segments, welche bei *Spilomicrus* fehlen. Das ♀ von *Idiotypa* hat zwölfgliedrige Fühler, ist dadurch also leicht von den beiden vorhergehenden Gattungen zu unterscheiden, aber wir haben noch drei andere Gattungen, deren ♀ auch nur zwölfgliedrige Fühler besitzen, *Cephalonomia*, *Diapria* und *Loxotropa*. Hier müssen demnach für alle bestimmte und sichere Unterscheidungsmerkmale hervorgehoben werden. Von *Cephalonomia* unterscheidet sich unsere Gattung durch den ganz runden Kopf, von *Diapria* durch das Vorhandensein einer Grundader, von *Loxotropa* durch die Furchen der Parapsiden und die scharf abgesetzte fünfgliedrige Keule, welche bei jener Gattung höchstens viergliedrig ist.

Der Hauptrepräsentant unserer Familie, die Gattung *Diapria*, ist auf solche Arten gegründet, deren ♂ meist wirtelig behaarte Fühler haben. Als Typus kann man die überall nicht seltne *Diapria* (*Psilus Jur.* *) *elegans Jur.* ansehen. Das ♂ hat vierzehngliedrige Fühler und Flügel, welche durch den Mangel der Grundader von *Basalys* und *Loxotropa* hinlänglich unterschieden sind. Das ♀ hat nur zwölfgliedrige Fühler; der runde Kopf unterscheidet es von dem ♀ von *Cephalonomia* und die mangelnde Grundader wiederum von *Loxotropa* ♀. Der Unterschied zwischen *Diapria* ♀ und *Idiotypa* ♀ wurde bereits bei dieser letztern Gattung erörtert.

Durch zwölfgliedrige Fühler steht auch *Glyptonota* in sehr enge Verwandtschaft zur Gattung *Diapria*. Sie unterscheidet sich aber standhaft durch die beiden Furchen des Mesonotum's, von denen bei *Diapria* nie eine Spur vorhanden ist. Von *Idiotypa* unterscheidet sie sich durch die Fühlergeißel, welche keine abgesetzte Fühlerkeule hat. Die Flügel sind so stark verkürzt, dass sie nicht oder kaum die Basis des zweiten Segments erreichen. In der Bildung des Hinterleibs stimmt sie ganz mit *Loxotropa* überein, die aber wieder keine Furchen des Mesonotums und eine abgesetzte Fühlerkeule hat und sich dadurch weit genug von *Glyptonota* entfernt.

Westwood hat unter dem Namen *Basalys* eine Gattung aufgestellt, welche durch vierzehngliedrige Fühler sich einzig und allein an *Diapria* und *Loxotropa* anschliesst. Die Geisselglieder sind ganz kurz behaart, wodurch sie sich augenblicklich von *Diapria* unterscheidet, dagegen ist der Unterschied von *Loxotropa* weniger schnell ersichtlich. Bei *Basalys* ist das erste Geisselglied immer bestimmt kürzer als das zweite, bei *Loxotropa* aber erreicht das erste Glied die Länge des zweiten oder es ist ganz unmerklich kürzer. Die einzige Art dieser Gattung, *Basalys fumipennis Westw.* ist in hiesiger Gegend häufig. Als Synonym glaube ich die *Diapria striolata Nees* angeben zu können.

Von der Gattung *Diapria* Aut. habe ich eine neue Gattung *Loxotropa* abgesondert, die sich im männlichen Geschlecht ganz enge an *Basalys* anschliesst, deren ♀ aber höchst ausgezeichnet durch eine stark abgesetzte Keule erscheinen. Diese Keule hat keine Ähnlichkeit mit der von *Idiotypa* und *Spilomicrus*, weil in diesen beiden Gattungen die Glieder der Keule allmählig an Dicke zunehmen, bei *Loxotropa* aber das erste Glied gleich in derselben Dicke wie das zweite auftritt, abgesehen davon, dass auch bei *Spilomicrus* dreizehngliedrige Fühler vorkommen. Unsere Gattung *Loxotropa* ist zahlreich an Arten und es kommen auch ungeflügelte ♀ vor, die eben an der eigenthümlichen Fühlerkeule gleich erkannt werden. Ein solches ♀ ohne Flügel hat *Jurine* auf Pl. XIII. unter dem Namen *Psilus antennatus* abgebildet. Irrthümlich aber hat er bei dieser Figur dem vergrösserten Fühler dreizehn Glieder gegeben, wodurch man leicht irre geleitet und

*) *Jurine*, Nouv. Méth. d. cl. les Hym. pl. XIII gen. 48. ♂.

auf die Gattung *Spilomicrus* hingewiesen werden könnte. Zwar kommen auch bei *Spilomicrus* Arten mit ganz kurzen Flügelstummeln vor, aber bei diesen ist die Keule immer fünfgliedrig. Eine viergliedrige Keule finde ich nur bei einigen Arten von *Loxotropa*, und ich vermüthe sogar, dass diese die ♀ der Gattung *Basalys Westw.* seien, dass also die Gattung *Diapria* im weiblichen Geschlecht nur eine dreigliedrige Fühlerkeule besitze. Diese Vermüthung bedarf aber natürlich noch durch genaue Beobachtungen der Bestätigung oder Widerlegung.

Es bleiben nun noch drei neue Gattungen zur Besprechung übrig, welche sich alle leicht charakterisiren lassen. Die eine derselben *Polypeza*, zeichnet sich durch vierzehngliedrige Fühler aus, sie ist die einzige, die im weiblichen Geschlecht so viele Glieder zählt. Möglicherweise (da sie ungeflügelt und nur im ♀ Geschlecht mir vorgekommen,) könnte sie das ♀ von *Platymischus* sein, da aber bei dieser Gattung das Mesonotum keine Furchen, bei *Polypeza* aber deutliche Furchen vorkommen, so bleibt das vorläufig bloß eine Vermüthung, die aber mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben würde, wenn auch *Platymischus* in hiesiger Gegend vorkäme. Aber diese schöne Gattung habe ich bis jetzt vergebens gesucht.

Die beiden andern Gattungen haben im weiblichen Geschlecht dreizehngliedrige Fühler. Die eine, welche ich *Monelata* nenne, hat ein so stark verdicktes Endglied der Fühler, dass man dasselbe füglich als Keule, und zwar als eine eingliedrige Keule ansehen kann. Hierdurch gewinnt der Fühler eine so eigenthümliche Gestalt, dass diese Gattung mit keiner andern mehr verwechselt werden kann.

Nicht schwieriger dürfte die Gattung *Hemilexis* zu definiren sein; das ♀ steht zwischen *Paramesius* und *Spilomicrus* in der Mitte, da die Zahl der Fühlerglieder hier ebenfalls dreizehn beträgt, aber durch den Mangel der Randader wird die Unterscheidung von beiden Gattungen leicht; von *Paramesius* weicht auch die Bildung der Hinterleibsspitze ab, indem der Hinterleib bei *Hemilexis* fast abgestutzt genannt werden könnte. Die Unterrandzelle ist an der Spitze breiter wie an der Basis und da, wo die Unterrandader den Vorderrand erreicht, sendet sie auch gleich den *ramus stigmaticus* ab, so dass von einem *ramus marginalis* eigentlich keine Rede sein kann. Die Furchen der Parapsiden sind bloß in der Nähe des Schildchens deutlich. Das ♂ hat ebenfalls dreizehngliedrige Fühler, es unterscheidet sich von *Paramesius*, *Idiotypa* und *Spilomicrus* durch die nach aussen offene Radialzelle; die Radialader fehlt also beim ♂ nicht minder wie bei dem ♀.

30. *Belytoidea*. Die Familie der *Belytoiden* ist noch zahlreicher an Gattungen wie die vorhergehende. Von diesen zeichnen sich einige durch scharfe und schnell in die Augen fallende Merkmale aus, andere müssen genauer untersucht und dem ganzen Habitus nach betrachtet werden, um sich den Gattungstypus leichter einzuprägen. Ich habe mich bemüht, bei jeder Gattung ein entscheidendes Merkmal aufzufinden, woran mit Sicherheit die Gattung ermittelt werden könnte. Zu diesem Zwecke habe ich mehrere tausend Exemplare untersucht und darf daher das Resultat meiner Untersuchungen in Bezug auf die Begründung neuer Gattungen mit einiger Zuverlässigkeit hier mittheilen. Um aber die Auffindung der Gattungen zu erleichtern, habe ich die Geschlechter getrennt und für beide einen besonderen *Conspectus* ausgearbeitet. Es erschien dieses um so nothwendiger, weil nur in wenigen Gattungen ♂ und ♀ sich durch ein und dasselbe generische Merkmal von allen übrigen scheiden lassen.

A. Die ♂.

a. Augen kahl.

b. Mesonotum ohne Furchen; Einschnitte des Hinterleibs sehr tief **Ismarus Hal.**bb. Mesonotum mit Furchen; Einschnitte des Hinterleibs nicht besonders tief. **Psilomma m. *)**

aa. Augen behaart.

c. Hinterschildchen mit einem starken Dorn **Oxylabis m. **)**

cc. Hinterschildchen ohne Dorn

d. Der Mittelkiel des Metanotums theilt sich vor der Spitze und umschliesst ein kleines Mittelfeld. (Radialzelle offen oder geschlossen) **Belyta Jur.**

dd. Der Mittelkiel des Metanotums nicht getheilt.

e. Radialzelle fehlend oder offen.

f. Der ramus stigmaticus und postmarginalis so stark verkürzt, dass eine Radialzelle kaum angedeutet wird.

g. Die Grundader erloschen **Synacra m. ***)**gg. Die Grundader deutlich ausgeprägt. **Pantolyta m. †)**

ff. Die Radialzelle mehr oder weniger deutlich ausgebildet.

h. Die Vorderschienen nach aussen ausgebuchtet, mit einem stumpferen oder spitzeren Zahn oder einem spitzen Dörnchen. **Zygota m. ††)**hh. Die Vorderschienen nach aussen ohne Ausbuchtung **Aclista m. †††)**

ee. Die Radialzelle geschlossen.

i. Der Stiel des Hinterleibs nicht oder kaum länger als das Metanotum.

*) Psilomma von *ψιλος*, *ή, όν*, kahl und *όμμα, ατος, τό*, das Auge. Der Gattungsname ist auch ohne nähere Erklärung verständlich.

**) Oxylabis von *όξύς, εία, ύ*, spitz und *λαβίς, ή*, das Werkzeug. Deutet den spitzen Dorn des Hinterschildchens an.

***) Synacra von *σύν*, mit und *άκρα, ή*, die Spitze. Eine Benennung, welche in der vorragenden Spitze der Legeröhre beim ♀ ihren Grund hat.

†) Pantolyta von *πάς, πᾶσα, πᾶν, παντός*, ganz und *λυτός, ή, όν*, gelöst, aufgelöst, offen. Der Name bezieht sich auf die Radialzelle, welche von der Innenseite ganz offen ist.

††) Zygota von *ζυγωτός, ή, όν*, gejocht, vereinigt. Die Unterrandzelle und die Radialzelle sind durch den etwas breiten ramus stigmaticus vereinigt, verbunden.

†††) Aclista von *α* priv. und *κλειστός, ή, όν*, verschlossen. Der Name bezieht sich auf die offene, nicht verschlossene Radialzelle.

- k. Der Rand an der Spitze des Schaftes scharf und in gewisser Richtung gesehen zahnartig vorspringend **Acropiesta m. *)**
- kk. Der Rand an der Spitze des Schaftes nicht vorspringend.
- l. Das letzte Bauchsegment ganz gerade und grubenartig vertieft **Anectata m. **)**
- ll. Das letzte Bauchsegment etwas umgebogen, ohne Grübchen. **Pantoclis m. ***)**
- ii. Der Stiel des Hinterleibs entschieden länger, meist doppelt so lang wie das Metanotum.
- m. Der ramus marginalis mehr als doppelt so lang wie die Radialzelle **Macrohynnis m. †)**
- mm. Der ramus marginalis nicht doppelt so lang wie die Radialzelle.
- n. Der ramus marginalis so lang oder kaum etwas länger als der ramus stigmaticus, aber stets viel kürzer als die Radialzelle **Xenotoma m. ††)**
- nn. Der ramus marginalis viel länger als der ramus stigmaticus, meist so lang wie die Radialzelle, selten etwas kürzer oder länger.
- o. Das zweite Segment von der Seite zusammengedrückt, birnförmig, der Stiel oben glatt; Schaft so lang wie das erste Geisselglied **Leptorhaptus m. †††)**
- oo. Das zweite Segment nicht von der Seite zusammengedrückt, daher mehr flach, der Stiel des Hinterleibs oben mehr oder weniger gefurcht, der Schaft länger als das erste Geisselglied **Cinetus Jur.**
- AA. Die ♀.
- p. Die Augen kahl.

*) Acropiesta von ἄκρος, α, ον, (lateinisch summus, extremus) das Aeusserste, in eine Spitze Auslaufende und περιστός, ή, όν, gedrückt. Die zusammengedrückte Spitze des Hinterleibs lässt die Bedeutung des Gattungsnamens nicht verkennen.

**) Anectata von ἀ priv. und ἐκτετός, ή, όν, ausgedehnt, ausgestreckt. Die nicht ausgedehnten, d. h. nicht besonders lang gestreckten Geisselglieder des ♀ liegen der Wahl dieses Namens zu Grunde.

***) Pantoclis von πας, πάσα, πάν, ganz und κλεις, ή, der Schlüssel, Riegel. Diese Benennung weist auf den ramus radialis hin, der gleichsam wie ein Riegel die Radialzelle ganz schliesst.

†) Macrohynnis von μακρός, ά, όν, lang und ὕνις, ή, die Pflugschaar. Der Name bezieht sich auf die nicht sehr lange, zugespitzte pflugschaarähnliche Radialzelle, in Verbindung gedacht mit dem sehr langen ramus marginalis.

††) Xenotoma von ξένος, η, ον, fremd, ungewöhnlich und τομή ή, das Abgeschnittene, der abgeschnittene Theil. Bezieht sich auf das zweite Segment, welches am Hinterrande nicht gerade, sondern bogenförmig ausgeschnitten ist.

†††) Leptorhaptus von λεπτός, ή, όν, fein und ῥαπτός, ή, όν, zusammengeñäht. Der Name bezieht sich auf den Hinterleib, der sich durch die feinen Nähte der Segmente nur undeutlich absondert und unterscheidet.

- q.* Mesonotum ohne Furchen; Einschnitte des Hinterleibs sehr tief . **Ismarus Hal.**
qq. Mesonotum mit Furchen; Einschnitte des Hinterleibs nicht tief . **Psilomma m.**
pp. Die Augen behaart.
r. Fühler zwölfgliedrig **Synacra m.**
rr. Fühler mehr als zwölfgliedrig.
s. Fühler vierzehngliedrig.
t. Ohne Nebenaugen **Anommatium m. *)**
tt. Mit Nebenaugen.
u. Die Radialzelle kaum angedeutet **Pantolyta m.**
uu. Die Radialzelle deutlich ausgeprägt **Anectata m.**
ss. Fühler fünfzehngliedrig.
v. Hinterschildchen mit einem starken Dorn **Oxylabis m.**
vv. Hinterschildchen ohne Dorn.
w. Das erste Geisselglied fast so lang wie alle folgenden zusammen **Diphora m. **)**
ww. Das erste Geisselglied viel kürzer als alle folgenden zusammen.
x. Der Mittelkiel des Metanotums geteilt und ein kleines Mittelfeld einschliessend (Radialzelle offen oder geschlossen) **Belyta Jur.**
xx. Der Mittelkiel des Metanotums nicht geteilt.
y. Das dritte Rückensegment viel länger als das vierte.
z. Der ramus marginalis so lang wie die Radialzelle; die letzten Geisselglieder mehr als doppelt so lang wie breit **Cinetus Jur.**
zz. Der ramus marginalis viel kürzer als die Radialzelle; die letzten Geisselglieder nicht mehr als doppelt so lang wie breit . . . **Xenotoma m.**
yy. Das dritte Rückensegment nicht oder nicht viel länger als das vierte (oder der Hinterleib mit drei sichtbar hervortretenden Rückensegmenten.)
α. Der Hinterleibsrücken zeigt acht Segmente.
β. Radialzelle geschlossen.
γ. Die Geisselglieder nach der Spitze nur wenig verkürzt **Zelotypa m. ***)**

*) Anommatium von *ἀ priv.* und *ἀμμέτιον, τό*, das Aeuglein.

**) Diphora von *διφάρος, ον*, zweimal oder Zwei tragend. Der Name enthält eine Anspielung auf die beiden durch Grösse ausgezeichneten Fühlerglieder, nämlich den Schaft und das erste Geisselglied.

***) Zelotypa von *ζηλότυνος, ον*, nacheifernd, *nachahmend*. Diese Gattung ahmt auf der einen Seite durch die Fühler, auf der anderen durch den Hinterleib mehrere Gattungen nach.

- γγ. Die Geisselglieder nach der Spitze hin stark verkürzt. **Pantoclis m.**
 ββ. Radialzelle offen.
 δ. Der ramus stigmaticus und postmarginalis stark verkürzt,
 der erstere fast unter einem rechten Winkel entspringend. **Zygota m.**
 δδ. Der ramus stigmaticus und postmarginalis nicht besonders
 verkürzt, der erstere unter einem sehr schiefen Winkel
 entspringend **Aclista m.**
 αα. Der Hinterleibsrücken mit weniger als acht Segmenten.
 ε. Der Hinterleibsrücken mit sieben Segmenten; das letzte Fühlerglied
 etwas keulförmig verdickt **Acropiesta m.**
 εε. Der Hinterleibsrücken mit weniger als sieben Segmenten.
 ζ. Der ramus marginalis mehr als doppelt so lang wie die Radial-
 zelle; der rücklaufende Fortsatz des ramus radialis schneidet
 in seiner Verlängerung die Grundader **Macrohynnis m.**
 ζζ. Der ramus marginalis kürzer, so lang oder kaum länger als
 die Radialzelle; der rücklaufende Fortsatz des ramus radialis
 schneidet in seiner Verlängerung nicht die Grundader.
 η. Hinterleibsrücken mit drei Segmenten, das zweite über-
 mässig verlängert, fast die Spitze des Hinterleibs erreichend,
 das dritte und letzte Segment aus dem zweiten wie ein
 kurzer Griffel hervorgehend; der ramus marginalis deutlich
 kürzer als die Radialzelle. **Miota m. *)**
 ηη. Hinterleibsrücken mit drei, sehr selten mit vier Segmenten,
 das zweite nicht übermässig verlängert, das dritte und letzte
 ebenfalls gross und von der Seite stark zusammengedrückt;
 der ramus marginalis nicht kürzer als die Radialzelle . . **Leptorhaptus m.**

Die Belytoiden haben im männlichen Geschlecht einen ganz durchgreifenden und leicht fasslichen Charakter um sie von den Diaprioiden zu trennen. Während in der letzten Familie immer das zweite Geisselglied mehr oder weniger ausgerandet erscheint, finden wir bei den Belytoiden immer das erste Glied durch dieses leicht in die Augen fallende Merkmal ausgezeichnet. Dieser durchgreifende Unterschied scheint mir ein besonderes und tiefer liegendes Motiv für die Trennung beider Familien zu bilden. Schwieriger wird es die ♀ scharf abzugrenzen; im Allgemeinen steht zwar fest, dass alle ♀, deren Fühler fünfzehngliedrig sind, zu der Gruppe der Belytoiden gehören, aber vier Gattungen, Anommatium, Synacra, Pantolyta und Anectata haben eine geringere Anzahl und gehören doch unverkennbar unserer Familie an. Von den Gattungen Pantolyta, Synacra und Anectata ist aber das ♂ bekannt, welches unverkennbar durch die Ausrandung des ersten Geisselgliedes den Belytoiden angehört. Die Gattung Anommatium könnte nun wohl zu den Dia-

*) Miota von *μειωτός*, *ή*, *ό*, verkürzt. Auf den ramus marginalis Bezug nehmend, der im Gegensatz zu Leptorhaptus kürzer als die Radialzelle erscheint, habe ich dieses Grössenverhältniss in dem Namen ausgedrückt.

prioiden gehören, da die zugespitzte Form des Hinterleibs auch bei zwei Gattungen derselben *Diapria* und *Paramesius* übereinstimmt, während die übrigen Gattungen der Diaprioiden einen an der Spitze mehr zugerundeten oder sogar abgestutzten Hinterleib haben. Von *Diapria* und *Paramesius* unterscheidet sich indessen unsere Gattung durch vierzehngliedrige Fühler, die bei *Diapria* zwölf-, bei *Paramesius* standhaft dreizehngliedrig sind.

Bei den geflügelten Arten der Belytoiden finden wir im Hinterflügel eine Mittelader, bloß bei *Synacra* und *Pantolyta* finde ich dieselbe nicht, möglich, dass sie gänzlich fehlt, oder bloß durch eine wasserhelle, leicht zu übersehende Linie angedeutet wird. Bei den übrigen Gattungen deuten wir immer die Mittelader im Hinterflügel als ein sicheres Merkmal für ihre Stellung unter den Belytoiden, da bei den Diaprioiden sich niemals eine Spur derselben zeigt.

Für diejenigen Gattungen dieser Familie, welche beim ♂ an dem ersten Geißelglied eine Ausrandung und deren ♀ fünfzehngliedrige Fühler besitzen, kann ein Zweifel in Bezug auf ihre Stellung gar nicht erhoben werden.

Die Gattung *Ismarus* ist durch zwei sehr schöne Merkmale ausgezeichnet, nämlich durch kahle Augen und sehr tiefe Einschnitte zwischen den Hinterleibssegmenten. In Bezug auf das letztere Merkmal sondert sich *Ismarus* von allen übrigen Gattungen ab und kann mit keiner einzigen verwechselt werden; in den kahlen Augen aber stimmt sie mit *Psilomma* überein, doch finden wir bei dieser Gattung das Mesonotum mit Furchen versehen, welche bei *Ismarus* fehlen. Ich habe in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens *) drei neue Arten dieser Gattung beschrieben, nämlich *rugulosus* ♀, *Halidayi* ♀ und *Neesii* ♀ (= *Belyta anomala* Nees.) Von *Halidayi* beschrieb ich später in denselben Verhandlungen **) das ♂, welches sich von dem ♀ durch vierzehngliedrige Fühler unterscheidet. In Bezug auf die nähere Auseinandersetzung der einzelnen Körpertheile verweise ich auf jene ausführlichen Beschreibungen.

Wenn auch *Psilomma* durch die kahlen Augen mit *Ismarus* übereinstimmt, so ist doch die Abweichung im Vergleich zum Hinterleibe sehr auffallend, denn es fehlen die tiefen Einschnitte zwischen den Segmenten gänzlich. An dem weiblichen Fühler ist das erste Geißelglied doppelt so lang wie das Stielchen, die folgenden sind walzenförmig, werden aber nach der Spitze des Fühlers hin allmählig kürzer und das letzte ist ungefähr so lang wie die zwei vorhergehenden. Die Geißelglieder beim ♂ sind langwalzig, ziemlich rauhaarig, das erste an der Basis ausgebuchtet, aber so, dass die Ausbuchtung nur das erste Drittel des ganzen Gliedes trifft. Das Mesonotum hat deutliche Furchen. Die Flügel haben keine Randzelle; die Unterrandader bildet, indem sie an den Vorderrand geht, einen ziemlich langen *ramus marginalis* und einen kurzen *ramus stigmaticus*. Dieser letztere hat eine sehr kurze aufwärtsstrebende Spitze und einen ziemlich verwischten rücklaufenden Ast. Die Grundader ist stark ausgeprägt und die Unterrandzelle nicht bloß sehr deutlich, sondern auch nach aussen durch eine Randader vollständig geschlossen. Der Hinterleibsstiel ist kurz, das zweite Segment sehr gross, die vier folgenden zwar deutlich aber nicht breit, das letzte fast so lang wie die vier vorhergehenden.

*) Siebenter Jahrgang, 1850, Seite 284—287.

**) Zwölfter Jahrgang, 1855, Seite 245.

Die Gattung *Oxylabis* schliesst sich enge an die beiden vorhergehenden Gattungen an, unterscheidet sich aber standhaft und leicht durch den starken Dorn des Hinterschildchens, abgesehen von andern Merkmalen. Beim ♀ finden wir zwischen dem zweiten bis sechsten Segment tiefe Einschnitte, welche sogleich an *Ismarus* erinnern. Uebrigens hat auch hier der Hinterleib beim ♂ auf der Bauch- und Rückenseite acht Segmente, beim ♀ stimmt die Rückenseite mit dem ♂ überein, die Bauchseite zählt deren jedoch nur sechs. Die Flügelbildung des ♂ weicht etwas von der des ♀ ab. Die Unterrandader bildet einen ziemlich langen *ramus marginalis* und einen eben so langen *ramus postmarginalis*. Der *ramus stigmaticus* entspringt unter einem schiefen Winkel. Der *ramus radialis* ist kurz, setzt sich aber als eine dunkle Linie noch weit fort, so dass dieser Fortsatz ziemlich deutlich den Vorderrand zu erreichen strebt und eine unvollkommene, aber doch scheinbar geschlossene Radialzelle bildet. Auch hat der *ramus radialis* einen rücklaufenden Fortsatz, welcher in seiner Verlängerung die Grundader ungefähr in ihrer Mitte schneidet. Bei dem ♀ ist der *ramus postmarginalis* viel kürzer als der *ramus marginalis*, auch sind die Fortsätze des *ramus radialis* nicht so deutlich, die Radialzelle also auch nicht so klar in die Augen fallend.

Um die Gattung *Belyta* *Jur.* im engern Sinne zu ermitteln, müssen wir unser Hauptaugenmerk auf die Fühler und Flügel der von *Jurine* dargestellten Figur Pl. 14 von *Belyta bicolor* richten. Die fünfzehngliedrigen Fühler bezeichnen ein ♀ und zwar ein solches, bei welchem die Geisselglieder mit Ausnahme des ersten und letzten breiter als lang erscheinen. Bei Betrachtung des Flügels kann nicht in Abrede gestellt werden, dass die Radialzelle nicht geschlossen ist. Es kann daher die Abbildung von *Jurine* keine Gattung mit geschlossener Radialzelle bezeichnen. Wir haben sie daher in unserem *Conspectus* bloß unter den ♀ mit fünfzehngliedrigen Fühlern zu suchen und hier allein solche, welche eine offene Radialzelle haben, ins Auge zu fassen. Diese Gattungen sind *Oxylabis*, *Zygota* und *Aclista*. Bei der ersteren finden wir das Hinterschildchen mit einem Dorn versehen, diese schliesst sich also durch ein so scharfes Merkmal von unserer Untersuchung aus. Die Gattung *Zygota* hat einen ziemlich deutlich verdickten *ramus marginalis*; der *ramus postmarginalis* ist aber so kurz, dass eine Radialzelle kaum angedeutet wird. Der Hinterleib ist ferner zugespitzt und durch alle diese Merkmale schliesst sie sich deutlich genug von der Gattung *Belyta* im Sinne *Jurine's* aus. Mithin bleiben noch *Aclista* und *Belyta* *nob.* zur genaueren Abwägung und Vergleichung übrig. Beide Gattungen sind im weiblichen Geschlecht durchaus verschieden durch die eigenthümliche Bildung der Hinterleibsspitze. Dieselbe ist in der einen Gattung ganz stumpf, wie es die Abbildung von *Jurine* zeigt, diese muss also den Namen *Belyta* führen, während die andere mit zugespitztem und sogar von der Seite zusammengedrücktem Hinterleibe von mir mit dem Namen *Aclista* bezeichnet wird. Um aber diese Differenz in der Bildung der Hinterleibsspitze noch genauer festzustellen, will ich hier etwas näher darauf eingehen. Bei *Belyta* und eben so bei *Aclista* finden wir auf dem Hinterleibsrücken acht Segmente, von welchen das erste oder der Stiel ziemlich kurz, das zweite aber sehr lang ist, die vier folgenden sind kurz, das siebente etwas länger als das sechste. Bei *Belyta* ist das achte Segment oder die Afterdecke mehr oder weniger herabgebogen, so dass es mit dem siebenten fast einen rechten Winkel bildet, und dadurch wird die Hinterleibsspitze ganz stumpf. Bei *Aclista* finden wir dieselbe Bildung des Hinterleibs mit dem Unterschiede, dass das achte Segment mit dem siebenten in gleicher Flucht liegt und deshalb der

Hinterleib an der Spitze geschärft, nicht stumpf erscheint. In Bezug auf das achte Segment, welches in beiden Gattungen nicht immer, (und namentlich wenn man etwas unreine, beschmutzte Exemplare hat,) ganz deutlich ist, muss ich noch hinzufügen, dass man sich hüten muss, dasselbe als einen Appendix zu den Genitalien zu betrachten, ich habe auf demselben zu deutlich die Stigmata gesehen, um in seiner Deutung noch irgend ein Bedenken tragen zu können. Auf der Bauchseite finden wir in beiden Gattungen nur sechs Segmente, und von diesen ist bei *Aclista* das sechste immer etwas länger als die drei vorhergehenden zusammen, dabei verlängert und scharf zugespitzt, bei *Belyta* aber ist das sechste immer etwas kürzer als die drei vorhergehenden zusammen, und aus sehr breiter Basis kurz zugespitzt. In Bezug auf die Flügel weichen die beiden Gattungen nicht oder nur sehr wenig von einander ab. Bloss bei den Arten von *Belyta*, welche wirklich eine geschlossene Radialzelle haben, ist der Unterschied allerdings auffallend. Die Unterrandader bildet einen deutlichen *ramus marginalis* und *postmarginalis*, der *ramus stigmaticus* entspringt unter einem sehr spitzen Winkel, er hat eine kürzere oder längere aufstrebende Spitze, (den *ramus radialis* darstellend,) welche sich mitunter dem Vorderrande so sehr nähert, dass man dadurch getäuscht, die Radialzelle für geschlossen halten könnte. Wenn der *ramus radialis* einen rücklaufenden Fortsatz hat, dann nimmt derselbe eine solche Richtung an, dass er verlängert die Grundader schneiden würde. Es erhellt aus dem hier Angeführten, dass wir die Gattung *Belyta* *Jur.* bis zur Evidenz festgestellt haben, was nur durch die ganz sorgfältige Gliederung dieser Familie in mehrere Gattungen möglich war.

Die ♂ der beiden Gattungen *Belyta* und *Aclista* sind einander sehr ähnlich, beide zählen nicht bloss auf der Rücken-, sondern auch auf der Bauchseite acht Segmente. Der Hinterleib zeigt uns daher kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Es blieb daher nicht bloss dieser schwierige Punkt, die ♂ zu unterscheiden, übrig, sondern es war auch die nicht zu läugnende Thatsache hervorzuheben, dass in beiden Geschlechtern bei *Belyta* die Radialzelle völlig geschlossen vorkommt. Es musste daher ein neues und mehr allgemeines distinktives Merkmal aufgefunden werden, um diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Ein solches aufzufinden wollte lange nicht gelingen, obgleich ich vermöge des Habitus alle Arten von *Belyta* mit Sicherheit bestimmen konnte, was mich natürlich in der Ansicht bestärken musste, dass ich hier eine bestimmte, scharf begränzte Gattung vor Augen habe. Es ist mir endlich gelungen dieses Merkmal an dem Mittelkiel des Metanotums zu entdecken, der sich bei *Belyta* ♂ ♀ immer, aber bei keiner andern Gattung dieser Familie, vor der Spitze so theilt, dass er ein mehr oder minder deutliches Feldchen einschliesst. Dieses Merkmal überhebt uns schon gleich jeder weiteren Untersuchung.

Für die Gattung *Synacra* haben wir beim ♀ in den zwölfgliedrigen Fühlern und beim ♂ in der erloschenen Grundader ein vortreffliches Merkmal, um in allen Fällen eine sichere Bestimmung zu treffen. Die Fühler beim ♀ werden vom zweiten Geisselglied ab nach der Spitze hin allmählig etwas dicker, das letzte ist völlig so lang, wo nicht etwas länger als die beiden vorhergehenden zusammen. In den Flügeln ist der *ramus marginalis* ziemlich lang und kräftig, aber der *ramus stigmaticus* und *postmarginalis* so stark verkürzt, dass von einer Radialzelle weiter keine Rede sein kann. Der Hinterleib ist sehr kurz gestielt und zeigt auf der Rückenseite nur sieben Segmente. Er ist von der Seite zusammengedrückt, die Spitze daher etwas lang ausgezogen, der

Bohrer kürzer oder länger vorragend. Beim ♂ finden wir in der Flügelbildung eine grosse Uebereinstimmung, nur die Grundader ist abweichend, denn sie wird blos durch eine undeutliche, fast erloschene Linie angedeutet. An den Fühlern ist das erste Geisselglied tief ausgebuchtet. Diese Gattung scheint artenarm zu sein.

Sehr nahe verwandt mit der vorhergehenden ist die Gattung *Pantolyta*, welche sich im weiblichen Geschlecht durch vierzehngliedrige Fühler und beim ♂ durch eine deutliche und scharf ausgeprägte Grundader unterscheidet. Bei dem ♂ finden wir auch die Geisselglieder etwas gestreckter.

An dem verdickten *ramus marginalis*, der nicht geschlossenen Radialzelle und vorzugsweise an der Ausbuchtung der vordersten Schenkel beim ♂ wird man mit leichter Mühe die Gattung *Zygota* erkennen. Das ♂ hat vierzehngliedrige Fühler mit langwulstigen Geisselgliedern. Die Ausbuchtung an dem ersten Glied geht nicht bis zur Mitte. Das ♀ hat fünfzehngliedrige Fühler von derselben Bildung wie bei der Gattung *Belyta*. Das Mesonotum hat durchgehende Furchen der Parapsiden; die Flügelbildung ist in dieser Gattung eigenthümlich. Die Unterrandader bildet einen ziemlich verlängerten und deutlich verdickten *ramus marginalis*, aus welchem der *ramus stigmaticus* ziemlich schiefwinklig entspringt. Der *ramus postmarginalis* ist kurz, beim ♀ sogar sehr kurz, und der *ramus radialis* zeigt eine sehr kurze Spitze, aber einen langen verwischten Fortsatz, welcher die Radialzelle beinahe schliesst. Auch hat der rücklaufende, kurze und fast grade Fortsatz des *ramus radialis* eine solche Richtung, dass er verlängert die scharf ausgeprägte Grundader schneiden würde. Beim ♀ fehlt oft der *ramus radialis* fast gänzlich und in solchen Fällen sind auch die Fortsätze desselben fast spurlos verschwunden. Der Hinterleib besteht beim ♂ aus acht Rücken- und Bauchsegmenten, das erste oder der Stiel ist kurz, das zweite sehr lang, die folgenden alle kurz; das letzte bildet eine wirkliche Afterdecke und auf diesem wie auf dem vorletzten treten die Stigmata als kleine runde Poren deutlich hervor. Beim ♀ finden wir statt acht nur sechs Bauchsegmente. Unter den Rückensegmenten ist das siebente ungefähr so lang wie die drei vorhergehenden, das achte aber viel kürzer als das siebente. Ich kenne von dieser Gattung mehrere Arten.

Die Gattung *Aclista* brauchen wir hier in der Reihenfolge der Gattungen keiner weiteren Betrachtung mehr zu unterziehen, da wir sie bereits oben, im Vergleich mit *Belyta*, weitläufig genug besprochen haben.

Unter den Gattungen mit geschlossener Randzelle und kurzem Hinterleibsstiel zeichnet sich *Acropiasta* ♀ noch weiter durch die von der Seite zusammengedrückte Spitze des Hinterleibs aus. Auf der Rückenseite des Hinterleibs fanden wir sieben, auf der Bauchseite nur sechs sichtbar hervortretende Segmente; das siebente Rückensegment ist etwas länger als die vier vorhergehenden zusammen genommen und zeigt an der Basis die beiden Stigmata, die einander ziemlich nahe gerückt sind. Die Fühler sind fünfzehngliedrig, nach der Spitze hin allmählig verdickt, die acht ersten Geisselglieder länger als breit, die vier folgenden etwas breiter als lang und das letzte kolbenartig verdickt und so lang wie die zwei vorhergehenden zusammen genommen. Der Flügel zeigt eine völlig geschlossene Radialzelle; der *ramus marginalis* ist ein wenig oder sehr deutlich kürzer als der *ramus postmarginalis*, so weit er die Radialzelle begränzt, der letztere setzt sich aber noch etwas über die Radialzelle hinaus fort. Der *ramus stigmaticus* entspringt nicht ganz unter einem

rechten Winkel, krümmt sich aber ein wenig und steht dann auf dem ramus radialis senkrecht. Der ramus radialis hat einen verwischten rücklaufenden Fortsatz, welcher verlängert die Grundader schneiden würde. Das ♂ von *Acropiesta* erkennt man unter den Gattungen mit geschlossener Radialzelle bald durch den kurzen Hinterleibsstiel, wodurch es sich blos an *Anectata* ♂ und *Pantoclis* ♂ anschliesst. Von beiden Gattungen unterscheidet es sich aber durch folgende Merkmale: Der ramus marginalis ist länger oder wenigstens so lang wie die Radialzelle, in jenen Gattungen immer kürzer; der Schaft hat an der Spitze einen scharf aufgeworfenen Rand, der in gewisser Richtung gesehen, gleichsam zahnartig vorspringt. Das erste Geisselglied ist nicht blos ausgebuchtet, sondern gleichsam ausgehöhlt; die Hinterleibsspitze nach abwärts gebogen, gewöhnlich mit einem häutigen Anhängsel. Von *Acropiesta* besitze ich mehrere geflügelte und eine ungeflügelte Art.

Von *Anectata* besitze ich ♂ und ♀, welche vor mehreren Jahren, wenn ich nicht irre, aus faulem Holz erzogen wurden. Leider ist mir die nähere Notiz darüber abhanden gekommen. Das ♂ hat vierzehngliedrige Fühler wie *Pantolyta*, unterscheidet sich aber gleich durch die vollkommen geschlossene und sogar ziemlich grosse Radialzelle. Der ramus marginalis ist etwas kürzer als diese Radialzelle und der ramus stigmaticus entspringt unter einem wenig schiefen Winkel. Das Metanotum hat ziemlich deutlich vorspringende Seitenzähne. Der Hinterleib zeigt auf dem Rücken acht Segmente und der Bohrer kommt als eine ganz kurze griffelartige Spitze zum Vorschein. Das ♂ stimmt mit dem ♀ genau überein, nur ist die Gestalt der Fühler verschieden, auch hat die Bauch- wie die Rückenseite acht Segmente. Von *Pantoclis* ♂ lässt sich das ♂ von *Anectata* nur sehr schwer unterscheiden, es hat aber immer eine grade Hinterleibsspitze, während dieselbe bei jener Gattung etwas nach abwärts gekrümmt erscheint.

Die Gattung *Pantoclis* zeichnet sich im weiblichen Geschlecht durch fünfzehngliedrige Fühler aus, das unterscheidet sie auf der einen Seite von *Anectata*, von der andern Seite bildet dagegen die geschlossene Radialzelle ein sehr gutes Merkmal dar, um sie von *Aclista* zu trennen. Sie steht daher zwischen beiden Gattungen gleichsam in der Mitte und nähert sich denselben auch im Habitus. Die Radialzelle ist gewöhnlich mehr als doppelt so lang wie der ramus marginalis und der Bohrer ragt bei einzelnen ♀ oft ziemlich weit hervor.

In der Gattung *Macrohynnis* haben wir eine durch die eigenthümliche Bildung des Flügelgeäders ausgezeichnete Form vor uns, die sich nicht leicht mit einer andern verwechseln lässt. Der ramus marginalis ist nämlich völlig doppelt so lang wie die ziemlich kurze Radialzelle und beide zusammen haben genau das Ansehen einer Pflugschaar von einfacher Construction. Der rücklaufende Fortsatz des ramus radialis würde bei seiner Verlängerung die Grundader schneiden. Alle Fühlerglieder sind beim ♀ langwalzig und so stark verlängert, dass man dasselbe leicht mit einem ♂ verwechseln könnte, wenn nicht der Mangel einer Ausrandung des ersten Geisselgliedes und der zugespitzte Hinterleib das Geschlecht verriethe. Der Schaft ist in beiden Geschlechtern kurz, beim ♀ höchstens so lang wie das erste Geisselglied, beim ♂ fast etwas kürzer. Am Metanotum springen die Seitenzähnen ein wenig vor. Der Stiel des Hinterleibs ist länger als das Metanotum, wenn gleich nicht besonders lang, oben schwach gefurcht. Das zweite Segment mit den übrigen zusammen hat ein birnförmiges Ansehen, indem es von der Seite schwach zusammengedrückt erscheint, namentlich wird dieses beim ♀ an der Spitze mehr ersichtlich als beim ♂. Beim ♂ ist auch die Spitze

des Hinterleibs nach abwärts gebogen, so dass der Hinterleib überhaupt dadurch stumpfer erscheint. Die Einschnitte zwischen den einzelnen Segmenten sind sehr fein, und diese selbst sehr stark verkürzt, fast querlinigt.

Wenn wir unsere Gattung *Xenotoma* von *Cinetus* unterscheiden wollen, müssen wir diejenigen Merkmale angeben, welche einen standhaften Unterschied begründen. Beide Gattungen lassen sich durch das Grössenverhältniss des *ramus marginalis* zu der Länge der Radialzelle, in so weit sie durch den *ramus postmarginalis* begränzt wird, sehr leicht unterscheiden, denn bei *Xenotoma* ist dieser *ramus marginalis* immer viel kürzer als die Radialzelle, ja meist nur von der Länge oder ein wenig länger als der *ramus stigmaticus*, während bei *Cinetus* der *ramus marginalis* in der Regel genau die Länge der Radialzelle hat. Diese Differenz ist durchgreifend für beide Geschlechter. Die ♀ beider Gattungen haben aber in den Fühlern ein eben so standhaftes als schönes Unterscheidungsmerkmal, indem bei *Xenotoma* die letzten Geisselglieder nie doppelt so lang wie breit, ja meist kaum etwas länger als breit sind, bei *Cinetus* sind sie aber alle langwalzig und meist mehr als doppelt so lang wie breit. Der Hinterleib der ♀ ist in beiden Gattungen flach, das dritte Segment verhältnissmässig lang, wenigstens immer länger als alle folgenden zusammen genommen. Ein kurzer griffelartiger Bohrer tritt bei beiden aus der Spitze des letzten Segments mehr oder weniger deutlich hervor, und dadurch unterscheiden sich beide wieder von anderen Gattungen auf leichte Weise.

Durch die eigenthümliche Bildung des Hinterleibs zeichnet sich das ♀ der Gattung *Leptorhaptus* sehr bald aus. Der Hinterleib besteht nämlich nur aus drei sichtbar hervortretenden Segmenten, dem mässig verlängerten Stiel, einem sehr grossen zweiten Segment, welches von der Seite mehr oder weniger stark zusammengedrückt ist, was auch namentlich bei dem dritten Segment immer der Fall ist. Auch die Bauchseite hat nur drei Segmente. Die Fühler sind sehr stark verlängert, die Geisselglieder langwalzig, obgleich nach der Fühlerspitze hin allmählig etwas kürzer werdend, das letzte Glied ist fast doppelt so lang, aber etwas dicker als das vorletzte. Das Mesonotum hat tiefe Furchen. Die Flügel sind mit einer vollkommen geschlossenen Radialzelle versehen; der *ramus marginalis* ist so lang oder kaum kürzer als der *ramus postmarginalis*, in so weit er nämlich die Radialzelle begränzt (er verlängert sich auch noch etwas über dieselbe hinaus,) der *ramus stigmaticus* entspringt fast unter einem rechten Winkel vom Vorderrande. Der Radialast (die Schlussader auf der Innenseite der Radialzelle) hat noch einen rücklaufenden etwas verwischten Fortsatz, welcher sich so krümmt, dass seine Verlängerung die Grundader nicht schneiden würde. Die Grundader selbst ist scharf ausgeprägt. Die ♂ unterscheiden sich von den ♀ blos durch vierzehngliedrige Fühler und die Bildung des Hinterleibs. Derselbe ist nicht so stark von der Seite zusammengedrückt und zeigt auf der Rückenseite acht Segmente, auf der Bauchseite nur sechs. Die Einschnitte zwischen denselben sind äusserst fein. Das zweite Segment ist sehr gross, die vier folgenden aber sehr kurz und auch die beiden letzten nicht besonders verlängert, deshalb erscheint der Hinterleib hinter dem zweiten Segment plötzlich stark verkürzt. Um die ♂ von denen der Gattung *Cinetus Jur.* zu unterscheiden muss man auf den Schaft und den Hinterleibsstiel sehen. Der erstere ist bei *Leptorhaptus* nur so lang wie das erste Geisselglied, der letztere oben glatt. Bei *Cinetus*

ist aber der Schaft länger als das erste Geisselglied und der Hinterleibsstiel oben mehr oder minder deutlich gefurcht.

Da wir die Gattung *Belyta* im Sinne der späteren Autoren in mehrere Genera aufgelöst haben, so werden wir auch die schwierige Frage über die Gattung *Cinetus Jur.* nicht umgehen dürfen. Vergleicht man die ganz dürftige und sehr ungenügende Charakteristik derselben bei *Jurine* *) so bleibt uns, wenn wir die fünfzehngliedrigen Fühler beim ♀, die vierzehngliedrigen beim ♂, die zweizähligen Mandibeln und den Mangel der Cubitalzellen in Abzug bringen, (weil dieses Alles auf mehrere Gattungen bezogen werden kann,) die „*cellula radialis una parva acuta*“ nur noch als einziger Anhaltspunkt übrig. Auch damit ist nicht viel anzufangen. Leider hat *Jurine* von *Cinetus* keine Abbildung gegeben und deshalb unterlag die richtige Auffassung dieser Gattung so grossen Schwierigkeiten, dass die späteren Schriftsteller alle in ihrer Deutung ebenso ungewiss wie unglücklich gewesen sind. Aber grade diese verfehlten Versuche mussten um so mehr ein Sporn sein, diesen schwierigen Punkt zu einer endgültigen Entscheidung zu bringen. In unsern Augen liegt nämlich eine viel grössere geistige Befriedigung darin, eine alte und lange verkannte Gattung wieder herzustellen, als eine neue an deren Stelle zu setzen. Der Weg, den wir dazu einschlagen, ist ein doppelter, einmal zu zeigen, dass die früheren Schriftsteller sich in der Deutung geirrt haben und dann, nach Abwägung aller Gründe, ein positives Resultat hinzustellen.

Latreille, den wir zuerst hierüber zu befragen haben, vermuthet, die *Cinetus* Arten seien die ♂ der Gattung *Belyta*, **) wofür indessen bei *Jurine* gar keine Anhaltspunkte gefunden werden können, und zwar um so weniger, da *Jurine* zwei ♂ und ein ♀ von *Cinetus* vor Augen hatte, welche er doch als zusammengehörig und von *Belyta* als verschieden betrachtete. Derselbe Schriftsteller hat, indem er sich zum Theil an die Abbildung von *Belyta bicolor Jurine* gehalten, zum Theil aber die vergrösserte Abbildung des Flügels auf Pl. 5 zu Grunde legte, von der Gattung *Belyta* ein nicht ganz unrichtiges Bild entworfen, blos in der Bildung der Radialzelle täuschte er sich, indem er sie für geschlossen hielt, weil *Jurine* sie in der oben angeführten vergrösserten Abbildung des Flügels als vollständig geschlossen durch Punkte abgegränzt hatte. In der Hauptabbildung ist die Radialzelle aber offenbar nicht geschlossen. Es ist daher nicht richtig, wenn auch *Haliday* die Gattung *Belyta Latr.* und *Cinetus Jur.* für identisch hält. ***) *Belyta Jur.* hat eine offene Radialzelle, wie ich oben nachgewiesen habe; aus der Angabe *Jurine's* über die Radialzelle von *Cinetus* †) scheint aber hervorzugehen, dass er diese für geschlossen hält.

*) *Jurine*, nouv. Méth. de class. l. Hym. etc., pag. 310.

**) Gen. Crust. et Ins. Tom. IV, pag. 37. „*Cineti dom. Jur. ejusdem Belytarum masculi videntur, aut ab illis saltem generice vix discerni possunt; antennarum enim forma pro sexu variat.*“ Dass die Form der Fühler nach dem Geschlecht abweiche, ist allerdings richtig, aber für die Meinung *Latreille's* ohne Gewicht, denn *Jurine* gründete ja seine Gattung *Cinetus* auf die Beobachtung und Untersuchung zweier ♂ und eines ♀ und das letztere hielt er natürlich generisch verschieden von seiner Gattung *Belyta*.

***) Ent. Mag. Vol. I, pag. 275. Add. „*Belyta Latr. et Cinetus Jur. idem sonant.*“

†) Nouv. Méth. de class. les Hym. etc., pag. 310. „*La cellule radiale des Cinètes forme un petit triangle scalène, dont le sommet est tourné vers le bout de l'aile*“.....

Nees von Esenbeck ist ebenfalls der Meinung, dass die Gattung *Cinetus Jur.* sich nicht entziffern lasse. *) Die von ihm unter dem Gattungsnamen *Cinetus* beschriebenen Arten können wegen des Dorns hinter dem Schildchen deshalb nicht dazu gerechnet werden, weil *Jurine* diesen Dorn gar nicht übersehen haben würde. Beide Arten, der *Cinetus picipes* und *Jurini Nees* gehören zu der von mir neu aufgestellten Gattung *Oxylabis*. Nur in Bezug auf die letztere Art, welche blos im männlichen Geschlecht beschrieben wurde, bleibt mir ein nicht zu lösender Zweifel, weil *Nees* bei diesem ♂ sechszehngliedrige Fühler annimmt. **) Nehmen wir auch an, dass er die *radicula* mitgezählt habe, (was er aber beim ♀ nicht thut) so würden doch noch fünfzehngliedrige Fühler herauskommen. Unter den Belytoiden hat aber, wie ich mit der grössten Bestimmtheit angeben kann, kein ♂ mehr oder weniger als vierzehn Glieder, daher bleibt mir obige Angabe ein Räthsel.

Auch bei den englischen Schriftstellern haben wir uns umzusehen, in welchem Sinne und Umfange sie die Gattung *Cinetus* angenommen haben. Die Meinung *Haliday's*, welcher *Belyta* und *Cinetus* für ein und dasselbe Genus hält, haben wir bereits zurückweisen müssen. *Westwood* hat die Gattung *Cinetus* ganz unbestimmt und offenbar im Gegensatz zu *Belyta* aufgefasst. Die Diagnosen beider Gattungen lauten bei ihm:

Belyta. Fühler beim ♀ fünfzehngliedrig, durchblättert, beim ♂ vierzehngliedrig, fadenförmig; Radialzelle eng, unvollständig.

Cinetus. Fühler beim ♀ fünfzehngliedrig, nach der Spitze hin dicker, beim ♂ vierzehngliedrig, lang und dünn; Radialzelle klein, dreieckig; Flügelscheibe ohne Adern.

In der Diagnose von *Belyta* finden wir nichts, was unserer Auffassung von *Belyta* widerspricht, aber auch nichts, was dieselbe genauer zu charakterisiren im Stande wäre. Aber in der Diagnose von *Cinetus* finden wir manchen Zusatz, der mit der *Jurine'schen* Diagnose nicht stimmt, oder in derselben nicht vorhanden ist. Zuerst heist es bei *Westwood*, die Fühler beim ♀ seien nach der Spitze hin dicker, bei *Jurine* aber heist es für beide Geschlechter ganz einfach: „*Antennae filiformes*.“ Bei *Westwood* finden wir ferner den willkürlichen Zusatz: „*Flügelscheibe ohne Adern*.“ Auch davon schweigt *Jurine*. Wir sehen hieraus klar, dass eine Uebereinstimmung zwischen den beiden Autoren nicht besteht. *Westwood* scheint alle Arten mit offener Radialzelle zu *Belyta*, mit geschlossener Zelle zu *Cinetus* rechnen zu wollen.

Um ein einigermaßen befriedigendes, positives Resultat zu erzielen, habe ich zuerst alles Unbestimmte aus der Diagnose des *Jurine* ausgeschieden, nämlich was er über die Fühler, Mandibeln und Cubitalzellen sagt. Es bleibt dann allein die Radialzelle übrig, über welche er sich etwas deutlicher ausdrückt. Die Radialzelle bildet, wie er sagt, ein ungleichseitiges Dreieck. Dass dieses Dreieck geschlossen sei, lässt sich wohl daraus entnehmen, weil *Jurine* das Gegentheil nicht anführt, wie er es doch bei *Belyta* ***) wirklich thut. Wenn aber die Radialzelle geschlossen ist,

*) Hym. ichn. aff. Monogr. Vol. II, pag. 348. „Species Jurineana, cujus feminam unam, mares duos ante oculos habuisse refert, mihi nullis auxiliis solvenda, neque scio, num una sit praecedentium.“

**) L. c. pag. 346. „Antennae fronti insertae, quindecim-vel sedecimarticulatae,“ und weiter auf der Seite 347: „Mares vix differunt a feminis, nisi antennis sedecimarticulatis.“

***) Nouv. Méth. de class. I. Hym. etc., pag. 311. „Les ailes enfin ont une cellule radiale, dont la nervure est quelquefois si peu opaque, qu'on ne l'aperçoit qu'à peine.“ (La nervure ist hier offenbar der ramus radialis!)

dann haben wir sie in unserm Conspectus auch nur unter den Gattungen mit geschlossener Radialzelle zu suchen. Diese sind: Acropiasta, Leptorhaptus, Cinetus nob., Xenotoma, Anectata, Pantoclis, Macrohynnis und Miota. Eine weitere Angabe *Jurine's*, dass das erste Segment *lang* und *oben gefurcht* sei, schliesst die Gattung Acropiasta, Pantoclis und Anectata wegen des kurzen, und die Gattung Leptorhaptus wegen des glatten Hinterleibsstieles aus, so dass die Wahl noch zwischen vier Gattungen allein schwankend sein kann, nämlich zwischen Xenotoma, Macrohynnis, Miota und Cinetus nob. Bei Macrohynnis und Miota finden wir den Stiel des Hinterleibs zwar etwas länger als das Metanotum, aber das berechtigt nicht ihn schon im Sinne von *Jurine* lang zu nennen. In den beiden andern Gattungen finden wir aber einen mehr verlängerten Stiel. Derselbe ist bei Xenotoma nicht so lang und mehr glatt, selten schwach gefurcht, bei Cinetus nob. aber sehr lang und meist sehr tief gefurcht. Eben so sind die Fühler bei Cinetus nob. sehr lang gestreckt und vorzugsweise *fadenförmig*, bei Xenotoma dagegen sind die letzten Geisselglieder oft kaum etwas länger als breit und die Geissel sieht daher an der Spitze manchmal mehr *schnurförmig* aus. Zwischen beiden Gattungen kann die weitere Angabe *Jurine's*: „Le point de l'aile est à peine visible, n'étant formé que par un léger renflement de la nervure“ keine Entscheidung bringen, da sich nicht ermitteln lässt, ob *Jurine* das Randmal (point de l'aile) in den ramus marginalis oder stigmaticus setzt. In unserer Gattung Xenotoma finden wir zwar einen kurzen ramus marginalis, der etwas verdickt ist und das Randmal vorstellen könnte, aber bei Cinetus ist derselbe ebenfalls bei einzelnen Arten etwas kräftiger, und der ramus stigmaticus ist an seiner Spitze sogar in beiden Gattungen etwas verdickt.

Auch die übrigen mehr untergeordneten Merkmale, welche *Jurine* seiner Gattung Cinetus zuertheilt, in so weit sie nämlich den Metathorax, *) welcher mit zwei kleinen Dörnchen versehen sein soll, den Bauch ferner, der ein wenig flach aber nicht so flach wie bei der Gattung Belyta und endlich den Stiel des Hinterleibs, der behaart und manchmal gebogen sein soll, betreffen, so finden wir dieses Alles auch bei derjenigen Gattung wieder, für welche wir den Namen Cinetus in Anspruch nehmen. Mit der grössten Zuversicht können wir daher, gestützt auf die vorangehenden Bemerkungen, die Gattung Cinetus im Sinne von *Jurine* als hergestellt betrachten, nachdem wir alles ihr Fremdartige davon ausgeschieden haben.

Als eine seltene Erscheinung müssen wir unter den Belytoiden die Gattung Anommium wegen der fehlenden Nebenaugen betrachten. Obgleich, im Ganzen genommen, im Habitus mit den ungeflügelten Arten der Gattung Aclista übereinstimmend, hat sie doch auch noch andere auffallende Merkmale. Die Fühler sind nämlich vierzehngliedrig, die Geisselglieder nach der Spitze allmählig dicker werdend, das letzte Glied besonders stark entwickelt, kurz, stumpf, fast rundlich und viel dicker als das vorhergehende. Auch die Tarsen sind ausgezeichnet, die Ferse ist nicht besonders lang, das zweite bis vierte Glied sogar kurz, das letzte dagegen so lang wie die beiden vorhergehenden zusammen, mit starker Klaue. Von Flügeln ist keine Spur vorhanden.

Wenn wir die Fühlerbildung allein in Betracht ziehen, dann haben wir in der Gattung Diphora unstreitig die merkwürdigste Form unter den Belytoiden vor uns. Nicht nur erreicht der

*) L. c. Le corselet des Cinètes n'est pas prolongé postérieurement, comme celui des Codres, et il est armé de deux petites épines. Leur ventre est un peu aplati, mais moins que celui des Bélytes, et il est porté par un pétiole long, sillonné en dessus, velu et quelquefois arqué.

Schaft eine ansehnliche Länge, sondern es hat auch das erste Geisselglied absolut die Länge des Schaftes, während die übrigen Geisselglieder, mit Ausnahme des letzten, sehr kurz und sogar breiter als lang sind, wodurch die Geissel überhaupt ein schnurförmiges Ansehen gewinnt. Nicht mit Unrecht durften wir daher die Fühler scheinbar wie mit einem Doppelschaft ausgerüstet, ansehen. Das Mesonotum hat deutliche und tiefe Furchen der Parapsiden. Der Hinterleib besteht aus drei Segmenten, der Stiel ist kurz und dick, das zweite Segment sehr gross, das dritte, von dem zweiten durch eine deutliche Naht getrennt, erreicht die Länge des Stiels und aus seiner Spitze tritt ein sehr kurzer Griffel wie aus einem Tubus hervor. Der Flügel hat eine vollkommen geschlossene Radialzelle; der ramus marginalis ist sehr kurz, ja sogar kürzer als der unter einem sehr schiefen Winkel entspringende ramus stigmaticus. Der ramus postmarginalis setzt sich über die Spitze der Radialzelle nur auf eine sehr kurze Strecke fort. Die Radialzelle ist stark verlängert, nicht breit, der ramus radialis derselben hat einen kurzen, verwischten und nur wenig gebogenen Fortsatz, welcher in seiner Verlängerung die deutlich ausgeprägte Grundader nicht schneidet. Ich kenne von dieser ausgezeichneten Gattung nur eine einzige Art, welche ich *Diphora Westwoodii* nennen will, um dadurch das Andenken eines berühmten Entomologen zu ehren, der sich nicht nur um die Hymenopteren im Ganzen, sondern auch speziell um die Gruppe der Proctotrupen, durch die Begründung mehrerer vortrefflich charakterisirter Gattungen, ein nicht genug zu würdigendes Verdienst erworben hat.

Unter den Gattungen, deren Hinterleibsrücken acht deutlich hervortretende Segmente wahrnehmen lässt und die zugleich eine geschlossene Radialzelle haben, werden wir mit leichter Mühe die Gattung *Zelotypa* an den stark verlängerten Fühlern, deren Geisselglieder alle gestreckt und walzenförmig sind, erkennen. Die Grösse der einzelnen Glieder nimmt zwar nach der Spitze hin allmählig ab, aber das vorletzte ist immer noch wenigstens ein und ein halbmal so lang wie breit. Das Metanotum hat keine deutlich vorspringenden Seitenzähne. Der Stiel des Hinterleibs ist kaum länger als das Mesonotum, stielrund, stark gefurcht, und diese Furchen setzen sich auch noch auf die deutlich verschmälerte Basis des zweiten Segments, welche dadurch gleichsam als eine Fortsetzung des Stiels erscheint, fort. Das zweite Segment ist sehr gross, breit, die folgenden kurz, nur die beiden letzten ein wenig länger, so dass der Hinterleib sich vom dritten Segment ab, gleichsam aus breiter Basis, schnell zuspitzt. Die Flügel haben eine lange, schmale völlig geschlossene Radialzelle; der ramus marginalis ist stark halb so lang wie die Radialzelle; der ramus stigmaticus entspringt fast unter einem rechten Winkel und der ramus radialis hat einen rücklaufenden Fortsatz, welcher bei seiner Verlängerung die Grundader nicht schneiden würde. In Bezug auf die Fühler schliesst sich *Zelotypa* an *Cinetus*, *Macrohynnis*, *Miota* und *Leptorhaptus* an, weniger schon an *Xenotoma*, aber von allen diesen Gattungen schliesst sie sich durch die Bildung des Hinterleibs aus, sowie auf der andern Seite durch die Form des Hinterleibs zwar eine Annäherung an *Pantoclis*, *Anectata* und *Aclista* nicht zu verkennen, aber durch die Fühlerform eine Abtrennung durchaus gerechtfertigt erscheint.

Von zusammengedrückter, ganz eigenthümlicher Form erscheint der Hinterleib bei der Gattung *Miota*, weshalb die Bestimmung derselben keiner besonderen Schwierigkeit unterliegt. Von der Seite gesehen ist derselbe nämlich einer Pflugschaar nicht unähnlich, auf der Rücken- wie auf

der Bauchseite nur aus drei sichtbar hervortretenden Segmenten bestehend; das erste oder der Stiel ist nur wenig länger als das Metanotum, das zweite dagegen übermässig entwickelt, nach hinten fast röhrenförmig zugespitzt, so dass das dritte Segment gleichsam als ein kurzer etwas aufwärts gebogener Griffel aus der tubusartigen Verlängerung des zweiten hervorkommt. Die Fühler sind stark verlängert, alle Geisselglieder langwalzig und nach der Spitze hin gar nicht verdickt. Die Radialzelle ist vollkommen geschlossen, der ramus marginalis ungefähr halb so lang wie die Radialzelle; der ramus stigmaticus entspringt unter einem schiefen Winkel. Der rücklaufende Fortsatz des ramus radialis schneidet, wenn auch verlängert, die Grundader nicht. Dieses neue Genus nähert sich unter allen am meisten Leptorhaptus, aber die höchst eigenthümliche Gestaltung des zweiten Segments liess eine Vereinigung mit dieser Gattung nicht zu.

31. Heloroidae m. Die Gattung Helorus, welche *Latreille* im Jahre 1802 in der „Histoire natur. d. Crust. et d. Ins., tom. XIII, pag. 230“ aufstellte, wurde auf den *Sphex anomalipes* *Panz.* (siehe Fauna germ. LII, 23 und C, 18) gegründet. *Latreille* erkannte in so fern schon den wahren Charakter dieser durch das Flügelgeäder so charakteristischen Gattung, als er sie von den Sphegiden zu den Proctotrupiden stellte. Den natürlichen Charakter findet man bei *Latreille* („Genera Crust. et Ins., tom. IV, pag. 38“) und *Nees* („Hym. ichn. aff. Monogr., vol. II, pag. 362“) weitläufig entwickelt. In Bezug auf ihre Stellung herrschte bis jetzt noch grosse Verwirrung. *Latreille* und *Nees* bringen sie in die Nähe von Proctotrupes (*Codrus* *Nees*), während *Westwood* sie zu den Diaprioiden stellt. In Wahrheit aber passt sie weder zu der einen Gattung, noch in der anderen Stellung unter den Diaprioiden, so dass der Gedanke nahe liegen musste, für sie allein eine eigene Familie zu bilden. Das eigenthümliche Flügelgeäder erweist sich so abweichend von allen bisher betrachteten Gattungen, dass schon hierin ein deutlicher Fingerzeig liegt, sie als typische Form zu betrachten, nicht etwa als eine höhere Entwicklungsstufe in der einen oder anderen Familie, nämlich der Diaprioidae oder der Proctotrupoidae (im engeren Sinne). Da meines Wissens noch kein Schriftsteller das Flügelgeäder von Helorus so entwickelt hat, dass wir den Verlauf der Hauptadern gehörig verfolgen könnten, so will ich hier etwas ausführlicher darauf eingehen und bemerken, dass ich die seltsam gekrümmte Ader, welche in der vorderen Schulterzelle auftritt, theilweise für die Grundader (im Sinne *Hartig's*) ansehe, welche, aus der Mittelader entspringend, sich nicht mit der Unterrandader verbunden hat, sondern gleichsam auf halbem Wege abgebrochen erscheint. Grade in dem Punkte nun, wo sie abbricht, entspringt die Cubitalader fast oder gradezu unter einem rechten Winkel, nimmt aber eine solche Richtung, dass sie sich in einiger Entfernung mit der Mittelader vereinigt, hierauf aufwärts gewendet, verbindet sie sich mit der vom Radius herablaufenden Cubitalquerader und geht von diesem Vereinigungspunkt aus in grader Richtung zur Flügelspitze hin. Etwas tiefer als die Cubitalader mündet die Mittelader am Hinterrande des Flügels. Da, wo die Grundader so plötzlich abbricht, lässt sich doch mit einiger Aufmerksamkeit noch eine ganz verwischte Spur derselben, die bis zur Unterrandader hingeht, erkennen; diese, so geringfügig sie auch an sich sein mag, ist hier von grosser Wichtigkeit, da sie sowohl jeden Zweifel an der Richtigkeit unserer Deutung der Grundader, als auch der Cubitalader gänzlich beseitigt. Werfen wir nun ferner auch nur einen flüchtigen Blick auf die Zellen, so wird deren Bestimmung nicht die geringste Schwierigkeit mehr zeigen. Wir haben eine völlig geschlos-

sene Radialzelle und zwei Cubitalzellen, von welchen die erste wegen der abgebrochenen Grundader nicht vollständig geschlossen, sondern mit der vorderen Schulterzelle sich vereinigt, was allerdings ein höchst seltener Fall ist. Die zweite Cubitalzelle liegt unter der Radialzelle, ist sehr gross und erstreckt sich bis zur Flügelspitze. Von sehr auffallender Bildung erscheinen aber hier die beiden Diskoidalzellen. Ihre Auffindung und Bestimmung wird nicht schwer fallen, wenn man nur fest hält, dass der ganze Raum zwischen der Cubital- und Mittelader das eigentliche Diskoidalfeld ist, welches durch die rücklaufenden Adern (Diskoidalqueradern wäre eine bessere Benennung dafür!) in zwei oder drei Zellen getheilt wird. Hier sind nun zwei Diskoidalzellen vorhanden, aber keine rücklaufende Ader, ein seltener, ja ein ganz abnormer Fall, und doch lässt sich diese Bildung sehr leicht dadurch erklären, dass die Cubitalader sich mit der Mittelader in einem bestimmten Punkte vereinigt. In diesem Punkte haben wir, wenn einmal als feststehend angenommen werden sollte, dass zur Bildung zweier Diskoidalzellen immer eine rücklaufende Ader vorhanden sein müsse, grade die rücklaufende Ader zu suchen; wenn man also nicht sagen will, es ist keine rücklaufende Ader vorhanden, so kann man auch umschreibend sagen, sie sei auf einen blossen Punkt zusammengeschrumpft. Die Zelle also, welche den Schriftstellern so auffallend schien, ist die erste Diskoidalzelle und sie ist, der eben entwickelten Ansicht gemäss, gleichsam nur durch einen Punkt von der zweiten getrennt.

Ueber die Lebensweise dieser seltenen Gattung habe ich bei den einzelnen Schriftstellern nichts in Erfahrung bringen können; ich habe aber den *Helorus anomalipes* Pz. aus Puppen von *Hemerobius* erzogen, und wenn ich nicht irre, auch Herr von *Heyden*. Es ist also *Helorus* ganz zuverlässig eine parasitische Gattung. In meiner Sammlung befinden sich drei Arten, welche sich ziemlich leicht in folgender Weise unterscheiden lassen:

- a. Die Fühler rothgelb *ruficornis* m. ♀.
- aa. Die Fühler schwarz.
 - b. Mesonotum ganz grob runzlig; Beine ganz schwarz. *nigripes* m. ♂.
 - bb. Mesonotum ganz glatt; Schienen und Tarsen rothgelb. *anomalipes* Pz. ♂.

Bemerkung. Nees hat den *Helorus ater* Jur. zum *anomalipes* Pz. gezogen, mit welchem Rechte, ist mir nicht klar geworden, da der erstere ganz schwarze Beine hat. Ich vermüthe, dass der von *Jurine* abgebildete *Helorus ater* mein *nigripes* ist, doch bin ich meiner Sache nicht ganz gewiss. *Jurine* hat von *Helorus ater* keine Beschreibung gegeben, es ist also über die Sculptur irgend eine Auskunft zu erhalten nicht möglich. Ferner ist in der Zeichnung des Flügels bei *Jurine* die Grundader vollständig entwickelt dargestellt, was nicht unmöglich erscheint, bei meinem Exemplar aber nicht der Fall ist, und dadurch wird, wie mir scheint, eine bedeutende Differenz konstatirt. An dem Fühler hat *Jurine* das kleine (aber doch leicht aufzufindende) Ringel übersehen, er nennt deshalb den Fühler fünfzehngliedrig, während ich mit dem Ringel sechszehn Glieder zähle. Endlich bin ich auch der Meinung, dass der Name *Jurine's* aus dem Grunde wegfallen müsse, weil von ihm keine Beschreibung existirt.

Nachtrag.

Den Grundsätzen folgend, die der Nomenclator zoologicus von *Agassiz* entwickelt hat, bemühte ich mich, alle Namen, welche dem Prioritätsrechte nach beseitigt werden mussten, oder mit gleicher Bildung durchaus denselben Sinn verbanden, theils auch durch gleichen Laut (z. B. *Eucomis* und *Eucomys*!) Verwirrung oder Zweifel erregen konnten, zu entfernen. Dennoch sind einige nothwendige Verbesserungen meiner Aufmerksamkeit entgangen, so dass ich hier noch die Abänderung folgender Gattungsnamen in Vorschlag bringen muss:

1. Auf Seite 100 und 102 muss *Baeus Hal.* wegen der älteren Gattung *Baea Comm.* wegfallen. Er kann zweckmässig durch *Hyperbaeus* *) ersetzt werden.
2. Auf Seite 40 wird die Gattung *Calypso Hal.* zu unterdrücken sein, da sie erst im Jahre 1841 gegründet wurde, während *Rich. Ant. Salisbury* in seinem Werke: „Paradisus Londinensis, or coloured figures of plants, cultivated in the vicinity of the metropolis. London 1800—1806. 2 Bände“ einer Orchideengattung denselben Namen beilegte. Ich schlage dafür den Namen *Euryphrys* **) vor.
3. Auf Seite 116 und 119, *Camptoptera m.* schlage ich vor in *Pteroclis* ***) zu verändern, da bereits durch *Presl* der gleichbedeutende Name *Camptopteris* in die fossile Flora eingeführt wurde.
4. Auf Seite 107 und 111 muss *Catillus* ausfallen, weil schon mehrere Gattungen unter diesem Namen aufgeführt werden. Ich substituire dafür *Piestopleura*. †)
5. Auf Seite 83. Ueber die Gattung *Diglyphus Hal.*, von welcher *Walker* zwei Arten in dem Appendix zu der List of the spec. of Hym. ins. p. II., Lond. 1848, pag. 235—36 beschreibt, ohne eine Gattungscharakteristik zu geben, ist zu bemerken, dass bereits *Blume* in seiner *Flora Javae Bruxellis* 1828—29 eine Orchideengattung unter dem Namen *Diglyphis* bekannt gemacht hat. Es wird daher *Diglyphus* jedenfalls ausfallen müssen. Ich halte sie für synonym mit *Asecodes m.*
6. Auf Seite 32 und 34 vertausche man *Discodes m.* mit *Phaenodiscus* ††) weil schon eine Gattung *Discoidea* und zwei *Discoides* vorhanden sind.
7. Auf Seite 108 und 113 ist statt *Ectadius* der Name *Polymecus* †††) einzuführen, da bereits eine Gattung *Ectadium* von *E. Meyer* unter den *Apocynaceen* vorkommt.
8. Auf Seite 32 und 34. Die Gattung *Eucomys*, welche wir von *εὖ* und *κόμης* ableiten, stimmt mit der Gattung *Eucomis Herit.* unter den *Liliaceen* dem Wortlaute nach überein; obgleich

*) *Hyperbaeus* von *ὑπέρ*, über, übermässig, über das Maass hinaus und *βαίος*, ἡ, ὀν, klein, gering.

**) *Euryphrys* von *εὐρύς*, εἶα, ὕ, breit und *ὄφρυς*, ἡ, die Stirn. Durch die weit abstehenden Augen in beiden Geschlechtern wird die Stirn sehr breit.

***) *Pteroclis* von *πτερός*, τό, der Flügel und *κλίσις*, ἡ, die Biegung. Dieser Name deutet wie der frühere dasselbe Merkmal an.

†) *Piestopleura* von *πιεστός*, ἡ, ὀν, gedrückt und *πλευρά*, ἡ, die Seite.

††) *Phaenodiscus* von *φαίνω*, deutlich machen, zeigen und *δίσκος*, ὁ, die Scheibe.

†††) *Polymecus* von *πολύς*, viel und *μήκος*, τό, die Länge.

nun letztere wohl von *ἐνκόμης* schön geschmückt, herzuleiten ist, so schlage ich doch vor, dem älteren Namen *Eucomis* unsere neue Gattung zu opfern und *Eucomys* nob. in *Comys* *) abzuändern.

9. Auf Seite 84 und 86 fällt der Gattungsname *Hyperteles* aus und wird durch *Oxymorpha* **) ersetzt, weil bereits von *E. Meyer* unter den *Portulaceen* eine Gattung gleichen Namens aufgeführt wird.
10. Auf Seite 53 und 57 verwandle man den Namen *Micromelus* *Walk.* in *Baeotomus*. ***) „*Blume* stellte bereits früher in dem Werke „*Bydragen tot de Flora van Nederlandsch Indie. Batav. 1825*“ eine Gattung *Micromelum* unter den *Aurantiaceen* auf.
11. Auf Seite 47 und 51. *Prosopon* wurde im Jahre 1835 bereits von *Herm. von Meyer* an eine *Crustaceen* Gattung und erst 1837 von *Walker* an eine *Hymenopteren* Gattung vergeben; der *Walker*'sche Name muss deshalb eingehen und kann durch *Pegopus* ****) vertreten werden.
12. Auf Seite 84 muss die Gattung *Pterothrix* durch *Gyrolasia* †) ersetzt werden. Der von *Westwood* *Pteroptrix* geschriebene, von *Nees* emendirte Namen, fällt mit einer Pflanzengattung des *De Candolle* unter den *Compositen* zusammen.
13. Auf Seite 31 muss der Name *Ratzeburgia* aus einem doppelten Grunde wegfallen, einmal weil er mit *Eusandalum* *Ratzeb.* ein und dasselbe Genus bildet, dann aber auch, weil schon unter den *Gramineen* von *Kunth* der Name *Ratzeburgia* längst eingeführt worden ist.
14. Auf Seite 83 und 84. *Triphasius* muss in *Plastocharis* ††) umgeändert werden. Während der Name *Thysanus* beseitigt und durch *Triphasius* ersetzt wurde, hatte ich übersehen, dass *Loureiro* auch bereits eine Gattung *Triphasia* begründete.
15. Auf Seite 59 und 60. Den Namen *Urolepis* ändere ich in *Halizoa* †††) um, weil der *Prod.* von *De Candolle* V. 136 denselben schon für eine Gattung unter den *Eupatoriaceen* in Anspruch genommen hat.
16. Auf Seite 43 und 44 wird der Name *Glyphomerus* in *Oligosthenus* umzuändern sein. Aus den Tageblättern (und zwar aus Nro. 6, S. 121) der 32. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien, im Jahre 1856 ersehe ich so eben, dass die Gattung *Glyphomerus* für eine *Staphylinen*-Gattung von *Müller* in Anspruch genommen worden und zwar für ein Thierchen, welches *Kraatz* *Typhlobium* genannt hatte. Diesem muss der

*) *Comys* von *κόμης*, ἡ, der Bündel, Büschel.

**) *Oxymorpha* von *ὀξύμορφος*, spitz gestaltet. Bezieht sich auf die lang gestreckte spitze Körpergestalt.

***) *Baeotomus* von *βαίος*, ἄ, ὀν, klein, gering und *τόμος*, ὅ, der Theil. Bezieht sich auf die drei kleinen Glieder der Geißel (Ringel.)

****) *Pegopus* von *πηγός*, ἡ, ὀν, gedrunken, stark, kräftig und *πούς*, ὅ, der Fuss. Der Name bezieht sich auf den starken Mittelfuss.

†) *Gyrolasia* von *γυρός*, ἄ, ὀν, rund, rund umher und *λάσιος*, ἰα, ἰον, dicht behaart.

††) *Plastocharis* von *πλαστός*, ἡ, ὀν, formend, bildend und *χάρις*, ἡ, die Anmuth.

†††) *Halizoa* von *ἑλίζωος*, ον, im, am oder vom Meere lebend. Da diese Gattung sowohl am Meeresufer wie an Salzsoolen vorkommt, indem sie hier die Dipterengattung *Coenia* verfolgt, deren Larven in der Soole selbst leben, so enthält der Name eine leicht verständliche Deutung.

Name *Glyphomerus* verbleiben, während unsere Gattung also in Zukunft *Oligosthenus* *) heissen wird.

Die Gattung *Metopon* *Walk.* (= *Metopum* *em.*) Seite 64 und 68 fällt ganz aus dem *Conspectus* der *Pteromaloiden* aus, weil *Walker* sie als ♀ zu *Dichalysis* (= *Psilocera* *Walk.*) zieht.

Hadroceras, welche nach ihren allgemeinen Merkmalen der Gattung *Calliceras* *Nees* angehörte, fällt nach Ausweis des Original Exemplars mit *Lagynodes m.* (= *Microps* *Hal.*) zusammen, und ist weiter nichts als ein ♂ dieser ungeflügelten *Lagynodes* Arten.

Bei der von *Ratzeburg* aufgestellten Gattung *Dendrocercus* habe ich Folgendes zu bemerken: Diese Gattung wird sich aus einem zweifachen Grunde nicht halten lassen, einmal weil das einzige Merkmal, worauf *Ratzeburg* dieselbe begründete, nämlich die kammstrahligen Fühler, nur sexuell ist, folglich ein Gattungscharakter nicht angegeben wird; zweitens, weil der Name selbst für die Gattung, welcher das Thierchen angehört, ganz unpassend sein würde, da die übrigen ♂ alle gesägte Fühler haben. In Bezug auf die Zeichnung habe ich zweierlei Ausstellungen zu machen: Die Fühler haben nach der Abbildung nur zehn Glieder, sind aber wirklich eifgliedrig; dann wird das Mesonotum ohne Näthe dargestellt, auch diese werden nicht fehlen, wenn genauer nachgesehen wird. Selbst die von *Ratzeburg* erzogene Art hat *Haliday* schon längst unter dem Namen *Ceraphron damicornis* beschrieben, ich besitze ein Exemplar von ihm selbst und habe auch dasselbe Thierchen in der Sammlung des Herrn von *Roser* in Stuttgart gesehen. In der Beschreibung von *Ratzeburg* finde ich übrigens noch einen Passus, woran ich, weil er mir völlig unverständlich, Anstoss nehme, er sagt: „Vielleicht liesse sich noch der Mangel von Näthen, welchen man bei *Ceraphron*(?) bemerkt, als Merkmal anführen.“ Sowohl bei *Ceraphron* im Sinne von *Ratzeburg* (= *Megaspilus* *Westw.*) als auch bei dem in Rede stehenden *Dendrocercus* sind die Näthe des Mesonotums vorhanden und deshalb ist mir der Sinn der angeführten Worte nicht klar geworden. Die Gattung, welcher *Dendrocercus* als ♂ angehört, wird man nach beiden Geschlechtern vollständig charakterisirt in dem *Conspectus* der *Ceraphronoiden* unter dem Namen *Lygocercus* finden.

Die von *Ratzeburg* unter dem Namen *Coccobius* im 3. Bande der *Forstins*. S. 195 erwähnte Gattung fällt mit *Coccophagus* *Westw.* zusammen, und muss deshalb beseitigt werden.

Die Gattung *Hybothorax* *Ratzeb.* (s. *Forst.* I. Band, S. 209) habe ich nicht entziffern können, sie soll zwischen *Chalcis* und *Eurytoma* in der Mitte stehen und einen sitzenden Hinterleib haben.

Es bleiben mir hier auch noch einige Synonyme zu berichtigen übrig, nämlich: *Heterolepis* *Nees* = *Anteon* *Jur.*, *Priomerus* *Walk.* = *Palmon*, *Stenomesus* *Westw.* = *Elachistus* und *Campylonyx* *Westw.* = *Dryinus* *Latr.* Die Zusammenstellung der beiden letzten Gattungen ist mir aber noch etwas zweifelhaft. Die Gattungen *Schizonotus* und *Pterolycus* *Ratzeb.* sind von *Pteromalus* abgetrennt, die erstere scheint mit *Seladerma* *Walk.* identisch zu sein, ob die zweite sich als eigene Gattung halten kann, dürfte sich erst nach Ansicht von Original Exemplaren entscheiden lassen. *Tritypus* *Ratzeb.* könnte vielleicht *Eunotus* *Walk.* sein.

*) *Oligosthenus* von *ὀλγος*, α, ον, wenig und *σθένος*, τό, die Stärke, Kraft. Es findet in dem Namen die Beziehung zu den hintersten Schenkeln Statt, welche nicht wie bei *Monodontomerus* mit einem Zahn versehen sind.

Auch in Betreff des Familiencharakters der Mymaroiden und Heloroiden habe ich eine wichtige Correctur anzugeben. Für die erstere Familie kann ich jetzt ein standhaftes und sicheres Merkmal angeben. Dieses liegt, wie mich wiederholte Untersuchungen überzeugt haben, in der Stellung der Fühler. Dieselben stehen nicht nur sehr weit über dem Mundrande, sondern, was viel wichtiger ist, weit von einander getrennt und dem innern Augenrande stark genähert.

In dem Familiencharakter der Heloroiden auf Seite 20 findet man die folgende Angabe: „Vorderflügel mit einer unregelmässigen, die Unterrandader nicht erreichenden, gekrümmten Grundader, welche eine unregelmässige Zelle in der vorderen Schulterzelle bildet.“ Dieser Ausdruck ist, wie folgt, abzuändern: Vorderflügel mit einer abgebrochenen Grundader, von deren Spitze eine, durch unregelmässigen Verlauf ausgezeichnete Cubitalader entspringt; beide zusammen bilden eine unregelmässige erste Diskoidalzelle.

Ein kurzer Rückblick auf das Resultat der vorliegenden Arbeit mag hier noch gestattet sein. Es wurden im Ganzen 291 Gattungen nebst deren Synonyme untersucht, in schematische Uebersichten gebracht, und weiter besprochen; von dieser grossen Anzahl enthält meine Sammlung 273, so dass mir nur noch 18 fehlen, nämlich: *Dirrhinus Dalm.*, *Calypso Hal.*, *Cephalonomia*, *Macrotelea*, *Ectroma* und *Hemisius Westw.*, ferner *Stenocera*, *Metallon*, *Caudonia*, *Prosopon*, *Notanisus*, *Euneura*, *Iso-cyrtus*, *Tityros*, *Meromalus*, *Tetramesa*, *Macromesus* und *Caraphractus Walk.* Diese fehlenden Gattungen führe ich hier an, weil mir deren Erwerb aus befreundeter Hand sehr angenehm sein würde. Hieran fühle ich mich gedrungen noch folgende Bemerkung zu knüpfen: Sehr häufig hört man die Klage über Vervielfältigung der Gattungen und man verbindet damit die Idee, das Studium müsse dadurch ganz besonders erschwert werden, ohne zu bedenken, dass das angehäuften Material eine Theilung nothwendig erfordert, um den Ueberblick, selbst über kleinere Gebiete möglich, zu machen. Es ist ein grosser Irrthum, wenn man glaubt, die Wissenschaft könne auf dem einmal eingenommenen Standpunkt stehen bleiben und Alles lasse sich in die bereits bestehenden Fächer einreihen. Wo eine zu grosse Zersplitterung Statt findet, mag man, statt der leeren Klagen, Hand anlegen und zeigen, dass dieselbe überflüssig oder unzulässig sei. Wenn aber, gestützt auf langjährige Beobachtungen, mit grosser Mühe eine Eintheilung zu Stande kommt, die man praktisch zu erproben oft genug Gelegenheit hatte, die den unendlichen Zeitverlust, der mit schwierigen Untersuchungen grosser Familien mit artenreichen Gattungen verknüpft ist, beseitigen soll, dann glaube ich, stösst man grade das Mittel von der Hand, welches das Studium erleichtern soll und sichere Resultate möglich macht. Ich werde daher auch bei dieser vorliegenden Arbeit ruhig den Vorwurf zu grosser Theilung vertragen können, überzeugt, dass alle, welche sich ernstlich mit dem Studium dieser kleinen Geschöpfe beschäftigen, die Früchte unserer mühsamen Arbeiten erndten und uns ein dankbares Andenken erhalten werden.

In dem Nomenclator von *Agassiz* finde ich aus beiden Gruppen noch sieben und achtzig Gattungen angeführt, von welchen mir achtzehn als exotische bekannt sind. Ob von dem Rest, d. h. von neun und sechzig Gattungen, alle aussereuropäisch sind und wie es mit der Synonymie derselben beschaffen, darüber vermag ich gar keine Auskunft zu geben, da mir die betreffende englische Literatur nur in einer beschränkten Masse zu Gebote steht. Jedenfalls wird man aus den angeführten Zahlen erkennen können, dass diese beiden Gruppen bereits unter den Hymenop-

teren bedeutend prädominiren. Einzelne Gattungen, namentlich unter den Chalcidien, scheinen die grösste räumliche Verbreitung zu haben, so dürfte vielleicht die Gattung *Pteromalus* nicht nur in allen Welttheilen, sondern auch auf allen grösseren Inseln der Erde sich vorfinden und das passendste Beispiel einer ganz allgemeinen Verbreitung abgeben. Der Name der Pteromalinen würde deshalb dieser Gruppe noch in einem höheren Sinne als ein ganz passender zuertheilt werden können, wenn nicht dem Prioritäts-Prinzip getreu die von *Spinola* eingeführte Benennung der Chalcidien beibehalten werden müsste.

Nach dieser schematischen Aufstellung der Gattungen werde ich in ähnlicher Weise eine dichotomische Auseinandersetzung der Arten folgen lassen. Da ich diese bis auf die schwierige Gattung *Pteromalus* bereits ausgearbeitet vor mir habe, so kann schon in dem rasch folgenden, nächsten Hefte damit begonnen werden.



Verzeichniss der Familien und Gattungen.

(Die arabische Ziffer bedeutet die Seitenzahl.)

A.

Acerota m. 107.
Aclista m. 128, 135.
Acolus m. 100, 102.
Acrocormus m. 66, 70.
Acropiesta m. 129, 135.
Aglyptus m. 33, 36.
Agonioneurus Westw. 30.
Alaptus Walk. 116, 117, 120.
Allotropa m. 106, 109.
Amblyaspis m. 107, 112.
Amblymerus Walk. 64, 69.
Anagrus Hal. 117, 121.
Anaphes Hal. 117, 121.
Anectata m. 129, 136.
Aneure Nees. 72.
Aneurhynchus Westw. 122, 124.
Anognus m. 59, 61.
Anommatium m. 130, 140.
Anopedias m. 108, 114.
Anozus m. 84, 85.
Anteon Jur. 91, 93.
Anteris m. 101, 103.
Antophorabia Newp. 75.
Anusia m. 32, 35.
Apegus m. 101, 104.
Aphelinus Dalm. 30.
Aphelopus Dalm. 91, 93.
Aprostocetus Westw. 86.
Arescon Walk. 120.
Arthrolysis m. 52.
Asaphes Walk. 58.
Accecodes m. 79, 82.
Astichus m. 78, 80.
Asynacta m. 87, 89.
Ateleopterus m. 95, 96.
Aulogymnus m. 72, 73.

B.

Baeoneura m. 100, 102.
Bacotomus m. 145.
Baeus Hal. 100, 102, 144.
Baryconus m. 101, 104.
Baryscapus m. 84, 86.
Basalys Westw. 122, 126.
Belyta Jur. 128, 133.
Belytoidea m. 20, 28, 127.
Bethyloidea m. 95.
Bethylus Latr. 95, 96.
Bothriothorax Ratzeb. 32, 34.
Brachista Walk. 90.
Brachymeria Westw. = *Chalcis*.
Brachysticha m. 88, 90.

C.

Caenacis m. 64.
Calleptiles Hal. 89.
Calliceras Nees. 98.
Callimome Spin. 43.
Calosoter Walk. 31.
Calotelea Westw. 106.
Calypso Hal. 40, 144.
Campoptera m. 116, 119, 144.
Campylonyx Westw. 146.
Caraphractus Walk. 117.
Caratomus Dalm. 51, 53.
Catillus m. 107, 111, 144.
Caudonia Walk. 47, 51.
Cea Hal. 46, 47.
Centrobia m. 87, 89.
Cephalonomia Westw. 122, 125.
Ceraniscus Walk. 84, 86.
Ceraphron Jur. 97, 98.

Ceraphronidae 20, 27, 97.
Cerapterocerus Westw. 32, 35.
Cerchysius Westw. 33, 36.
Cercobelus Walk. 33.
Cerocephala Westw. 41.
Chaetosticha m. 87, 89.
Chaetostricha Walk. 89.
Chalcidoidea 18, 21, 29.
Chalcis F. 29.
Charitopus m. 31.
Cheiropachys Westw. 69.
Chelognus Hal. 91, 93.
Chiloneurus Westw. 32.
Choreia Westw. 33, 35.
Choreius Westw. = *Choreia*.
Chrysocharis m. 79, 83.
Chrysolampus Aut.
Cinetus Jur. 129, 130, 138.
Cinipsyllum Lam. = *Perilampus*.
Cirrhospilus Westw. 74.
Cleonymoidea 19, 24, 46.
Cleonymus Latr. 47, 50.
Closterocerus Westw. 82.
Coccobius Ratzeb. 146.
Coccophagus Westw. 30.
Codrus Jur., Nees. 99.
Coelopisthia m. 65.
Comys m. 145.
Copidosoma Ratzeb. 33, 36.
Coruna Walk. 59.
Corynocere Nees. 40.
Cosmocoma m. 117, 120.
Cratomus Dalm. = *Caratomus*.
Cryptopristus m. 43, 44.
Cryptoprymna m. 52, 56, 59.
Cyrtogaster Walk. 52, 53, 55.
Cyrtosoma Perris. 42.

D.

Decatoma Spin. 44, 45.
Dendrocerus Ratzeb. 146.
Derostenus Westw. 79, 83.
Diapria Latr. 122, 126.
Diapriæ Hal. 123.
Diapriides Westw. 123.
Diaprioidæ 20, 28, 121.
Dibrachys m. 65.
Dichalysis m. 52, 56.
Di cladocerus Westw. 77.
Dicondylus Hal. 90.
Dicormus m. 55.
Dicyclus Walk. 53, 55.
Diglochis m. 65.
Diglyphus Hal. 83, 144.
Dinocarsis m. 33, 37.
Dinotus m. 66, 70.
Diomorus Walk. 43.
Dipara Walk. 51, 54.
Diphora m. 130, 140.
Diplolepis Ant.
Dirrhinus Dalm. 29.
Discodes m. 32, 34, 144.
Disogmus m. 99.
Doriclytus m. 117, 120.
Dryinoidæ 20, 27, 90.
Dryinus Latr. 90, 91.

E.

Echthroplexis m. 33, 36.
Ectadius m. 108, 113, 144.
Ectroma Westw. 39.
Elachestus Spin. = *Elachistus*.
Elachistoidæ m. 19, 26, 72.
Elachistus Spin. 72, 73.
Elasmoidæ m. 19, 25, 71.
Elasmus Westw. 71.
Elatus Walk. 42.
Embolemodæ m. 94.
Embolemus Westw. 94.
Encyrtoidæ 18, 21, 31.
Encyrtus Dalm. 34.
Entedon Dalm. 79.
Entedonoidæ m. 19, 26, 78.
Entomacis m. 121, 123.
Epicerus Hal. 78, 79.

Epimacrus Walk. 41.
Epimeces Westw. 111.
Epyris Westw. 96.
Ericydnus Hal. 33, 36.
Etroxys Westw. 66, 71.
Eucharis Latr. 22.
Eucharoidæ 19, 22, 42.
Eucomys m. 32, 34, 144.
Euderus Hal. 78, 80.
Eulophoidæ m. 19, 26, 74.
Eulophus Geoffr. 74, 77.
Euneura Walk. 52, 54.
Eunotus Walk. 66.
Eupelmoidæ 18, 21, 30.
Eupelmaus Dalm. 31.
Euplectrus Westw. 72.
Euryophrys m. 144.
Euryscapus m. 32, 35.
Eurytoma Ill. 44.
Eurytomoidæ 19, 23, 44.
Eusandalum Ratzeb. 145.
Eustochus Hal. 117, 120.
Eutelus Walk. 71.
Eutriche, Nees. 118, 120.

G.

Galesus Curt. 121, 124.
Gastrancistrus Westw. 60 63.
Geniocerus Ratzeb. = *Tetrastichus*.
Glyphe Walk. 59.
Glyphomerus m. 43, 44, 145.
Glyptonota m. 122, 126.
Gonatocerus Nees. 116, 117.
Gonatopus Ljungh. 90, 92.
Goniozus m. 96.
Gryon Hal. 101, 105.
Gyrolasia m. 145.

H.

Habrolepis m. 34, 38.
Hadroceras m. 146.
Hadronotus m. 101, 105.
Halidea m. 31.
Halizoa m. 145.
Halticella Spin. 29.
Haltichella Spin. Walk. 30.
Heidenia m. 46, 48.

Heloroidæ m. 20, 28, 142.
Helorus Latr. 142.
Hemilexis m. 122, 123, 127.
Hemisius West. 105.
Hemiptarsenus Westw. 77.
Heterolepis Nees. 146.
Hetroxys Westw. 66, 71.
Hockeria Lap. 30.
Holpopelte m. 78, 81.
Holopedina m. 95, 96.
Hormoceroidæ 19, 24, 59.
Hormocerus Walk. 59, 60.
Hybothorax Ratzeb. 146.
Hyperbaeus m. 144.
Hyperteles m. 84, 86, 145.
Hypocampsis m. 108, 115.
Hypsicamara m. 52, 54.

I.

Idiotypa m. 122, 125.
Idris m. 102, 105.
Inostemma Hal. 107, 110.
Iphitrachelus Hal. 106, 109.
Ismarus Hal. 128, 132.
Isobrachium m. 96.
Isocratus m. 53, 58.
Isocybus m. 108, 114.
Isocyrtus Walk. 53, 57.
Isoplatea m. 60, 62.
Isorhombus m. 107, 113.
Isosoma Walk. 45.
Isostasius m. 106, 109.

L.

Labco Hal. 90, 93.
Labolips Hal. 122, 124.
Laesthia Hal. 41.
Lagynodes m. 97, 98.
Lamprostylus m. 42.
Lamprotatus Westw. 53, 57.
Lathromeris m. 87, 89.
Leimacis m. 120.
Leptacis m. 107, 112.
Leptomastix m. 34, 37.
Leptorhaptus m. 129, 137.
Leucaspoidæ. 18, 20, 29.
Leucaspis F. 29.

Limacis m. 116, 120.
Litus Hal. 116, 120.
Lochites m. 43, 44.
Lonchentedon Ratzeb. 87.
Loxotropa m. 122, 123, 126.
Lygocerus m. 97, 99.
Lymaenon Walk. 118.

M.

Macroglencs Westw. 40.
Macrohynnis m. 129, 136.
Macromesus Walk. List. of t. Spec.
 p. II. 161.
Macroneura Walk. 47, 50.
Macrotelia Westw. 105.
Megapelte m. 63, 66.
Megaspilus Westw. 97, 99.
Megastigmus Dalm. 43.
Megorismus Walk. 59.
Melittobia Westw. 74, 75.
Meraporus Walk. 64, 68.
Merismus Walk. 57.
Merisus Walk. 53, 58.
Meromalus Walk. 60, 63.
Merostenus Walk. 47, 50.
Mesidia m. 30.
Mesopolobus Westw. 71.
Metaclisis m. 106, 109.
Metacolis m. 65, 70.
Metallon Walk. 33, 35.
Metastenus Walk. 64, 68.
Metopon Walk. 69, 146.
Metopum Walk. 64, 68, 146.
Micradelus Walk. 60, 61.
Micromelus Walk. 53, 57, 145.
Microps Hal. 98.
Miota m. 131, 141.
Miscogaster Walk. 57.
Miscogastroidae 19, 24, 51.
Monelata m. 123, 127.
Monocrita m. 106.
Monodontomerus Westw. 43.
Myina Nees. 30.
Myinoidae m. 18, 21, 30.
Mymar Hal. 117, 120.
Mymaroidae 20, 28, 116.
Myrmecomorphus Westw. 94.
Mystrophorus m. 91, 93.

N.

Notanisus Walk. 47, 51.

O.

Oligosita Hal. 88, 90.
Oligosthenus m. 145.
Olynx m. 72, 73.
Omphale Hal. 79, 82.
Ooctonus Hal. 116, 120.
Ophioneurus Ratzeb. 88.
Ormoceroidae Walk. 19, 24.
Ormocerus Walk. 60.
Ormyroidae m. 19, 22, 42.
Ormyrus Westw. 42.
Oxyglypta m. 64, 68.
Oxylabis m. 128, 133.
Oxymorpha m. 145.

P.

Pachyceras Ratzeb. 68.
Pachychirus Ag. Nom. 66, 69, 70.
Pachycrepis m. 51, 54, 59.
Pachylarthrus Westw. 52, 53, 55.
Pachyneuron Walk. 52, 54.
Palmon Walk. 43.
Pandelus m. 65, 69.
Panstenon Walk. 52, 58.
Panthus Walk. 121.
Pantoclis m. 129, 136.
Pantolyta m. 128, 135.
Paramesius Westw. 122, 123, 125.
Pedinomma m. 94, 95.
Pegopus m. 145.
Peridesmia m. 65.
Periglyphus Boh. 42.
Perilampoidae 19, 22, 42.
Perilampus Latr. 42.
Perisemus m. 95, 96.
Phacostomus Nees. 55.
Phaenodiscus m. 144.
Phagonia Hal. = *Pachylarthrus*.
Piestopleura m. 144.
Pirene Hal. 40.
Pireniani Hal. 40.
Pirenoidae 18, 22, 40.
Plastocharis m. 145.
Platyaster Latr. 108, 110, 116.
Platyastroidae 20, 28, 106.
Platymesopus Westw. 71.

Platymischus Westw. 121, 123.
Platynoecheilus Westw. 47, 50.
Platyterma Walk. 64, 69.
Pleuropachys Westw. 78, 81.
Pleurotropis m. 78, 82.
Plutothrix m. 46, 49.
Polygnotus m. 108, 115.
Polymecus m. 144.
Polymoria m. 31.
Polynema Hal. 118, 120.
Polypeza m. 123, 127.
Polyplanus Nees. 95.
Poropoea m. 87, 88.
Priomerus Walk. 146.
Proctotrupes Latr. 99.
Proctotrupidae 20, 27, 99.
Prosacantha Nees. 101, 103.
Prosodes Walk. 56, 59.
Prosonopon Walk. 47, 51, 145.
Psilocera Walk. 56.
Psilomma m. 128, 132.
Psilonotus Walk. 60, 62.
Psilus Pz. 124.
Pteroclis m. 144.
Pterolycus Ratzeb. 146.
Pteromaloidae 19, 25, 63.
Pteromalus Swed. 66.
Pteroptrix Westw. 84.
Pterothrix Westw. em. 84, 145.

R.

Rachistus m. 119, 120.
Ratzeburgia m. 31, 145.
Rhaphidotelus Walk. 60, 62.
Rhopalicus m. 66, 69, 70.
Rhopalotus m. 78, 80.
Rhopus m. 34, 37 = Enc. Piso.
Roptrocercus Ratzeb. 64, 68.

S.

Sactogaster m. 108, 113.
Scelio Latr. 102, 105.
Scelionoidae 20, 27, 100.
Sceptrophorus m. 34, 38.
Schizonotus Ratzeb. 146.
Sciatheras Ratzeb. 41.
Sclerochroa m. 95, 96.
Scleroderma Kl. 96.

Secodes m. 78, 81.
Seladerma Walk. 67.
Selaoderma Walk. em. 67.
Semiotus Walk. 68.
Serphus Schrk. 99.
Simopterus m. 65, 69.
Siphonura Nees. 42.
Smaragdites Westw. 82.
Smicra Spin. em. 29, 30.
Smiera Spin. Walk. 30.
Solenotus m. 74, 76.
Spalangia Latr. 41.
Spalangidae Latr. 18, 22, 41.
Spaniopus Walk. 52, 56.
Sparasion Latr. 101, 104.
Sphaeripalpus m. 52, 55.
Sphagigaster Spin. 53, 57.
Sphenolepis Nees. = *Choreia*.
Spilomicrus Westw. 123, 125.
Stenocera Walk. 31.
Stenomesius Westw. 146.
Stenophrus m. 40.
Sterrhocoma m. 33, 36.
Stichothrix m. 117.
Stictonotus m. 64, 68.
Storthygocerus Ratzeb. 62.

Stylocerus Ratzeb. 62.
Sympiesis m. 74, 76.
Synacra m. 128, 134.
Synopeas m. 108, 114.
Syntomaspis m. 43, 44.
Syntomopus Walk. 52, 56.
Systasis Walk. 64, 68.
Systole Walk. 45, 46.

T.

Teleas Latr. 100, 102.
Telegraphus Ratzeb. 35.
Telenomus Walk. 101.
Teleogmus m. 72, 74.
Tetracampe m. 46, 49, 79.
Tetracampoidae m. 79.
Tetramesa Walk. List. spec. p. II. 154.
Tetrastichoidae m. 19, 26, 83.
Tetrastichus Hal. 84, 86.
Theocolax Westw. 40, 41.
Thoron Hal. 100, 102.
Thysanus Walk. 84.
Tityros Walk. 53, 58.
Torymoidae 19, 23, 43.
Torymus Dalm. 44.
Toxenuma Walk. 53, 58.

Trichacis m. 108, 115.
Trichaporus m. 84, 85.
Trichocerus Ratzeb. = *Tetrastichus*.
Trichogramma Westw. 87, 88.
Trichogrammatoidae m. 20, 26, 87.
Trichosteresis m. 97, 99.
Tricoryphus m. 46, 47.
Tridymus Ratzeb. 64, 67.
Trigonoderus Westw. 47, 49.
Trimorus m. 101, 104.
Tripedias m. 60, 61.
Triphasius m. 83, 84, 145.
Tritypus Ratzeb. 146.

U.

Urolepis Walk. 59, 60, 145.

X.

Xenocrepis m. 64.
Xenomerus Walk. 100, 102.
Xenotoma m. 129, 137.
Xestonotus m. 107, 112.

Z.

Zelotypa m. 130, 141.
Zygota m. 128, 135.

