

HYMENOPTERA SCANDINAVIÆ

AUCTORE

C. G. THOMSON.

TOM. V.

PTEROMALUS (SVEDERUS)

CONTINUATIO.

LUNDÆ 1878.

TYPIS EXPRESSIT HAQV. OHLSSON.

Subtribus *Cleonymides*.

Caput scrobe antennali profunda et magna, determinata, sed scapum antennarum haud totum occupante; vertice immarginato; genis teretibus, sulco sat distincto; clypeo apice mutico late rotundato-truncato vel deute medio acuto armato; mandibulis plerumque validis; oculis rarius hirtis; labro interdum libero. Antennæ basi subdistantes, annellis 2, funiculo 6-articulato plerumque arcte contiguis, clava sat magna, haud subulata. Thorax haud brevis; pronoto magno antice sensim declivi, collari angusto vix determinato; scapulis fere semper discretis et sulcis mesonoti integris; scutelli freno plerumque linea impressa discreto; metathorace brevi, haud rugoso, carina media distincta. Alæ superiores nervis spurio e vena basali egrediente, hac sat distincta, præstigmate et metacarpo sæpe longis, stigmate haud crasso, radio haud abbreviato, clava parva vel mediocri; interdum maculis nigro-fusco-fumatis ornatae. Abdomen plerumque longum et sessile, petiolo haud vel parum conspicuo, postpetiolo mediocri fovea fere nulla. Pedes sæpius validi, tibiis posticis fere semper 2-calcaratis. Mas antennis articulis funiculi sæpe pilosellis vel hirtis, clavæ articulis rarius liberis, pedibus plerumque obscurioribus, abdomine elongato, supra subdepresso apicem versus latiore.

Denna afdelning skiljes lättast från närstående genom den djupa gropan på pannan ofvanför antennernas insertion, starkt utveckladt pronotum, oftast tydligt afsatta scapulæ och 2 sporrar på bakbenens tibiaer, nästan sessil abdomen och kort postpetiolus.

Från *Mischogastrides* skiljes den genom nästan sessil abdomen och entandad eller obehäpnad clypeus; från *Sphigigastrides* genom samma karakterer och oftast 2 sporrar på baktibierna; från *Chiropachides* genom tydligt afsatta scapulæ och ej grofva lår; från *Pteromalides* äfvenledes genom hela sulci mesonoti och djup antennal-grop på pannan. De flesta synas lefva på träinsecter, mest Coleoptera.

Conspectus generum.

- A) Oculi hirti. Labrum conspicuum. Mandibulæ minus validæ. Anelli magni.
 - a) Corpus metallicum. *Cleonymus.*
 - aa) Corpus vix metallicum. Abdomen subrotundum. Antennæ clavatæ. *Micradelus.*
- B) Oculi glabri. Labrum occultum. Mandibulæ validæ, sinistra 3-dentata, dente basali lato truncato, dextra 4-dentata.
 - b) Frenum scutelli impressione transversa discretum. Caput genis buccatis. *Trigonoderus.*
 - bb) Caput triangulare, antrorsum angustatum. Præsterna scuto nullo triangulari.
 - c) Abdomen sessile. *Platygerrhus.*
 - cc) Abdomen petiolo distincto. *Photismus.*

Genus *Cleonymus* Latr.

Corpus læte metallicum. Caput oculis magnis, hirtis, labro libero, clypeo apice mutico, mandibulis sat debilibus, margine externo haud sinuato. Antennæ annellis magnis, funiculi articulo ultimo clavam solidam acuminatam obtegente. Thorax pronoto magno, sed collari haud discreto; mesonoti scapulis haud distinctis; metathorace brevi. Alæ fere totæ pubescentes, cellula radiali angusta. Abdomen oblongum, supra depressum. Pedes sat validi, tibiis posticis 2-calcaratis.

Detta släkte afviker från alla följande genom honans byggnad i antenner, stora ludna ögon, temligen grofva ben och ej skarpa sulci mesonoti.

1. *C. depressus*: Virescens, pedibus antennisque flavis, his clava nigra, alis umbra fumata. ♀ Long. 3—4 mill

Walker Ent. Mag. IV. 550. 1.

Ichneumon depressus Fab. Ent. Syst. Suppl. 231. 220, 221.

Caput thorace haud angustius, transversum, rotundo-triangularē, vertice angusto, ocellis magnis in triangulum dispositis; oculis magnis subrotundis, dense sat longe hirtis, orbita frontali parallela, faciali fortius divergente, genis angustis sulco tenui distincto; scrobe antennali lata superne quasi linea transversa subelevata determinata; clypeo apice rotundato-truncato, labro pallido; mandibulis flavis; palpis maxillaribus articulo ultimo longo fere falcato. Antennæ haud longæ sed crassæ basi late distantes, flavæ, articulis 1:o brevi sed crasso, 2:o triangulari, 3:o parvo sed distincto, 4—6 sensim latioribus, 7—10 transversis æqualibus, 10:o apice externe in mucronem, clavam nigram obtegentem producto. Thorax longus, sat fortiter crebre subrugoso-punctatus, pube sat densa pallida, haud tenui vestitus; pronoto magno, sed collari haud discreto antice tereti; mesonoto subdepresso; scutello freno haud discreto; metathorace fere horizontali, lævi, subcyaneo, plica nulla, postice in nucham haud producto, spiraculis sat magnis rotundis. Alæ angustæ, sat longæ, haud dense sed fere æqualiter pubescentes, nervo basali vix conspicuo, metacarpo stigmatē breviorē, hoc quam radio, sub angulo valde acuto egrediente, fere sesqui longiorē; umbra fusca sub radio versus præstigma ducta. Abdomen thorace paullo longius, supra subdepressum, subtus leviter convexum; segmentis 2:o brevi, 3:o et 4:o brevissimis, 5—6 longis subquadratis, viride-cyaneis apice violaceis crebre

punctatis, 7—8 haud elongatis. Pedes flavi, coxis posticis apice excepto viridi-cyaneis. Mesopleura sutura divisa.

Sällsynt; funnen i Skåne och på Gottland; hannen skall enligt Walker hafva svarta antenner med ledad klubba.

Genus *Micradelus* Walk.

Caput oculis hirtis, scrobe antennali profunda, labro libero. Antennæ clavatæ, annellis magnis. Thorax brevis; pronoto sat magno, collari haud discreto; scapulis discretis; metathorace declivi. Alæ cellula radiali fere occlusa, unco radii maximo. Abdomen rotundum. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ.

Detta slägte afviker så väsendtligen från alla öfriga, att det med rätta borde bilda en egen subtribus. Det sluter sig i viss mån nära till *Tridymina*, men afviker genom starkare utveckladt pronotum. Jag har ställt det närmast *Cleonymus* på grund af de tätt ludna ögonen och den fritt liggande öfverläppen.

1. *M. obscurus*: Niger, vix coerulescens, genubus, tibiis apice tarsisque basi pallidis. Long. 2—3 mill.

Walk. Ent. Mag. II. 170. 1.

Corpus breve, obsolete punctatum, tenuiter pubescens, nigrum vix metallice nitens. Caput thorace fere angustius, transversum, antrorsum leniter angustatum, vertice angusto, ocellis magnis albidis, fere in triangulum dispositis; oculis rotundis, dense et sat longe hirtulis; scrobe antennali profunda, antennarum scapum fere totum excipiente sed ocellum anteriorem haud attingente; clypeo apice mutico truncato, utrinque foveola obliqua impressa; palpis tenuibus fuscis; genis haud compressis, sulco vix conspicuo. Antennæ breves nigræ; articulis 1:o compresso, 2:o breviter triangulari, (feminæ mutilatæ,) maris 3:o et 4:o bene distinctis transversis, 5—10 sensim fortiter dilatatis, transversis vix pilosellis, clava 3-articulata magna

apice obtusa. Thorax supra subdepressus; pronoti collari haud discreto, postice fere truncato; scapulis haud magnis sed bene discretis; scutello postice vix declivi, freno haud discreto; metathorace transverso, subdeclivi, carina media alte elevata, basi linea transversa obliqua instructo, plica nulla, spiraculis parvis rotundis. Alæ totæ pubescentes, apice sat lato, ciliato, subfumatæ, n. basali curvato sat distincto, præstigmate magno basi angulato, stigmate haud tenui quam radio fere brevior, hoc clava subrotunda sat magna, uncum longum superne emittente, metastigmate longo, radio sesqui longiore. Abdomen subrotundum, ♂ breviter ovale; subsessile, dorso depresso, ventre vix convexo postpetiolo haud parvo. Pedes haud validi, coxis posticis subovatis, femoribus tibiisque pube adpressa vestitis. Mesosternum lateribus lævibus, mesopleuris antice sutura curvata parum distincta a mesosterno distinctis, epimeris punctulatis.

Sällsynt; funnen i Luleå Lappmark.

Genus *Trigonoderus* Westw.

Caput vertice lato; genis tumidis, pone sulcum sat profundum politis, sinu mandibulari profundo; scrobe antennali longa et profunda; clypeo lævi apice sinu utrinque parvo laterali et dente medio acuto sat longo instructo; mandibulis validis, externe basi sinuatis, sinistra 3-, dextra 4 dentata, dente basali truncato, apicali forcipato. Antennæ sat longe infra medium faciei insertæ, basi subdistantes, annellis transversis postannello longo arcte applicatis. clava parva haud lata. Thorax pronoto magno, antice declivi-producto, collari angusto medio vix discreto; mesonoti sulcis profundis integris; scutelli freno sutura profunda discreto; metathorace lævi, carina media, apice incisura angulata sed nucha nulla, spiraculis subrotundis. Alæ metacarpo radio saltim duplo longiore, hoc clava

parva subovali fere horizontali, cellula basali fere tota pubescenti, n. basali sat distincto. Abdomen longum, ♀ apice acuminatum, fere sessile, ♂ petiolo brevi metallico, segmento 2:o haud magno, apice medio inciso, 3:o brevi, 6—8 longis. Pedes sat validi, coxis posticis basi externe pubescentibus. Mesosternum sulco medio sat profundo, mesopleura magna margine antico arcuato. Præsterna plaga humerali triangulari determinata. Mas abdomine immaculato, antennis hirtis vel pubescentibus, clavæ articulis interdum liberis, scapo brevi. Corpus magnum, metallicum.

Detta slägte skiljes lätt från båda följande genom de utspända kinderna och skarpt afsatt plåt på præsterna.

- A) Pronotum magnum, collari vix determinato. Prosternum sulco medio nullo. Episterna mesothoracis linea obliqua tenui quasi divisa. Alæ ♀ totæ pubescentes, speculo nullo. (*Pterolycus* Ratz.)

1. *T. pedicellaris* m: Cocruleo-virescens, minus pubescens antennis pedicello haud transverso, scapo sat longo pedibus abdominisque basi rufescentibus, alis fasciis 2 abbreviatis; ♂ antennis corporis longitudine, clavæ articulis liberis et funiculo pube adpressa vix conspicua, pedibus fuscis. Long. 3—6 mill.

Pteromalus Quadrum Nees l. c. 86. 2.

Species a sequente ♀ fasciis 2 costam attingentibus pedicello longiore, ♂ clavæ articulis liberis discedens.

Caput thorace fere latius, subtilius crebre vix rugoso-punctatum, vertice lato, ocellis inter se fere minus quam ab oculis distantibus, his breviter ovatis, quam genis politis sesqui longioribus; palpis maxillaribus obscure rufis, articulo ultimo interne apicem versus subdilato, mandibulis piceo-rufis. Antennæ sat longæ et validæ; articulo

1:a ocellum anteriorem haud attingente, superne vix dilatato et pedicello subtriangulari flavis, annellis brevissimis funiculo arcte adpressis; hoc basin versus sæpe pallido, articulis sensim brevioribus, 1:o 6:o haud transverso fere triplo longiore; clava apice obtusa quam postannello brevior. Thorax sat robustus; pronoto superne viso vix transverso, collari medio angusto subacuto; mesonoto crebre punctato; scutelli freno apice marginato; metathorace haud brevi, carina media integra, plica apice distincta, basali nulla, sulco spiraculari brevi sed sat profundo; spiraculis subrotundis a postscutello sat magno fere horizontali sat longe remotis; calli fimbria parva; nucha nulla, sed apice angulatim exciso et marginato. Alæ superiores sat longe fere æqualiter pubescentes, apice ovato-rotundato; præstigmate radio fere sesqui longiore, hoc sub angulo sat acuto egrediente; fasciis 2 nigrofuscis medium disci superantibus, altera stigmatis basi, altera radium secante, ornatae. Alæ inferiores cellula costali lata et longa. Abdomen basi tereti rufum tenuiter et parcius, apice densius pubescens, cupreo et smaragdino fasciatum, conico-productum; valvula ventrali medium abdominis haud attingente. Mesosternum sulco medio integro sat profundo tenui. Pedes validi rufi, vix pubescentes, coxis viridi-æneis, posticis ovatis basi externe vix pubescentibus, tarsis tibia brevioribus basi albidis.

Mas differt: corpore parvo, obscuriore; antennis scapo brevi, metallico, flagelli articulis longis; femoribus tibiisque obscure rufis, gracilioribus; abdomine immaculato, fere lineari, plica ventrali distincta, obscure virescenti, medio cupreo.

Temligen sällsynt i barrskogar.

2. *T. Brandti*: Coeruleo-virescens, antennis, pedicello transverso, scapo pedibusque flavis, alis macula radii clavæ adhærenti fusca, metacarpo apicem alæ fere

attingente; abdomine valde conico-elongato, basi rufo valvula ventrali trientem vix superante. Long. 3—5 mill.

Pteromalus Brandti Ratz. die Ichn. d. Forst. 1. 188.

Pteromalus heros Dalm.

Præcedenti abdomine basi rufa affinis, sed ♀ alis macula tantum 1 fusca, præstigmate maximo, abdomine thorace multo longiore et magis conico-subulato, antennis pedicello transverso, scapo brevior, pedibus gracilioribus tarsis longioribus; ♂ antennarum scapo pedibusque flavis, coxis ut in femina metallicis discedens.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

3. *T. Lichtensteini*: Obscure coeruleo-virescens, abdomine basi haud rufo, pedicello transverso; ♂ antennis clava haud libere articulata, postannello subtus medio tumidulo, speculo distincto. Long. 3—6 mill.

Pteromalus Lichtensteini Ratz. l. c. 1. 188.

Var. a. Latior, magis pubescens, antennis scapo femoribusque metallicis, alis macula radii clava adhærente fusca sæpe interne basin versus producta; abdomine minus elongato, segmentis ultimis subtransversis; præclava leviter transversa.

Pteromalus Nephele Dalm.

Var. b. Magis elongatus, antennis, præclava haud transversa, scapo femoribusque plerumque flavis; alis immaculatis; scrobe antennali longiore; abdomine segmentis ultimis latitudine sua longioribus.

Pteromalus pilipes Zett. Ins. Lapp.

Pteromalus elongatus Dalm.

Species præcedenti similis et affinis, ♀ abdomine basi haud pallido, metacarpo paullo brevior, apicem alæ haud attingente; ♂ alis speculo distincto, femoribus tibiisque obscuris, clavæ articulis haud liberis, postannello subtus prope basin leviter tumidulo discedens.

Ej sällsynt.

B) Pronoti collare angustum sed acute marginatum. Prosternum sulco medio. Alæ speculo distincto. Episterna simplicia. Mas antennis funiculo pilosello vel hirtis.

a) Alæ ♀ fasciis 3 fuscis ornatae. Mas antennis hirtis, clavæ articulo 1:o libero.

4. *T. trifasciatus* m: Obscure æneus, vix pubescens, antennæ basi pedibusque rufis, coxis corpori concoloribus; alis ♀ fasciis 3, ♂ maculis parvis fuscis ornatis, hoc pedibus et antennarum scapo obscurioribus. Long. 3—6 mill.

Statura omnino *T. pedicellaris*, ♀ alarum fasciis, ♂ antennæ hirtis ab omnibus mox discedens. Caput thorace fere latius, pone oculos vix angustatum, vertice lato, facie fere strigoso-punctata; scrobe antennali medium longe superante. Antennæ scapo sat longo sed ocellum anteriorem haud attingente subtus leniter dilatato et pedicello haud transverso rufis; annellis funiculo arcte adpressis; hoc subfiliformi, articulo 1:o elongato quum clava apice obtuso longiore, 2—6 sensim brevioribus vix latioribus, 6:o haud transverso. Prothorax transversus; mesonoto subsquamoso-punctato; scutelli sulcis minus convergentibus; metathorace fere horizontali, carina distincta, plica postice conspicua, calli fimbria distincta. Alæ fere hyalinæ, fasciis 3 fuscis, discum paullo superantibus ornatae, 2:a parva radii clavæ adhærente et cum basali lata maculari e stigmatis basi egrediente connexa, 3:a sive apicali libera subrenata; præstigmate quam stigmate brevior,

metacarpo radio saltim duplo longiore; cellula basali pubescenti sed speculo pone n. basalem distincto. Abdomen thorace longius conico-subulatum, ventre et superne interdum basi rufescens; segmentis 1:o vix conspicuo, 2:o haud magno, 3:o minimo, 4:o paullo majore, 5—8 longis. Pedes validi rufi, coxis æneis, posticis subovatis haud fimbriatis, tarsis tibia brevioribus.

Mas differt: abdomino longo fere lineari, cupreo-violaceo, basi haud pallido, pedibus obscurioribus, interdum femoribus et scapo fuscis, alis cellula basali fere nuda, fasciarum vix nisi rudimentis punctiformibus; antennis articulis funiculi et primo clavæ longe et sat dense nigro-hirtis, omnibus linearibus.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

5. *T. vittiger* m: Obscure æneus, parum pubescens, antennis basi pedibusque rufescentibus, coxis corpori concoloribus; ♀ abdomine basi et ventre rufescentibus, alis vitta media discoidali maculaque ante apicem fusca; ♂ antennis funiculi articulis longis, pube longa erecta dense vestitis, femoribus tibiisque flavis. Long. 3—5 mill.

Cleonymus bimaculatus Nees l. c. 85. 1. (forte).

Præcedenti simillimus, sed plerumque minor, ♀ alarum maculis, altera oblonga discoidali, altera ante apicem subrotunda fuscis, pedibus gracilioribus trochanteribus et tarsis basi albidis; ♂ antennis clava haud libere articulata, pedibus gracilioribus pallidis, alis immaculatis mox discedens.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

6. *T. apicalis* m: Virescenti-æneus, parum pubescens, antennis basi pedibusque, coxis exceptis, rufescenti-

bus; ♀ alis macula subrotunda prope apicem fusca, abdomine conico-elongato, ventre rufescenti; ♂ antennis articulis funiculi longiusculis, parce breviter hirtulis, alis immaculatis. Long. 2—5 mill.

T. vittigero simillimus, ♀ alis macula discoidali nulla; ♂ antennis funiculi articulis minus elongatis sed longius parcius pilosis discedens.

Sällsynt i södra Sverige.

7. *T. acuminatus* (Dalm.): Æneo-viridis, coxis concoloribus, antennis basi pedibusque rufo-testaceis, abdomine immaculato, ventre compresso-carinato: ♂ antennis scapo sat longo, funiculi articulis minus longis, pube longa exserta dense vestitis. Long. 2—5 mill.

Cleonymus immaculatus Nees l. c. 87. 4. (forte).

Var. Alis macula sub radii clava fusca, femoribus interdum medio fusco-æneis.

Species a præcedentibus ♀ abdomine basi haud rufo, fortius compresso-carinato, antennis funiculi articulo 1:0 minus elongato; ♂ antennis scapo sat longo rufo-testaceo, funiculi articulis minus longis, ultimo clavæ breviori fere contiguo, femoribus sat crassis optime distinguenda.

Ej sällsynt.

Genus *Platygerrius* m.

Caput triangulare, antrorsum fortiter angustatum, vertice angusto, genis haud buccatis, clypeo apice mutico. Frenum haud discretum. Abdomen subsessile postpetiolo apice integro. Præsterna magna, plaga nulla triangulari discreta prope tegulas. Corpus cum pedibus gracile.

Detta slägte skiljes lätt från föregående genom hufvudets form, som är kort triangulär, nedåt starkt afsmalnande med smala kin-

der och hjessa, genom scutellens frenum, som endast är antydd genom en djup marginalstria, samt genom de starkt utvecklade præsterna, på hvilka ej den triangulära plåt finnes afsatt, som så tydligt framträder hos föregående slägte.

1. *P. gracilis* (Dalm.): Virescens, antennis scapo pedibusque testaceis, alis immaculatis, stigmatibus radio duplo longiore: ♂ antennis scapo brevi, coeruleo, funiculi articulis subcompressis, pube haud exserta, pedibus fuscis. Long. 3—4 mill.

Caput thorace fere latius, subtiliter punctatum, fere glabrum, oculis ovatis rubris magnis, ocellis in lineam sat curvam dispositis; scrobe antennali sat profunda; clypeo superne linea impressa transversa ab epistomate discreto; genis sulco tenui; mandibulis minus validis, externe haud sinuatis, testaceis. Antennæ nigræ scapo testaceo, longe ocellum superante. Pronotum antrorsum angustatum; collari haud discreto; mesonoto subtiliter fere squamoso-punctato, sulcis profundis; scutelli freno linea profunda marginali tantum discreto; metathorace lævi, carina distincta, spiraculis rotundis, callo vix piloso aureo, interne cyaneo. Alæ sat longæ, speculo distincto, præstigmatibus quum radio vix longiore, hoc stigmatibus duplo brevioribus. Abdomen elongatum, postice attenuatum basin versus haud cylindricum, postpetiolo cyaneo apice truncato integro, segmentis 3:o brevi, 4—6 sensim paullo longioribus, 7—8 magnis. Præsterna squamoso-punctata; meso- et metapleura lævia cupreo-aurea, suturis concinne discreta. Pedes graciles testacei, coxis corpori concoloribus.

Mas differt: corpore magis coeruleo-virescente, capite cyaneo; antennis scapo brevi compresso-dilatato coeruleo, funiculi articulis crassis subcompressis, pube adpressa vix conspicua; femoribus tibiisque obscure fusco-rufis.

Sällsynt, men utbredd från Skåne till Lappland.

Genus *Photismus* m.

Caput triangulare, os versus angustatum, genis angustis; clypeo apice mutico. Scutelli frenum sulco medio linea transversa impressa bene discretum. Abdomen conico-subulatum, segmento 1:o distincto, ♀ transverso, ♂ longiore metallico lævi, 2:o apice haud inciso. Pedes graciles. Præsterna scuto nullo triangulari. Mas antennis hirtis.

I hufvudets form, præsterna och postpetiolus öfverensstämmer detta slägte med föregående, men skiljes dels genom tydligt afsatt frenum, fritt liggande petiolus, ♀ dessutom genom fläckiga vingar, ♂ genom ragghåriga antenner.

1. *P. nubilosus* (Dalm.): Viridi-æneus, antennis basi pedibusque testaceis, coxis posticis basi æneis, alis fasciis 2 macularibus magnis, medio connexis; ♂ antennis longis, scapo brevi coeruleo, femoribus tibiisque obscure rufis. Long. 3—6 mill.

Pteromalus pulcherrimus Walk. l. c. IV. 9. 164. (forte).

Caput os versus fortiter angustatum, pone ocellos angustatum, vertice angusto, ocellis magnis albidis fere in triangulum dispositis; scrobe antennali profunda, superne vage impressa; clypeo bene discreto apice mutico; mandibulis sat validis, testaceis, sed basin versus externe haud sinuatis; oculis magnis ovatis, convexis. Antennæ nigræ, scapo compresso-dilatato, sat longo, funiculi articulis crassitie æqualibus sed sensim brevioribus ultimo haud transverso, clava apice obtuse truncata. Thorax longus; pronoto antice conico-angustato, haud transverso, collari haud discreto; mesonoto subsquamoso-punctato; scutello subtilissime punctato, sulcis antrorsum fortiter convergentibus, freno sulco medio; dorsello magno polito; metathorace parum declivi, carina media, plica basali nulla, sulco spi-

raculari distincto, calli fimbria obsoleta. Alæ longæ, speculo distincto, præstigmate radio fere brevior, stigmate radio duplo longior. Abdomen longum, conico-subulatum, ventre rufescenti. Præsterna fortiter, mesosterni latera sat fortiter subsquamoso-punctata; meso- et metapleura læte cuprea, lævia, sed suturis concinne discreta. Pedes elongati, pallide testacei; coxis conicis, posticis basi æneis.

Mas differt: alis fere hyalino-immaculatis, antennis scapo brevi compresso, coeruleo, funiculi articulis longis, bene discretis, pilis exsertis nigris hirtulis, clava postannello haud longior, coxis æneis, femoribus tibiisque obscure rufis, metathorace ut in omnibus subtilius punctulato, abdomine longo, fere lineari, apice subdilatato cupreo-violaceo.

Ej sällsynt i södra Sverige; möjligen är *T. hirticornis* Walker hannen till denna art.

Subtribus Sphegigastrides.

Caput vertice sæpissime immarginato, genis plerumque compresso-acutis; clypeo apice medio sæpius bidentato; mandibulis acute 4-dentatis, externe basi sinuatis; scrobibus antennalibus haud determinatis. Antennæ fronti mediæ vel infra medium insertæ, basi parum distantes, scapo haud compresso dilatato, longo, funiculo ♀ plerumque incrassato articulo 1:o rarissime parvo, annellis minimis, clava apice haud subulata, distincte 3-articulata. Thorax collari interdum magno, semper bene discreto et margine antico acuto; mesonoti sulcis rarius integris, plerumque antice inchoatis, scutelli freno linea rarissime discreto. Alæ stigmate rarius incrassato, radio sat longo, clava interdum magna, quam metacarpo semper brevior; maculis nullis fuscis fumatæ; n. spurio fere e medio cubiti egrediente; præstigmate brevi. Abdomen petiolo magis mi-

nusve longo, punctato, segmentis 2:o semper, interdum etiam 3:o magnis, terebra anum vix superante. Mesosternum haud breve, sulco medio distincto sat profundo, episternis politis, margine antico haud curvato, epimeris subsquamoso-punctatis. Pedes graciles, coxis metallicis parvis, tibiis posticis 1-calcaratis.

Denna grupp står närmast *Mischogastrides* med afseende på clypei bildning och abdomens petiolus, men avviker genom skarpt afsatt collare på pronotum, svagare utvecklad n. basalis i framvingarne, endast en sporre på bakbenens tibier. Från *Cleonymides* skiljes den äfvenledes genom endast en sporre på baktibierna, ej sessil abdomen, kortare pronotum och genom clypei beväpning. Närmast kommer den *Pteromalides*, men skiljes genom starkare fåra på mesosternum, oftast lång och punkterad petiolus, starkt utveckladt 2:a och stundom 3:e dorsalsegment, ej sylformig antennklubba, i allmänhet svagare ben och oftast skarpt 2-tandad clypei spets.

Många arter tyckas lefva parasitiskt på *Aphides*.

Conspectus generum.

- A) Alæ superiores stigmatе tenui. Petiolus supra punctatus, latitudine sua longior.
 - a) Petiolus coxis posticis longior. Palpi ♂ normales.
 - b) Caput genis compressis, vertice minus angusto.
 - c) Scapulæ discretæ. *Merismus.*
 - cc) Scapulæ haud plane discretæ.
 - d) Abdominis segmenta dorsalia 2:m et 3:m maxima. *Sphegigaster.*
 - dd) Abdominis segmentum 2:m maximum, reliqua breviora, saepius retracta. *Cryptoprymnus.*
 - bb) Caput genis teretibus, sublenticulare, vertice angusto. Postpetiolus maximus. Collare latum. Scutellum planum. *Syntomopus.*

- aa) Petiolus abdominis coxis posticis haud longior, segmenta 2:m profunde emarginatum et 3:m maxima. Palpi ♂ abnormes.
- e) Vertex medio acutus. Scapulæ haud plane discretæ.
Cyrtogaster.
- ee) Vertex medio haud acutus. Scapulæ plane discretæ.
Polycystus.
- B) Alæ superiores stigmatе crasso. Petiolus coxis posticis brevior.
- f) Scapulæ plane discretæ. Radii clava magna. *Pachycrepis.*
- ff) Scapulæ haud plane discretæ. *Pachyneuron.*

Genus *Merismus* Walker.

Caput fere triangulare, vertice sat lato, immarginato, ocellis fere in triangulum dispositis; clypeo sat bene discreto; genis subcompressis, pone sulcum tenuem politis. Antennæ fere in medio faciei insertæ, sat longæ, funiculo 6-articulato, articulis ♂ longis hirtulis, ♀ sensim leniter incrassatis. Thorax sat longus; pronoti collari acute marginato mutico; mesonoti sulcis integris; scutelli freno discreto; metathorace postice angustato, rugoso, nucha nulla. Alæ superiores metacarpo radio duplo longiore, hoc clava parva, stigmatе tenui quam radio sesqui longiore, speculo distincto, cellula basali fere nuda; inferiores cellula costali angusta. Abdomen segmento 1:o coxas posticas superante, lineari, punctatissimo, 2:o magno apice rotundato-truncato, integro, 3:o etiam magno, reliquis parvis, ventralibus haud inter coxas posticas compresso-retractis. Mesosternum lateribus fortiter squamoso-punctatis. Pedes flavi, coxis corpori concoloribus.

1. *M. megapterus*: Viridis, sericeo-nitens, antennis fuscis, scapo pedibusque flavis, tibiis intermediis annulo medio, ♂ fere totis nigro-fuscis. Long. 3—4 mill.

Walk. l. c. I. 377. 4.

Chrysolampus pallicornis Nees l. c. 132. 12.

Corpus gracile, fere glabrum. Caput thoracis latitudine, cyaneo-viride, pone oculos vix angustatum, ocellis rufis, oculis ovato-rotundis, convexis, genis haud longis; mandibulis palpisque rufescentibus. Antennæ sat longæ, nigræ, scapo basin versus rufo, breviusculo, pedicello obconico, annellis parvis et angustis sed bene conspicuis funiculi articulis sensim paullo latioribus, penultimo vix transverso, clava magna, acuminata. Thorax longiusculus, viridi-cyaneus, nitidus; pronoti collari latera versus parum ampliatio; mesonoti sulcis profundis, subcrenatis, minus fortiter, antice sericeo-punctato; scutello convexo, sulcis sat convergentibus; dorsello haud parvo; metathorace reticulato-rugoso, spiraculis parvis. Alæ apice sat lato, ciliato, hyalinæ, cellula basali nuda, n. basali parce pubescenti. Abdomen thorace longius, apice acuminato-producto, segmentis 2:0 3:0 vix longiore, convexis, 4—8 parvis; ventre medio gibboso. Metapleura fortiter squamoso-punctata. Pedes rufo-testacei, coxis æneis, tibiis intermediis medio fuscis.

Mas differt: antennis testaceis, flagello filiformi, breviter pallide hirtulis, tibiis intermediis nigro-fuscis, abdomine apice obtuso.

Sällsynt i Skåne.

2. *M. clavicornis*: Viridi-cyaneus, antennis scapo pedibusque flavis, postpetiolo ♀ medium abdominis superante, tibiis intermediis ♂ immaculatis. Long. 3—4 mill.

Walk. l. c. I. 377. 5.

Præcedenti simillimus, sed capite os versus magis angustato, fovea genali pone mandibularum basin profun-

diore, postpetiolo longiore, fovea basali longiore; ♀ antennis scapo toto flavo longiore, flagello magis incrassato, ♂ tibiis intermediis totis flavis discedens.

Sällsynt vid Lund.

Genus *Sphegigaster* Spinola.

Merismus Walker. *Chrysolampus* Foerst.

Caput vertice lato. Scapulæ haud discretæ. Metathorax punctatissimus carina media et plica nullis. Metacarpus radio parum longior, quam stigmatum multo brevior. Abdomen segmento 1:o longo coxas posticas superante, 3:o maximo, superne quam 2:o longiore, hoc utrinque sublobato-producto. Frenum haud discretum.

Detta släkte skiljes lätt från föregående genom scapulæ, som ej, liksom frenum, äro skarpt afsatta, genom likformigt tätt puncterad metathorax, och kortare metacarpus. Från *Syntomopus* afviker det genom bredare hjessa och olika segmentbildning; från *Cyrtogaster* genom längre petiolus och ej skarpkantad hjessa.

1. *S. flavicornis*: Æneus, antennis scapo basi pedibusque flavis, antennis ♂ totis pallidis hirtulis, pronoto margine antico ♀ obsolete, ♂ evidenter 5-denticulato; postpetiolo medio apice lobato-producto. Long. 3—4 mill.

Merismus flavicornis Walk. l. c. 377. 3.

Chrysolampus coronatus Foerst.

Corpus elongatum, gracile, thorace capiteque sat fortiter punctatis. Caput transversum, subrotundum, vertice latiusculo, ocellis sat magnis fere in triangulum dispositis, facie fortius punctata, genis parum compressis subbuccatis, mandibulis pallidis; oculis sat magnis, subovalibus, fuscis. Antennæ thoracis apicem haud attingentes, fere

in medio faciei insertæ, nigrofuscæ; articulo 1:o basi vel rarius ultra medium et pedicello apice pallidis; flagello sensim fortius incrassato, articulis transversis. Pronoti collare margine antico denticulis 5 armatum; mesonoti sulcis antice inchoatis, hoc fortius subsquamoso-punctato; scutello sat convexo, freno declivi, dorsello angusto; metathorace sat longo medio subcompresso, callo laterali sat dense fimbriato, sulco spiraculari distincto, spiraculis parvis postscutello contiguus. Alæ hyalinæ, apice sat lato. Abdomen thorace longius, apice conico-attenuatum; segmento 2:o margine postico medio producto, ventre medio gibboso. Pedes testacei, coxis metallicis. Metapleura sat fortiter subsquamoso-punctata.

Mas differt: antennis longis totis flavis, funiculi articulis cylindricis, pube longa pallida hirtulis.

Ej sällsynt i Skåne, mera sparsamt i medlersta Sverige.

2. *S. aculeatus*: Æneus, abdomine subcoeruleo, hoc segmento 2:o dorsali apice medio truncato, tibiis tarsisque pallidis; pronoti collari 5-spinoso. Long. 3—4 mill.

Merismus aculeatus Walk. l. c. I. 375. 1.

Chrysolampus nigricornis Nees. l. c. 133. 14.

Præcedenti simillimus, sed antennis scapo et femoribus metallicis, tibiis interdum ♀ medio fuscis, segmento 2:o apice medio recta truncato; ♂ antennis haud pallidis, funiculi articulis nigris, crassioribus pube haud exserta, petiolo abdominis multo tenuiore bene distinctus.

Temligen sällsynt.

3. *S. truncatus* m: Æneus, abdomine viridi, antennis basi pedibusque flavis, pronoto obtuse 5-dentato, postpetiolo apice medio truncato. ♀ Long. 3 mill.

Species statura parva, abdominis segmento 2:o dorsali apice medio recta truncato, pedibus antennisque articulis 2 primis flavis, his brevibus, flagelli articulis bene discretis, pilosulis, transversis, clava apice obtusa a præcedentibus diversa.

Sällsynt; funnen på Gottland.

4. *S. muticus*: Æneus, antennis fortiter incrassatis, scapo pedibusque flavis, collari mutico. ♀ Long. 5 mill.

Species a præcedentibus corpore majore, antennis pilosulis fortius incrassatis, scutello subdepresso mox discedens

Sällsynt; funnen i Småland.

Genus *Cryptoprymnus* Foerst.

Prosodes Walker.

Caput clypeo medio emarginato, vertice lato. Pronoti collare margine acuto mutico. Scapulæ haud discretæ. Metathorax punctatissimus. Abdomen segmento 1:o coxas posticas superante, 2:o maximo, apice truncato, reliquis minimis plerumque retractis.

Detta släkte afviker från föregående väsentligen genom 2:a abdominal-segmentets starkare utveckling och djupare grop på kinderna ofvanför mandiblerna, clypeus i midten emarginerad.

1. *C. cavigena* m: Obscure æneus, antennis basi pedibusque testaceis: ♂ antennis pube adpressa, femoribus medio æneis. Long. 4 mill.

Caput thorace fere latius, transverso-rotundum, ocellis in triangulum dispositis; facie sat punctata; genis sulco tenui et fovea magna pone mandibulas validas rufo-piceas instructis; clypeo fere lævi, nitido. Antennæ nigro-fuscæ,

breviusculæ, articulis 2 primis testaceis, annellis parvis sed discretis, funiculo incrassato, articulis sensim latioribus pilosulis, clava magna, oblique truncata. Thorax brevis; pronoti collari angusto, margine acuto mutico; mesonoti scuto fortiter transverso, parum convexo, subsquamoso-punctato, æneo, sulcis antice conspicuis; scutello parum convexo; dorsello angusto; metathorace haud brevi, subtiliter crebre punctato, carina tenui et plica laterali instructa, spiraculis rotundis a postscutello remotis. Alæ fere hyalinæ, cellula et nervo basali nudis, radio metacarpo paullo brevior. Abdomen æneum, petiolo supra depresso, punctatissimo, segmento 2 maximo ventrem plane amplexente, fovea basali profunda et longa, dorso convexo polito glabro, reliquis retractis. Pedes testacei, coxis æneis. Meso- et metapleura lævia.

Mas differt: antennis funiculi articulis subcylindricis fusco-testaceis pube brevi adpressa vestitis, segmento 2:o brevior, femoribus basin versus æneis.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Genus *Syntomopus* Walker.

Caput vertice angusto, genis teretibus. Scapulæ haud discretæ. Scutellum planum. Metathorax sat longus, punctatissimus. Abdomen segmento 1:o coxas posticas superante, 2:o maximo. Pedes brevisculi. Pronotum magnum. clypeus medio 3-dentatus.

Detta släkte skiljes lättast från föregående på den platta scutellum, ovanligt starkt utveckladt pronotum, smal hjessa, ej starkt utbildadt 3:e dorsalsegment och gröfre lår.

1. *S. incisus* m: Coeruleus vel virescenti-æneus, tibiis totis vel pro parte pallidis, capite transverso, postpetiolo apice medio inciso. Long. 3—5 mill.

Caput thorace latius, transversim rotundum, vertice angusto, tereti, ocellis fere in lineam transversam dispositis; facie plana; clypei dente medio majore, lateralibus parvis; genis teretibus, fovea pone mandibulus sat validas breviusculas nulla. Antennæ longe infra medium insertæ, breves; articulo 1:o æneo sat longo sed ocellum anteriorem haud attingente, 2:o breviter obconico, metallico, anellis brevissimis sed conspicuis, funiculi articulis omnibus transversis nigris, sensim latioribus, clava magna obtuse rotundata. Thorax longus, supra planiusculus; pronoto latera versus dilatato, margine postico emarginato, antico truncato, certo situ obsolete 4-dentato, humeris rectangulis; mesonoto dense subtilissime punctato; scutello magno, sutura minus sinuata, dorsello haud lato; metathorace magno, confertissime concinne punctato, plica laterali sulco spiraculari contigua et interdum carina media instructo. Alæ fere hyalinæ, apice sat late rotundato ciliato, stigmatibus radio sesqui longiore. Abdomen dorso supra planiusculo, plerumque cyaneum vel violaceum, segmento 1:o coxas posticas paullo superante, 2:o maximo, dimidium abdominis superante, apice truncato medio leniter inciso, lateribus lobato-producto, 3—7 brevibus, terebra anum paullo superante. Pedes ænei, tarsis et tibiis pallidis, his plerumque æneis basi apiceque pallidis. Præsterna magna punctatissima. Mesosterni longi sulcus medius profundus subcrenulatus. Epimera mesothoracis et metapleura subsquamoso-punctata.

Mas differt: antennis funiculi articulis pube brevi exserta grisea dense vestitis, crassitie æqualibus fere transversis; postpetioli fovea basali adhuc majore.

Ej sällsynt i medlersta och södra Sverige.

2. *S. oviceps* m: Obscure æneus, capite ovali, postpetiolo apice medio integro. Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, capite ovali, inferne fere latiore, clypei dente medio majore, antennis flagello adhuc brevior, postpetiolo apice haud inciso, petiolo minus longo certe discedens.

Sällsynt i Småland och Skåne.

Genus *Cyrtogaster* Walker.

Dicormus Foerster.

Caput vertico lato, medio acuto. Scapulæ haud discretæ. Abdomen segmento 1:o sat longo sed coxas posticas haud superante, 2:o et 3:o maximis, 2:o apice late emarginato, ventre convexo. Palpi maxillares ♂ articulo penultimo maximo subgloboso viridi, ultimo tenui sulclavato.

Detta slägte afviker från alla föregående genom hjessan som är skarpkantad nästan ända till ögonen, genom abdomen, hvars 1:a segment ej är längre än bakhöfterna, 2:a i midten bredt urbräddadt och liksom 3:e mycket stort. Från *Polycystus* skiljes det genom ej afsatta scapulæ och skarp hjesskant.

1. *C. vulgaris*: Æneus, pedibus rufis vel fuscis, tibiis intermediis ♂ nigro-fuscis. Long. 3—4 mill.

Walk. l. c. I. 383.

Æneus vel cupreus. Caput subtriangulare, genis compressis, ocellis fere in triangulum dispositis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo longo tenui, flavo, apice interdum æneo, flagello apicem versus incrassato, articulis subtransversis nigro-fuscis. Thorax haud longus; pronoti collari angusto, margine antico acuto mutico; mesonoto subsquamoso-punctato; scutelli freno declivi haud discreto; metathorace haud brevi, declivi, fortius rugoso, calli fimbria sat magna. Alæ fere hyalinæ, radio metacarpo brevior. Abdomen subtus convexum, æneum, petiolo rugoso-sulcato, segmento 3:o supra medio quam 2:o longior. Pedes graciles, obscure rufi vel testacei, coxis æneis. Epimera mesothoracis et metapleura squamoso-punctata.

Mas differt: antennis flavis, funiculi articulis cylindricis hirtulis, pedibus intermedis tarsis totis tibiisque basi excepta nigro-fuscis.

En af våra allmännaste arter, utbredd öfver hela Sverige.

Genus **Polycystus** Westwood.

Caput vertice immarginato. Scapulæ discretæ. Scutelli frenum sutura impressa discretum. Abdomen petiolo coxis posticis haud longiore, segmento 2:o profunde emarginato et 3:o maximis. Mas palpis utrisque articulo penultimo subgloboso metallico.

Detta slägte står i kroppsform mycket nära föregående, men skiljes lätt genom ej skarpkantad hjessa, tydligt afsatta scapulæ och frenum, hannen dessutom genom palpernas form.

1. *P. scapularis* m: Æneo-niger, pedibus fuscis, ♂ antennis flagello fusco, femoribus tibiisque rufis. Long. 2—3 mill.

Cyrtog. vulgari simillimus, sed paullo minor, magis nigro-æneus, pedibus obscurioribus, mesonoto obsoletius punctato, ♂ antennis flagello fusco, tibiis et tarsis intermediis mox discedens.

Sällsynt; funnen på en fuktig äng vid Lund.

Genus **Pachycrepis** Foerster.

Coryna Walker.

Caput genis compresso-acutis. Scapulæ discretæ. Alæ stigmatæ crasso, radii clava sat magna. Abdomen subclavatum, petiolo brevi, segmentis 2—4 magnis.

Genom tjockt stigma och tydligt afsatta scapulæ genast skildt från öfriga släkten.

1. *P. clavata*: Viridis, antennis fuscis scapo pedibusque testaceis: ♂ antennis flagello hirtulo, abdomine segmento 2:o lineari. Long. 3 mill.

Coruna clavata Walk. l. c. I. 380.

Læte æneo-viridis, fere glabra, abdomine apice pilosello. Caput thorace paullo latius, vertice immarginato, sat lato, ocellis magnis, facie lateribus et inferne subtrigosa, clypeo apice medio dente armato; genis compressis, pone mandibulus fovea impressa; oculis magnis prominulis. Antennæ filiformes, fronti medio insertæ, basi paullo distantes, scapo lineari testaceo, funiculo obscuriore, articulis haud transversis, clava longa acuminata. Thorax minus robustus, pronoti collari haud lato, margine antico recto acuto; scutello convexo lævi, freno discreto; metathorace haud brevi, declivi, punctatissimo, plica nulla, nucha brevi compressa, calli fimbria fere nulla. Alæ magnæ, apice lato rotundato ciliato, cellula basali parce pubescenti, speculo parvo, costa stigmatē sesqui longiore, hoc radii longitudine, quam metacarpo multo breviorē, præstigmatē fractura sat distincta. Abdomen æneo-viride, postpetiolo subtus rufescente. Pedes testacei, coxis metallicis, posticis et femoribus pilis parvis longis fimbriatis. Mesopleura evidenter divisa inferne et metapleura vix punctata. Mesosternum postice sulco lato et sat profundo.

Mas differt: antennis pilosulis, abdomine segmento 2:o angusto sublineari, 6—7 punctulatis.

Sällsynt.

Genus *Pachyneuron* Walker.

Caput genis compresso-acutis. Scapulæ haud discretæ. Alæ stigmatē crasso brevi, radii clava haud magna. Abdomen petiolo brevi, rotundum vel subovale.

Detta släkte, som lätt skiljes från *Pachycripsis* genom ej af-satta scapulæ, bildar öfvergången till *Pteromalides*, men afviker genom djupare fåra på mesosternum i förening med tjockt stigma, skarpt hoptryckta kinder och hvasskantadt collare.

1. *P. formosum*: Æneum virescens, antennis scapo pedibusque flavis, coxis et ♀ interdum femoribus æneis, scutello convexo, abdomine segmento 1:o haud transverso, 2:o medium attingente. Long. 3 mill.

Walk. l. c. I. 380.

Caput sat latum, pone oculos vix angustatum, vertice sat lato, medio immarginato, ocellis magnis in triangulum dispositis, clypeo apice mutico striolato, haud discreto, genis usque ad tempora fortiter acute compressis; peristomio parvo, sed mandibulis validis, rostrato-subproductis. Antennæ fronti medio leniter protuberanti insertæ, scapo tenui flavo, funiculo nigro-fusco, tenui, apicem versus vix incrassato, clava subacuta, mediocri. Thorax sat crassus; pronoti collari brevi, margine antico acuto subrotundato; mesonoti sulcis antice inchoatis, minus fortiter, scutello convexo subtilius punctato, freno declivi; dorsello haud magno; metathorace haud brevi subdeclivi, punctatissimo, nucha brevi, carina et plica nullis, spiraculis subrotundis. Alæ costa stigmatæ duplo longiore, hoc radii longitudine, metacarpo radio sesqui longiore; cellula basali et n. basali nudis, speculo sat magno, apice late rotundato ciliato. Abdomen ovali-rotundum, postpetiolo magno, apice late rotundato, segmentis 3—7 parvis æqualibus, 8:o minimo, 1:o subpunctato, latitudine sua paullo longiore sed coxis posticis brevior; ventre planiusculo, basi haud inter coxas compresso-gibboso. Mesopleura divisa, inferne et metapleura punctata. Mesosternum sulco medio profundo fere integro. Pedes graciles sed minus longi, femoribus plerumque æneis.

Mas differt: antennis funiculi articulis testaceis, longioribus, hirtulis, abdomine ovali, femoribus testaceis.

Ej sällsynt i Skåne på Pil.

2. *P. grande* m: Cyaneo-virescens, abdomine subrotundo, postpetiolo brevi, scutello convexo. ♀ long. 4 mill.

Præcedenti simillimum sed fere duplo majus, abdomine thorace latiore rotundo, postpetiolo brevi trientem abdominis haud occupante; genis latioribus inferne magis dentato-prominulis; metathorace nucha majore, spiraculis magnis, ovalibus distinctum.

Funnen i Dalarne af framlidne prof. Boheman.

3. *P. gibbiscuta* m: Coerulescens, mesonoto cum scutello alte elevato punctis majoribus adperso, petiolo transverso. ♂ ♀. Long. 3 mill.

A præcedentibus ♀ capite vertice minus lato, prope ocellos parcius punctato, genis minus acutis; antennis brevioribus, funiculi articulis transversis; mesonoto et scutello fortius elevato punctis majoribus setulas nigras gerentibus adpersis; metathorace brevior, fere lævi, spiraculis parvis, rotundis, sulco spiraculari nullo; abdomine breviter ovato, petiolo brevi, leviter transverso; ♂ antennis funiculi articulis transversis, parcius hirtulis, scapo brevi, dimidio apicali compresso-dilatato bene distinguendum.

Sällsynt; funnen på Öland och vid Ringsjön i Skåne.

4. *P. planiscuta*: Virescenti-æneum, mesonoto cum scutello planiusculis. Long. 2 mill.

P. formoso simillimum, sed ♀ capite brevior, vertice minus lato, genis parum compressis, ocellis fere in lineam curvam dispositis; antennis scapo flavo, brevi, flagelli fusci tenuis articulis transversis; mesonoto plano, scutello nitido fere lævi depresso; metathorace, nucha fere nulla;

alis stigmatē radio fere longiore, hoc clava fere nulla; abdomine petiolo breviorē, subtransverso: ♂ antennis funiculi obscurē testacei articulis transversis, parce hirtulis bene distinctum.

Sällsynt vid Holmeja i Skåne.

5. *P. Aphidis*: *Coerulescens*, antennis postannello ♀ abrupte ♂ paullo minore. Long. 2 mill.

Pteromalus aphidis Bouche (teste Reinhard.)

Species a præcedentibus colore obscuriore pedum antennarumque structura mox discedens. Caput thoracis latitudine, transversum, antrorsum angustatum, vertice parum lato, genis minus compressis. Antennæ breves, articulo 1:o coerulescenti, 2:o subtransverso, 3-4 vix conspicuis, 5:o sequentibus fuscis transversis duplo angustiore. Thorax brevis, mesonoto subtilissime punctato, scutello alte elevato, sublævi; metathorace brevi vix visibiliter punctato, sulco spiraculari fere nullo. Abdomen ovali-rotundum, segmento 1:o brevissimo, 2:o medium haud attingente. Pedes coerulescentes, tibiis subfuscis, basi et apice pallidis.

Mas differt: antennis articulis 1:o coeruleo vix compresso, 5:o sequentibus subquadratis sat longe hirtulis paullo angustiore, petiolo vix transverso.

Sällsynt; funnen vid Lindholmen i Skåne.

Subtribus *Chiropachides*.

Caput vertice immarginato, genis teretibus, clypeo parum discreto, rarius transverso; oculis glabris; facie plana inferne punctis paullo majoribus piliferis subpuberula; mandibulis sat magnis sed margine externo basi haud sinuato, sinistra 3-, dextra 4-dentata; scrobe haud vel vix impressa. Palpi maxillares articulo ultimo subdilatato. Antennæ fronti medio insertæ, basi parum

distantes, annellis plerumque bene discretis, funiculo semper 6-articulato, clava haud magna, rarissime ♀ apice stylata. Thorax pronoti collari interdum margine antico acuto; scapulis haud discretis sed mesonoti sulcis interdum ad medium productis; scutelli freno haud discreto; dorsello rarissime polito haud magno; metathorace plerumque brevi, spiraculis sat magnis subrotundis. Alæ sæpissime maculatæ et præstigmatæ cum radii clava magnis, interdum etiam stigmatæ crasso, nervo spurio fere e medio cubiti egrediente. Abdomen fere sessile, plerumque ♀ compressum, ventre carinato, segmento 2:o apice subtruncato. Pedes sat validi, coxis posticis plerumque basi margine postico dense pubescente; femoribus sæpius validis. Episterna mesothoracis distincta, epimera creberrime subtilius punctata. Tibiæ posticæ plerumque 1-calcaratæ. Corpus plerumque magnum. Mas antennis ♀ fere conformibus, rarissime hirtulis.

Denna afdelning sluter sig å ena sidan till *Cleonymides*, från hvilka den skiljes genom ej afsatta scapulæ eller frenum, svaga eller inga antenn-gropar på pannan, starkare utbildade låår och oftast blott en sporre på bakbenens tibier; å andra kommer den så nära till *Pteromalides*, att gränsen emellan dessa båda afdelningar blir svår att uppdraga. I allmänhet kan man säga om *Chiropachides* att deras antenner hafva tydligare utbildade annelli men svagare klubba; ansigtet är nedtill försedt förutom den täta bottenpuncturen, med större glest stående hårbärande puncter; clypeus har merendels lika stor längd som bredd; vingarne äro merendels försedda med bruna fläckar eller band och oftast äro præstigma samt radii klubba ovanligt starkt utbildade, hvilket stundom äfven inträffar med stigmat; lååren äro jemförelsevis gröfre än hos de flesta andra; abdomen ofta hos ♀ koniskt förlängd och kölformigt hoptryckt på buksidan.

De flesta arter, hvilkas metamorphos är känd, lefva parasitiskt på träinsecter oftast på Coleoptera.

Conspectus generum.

- A) Tibiæ posticæ calcaribus 2 armatæ. Alæ fasciatæ, stigmatæ haud crasso.

- a) Femora antica exciso-dentata. Tibiæ posticæ calcaribus arcuatis. Alæ fasciis 2 ornatæ. *Chiropachys*.
- aa) Femora antica simplicia. Alæ fasciæ 1 ornatæ, radii clava magna horizontali. *Acrocormus*.
- B) Tibiæ posticæ 1-calcaratæ.
- b) Alæ stigmatæ crasso.
- c) Antennæ annello 1:o 2:o majore haud transverso. Coxæ anticæ subcylindricæ. Radii clava obsoleta. Pronoti collare margine haud acuto. Sulci mesonoti medium superantes. *Pandelus*.
- cc) Antennarum anelli transversi. Coxæ posticæ cyaneæ.
- d) Radius et metacarpus brevia. *Metacolus*.
- dd) Radius stigmatæ longior. Antennæ ♀ clava apice stylata. *Raphitelus*.
- bb) Alæ stigmatæ haud crasso.
- e) Alæ radii clava maxima. Pronoti collare margine antico acuto. Metathorax plica integra. *Dinotus*.
- ee) Alæ radii clava parva vel mediocri. Collaris margo anticus haud acutus. Metathorax impunctatus. *Rhopalicus*.

Genus *Chiropachys* Westwood.

Caput clypeo apice medio leniter emarginato. Antennæ flagello filiformi, annellis transversis, scapo superne compresso-dilatato. Pronoti collare subdiscretum sed margine antico haud acuto; scutello postice declivi; metathorace brevi, carinato, fere levi. Alæ stigmatæ haud in-crassato, metacarpo præstigmatæ et radio longitudine sub-æqualibus, hoc clava ovali haud magna; fasciis 2 fuscis ornatæ. Abdomen ♀ elongatum, ventre compresso-carinato. Femora antica subtus apice sinuato-excisa; tibiæ

posticæ margine externo spinulis brevissimis muricatæ calcaribus 2 arcuatis armatæ. Coxæ subovatae.

Detta slägte skiljes med lätthet på frambenens lår, hvilka i spetsen på undre sidan äro försedda med en bugt samt på de 2 fascierna på framvingarne.

- 1 C. *Colon*: Cupreus, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis: ♂ abdomine basi pedibusque rufescentibus, coxis posterioribus basi æneis. Long. 3-6 mill.

Sphex Colon Lin. Fauna Sv. Ed. II pag. 413. n:o 1656.

Chiropachys Quadrum. Walk. 1. c. IV. 14. 1.

Pteromalus bimaculatus. Sweder.

Caput thoracis latitudine, confertim punctatum; ocellis magnis, in lineam curvam dispositis; oculis subrotundis; genis sat longis buccatis; clypeo subquadrato, superne subdiscreto. Antennæ fere in medio frontis insertæ, scapo flavo sat longo superne evidenter compresso dilatato, pedicello oblongo, annellis parvis sed bene discretis, funiculo filiformi articulis crassitie æqualibus sed sensim paullo brevioribus, haud transversis, clava parva quam postannello paullo brevior. Thorax haud brevis; cupreus, sat fortiter subsquamoso-punctatus; pronoto magno, lateribus punctatis, sulco ordinario obliquo nullo; mesonoti sulcis antice inchoatis; dorsello haud polito; metathorace brevi, postice truncato paullo declivi, carina media distincta, plica nulla, spiraculis magnis subrotundis, calli fimbria sat longa. Alæ fasciis 2 abbreviatis ornatae, altera pre-stigmatali, altera radiali; cellula basali nuda. Abdomen thorace longius, segmentis cupreo-purpureo-fasciatis, omnibus lateribus pubescentibus, 1:o apice truncato, medio vix inciso. Pedes validi, coxis æneis, femoribus et interdum tibiis fusco-æneis; tarsis posticis articulo 1:o reliquis simul sumtis fere æquali. Pectus æneum; præsterna magna

punctata; mesosterni sulcus medius tenuis sed distinctus; epimera metathoracis evidenter crebre subtiliter punctata, metapleura brevia.

Mas differt: antennis flagello paullo longiore, vix magis pubescenti, scapo fortius compresso-dilatato; abdomine ovali segmento 1:o et 2:o rufis, hoc fovea basali profunda postice in canaliculam continuata; pedibus rufis, coxis posterioribus basi æneis; prosterno pallido.

Temligen sällsynt; men utbredd från Skåne till Lappland; troligen Ratzeburgs *Pter. bicaliginosus*.

Genus *Aerocormus* Foerster.

Caput clypeo apice medio obtuse bidentato. Alæ nervis crassis, radii clava magna, horizontali fere securiformi. Tibiæ posticæ calcaribus 2 rectis armatæ. Femora antica mutica.

Detta släkte står mycket nära föregående, men skiljes genom clypeus, som i midten har en smal inskränning, genom vingarne som hafva gröfre nerver med starkt utbildad klubba på radius och äro försedda med endast den bakre fascian, genom obehäpnade framlår och raka sporrar på tibierna.

1. *A. semifasciatus*: Cupreus, antennis scapo pedibusque pro parte flavis, metathorace punctulato; ♂ abdomine coxisque immaculatis. Long. 4-5 mill.

Chiropacho Colon simillimus, alis fascia tantum radiali fusca, metathorace punctulato, plica sulco spiraculari contigua, abdomine minus elongato, antennis flagello crassiore, scapo superne haud dilatato, metatarso postico minus elongato, tibiis posticis vix spinulosis, femoribus anticis haud excisis: ♂ abdomine coxis et femoribus æneis, his apice tibiis tarsisque pallidis discedens.

Sällsynt i norra Sverige.

Genus *Pandelus* Foerster.

Caput clypeo apice medio inciso-bidentato. Antennæ flagello longo, articulo 3:o haud transverso 4:o longiore. Thorax pronoto magno sed collari haud discreto; metathorace haud brevi, carina et plica instructo. Alæ stigmatate crasso, radio clava vix discreta. Abdomen ♀ ventre compresso-carinato. Pedes coxis longis, tibiis posticis unicalcaratis.

Detta slägte skiljes lätt från öfriga genom den ovanligt långa 1:a ringformiga antennleden, tjockt stigma och ej utbildad radialklubba.

1. *P. flavipes*: *Æneus*, antennis scapo pedibus cum coxis flavis, ventre prothoraceque pallidis; alis macula magna disci fusca ♀. Long. 5–6 mill.

Caput thorace fere latius, subtilius punctatum, ocellis fere in lineam curvam dispositis, facie maculis 3 cyaneis ornato; clypeo subtransverso, apice medio inciso, incisura utrinque dente obtuso terminata. Antennæ fere infra medium frontis insertæ; articulo 1:o flavo, superne leviter dilatato, apice angustiore, 2:o oblongo-triangulari, 3:o et 4:o reliquis angustioribus sed sat magnis, 5-10 crassitie æqualibus sensim brevioribus, cylindricis fusco-testaceis, clava pallidiore postannello brevior. Thorax sat longus; pronoti lateribus vix punctatis, collari haud discreto æneo; mesonoto subtilius punctato, sulcis mesonoti ad medium usque productis; scutello magno, freno declivi; metathorace haud brevi, nucha nulla, fere impunctato, carina et plica laterali fere recta distinctis, spiraculis magnis rotundis a postscutello remotis, calli fimbria parva. Alæ magnæ, disco medio umbra magna fusca, præstigmatate quam radio vix brevior, hoc sat crasso sed radii clava vix conspicua, stigmatate crasso quam metacarpo paullo brevior, quam radio fere longior, cellula basali nuda. Abdomen sat longum, triquetrum, apice haud conico, ventre

pallido, valvula ventrali medium haud attingente. Pedes sat longi sed femoribus validis fere fusiformibus; coxis longis, posticis supra basi pubescentibus, tibiis posticis fere muticis, tarsis tenuibus elongatis, articulo 1:o reliquis simul sumtis vix brevior. Mesosterni sulcus medius vix conspicuus, præsterna magna, episterna aurea, metapleura subpunctata.

Sällsynt i mellersta Sverige.

Genus *Metacolus* Foerster.

Caput clypeo apice medio subinciso. Antennæ flagello sub-incrassato, annellis transversis majusculis. Thorax pronoto magno sed collari haud discreto; metathorace carina et plica nullis. Alæ fascia sub stigmatæ, hoc crasso, quam metacarpo et radio brevissimis multo longiore. Abdomen elongatum. Tibiæ posticæ unicalcaratæ.

I formen af pronotum sluter sig detta slägte närmast till *Pandelus*, men skiljes lätt genom de starkt förkortade metacarpus och radius i framvingarne; från alla öfriga genera inom denna afdelning dessutom afvikande genom metathorax, som saknar både midtelköl, sidofålla och spiracular-fåra.

1. *M. unifasciatus*: Aureo et cupreo tinctus, antennis basi pedibusque flavis; ♂ fascia basali rufescenti. Long. 2—5 mill.

Species sculptura et colore pulcherrima. Caput transversum, thorace haud latius, vertice minus lato, ocellis rufis magnis fere in triangulum dispositis; oculis ovatis magnis; facie parum convexa, subtilissime creberrime punctata, inferne pubescenti, limbo cum ore flavis. Antennæ scapo longo lineari flavo, ocellum anteriorem fere superante, pedicello oblongo triangulari supra æneo, annellis fuscis, funiculi obscure testascei articulis sensim lenissime crassioribus, postannello cylindrico, præclava transversa, clava postannello brevior, apice obtusa oblique

acuminata. Thorax supra subdepressus, sculptura subtili sed acuta; pronoto flavo, supra medio æneo; mesonoti sulcis antice vix conspicuis; scutello fere aureo, freno vix declivi, axillis coeruleis; metathorace brevi, subcoeruleo lateribus cyaneis. Alæ fere hyalinæ fascia sub stigmatate nigro-fusca inferne abbreviata sed stigma totum occupante, hoc quam costa triplo brevior, radio clava parva sed distincta, cellula basali nuda. Abdomen elongatum, ventre carinato, apice subconico, valvula ventrali medium attingente. Coxæ pallidæ, posticæ saltim supra cyaneæ, margine postico basi dense pubescenti; femora valida cyaneo-micantia; tibiæ posticæ margine postico subdeplanato vix spinuloso, tarsis tibiis brevioribus, metarso minus elongato. Mesosternum sulco medio tenui, præsternis amplis sæpe flavis; metapleura aurea sublævia.

Mas differt: antennis flagello paullo magis elongato; metapleuris interdum flavis; abdomine basi pallido, ovali.

Sällsynt från Skåne till Dalarne; träffas på nyhuggna stubbar af gran.

Genus *Raphitelus* Walker.

Alæ stigma crassum, radio brevius. Pronoti collare vix discretum. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Antennæ annellis transversis, flagello incrassato, clava ♀ apice stylata.

Detta slägte öfverensstämmer med föregående i det tjocka stigmat, men afviker genom längre radius med ganska stor klubba; honan skiljes dessutom från alla andra genera genom antenn-klubban, som slutar i ett smalt stift.

1. *R. maculatus*: Cupreus, alis fascia abbreviata fusca substigmaticali, abdomine ovato, ♂ immaculato, pedibus fere totis et antennis scapo flavis. Long. 3—4 mill.

Walk. l. c. II. 179.

Statura reliquis hujus subtribus magis obtusa. Caput cupreum, clypeo apice medio truncato. Antennæ scapo minus longo sed sat crasso, flavo, pedicello oblongo-triangulari, annellis nigris 1:0 2:0 minore bene distinctis, funiculi articulis crassis, sensim paullo latioribus, omnibus transversis, clava parva vix nisi stylo apicali conspicua. Thorax crassus, cupreus, supra parce nigro-pilosellus; pronoti collari sat discreto sed margine haud acuto; mesonoti sulcis antice inchoatis, scutelli freno declivi; metathorace brevi, vix punctato, carina vix sed plica et sulco spiraculari bene conspicuis. Alæ stigmatè radio fere breviorè, hoc metacarpi longitudine, clava sat magna rotunda, speculo et cellula basali nudis, fascia abbreviata nigro-fusca substigmatica. Abdomen breviter ovatum, subtus haud compresso-carinatum, postpetiolo margine postico lenissime inciso. Pedes breviusculi validi, rufi, coxis metallicis, posticorum femoribus apice et tibiis sæpe nigro-fuscis. Mesosternum sulco medio vix conspicuo; præsternis amplis, metapleuris cyaneis.

Mas differt: antennis clava articulis normalibus, funiculo filiformi articulis longioribus pube exserta sat longa dense vestitis.

Sällsynt; funnen i Lappland.

Genus *Dinotus* Foerster.

Antennæ scapo longo, annellis transversis, funiculo filiformi. Thorax collari margine antico acuto; metathorace brevi, plica sæpissime integra fere recta. Alæ stigmatè radio sesqui longiore, hoc clava magna. Abdomen ♀ compressum, apice conico-producto. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ.

Detta slägte skiljes från alla genom pronoti collare, hvars framkant är skarp och genom metathorax, hvars sidofälla oftast

löper oafbruten ända till spetsen. I habitus sluter det sig närmast till *Pandelus*.

1. *D. bidentulus* m: Viridi-æneus, alis præstigmatè crasso, radii clava maxima, antennis basi pedibusque pro parte pallidis: ♂ abdomine ovali macula vel fascia basali pallida. Long. 3—6 mill.

Species a sequente metathorace minus brevi, calcari postico longo valvulaque ventrali medium abdominis superante distincta. Caput thoracis latitudine, pone oculos haud angustatum, vertice lato, ocellis in triangulum dispositis, clypeo haud transverso, apice medio inciso-bidentato. Antennæ longæ, graciles frontis puberulæ medio insertæ; articulis 1:o flavo ocellum anteriorem superante, fere lineari, 2:o oblongo-triangulari, 3-4 angustis, parum transversis, 5-10 cylindricis, fusco-testaceis, clava obtusa postannello breviorè. Thorax sat longus; pronoti collari medio angusto, latera versus dilatato, margine antico acuto elevato; mesonoti sulcis tenuibus ad medium usque productis; scutelli freno parum declivi; metathorace vix punctulato, carina media minus distincta quam plica laterali breviorè, spiraculis haud magnis rotundis a postscutello remotis. Alæ amplæ, cellula basali et speculo nudis; præstigmatè brunneo sat crasso radio fere longiore, stigmatè costa haud duplo breviorè minus tenui pallido, metacarpo radio saltim duplo longiore, hoc clava maxima interne dilatata et sæpius macula fusca ornato, hac rarius ad metacarpum usque dilatata. Abdomen viridi-cyaneum, compressum, ventre carinato, apice conico-producto valvula ventrali medium superante. Pedes sat longi, femoribus validis rufis vel viridi-tinctis, tibiis rufis, coxis æneis posticis margine postico dense pubescenti, tarsis posticis articulo 1:o reliquis breviorè. Mesosterni sulcus medius tenuis, epimera concinne subtiliter punctata.

Mas differt: antennis flagello vix puberulo, scapo magis dilatato, abdomine ovali cupreo, basi pallida, cellula basali parce pubescente, coxis interdum intus pallidis.

Ej sällsynt. *Pteromalus multicolor* Ratzeburg synes komma den mycket nära.

2. *D. calcaratus* m: Cyaneo-viridis, metathorace brevissimo, alis radii clava maxima, tibiis posticis calcari longo. ♀ Long. 5—6 mill.

Præcedenti simillimus, sed metathorace adhuc brevior, carina media fere nulla, alis radii clava interne magis dilatata, abdomine magis compresso sed valvula ventrali medium haud attingente, tibiis posticis calcari longiore et præstigmatæ crassioræ basi angulato bene distinctus.

Sällsynt i medlersta Sverige.

3. *D. clypealis* m: Virescens, antennis basi pedibusque flavis, alis immaculatis clava mediocri subrotunda, clypeo apice medio truncato mutico, ano rigide hirta ♀ Long. 3 mill.

A præcedentibus corpore minore, graciliore, alis præstigmatæ tenuiore, radii clava magna sed minus inferne dilatata, clypeo apice medio haud inciso, abdomine segmento ultimo rigide setoso compresso terebram obtegente, antennis funiculo parce pilosulo, femoribus minus validis bene distinctus.

Sällsynt i norra Sverige.

4. *D. Pteromalinus* m: Virescens, antenni basi pedibusque pro parti pallidis, metathorace longo costula transversa, alis immaculatis clava majuscula: ♂ antennis hirtulis, tibiis, fuscis. Long. 3—5 mill.

Species transitum ad genus *Cenacis* formans, sed coxis posticis basi pubescentibus abdomine compresso-carinato huic generi associata. Caput thoracis latitudine, vertice lato, ocellis magnis in triangulum dispositis, facie planiuscula, clypeo apice trisinuato. Antennæ longæ fronti medio insertæ, articulis 1:o testaceo, sublineari ocellum anteriorem attingente, 2:o oblongo-triangulari 3-4 transversis nigris minus discretis, 5-10 nigris, cylindricis, clava magna, ovali, subtus deplanata, interne suturis subobliquis. Thorax obscure viridi-æneus, supra subsquamoso-punctatus, parce pallide pilosellus; pronoti collari margine antico acuto, latera versus dilatato; mesonoti sulcis antice inchoatis; scutelli freno declivi, dorsello punctatissimo; metathorace sat longo, declivi, postice angustato, subpunctato, costula ante medium distincta, carina vix discreta sed plica medio interrupta, spiraculis subovalibus. Alæ subhyalinæ, præstigmatæ haud crasso sed fere radii longitudine, hoc clava sat magna ovali, stigmatæ minus tenui radio sesqui longiore, cellula basali postice parce pubescenti. Abdomen thorace longius, postice conico-attenuatum, ventre compresso-carinato, segmentis haud fasciatis, 1:o apice medio rotundato. Pedes elongati, coxis et femoribus æneis, illis posticis margine postico dense pubescenti. Mesosterni sulcus medius tenuis, præsterna sat magna triangularia, metapleura fere lævia.

Mas differt: antennis funiculo hirtulo, clava elongata, abdomine cupreo, tibiis præsertim posterioribus fuscis.

Sållsynt i Skåne.

Genus *Rhopalicus* Foerster.

Caput clypeo apice medio bidentato. Pronoti collare vix discretum, margine antico haud acuto. Metathorax brevis, carina media distincta, plica nulla. Alæ radii

clava haud magna, angusta. Abdomen ventre minus carinato, apice obtuse productum. Tibiæ posticæ unicalcaratæ.

Detta slägte skiljes från *Dinotus* genom pronotum, hvars framkant ej är skarp, genom metathorax, som saknar sidofålla samt genom vingarnes radialklubba, som är smal.

1. R. *Annellus* m: [Æneus, aureo-tinctus, alis macula radii fusca, antennis longis scapo pedibusque flavis, coxis macula viridi vel cyanea: ♂ abdomine fascia basali pallida, alis totis pubescentibus, nervis validis. Long. 3—5 mill.

Pteromalus binotatus et *4-notatus* Dalman.

Species a sequentibus annellis magnis, 2:o majore quam funiculo parum angustiore, hoc filiformi articulis omnibus crassitie longioribus optime distinguenda. Caput thoracis latitudine, pone oculos vix angustatum, vertice minus lato, ocellis magnis rufis in arcum dispositis; clypeo haud transverso, apice medio inciso-bidentato. Antennæ fronti medio insertæ; articulo 1:o flavo, fere lineari, 2:o oblongo, 3:o 4:o paullo minore, hoc vix transverso, quam sequentibus sensim brevioribus paullo angustiore, clava parva postannello brevior. Thorax æneotinctus, supra subdepressus, antice punctis parce adspersus, dense subtiliter punctulatus; mesonoti sulcis ad medium usque fere productis; scutello subdepresso, freno haud declivi; metathorace brevi coeruleo, lævi, apice medio emarginatus, spiraculis rotundis a postscutello remotis. Alæ fere hyalinæ, macula fusca sub radii clava nervis sat crassis, præstigmatum sat longo sed radio brevior, stigmate radio haud sesqui longiore, hoc clava ovali. Abdomen thorace vix longius, ventre minus carinato, segmento 1:o apice truncato, medio lenissime inciso. Pedes rufi, sat validi, coxis supra viridibus, posticis cyaneis margine postico dense pubescenti. Epimera meso-

thoracis subtiliter punctata et episterna fere aurea. Præsterna magna triangularia, superne striga impressa.

Mas differt: antennis scapo magis dilatato, flagello subtestaceo; alis totis pubescentibus nervis crassioribus; abdomine ovali cupreo basi fascia pallida; pectore viridi cyaneo.

Temligen sällsynt öfver hela Sverige.

2. *R. brevicornis* m: Viridis, antennis brevibus subincrassatis, basi pedibusque flavis, alis immaculatis ♀. Long. 4 mill.

Præcedenti simillimus, sed antennis flagello apicem versus lenissime incrassato, annellis brevioribus, funiculi articulis bene discretis, penultimo fortius transverso; præsternis superne striga nulla; alis immaculatis, nervis paullo tenuioribus; abdomine fasciato; femoribus paullo validioribus, coxis posticis superne et callo metathoracis cyaneis bene distinctus.

Sällsynt; en hona funnen på barrträd vid Wittsjö i Skåne.

3. *R. guttatus*: Cyaneo-viridis, antennis scapo pedibusque pro parte flavis; alis hyalinis macula fusca sub stigmatis basi; femoribus minus validis ♀. Long. 4 mill.

Pteromalus guttatus Ratz. die Forstins. I. 188.

Species femoribus minus validis et antennis funiculo crasso, clava ovata ventreque paullo magis compresso a præcedentibus diversa, sed sculptura thoracis, metathorace brevi, carina media distincta sed plica nulla, præsternis magnis punctatis, dorsello punctatissimo huic generi associata. Caput vertice minus lato, ocellis in lineam curvam dispositis. Antennæ scapo flavo, pedicello minus longo, annellis brevissimis, funiculi nigri articulis arcte

contiguis, penultimo transverso, clava haud brevi apice obtusa. Thorax haud longus; pronoto collari haud acuto, medio angusto, latera versus dilatato; mesonoti sulcis brevibus; scutelli freno declivi; metathorace cyaneo, callo laterali pulchre coeruleo. Alæ hyalinæ præstigmatate tenui haud brevi, stigmatate sat crasso radio fere sesqui longiore, hoc clava parva fere rotunda, metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen thorace vix longius, apice producto, ventre leviter carinato, segmento 2:o cyaneo, lateribus coeruleo, apice cupreo. Pedes coerulescentes, coxis posticis pulchre cyaneis, trochanteribus, genubus, tibiis apice, anticiis totis tarsisque flavescentibus.

Sällsynt; funnen i Lappland.

Subtribus *Caratomides*.

Caput maximum latum, facie excavata, radiatim striata, utrinque prope oculos tuberculis 2 acutis armata. Abdomen subrotundum, petiolo vix transverso.

Denna grupp, som endast innehåller ett slägte, skiljes genast från alla andra genom hufvudets form och ansigtets striering.

Genus *Caratomus* Dalman.

Caput clypeo haud discreto; mandibulis, dextra 4-, sinistra 3-dentata; oculis parvulis hirtis. Antennæ clavatae, annellis magnis. Thorax brevis crassus, collari vix discreto, margine haud acuto; scapulis haud discretis; metathorace haud brevi, declivi. Alæ præstigmatate maximo, stigmatate haud crasso, radio fere brevior, hoc curvato, clava parva. Abdomen subrotundum, postpetiolo magno. Pedes validi, tibiis posticis 1-calcaratis.

1. *C. megacephalus*: Coeruleo-niger, antennis scapo pedibusque fere totis pallidis: ♂ abdomine breviter ovali, subtus planiusculo, plica ventrali nulla. Long. 3-5 mill.

Diplolepis megacephala Fab. Sys. Piez. 149. 21. 2.

Pteromalus macrocephalus Foerster. 252.

Species corpore brevi, coacto, capite grande insignis. Caput crebre sat fortiter punctatum, fusco-pubescent, thorace latius, pone oculos vix angustatum, vertice lato sed profundius emarginato, tereti; ocellis in triangulum dispositis; clypeo cum facie usque ad oculos striis radiantibus instructo: genis longis et latis, subcompressis; mandibulis validis, piceis, externe basi transversim depressis. Antennæ breves, in medio faciei insertæ; scapo sublineari, ocellos haud attingente, pedicello oblongo, magno, articulis 3:o 4:o pallo longiore, 4—10 sensim latioribus brevibus, fuscis vel obscure testaceis, clava pallida magna, subtus excavata, oblique acuminata. Thorax latitudine sua vix longior, coerulescenti-niger, creberrime sat fortiter punctatus; pronoti collari latitudine subæquali; mesonoti sulcis antice conspicuis, scutello convexo, freno haud discreto sed fortiter declivi, dorsello angusto verticali; metathorace postice angustato, fortiter declivi, sublævi, carina media tenui, plica nulla, spiraliculis parvis subrotundis. Alæ apice sat lato rotundato, ciliato, cellula basali fere tota pubescenti, speculo nullo, nervis basali vix conspicuo, spurio e medio cubiti egrediente; costa stigmatate fere triplo longiore, metacarpo radio fere longiore; cellula costali lata. Abdomen rotundum, supra planum æneum, subtus convexum; segmentis 1:o fusco-testaceo, 2:o maximo, medium occupante, 3—8 brevissimis, terebræ apice occulto. Pedes sat longi sed validi, rufescentes vel fusci, coxis ovatis, posticis margine superne haud pubescenti; femoribus anticis haud attenuatis; tibiis posticis apicè subsinuatis, calcari sat longo; metatarso elongato. Pectus brevissimum, præsternis parvis; mesosterni lateribus et pleuris punctatis, episternis politis sutura bene discretis.

Mas differt; capite pone oculos haud angustato; alis umbra disci fumata nulla; antennis conformibus sed minus validis, scapo metallico, clava haud excavata; abdomine ovali-rotundo, subtus planiusculo.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Subtribus *Colotrechnides*.

Caput epistomate carinato, vertice angusto. Antennæ funiculo cylindrico, annellis vix conspicuis. Thorax scapulis haud discretis. Alæ metacarpo et radio brevissimis, hoc clava fere sessili rotunda. Abdomen compressum subsessile. Pedes coxis posticis magnis ovato-compressis, tibiis posticis calcaribus 2 longis armatis.

Det slägte, hvarpå denna grupp är grundad, erinrar om *Ormyrus* i vingarna, men skiljes genom occipitallinjen, som saknas. Från öfriga grupper af *Pteromalides* kännes den lätt, förutom på vingnerverne, på de 2 långa sporrarne på bakbenens tibia och starka hoptryckta höfter.

Genus *Colotrechnus*.

Caput scrobe antennali longa, sed parum profunda, genis longis, haud latis, teretibus; clypeo apice mutico; mandibulis parvulis, tridentatis. Antennæ fronti infra medium insertæ. Thorax pronoti collari angusto vix discreto; metathorace brevissimo. Abdomen apice conico-productum, segmentis omnibus dorsalibus pubescentibus. Tibiæ posticæ compressæ margine postico denticulato.

1. *C. subcoeruleus* m. Coeruleus, fere glaber tarsis albidis apice obscuris, alis medio subfumatis: ♂ antennis funiculo crasso, 5-articulato. Long. 3—4 mill.

Species nervis alarum *Ormyro* simillima, sed abdomine sculptura haud serrato-punctata mox discedens. Caput thorace fere angustius, haud transversum, antrorsum angustatum; ocellis in lineam sat curvam dispositis inter

se duplo magis quam ab oculis ovatis glabris distantibus; fronte superne punctulis majoribus parce impressis; scrobe antennali scapum antennarum totum excipiente; clypeo haud discreto, mandibulis piceis. Antennæ nigræ, scapo fere lineari æneo, annellis vix observandis, funiculi articulis crassis, æqualibus sed sensim paullo brevioribus, clava haud magna, subacuminata. Thorax supra subconvexus, vix fusco-pilosellus, nigro coeruleus, creberrime subtilissime punctatus; pronoto sensim declivi; mesonoti sulcis antice vix conspicuis; scutello acuminato, freno haud discreto, sutura utrinque fortiter sinuata, axillulis magnis, bene discretis, dorsello angusto lineari, metathorace carina media acuta brevissima, plica et sulco spiraculari nullis, spiraculis subrotundis postscutello arcte contiguis. Alæ apice sat lato rotundato, umbra fumata disci sub radio; cellula costali lata, basali nuda, speculo distincto; præstigmatæ brevi, costa stigmatæ fere duplo brevior. Abdomen thorace longius, fortius compressum, segmentis 1:o haud conspicuo, 2:o parvo fovea basali fere nulla, 2:o minimo, 3—8 sensim paullo longioribus, valvula ventrali medium superante. Pedes coeruleo-nigri, fere glabri, coxis posticis magnis, haud pubescentibus; femoribus compressis, anticis apice haud attenuatis; tibiis posticis leviter incurvis, margine postico spinuloso, calcariis albidis; tarsis tibia brevioribus. Mesosternum breve lateribus cum meso- et metapleuris politis, coeruleum, propleuris magnis triangularibus punctatis; mesopleura sutura bene divisa.

Mas differt: antennis funiculo crassiore, haud piloso, 5-articulato, pedicello brevissimo, in medio faciei insertis, scapo brevior compresso; alis immaculatis, abdomine oblongo, plica ventrali distincta.

Temligen sällsynt på Öland, Gottland och i Slåne.

An m. *Dibrachys* Foerster skulle bäst passa på detta släkte, men Reinhard har sändt mig *Pteromalus Boucheanus* som typ för detta genus.

Subtribus *Pteromalides*.

Caput vertice interdum medio acuto, oculis rarius hirtulis, facie interdum medio prominente; clypeo rarius discreto, genis plerumque teretibus; mandibulis 3—4 dentatis, sæpius sinistra 3-, dextra 4-dentata. Antennæ in medio vel infra medium frontis insertæ, scrobe frontis rarissime profunda, annellis 2 parvis, 2:o plerumque majore; funiculo 6-articulato sed articulo primo interdum abrupte minore annuliformi, clava ♂ rarius articulis plane liberis. Thorax scapulis numquam plane discretis, scutello freno sutura nulla distincto. Alæ præstigmatæ rarius magno, radio interdum clava sat magna, stigmatæ sæpissime tenui, nervo spurio e medio cubiti egrediente; maculis fumatis rarissime ornatæ. Abdomen petiolo haud longo, plerumque transverso, ♂ paullo longiore, terebra anum rarissime superante. Tibiæ posticæ rarius 2-calcaratæ. Corpus plerumque æneum vel viridi-metallicum.

Med denna grupp äro vi hunna till den svåraste afdelningen inom hela familjen. Om ock ej arterna äro så talrika som man af Walkers och Foersters arbeten skulle förmoda, så äro svårigheterna ändå betydliga med afseende på deras fördelning i genera eller subgenera. Flera sådana hafva redan blifvit af de ofvannämnda författarne framställda; men dels äro många af dem baserade endast på sexuella formkarakterer, dels äro ej få uppställda efter oriktiga observationer på de så kallade *annelli*, såsom man kan se af Foersters synoptiska tabeller. Walker indrog sjelf dessa släkten, emedan han ansåg dessa annelli ej vara af tillräcklig betydelse för uppställande af genera. Foerster deremot upptog dem på grund af det ej ringa antal arter, som till följe häraf komme att afskiljas från släktet *Pteromalus*. Nekas kan ej, att det skulle vara af stor vinst för indelningen om antenn-ledernas proportion kunna läggas till grund för grupperingen; men dervid möter ty värr! den svårigheten att dessa antennsträngens leder stundom variera hos könen, så att man ej kan veta på förhand när dessa annelli äro lika bildade hos hanne och hona. Ibland de bästa kännemärken äro onekligen mandiblerna, hvilkas olika dentition lemnar säkra karakterer för båda könen; men då jag ej varit i tillfälle att undersöka alla arterna, så har jag försökt att på grund af antennklubbans

form, metathorax' sculptur och vingarnes nervgång uppställa några få släkten, af hvilka man likväl i framtiden, då lefnadssättet af hithörande arters blir bättre känt, torde kunna uppställa många subgenera, som jag stundom sökt antyda i de underafdelningar inom släktena, som här och hvar förekomma. Först afsöndras de jemförelsevis få och olika bildade arter, som hafva 2 sporrar på bakbenen. De öfriga äro sammanfattade i endast 7 genera såsom synes af följande

Conspectus generum.

Section 1. Tibiæ posticæ 2-calcaratæ.

Dimachus.

Section 2. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ.

Diviso 1. Antennæ clava subulata ♀ vel ♂ conico-acuminata. Collare haud discretum. Metathorax punctatus, plica ett sulco spiraculari nullis.

Diviso 2. Antennæ clava haud subulata.

A) Antennæ infra medium faciei insertæ, postannello articulo sequente funiculi semper, interdum abrupte minore. Metathorax haud punctatus, carina sæpe stiam plica instructus. Alæ radii clava vix discreta, Vertex medio haud acuto genis teretibus. Abdomen haud rotundum. Mandibula sinistra 3-, dextra 4-dentata. *Eutelus.*

B) Terebra anum longe superans. Antennæ funiculo crasso articulo 1:o ♀ abrupte minore. Thorax supra læviusculus, metathorace brevissimo. *Roptrocerus.*

C) Antennæ funiculi articulo 1:o sæpissime magno, rarissime sequenti abrupte minore. Coxæ posticæ margine postico basi haud pubescenti. Mandibula sinistra plerumque 3-dentata, dente basali lato. *Etroxys.*

D) Collare margine antico discreto, acute reflexo. Metathorax nucha distincta. Mandibulæ acute 4-dentatæ. Calli fimbria, plerumque stiam postpetioli et coxæ posticæ magna. *Isocyrtus.*

E) Caput vertice medio interdum acuto, oculis interdum hirtis, mandibulis plerumque 4-dentatis. Antennæ interdum infra medium faciei protuberantis insertæ, annello utroque

sæpius bene discreto. Metathorax plerumque punctulatus et carina instructus. Abdomen sæpe rotundum, ♀ numquam apice conico-producto. *Pteromalus.*

- F) Mandibulæ dentibus 3 acutis, validis armatæ. Pronoti collare angustum vix discretum. *Metopon.*

Genus *Dimachus.*

Caput vertice medio haud acuto, oculis glabris, genis haud compresso-acutis, clypeo interdum lævi et subdiscreto. Antennæ funiculo articulis crassitie plerumque æqualibus, fere in medio faciei planiusculæ insertæ. Thorax collari haud lato, interdum haud discreto. Alæ stigmatæ rarius crassiusculo, radio sat longo clava haud magna. Abdomen postpetiolo mediocri. Tibiæ posticæ calcaribus 2 distinctis armatæ.

Från alla följande släkten skildt genom bakbenens tibier, som äro beväpnade med 2 sporrar. För öfrigt äro de få hithörande arter så olika i afseende på kroppsform, antenner och metathorax, att de lämpligen böra fördelas i flera subgenera.

Conspectus subgenerum.

- A) Pronoti collare haud discretum. Funiculus filiformis, postannello magno.

- a) Stigma crassiusculum, radio fere brevius. Corpus breve. *Cænocrepis.*

- aa) Stigma tenue, radio longius.

- b) Abdomen fascia basali flava. *Dimachus.*

- bb) Abdomen fascia nulla. *Hemitrichus.*

- B) Pronoti collare subdiscretum.

- c) Antennæ postannello parvo.

- d) Antennæ breves, clavatæ. *Habritus.*

- dd) Antennæ filiformes. *Dinarmus.*

- cc) Antennæ filiformes, postannello cylindrico. *Picroscytus.*

Subgenus *Cænocrepis*.

Caput vertice angusto, clypeo transverso, superne linea arcuata subdiscreto, apice inciso-bidentato; mandibulis parvis 3-dentatis, margine externo recto, dente basali obtuso, apicali haud forcipato. Antennæ medio frontis insertæ, scrobiculis nullis, funiculo articulis 6 crassitie æqualibus, præclava transversa, annellis minimis. Thorax brevis, pronoti collari haud parvo sed vixdiscreto, mesonoti sulcis antice parum discretis, metathorace brevissimo, carina media sed plica nulla. Alæ costa stigmatum crasso plus quam duplo longiore, radia clava mediocri rotunda, speculo distincto sæpe fumato. Abdomen subsessile, breviter ovatum, ventre leviter convexo. Pedes breves, femoribus tibiisque compresso-dilatatis.

Detta subgenus skiljes från alla andra inom subtribus *Pteromalides* genom 2-tandad clypeus, kort stigma och metathorax samt 2 sporrar på bakbenens tibiaer.

- 1 *C. arenicola* m: Coeruleo-ænea, genubus, tibiis apice tarsisque albidis. ♀ Long. 2—3 mill.

Statura brevis coacta fere *Pteromali puparum*, parum aneo-nitens, fere glabra. Caput fere lenticulare thoracis latitudine, ocellis in lineam vix curvam dispositis, genis angustis teretibus, oculis parum prominulis ovatis, mandibulis piceis. Antennæ thoracis apicem vix attingentes; articulo 1:o æneo, ocellum haud attingente, pedicello breviter triangulari, funiculi articulo 1:o latitudine sua paullo longiore, clava obsuse rotundata, mediocri. Thorax supra parum convexus dense subtiliter subsquamoso-punctatus, mesonoto fortiter transverso, scutello freno declivi; metathorace declivi, lævi nitido, spiraculis sat magnis. Alæ apice late rotundatæ, cellula basali nuda, præstigmatum haud longo sed sat crasso, speculo et interdum umbra parva sub radii clava sæpe fuscis, metacarpo radio paullo

longiore. Abdomen thorace fere latius, ventre haud carinato, apice haud conico-producto; æneum, parum pubescens, postpetiolo viridi. Pedes nigro-coerulei, genubus, tibiis apice tarsisque albidis, hic apice fuscis, coxis posticis ovato-compressis. Præsterna parva; mesosterni epimera subtiliter squamoso-punctata, epinemia sat distincta, episterna coerulea polita bene discreta: metapleura parva.

Sällsynt; funnen på sandfälten i Skåne och på Öland.

Subgenus **Dimachus**.

Caput scrobe antennali longa sed parum profunda; clypeo discreto, apice rotundato-truncato; mandibulis parvis, 3-dentatis, dente basali obtuso. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, flagello filiformi sat longo. Thorax collari angustulo vix discreto; metathorace brevi, carina acuta et plica laterali instructo. Alæ stigmatе tenui sesqui longiore, hoc clava vix discreta. Abdomen ovatum, ventre convexo, apicæ leniter conico-productum, fascia prope basim pallide testacea. Pedes minus validi, sat longi.

Den art, hvarpå detta subgenus är grundad, skiljes lätt på abdomens fascia, afsatt clypeus, fin sculptur på thorax och skarp köl på metathorax.

1. *D. discolor*: Olivaceo-æneus, pedibus maxima parte antennarumque scapo flavis, alis fere hyalinis minus latis. ♂ ♀. Long. 3—4 mill.

Pteromalus discolor Walk. 1 c. III. 473. 115.

Corpus parum nitidum, obscure orichalceum, vel olivaceo-æneum, vix pubescens. Caput latitudine sua parum brevius, antrorsum vix brevius, vertice angusto, ocellis in lineam curvam dispositis, oculis ovatis, fronte superne punctulis parce impressis, genis teretibus haud buccatis, mandibulis piceis. Antennæ, nigræ, scapo flavo, lineari,

pedicello triangulari, annellis parvis sed discretis, funiculi articulis sensim brevioribus, præclava vix transversa, clava conica acuminata. Thorax haud crassus, supra leviter convexus; pronoti collari haud lato; mesonoto subtilissime denseque, haud squamoso-punctato; scutelli sutura utrinque sinuata, freno haud discreto apice declivi, dorsello angusto; metathorace fere lævi, carina basi alte elevata, plica sulco spiraculari contigua, calli fimbria parva. Alæ subhyalinæ, cellula basali parce pubescenti, speculo distincto; costa stigmatē vix longiore, metacarpo radio paullo longiore. Abdomen ovatum, æneum, segmento 1:o vix conspicuo, 2:o haud magno, fascia pallide testacea ornato, 3—6 parvis, 7—8 longioribus; ventre convexo, flavescenti. Pedes rufescentes, coxis æneis, femoribus sæpius fusco-æneis. Mesosterni epinemia sat distincta, epimera et metapleura confertim punctata, præsterna haud parva.

Mas differt: antennis funiculo longiori, articulis pube adpressa vestitis; abdomine ovali, subtus plica distincta.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

Subgenus *Hemitrichus*.

Caput clypeo polito discreto, dente medio armato. Antennæ filiformes, sat crassæ. Pronotum sat magnum, declivē; mesonoti sulcis antice vix conspicuis; metathorace haud brevi, sed declivi, punctatissimo, carina et plica nullis. Alæ stigmatē sensim attenuato radio sesqui longiore, hoc clava parva ovali fere horizontali. Abdomen ovatum, ventre obtuse carinato. Pedes haud validi.

Detta slägte öfverensstämmer i kroppsform ganska mycket med föregående, men skiljes lätt genom polerad i midten tandad clypeus, puncterad metathorax. I bildningen af radius och clypeus erinrar det om *Trigonoderus*.

1. *H. rufipes* m: Olivaceo-viridis, antennis basi pedibusque rufis, coxis corpori concoloribus; abdomine basi fere nudo. ♀ Long. 3 mill.

Statura et magnitudo omnino *Dimachi discoloris*. Caput vix transversum, vertice haud lato genis fere lævibus sat longis, teretibus haud buccatis; clypeo læte æneo polito, subquadrato, sat bene discreto, apice medio dente armato; mandibulis sat validis, dentibus 42 acutis. Antennæ paullo infra medium faciei planiusculæ insertæ; scapo lineari rufo-testaceo, pedicello pallido, subtriangulari, annellis parvis sed distinctis, funiculo articulis sensim paullo brevioribus, articulo 1:o crassitie sua longiore, ultimo transverso, clava mediocri apice acuto. Thorax latitudine sua longior, supra leviter convexus, vix pubescens, dense subtilissime, haud squamoso-punctatus; collari magno sed antice tereti; scutelli freno convexo, declivi, vix nisi sculptura fortiore discreto; dorsello haud parvo, punctulato; metathorace confertim punctato, calli fimbria magna. Alæ fere hyalinæ, apice haud lato, costa stigmatum paullo longiore, hoc basi subincrassato sensim attenuato, metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen thorace paullo longius, æneum, subsessile; segmentis 2:o mediocri, fovea basali fere nulla, 3:o brevissimo, 4—6 æqualibus, 7—8 haud vel vix productis, 2—4 lateribus teretibus fere glabris 5—8 totis pubescentibus. Pedes rufescentes, minus validi, coxis æneis, posticis ovatis. Mesosterni epimera et metapleura sat fortiter punctata, episterna polita bene discreta; præsterna sat magna triangularia, punctata.

Sällsynt; ett exemplar funnet vid Lindholmen i Skåne.

Subgenus *habritys*.

Caput crassum, mandibulis validis, 3-dentatis, clypeo sublævi apice truncato, sinu nullo. Antennæ in utroque

sexu breves, crassæ, clavatæ, postannello parvo. Abdomen subovatum, apice haud producto.

Detta slägte, som i habitus står närmast *Coelopisthus*, skiljes lätt från alla genom de korta antennerna, de starka mandiblerna och genom clypeus, som saknar bugt, stor munöppning och 2 sporrar på baktibierna.

1. *H. brevicornis*: Nitidulus, olivaceo-viridis, antennis basi pedibusque pro parte pallidis: ♂ genis antice nigro-fimbriatis. Long. 4—5 mill.

Pteromalus brevicornis Ratzeburg (teste Reinhard).

Caput magnum, vertice lato, ocellis in triangulum dispositis; facie plana, utrinque prope ocellos punctis majoribus impressis; clypeo magno, sublævi, vix discreto; peristomio maximo; mandibulis magnis, margine externo recto dentibus validis acutis; genis teretibus buccatis. Antennæ brevissimæ, deflexæ clypei apicem haud attingentes; paullo infra medium faciei insertæ; scapo flavo, ocellum haud attingente, articulo 2:o triangulari, 3—5 sensim majoribus, 6—10 fortiter transversis, sensim parum latioribus, clava parva, acuta. Thorax brevis, crassus, pronoti collari vix discreto; mesonoto fortius transverso, subtiliter punctato, sulcis tenuibus ad medium productis; scutello convexo cupreo, freno declivi sculptura fortiore discreto; dorsello angusto; metathorace breviusculo declivi, punctatissimo, carina et plica nulla sed fovea utrinque basali impressa, spiraculis subrotundis a postscutello distantibus, nucha nulla. Alæ fere vitræ, parce pubescentes, cellula basali et speculo magno nudis, præstigmatum haud brevi, tenui, stigmatum radio sesqui. longiore, tenui, hoc clava parva quam metacarpo vix brevior. Abdomen ovato-rotundum, supra planiusculum, subtus leviter convexum æneum, postpetiolo viridi medioeri. Mesopleura

tota punctulata. Pedes breves crassi, pallidi, coxis semper, femoribus sæpe fusco-æneis.

Mas differt: genis brevibus antice prope clypeum margine nigro-fimbriato, mandibulis basi tuberculatis; antennis scapo obscuriore, flagello pilosulo sed articulis fortiter trausversis nigris; tibiis obscuris; abdomine plica ventrali, haud pallida.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Subgenus *Dinarmus*.

Thorax collari margine acuto. Antennæ funiculo filiformi, postannello parvo. Abdomen ovatum. Corpus pilosulum, obscurum.

Detta slägte, som i habitus står nära *Cænacis*, skiljes från alla föregående genom den lilla första leden i funiculus, som är trådformig, skarp framkant på pronoti collare, genom föga glänsande kropp samt mörka antenner och ben.

1. *D. acutus* m: Virescenti-niger, mesopleuris totis punctulatis, abdomine ovato, basi glabro, pronoti collari ad coxas usque acuto ♀. Long. 4 mill.

Species corpore coacto, capite thoraceque parce albo-pilosellis, crebre sat fortiter punctato, collari ad coxas anticas usque acuto ab omnibus mox discedens. Caput magnum, pone oculos haud angustatum, vertice lato, ocellis in curvam dispositis; fronte lenissime convexa, scrobe antennali vix perspicua; clypeo cum genis antice strigosa, apice medio emarginato, his buccatis, sat longis; mandibulis sat validis, piceis. Antennæ in medio faciei insertæ, scapo viridi basi pallido, ocellum attingente, articulo 2:o triangulari, 3—5 subæqualibus parvis sed bene discretis,

6—10 subtus brunneis, supra fuscis, sensim vix brevioribus, præclava transversa, clava haud parva obtusa. Thorax crassus supra convexus, pronoti collari haud angusto, ad coxas anticas usque bene discreto acuto, sed margine haud reflexo; scutello convexo; dorsello angusto; metathorace punctulato, haud longo, carina media nulla, spiraculis magnis fere linearibus, sulco spiraculari distincto, nucha nulla, fovea basali utrinque arcuata impressa. Alæ vitreæ, cellula costali lata, basali et speculo magno nudis; præstigmatum brevi, costa quam stigmate tenui sesqui longiore, hoc radio clava parva rotunda sesqui longiore, metacarpo radio evidenter longiore. Abdomen ovatum, supra leviter, subtus magis convexum, aneum, segmentis 2:o viridi fere, 3—4 totis glabris, 5—7 lateribus parce pilosulis. Pedes sat validi, fusco-ænei, genibus, tibiis apice et basi, anticis totis cum tarsis albidis. Mesosternum breve lateribus æqualiter punctatis, mesopleuris vix sutura divisum, præsternis minutis.

Sällsynt; funnen i Småland.

2. *D. pilosulus* m: Obscure olivaceo-viridis, abdomine oblongo, segmentis omnibus basi pubescentibus. ♀. Long. 4—5 mill.

A precedente capite pone oculos angustato, vertice angusto, facie convexiuscula, clypeo apice medio inciso, pedibus antennisque pallidioribus, his scapo ocellum superante, flagello longiore, clava articulis sutura obliqua; pronoti collari margine antico reflexo-marginato; abdomine longiore, segmentis albo-pilosulis; præsternis magnis, triangularibus; mesopleuris sutura bene divisum, superne politis bene distinctus.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

Subgenus **Picroscytus**.**Pteromalus** Nees.

Antennæ postannello cylindrico, clava ♀ apice aciculari, ♂ funiculi articulis verticillato-pilosis. Pronoti collare subdiscretum.

Detta slägte, som i habitus fullkomligt öfverensstämmer med sist beskrifna art, skiljes hos ♀ genom klubbans sista led som är nålformig, hos ♂ genom kranshårig antennsträng.

1. *P. scabriculus*: Obscure olivaceo-æneus, fere opacus, pube albida acuta subscaber, genubus, tibiis apice tarsisque albidis, abdomine oblongo-ovali: ♂ antennis clavæ articulo 1:o libero. Long. 5—6 mill.

Pteromalus scabriculus Nees l. c. 100. 13.

Pteromalus subniger Walker (forte).

Caput thoracis latitudine, vertice haud lato, ocellis in lineam curvam dispositis; genis haud plane teretibus sat longis, vix buccatis; clypeo apice medio sinuato et genis antice strigosis; oculis haud magnis breviter ovatis, convexis; facie lenissime convexa, scrobe nulla, confertim punctata, pube albida rigida parcius vestita. Antennæ longæ, sat graciles, nigræ, in medio faciei insertæ; articulo 1:o æneo basi rufo ocellum superante, 2:o obconico, 3- 4 parvis angustis sed discretis, 5—10 longitudine vix, latitudine haud decrecentibus, clava haud lata, articulo ultimo aciculari. Thorax confertim, subsquamoso-punctatus, pube albida subrigida parce vestitus: pronoti collari bene discreto, sed margine antico haud acute reflexo, postice arcuato, antice recta truncato; mesonoti sulcis antice vix conspicuis; scutelli freno haud discreto, declivi, dorsello sat magno punctulato; metathorace parum declivi, haud brevi, nucha nulla, concinne punctato, carina, plica et sulco spiraculari nullis, spiraculis magnis ovalibus.

Alæ parum pubescentes, cellula costali lata, basali et speculo nudis; umbra longitudinali subfumata sub radio et stigmate, hoc tenui quam radio, clava parva rotunda, sesqui longiore, metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen æneum, nitidum oblongo-ovale, supra leniter subtus vix magis convexum; segmentis 1:o vix conspicuo 2:o haud magno et 3:o lateribus parcius, 4—7 dense pubescentibus, 3—7 æqualibus, 8:o parvo. Mesosternum epimeris et metapleuris punctatis; præsternis parvis. Pedes haud validi, coxis posticis breviter-ovatis, compressis.

Mas differt: antennis articulo 1:o vix dilatato, 2:o parvo subrotundo, annellis haud conspicuis, 5—11 longis, linearibus, isthmo sejunctis, albido-verticillatis, clava biarticulata acuta; alis vitreis, immaculatis; dorsello nitido, lævi; abdomine oblongo medio cupreo, segmento 3:o haud occulto.

Sällsynt; funnen vid Lund på Salix.

Genus *Merisus* Walker.

Pteromalus Nees.

Caput thorace haud latius, vertice medio haud acuto; clypeo haud discreto; mandibulis haud validis, sæpissime 3-dentatis. Antennæ in medio fere faciei leniter convexæ insertæ, annellis haud magnis, funiculo apicem versus haud vel vix incrassato, articulo 1:o rarissime abrupte minore; clava ♀ oblique acuminata, fere subulato-conica plerumque pallida. Pronoti collare haud vel vix discretum; mesonoti sulcis antice vix indicatis; metathorace punctulato, haud brevissimo, subdeclivi, carina media nulla, spiraculis rotundis. Alæ stigmate rarissime crassiusculo, quam radio plerumque longiore, hoc clava parva, sæpe sub stigmate ♀ umbra fusca notatæ. Abdomen fere sessile, plerumque convexum segmento 8:o haud conico-producto. Pedes coxis posticis basi externe haud dense

pubescenti. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Mas antennis scapo plerumque metallico, funiculo sat longo pilosulo, clava acuminata, abdomine oblongo, macula nulla pellucida.

Detta slägte skiljes från föregående genom bakbenens tibier, som endast äro beväpnade med en sporre. Från följande afviker det genom hos ♀ skarpt tillspetsad antennklubba, genom puncterad metathorax, som saknar både medianköl och tydlig sulcus spiracularis, genom ej rund abdomen och antennernas insertion i midten af ansigtet.

Conspectus subgenerum.

- A) Antennæ postannello parvo. Metathorax nucha magna punctata. Coxæ omnes rufæ. *Bætomus.*
- B) Antennæ postannello sequenti fere longiore.
 - a) Abdomen subcylindricum, segmento 3:o brevi. *Merisus.*
 - aa) Abdomen subovatum, dorso interdum planiusculo. *Homoporus.*

Subgenus *Bætomus* Foerster.

Micromelus Walker.

Antennæ postannello parvo. Caput majusculum, mandibula dextra dentibus 4, sinistra 3, basali acuto armatis. Pronoti collare medio angusto subdiscreto fere acuto; metathorace longo, nucha magna. Alæ stigmatè radio duplo longiore, hoc clava fere nulla, quam metacarpo paullo brevior. Abdomen ventre et macula dorsali magis minusve lata rufa, dorso plano, ventre parum convexo. Coxæ omnes rufæ. Mas antennis clava apice oblique acuminata, abdomine subrotundo, plica nulla.

Detta subgenus skiljes från alla genom den starkt utvecklade metathorax, liten postannellus, röda höfter och större eller mindre röd fläck i båda könen på abdomen.

1. *B. plagiatus*: Aneo-viridis, abdomine segmentis 2:0 et 3:0 magnis, antennis scapo ♀ apice viridi: ♂ tibiis anticis apice nigris, tarsis basi fuscis. Long. 3 mill.

Pteromalus plagiatus Nees l. c. II. 115. 30.

Micromelus rufomaculatus Walker l. c. 1. 465. 1.

Pteromalus futilis Foerster.

Caput thoracis latitudine, vertice sat lato, occipite retuso; ocellis fere in triangulum dispositis: clypeo striato, apice medio sinuato; genis sat longis, parum buccatis. Antennae nigræ, fere in medio faciei insertæ; articulo 1:0 lineari, testaceo, apice æneo, ocellum haud attingente, 2:0 subtriangulari, æneo, 3:0 vix conspicuo, 4:0 et 5:0 parvis subæqualibus, 5—10 crassitie æqualibus, sensim brevioribus, præclava transversa, clava articulo ultimo fere aciculari. Thorax sat longus, supra fere glaber, sat fortiter fere squamoso-punctatus, pronoti collari medio fere acuto; mesonoti sulcis antice inchoatis, scutelli freno apice vix declivi, dorsello angusto; metathorace concinne punctato, foveola utrinque basali impressa, nucha longa, spiraculis parvis rotundis, calli fimbria parva. Alæ angustæ, lenissime fumatæ, apice ciliato, cellula costali haud lata, basali et speculo distincto nudis, præstigmate parvo. Abdomen petiolo in nucha occulto, breviter ovatum, supra depressum, viride, plaga media et ventre rufis, segmentis 2:0 et 3:0 magnis glabris, 4—7 parvis. Pedes graciles rufi, coxis posticis ovatis. Mesosternum haud breve, sulco medio antice distincto, epimeris et metapleuris punctatis, præsternis parvis.

Mas differt: antennis scapo flavo, funiculo testaceo, articulo 1:0 paullo majore, clava apice oblique acuminata, tibiis anticis apice nigris, tarsis anticis articulis 3 primis nigro-fuscis.

Ej sällsynt.

2. *B. pyrrhogaster*: Æneo-viridis, abdomine basi rufo, segmentis 2:o et 3:o magnis alis abbreviatis. Long. 2—3 mill.

Micromelus pyrrhogaster Walk. l. c. 1. 465. 2.

Præcedenti simillimus, sed paullo minor, capite latiore, antennis scapo flavo, funiculo testaceo, alis brevissimis, abdomine magis convexo rufo, apice viridi, nucha brevior tantum discedens.

Allmän.

3. *B. elongatus*: Æneo-viridis, abdomine elongato, segmentis 3—6 æqualibus ♀. Long. 3 mill.

B. plagiato similis et affinis, sed antennis scapo flavo, ocellum superante, abdomine segmentis 2:o mediocri, 3—7 æqualibus bene distinctus.

Sällsynt; funnen vid Stockholm.

Subgenus *Merisus* Walk.

Caput oculis magnis, genis brevibus; clypeo apice medio truncato, ocellis in triangulum dispositis. Antennæ breves, flavæ, annellis obsoletis. Thorax collari sat magno, haud discreto margine tereti. Alæ stigmatum tenui flavo radio, clava parva, fere duplo longiore. Abdomen cylindricum, segmento 3:o parvo.

Detta släkte skiljes lätt från föregående genom de korta antennerna, hvilkas postannellus är stor, genom ingen nucha på metathorax och cylindrisk abdomen, hvars 3:e segment är litet, 4—6 smånigom större.

1. *M. splendidus*: Læte viridis, genibus, tibiis tarsisque stramineis, antennis luteis, postannello ♂ magno subtus compresso-dilatato, stigmatum radio duplo longiore. Long. 3—4 mill.

Walk. l. c. II, 167. 1.

Pteromalus Spinolæ Foerster N:o 170.

Corpus læte viride, fere glabrum, Caput crassum, vertice sat lato; fronte vix convexa, scrobe antennali haud longa parum determinata, oculis magnis ovatis, genis subbuccatis duplo longioribus. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, luteæ, articulo 1:o oculis brevior, supra apice et 2:o æneo, annellis minimis transversis et angustis vix observandis, 5—10 sensim vix brevioribus parum crassioribus, 5:o quadrato, 10:o transverso, clava magna sub-solida postannello majore, oblique acuminata, articulo ultimo minutissimo. Thorax latitudine longior, supra leniter convexus, pronoti collari latera versus dilatato et mesonoto subsquamoso-punctatis, hoc sulcis antice indicatis; scutello haud angusto punctulato; metathorace paullo declivi haud brevi, nucha nulla, confertissime punctato, fovea utrinque basali impressa, spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis. Alæ sat angustæ, hyalinæ, costa stigmatæ paullo longiore, hoc radio duplo longiore, metacarpo stigmatæ paullo brevior. Abdomen thorace paullo angustius, cylindricum, splendens, cyaneum, lateribus plane teretibus, apice vix conico angustato; segmentis 1:o transverso, vix conspicuo, 2:o semigloboso, et 3:o 4:o lateribus parce, 5—7 dense albo-pubescentibus, 4—6 sensim majoribus, 8:o parvo compresso, valvula ventrali medium haud attingente. Pedes sat validi, coxis ovatis, viridi-æneis, trochanteribus apice, genubus, tibiis tarsisque stramineis, tarsis tibia brevioribus. Epimera mesosterni et metapleura punctata, hoc sulco medio obsoleto, præsterna sat magna punctata, triangularia.

Mas differt: thorace magis cyaneo, abdomine thorace duplo angustiore, plica ventrali distincta; antennis funiculo longiore, haud piloso articulo 1:o subtus compresso-triangulari.

Sällsynt i södra och medlersta Sverige.

2. *M. acutangulus* m. Viridis, abdomine apice parcius pubescente, genubus, tibiis tarsisque stramineis, stigmatate radio fere duplo longiore. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minus splendens, capite paullo longiore; antennis fere in medio faciei insertis, funiculo supra fusco articulis longioribus, clava brevior quam postannello haud longiore, abdomine medio cupreo; alis radio sub angulo magis acuto egrediente quam stigmate haud duplo brevior discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

Subgenus *Homoporus*.

Caput thorace haud latius, fronte superne et mesonoto fortius crebriusque squamoso-punctatis, metathorace nucha nulla. Antennæ ♂ pilosæ, scapo sæpius metallico. Abdomen subovatum, vel ovale, haud cylindricum, segmentis 3—5 æqualibus. Alæ ♀ sæpe umbra fusca substigmatate.

Detta slägte skiljes hufvudsakligen genom abdomens form från föregående, antennsträngen är hos ♂ försedd med längre eller kortare utstående hår.

- A) Antennæ scapo ♀ metallico. Alæ immaculatæ, hyalinæ, stigmate tenui radio fere duplo longiore. Abdomen ventre ♀ sæpe planiusculo.

1. *H. fulviventris*: Coerulescens, antennis flagello abdomineque luteis, pedibus stramineis, macula femorum coxisque æneis: ♂ flagello abdomineque æneis, hoc macula discoidali pallida. Long. 2—3 mill.

Pteromalus fulviventris Walk. l. c. III. 190. 81.

Corpus elongatum, sat gracile, capite thoraceque coerulescentibus parum nitidis, minus fortiter punctatis glabriculis. Caput thoracis latitudine, paullo transversum,

antrorsum parum angustatum; vertice transversim convexo, haud lato, ocellis fere in triangulum dispositis; genis parum buccatis, clypeo subtiliter strigoso, apice truncato; mandibulis haud validis, margine externo subrecto, 4-dentatis, dente basali parvo acuto, apicali haud forcipato; fronte lenissime convexa, scrobe antennali haud distincta; palpis albidis. Antennæ breves, paullo infra medium faciei insertæ, basi subdistantes; articulo 1:o æneo-viridi, lineari, ocellum haud attingente, 2:o triangulari æneo, 3—4 minimis vix observandis, 5:o sequente paullo angustiore et fere brevior, 6—10 subæqualibus transversis cum clava flavis, hac magna, articulo ultimo aciculari. Thorax oblongus, supra sat convexus; pronoti collari haud discreto; mesonoti sulcis antice indicatis, scutello minus convexo, freno haud discreto parum declivi, dorsello angusto; metathorace nitidulo, subtilius punctulato, haud brevi, nucha nulla, spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis, calli fimbria obsoleta. Alæ angustæ, hyalinæ, nervis flavis, costa stigmatæ paullo longiore, hoc quam radio sesqui longiore, radii clava tenui, metacarpo radio paullo longiore, præstigmatæ minus brevi, cellula basali et speculo nudis. Abdomen oblongum, thoracis latitudine, vix longius, basi fere glabra, apice parce pubescente, dorso plano, ventre parum convexo; flavum, linea ventrali terebraque æneis; segmentis 1:o vix conspicuo, 2:o solito brevior, apice late rotundato-truncato, 3—6 æqualibus, 8:o parvo. Pedes minus validi, straminei, coxis ovatis femoribusque macula basali magna viridi-æneis, tarsis tibia paullo brevioribus. Mesosternum lateribus punctulatum, epimeris vix nisi fovea superna discretis et metapleuris haud squamoso-punctatis; præsterna parva.

Mas differt: antennis flagello nigro, funiculi articulis subquadratis æqualibus, parcius sat longe pilosulis, ab-

domine longiore obscure æneo, ventre et macula discoidali dorso testaceis.

Sällsynt på sandmarker i medlersta och södra Sverige.

2. *H. gibbiscuta* n: Coeruleo-viridis, pedibus abdomine-que flavis, antennis flagello testaceo medio obscuriore, scutello subpulvinato. ♀ Long. 3 mill.

Pteromalus bicolor Foerster (forte).

Præcedenti statura et magnitudine simillimus, sed antennis funiculi articulis longioribus et tenuioribus, 1:0 æquali, clava brevior; mesonoto evidentius squamoso-punctato; scutello alte elevato; alis radio sub angulo minus acuto egrediente, metacarpo hoc fere duplo longiore; abdomine apice magis prominente, terebra subexserta, femoribus totis tibiisque flavo-stramineis; episternis magis discretis certe distinctus.

Sällsynt vid Helsingborg.

3. *H. chlorogaster* m: Læte viridis, antennis flagello fusco, clava obscure testacea, trochanteribus, tibiis tarsisque stramineis: ♂ antennis flagello parce hirtis. Long. 2—3 mill.

Species a præcedentibus colore læte viridi, pedibus validioribus, antennis funiculi articuli longioribus, ♂ parce sed longe hirtis, in medio faciei insertis, scutello parum convexo, metathorace paullo evidentius punctato, abdomine subtus magis convexo, apice magis obsuso in utroque sexu immaculato, ♀ læte viridi, ♂ obscuriore mox discedens.

Sällsynt vid Stockholm och Lund.

4. *H. crassiceps*: Olivaceo-æneus, antennis nigris, pedibus gracilibus rufo-testaceis, femoribus medio fuscis,

coxis æneis, vertice crasso, abdomine depresso elongato. Long. 4 mill.

Species capite crasso, vertice lato, clypeo apice emarginato genis buccatis, mandibulis validioribus; antennis annellis sat distinctis, alis apice latiore, radio clava distincta quam stigmatē nonnihil breviorē; pedibus gracilioribus; abdomine thorace latiore, lætæ æneo, apice acuminato, subtus depresso, segmentis 3—6 brevibus, 7:0 magno, 8:0 parvo, terebra apice exserta, mesonoto subtilius squamoso-punctato discedens; sed antennis clava apice oblique subulata, metathorace punctulato, carina et plica nulla huic generi associata.

Sällsynt; ett exemplar funnet vid Helsingborg.

B) Antennæ scapo ♀ pallido. Abdomen ventre convexo, obtuse carinato. Alæ ♀ macula fusca sub stigmatē. Pedes validi, breviusculi.

5. *H. luniger*: Coeruleus vel obscure violaceus, stigmatē tenui radio sesqui longiore: ♂ antennis scapo viridi, dimidio apicali, inferne compresso-dilatato, funiculo albo dense pubescenti. Long. 3—4 mill.

Pteromalus luniger Nees l. c. 119. 37.

Pteromalus tricolor Walk. l. c. III. 190. 82. (forte).

Pteromalus ater Ratz. l. c. III. 233. 18. (forte).

Caput thorace fere latius, antrorsum parum angustatum, vertice sat angusto, ocellis fere in triangulum dispositis; facie leniter convexa, subsquamoso-punctata; clypeo apice truncato, strigoso; mandibulis 4-dentatis; genis vix buccatis. Antennæ fere in medio faciei insertæ, sat crassæ, articulo 1:0 et clava flavis, illo ocellum haud attingente, pedicello subtriangulari, annellis minimis, funiculo nigro-fusco, subtus interdum testaceo, articulis sen-

sim paullo brevioribus, vix crassioribus, præclava transversa, clava oblique acuminata, sat magna. Thorax haud longus, supra convexus, fere glaber; pronoti collari haud discreto; mesonoti sulcis antice indicatis, minus fortiter, scutello subtilius punctato, hoc leniter convexo, dorsello haud angusto, punctulato; metathorace haud brevi, confertim punctato, nucha nulla, fovea utrinque basali impressa. Alæ stigmatè haud crasso quam radio sesqui longiore, metacarpo longo, macula sub stigmatè ad radii clavam extensa, magis minusve magna ornatæ. Abdomen thorace haud latius, vix longius, subovatum, cupreum, apice parce albo-pubescent, basi viride, segmentis 2:0 trientem occupante, viridi, 3—6 brevibus, 7:0 paullo longiore, 8:0 parvo, valvula ventrali medium vix attingente. Pedes fusco-ænei, coxis ovatis subcoeruleis, tibiis basi et apice cum tarsis albidis, his posticis tibia brevioribus. Mesosternum lateribus punctatum, subcoeruleum, præsterna parva.

Mas differt: antennis nigris, clava longiore fortius acuminata, scapo breviorè subtus apicem versus dilatato, pedicello parvo, funiculi articulis pube longa grisea dense exserta ornatis, 1:0 cylindrico, ultimo vix transverso; abdomine cupreo, plica ventrali distincta haud pallida.

Temligen allmän från Skåne till Lappland.

6. *H. crassinervis* m; Coeruleus, stigmatè crasso radio vix longiore, scutello fortius convexo et elevato. ♀ Long. fere 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, scutello magis convexo, fortius punctato; alis stigmatè crasso, radii longitudine, quam metacarpo breviorè; abdomine purpureo-violaceo, tibiis rufis adhuc crassioribus bene distinctus.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

7. *H. flaviscapus* m: Obscure virescens, antennis funiculi articulis haud transversis, postpetiolo magno, scapo ♂ flavo. Long. fere 4 mill.

A præcedentibus antennis annellis distinctis, funiculi articulis tenuioribus, haud transversis, mesonoto fortiter squamoso, scutello convexo subtilius punctato; alis stigmatate parum crasso radio paullo longiore; abdomine postpetiolo dimidium fere occupante, plica ventrali ♂ nulla distinctus.

Sällsynt vid Båstad i Skåne.

Genus *Eutelus* Walker.

Caput transversum, genis plerumque buccatis, haud compressis; vertice medio haud acuto, sæpius angusto, ocellis interdum parvis; oculis sæpe rubris, magnis, glabris; facie planiuscula, scrobibus antennalibus nullis; clypeo minus distincte strigoso, interdum subdiscreto et transverso, apice medio sæpius late emarginato, dente medio nullo; mandibulis sat validis, dextra 4-, sinistra sæpissime 3-dentata, hoc dente basali lato subtruncato. Antennæ infra medium faciei insertæ; pedicello postannello longiore annellis parvis, funiculi articulis 1:o sequente haud longiore, plerumque abrupte minore, clava haud subulatoconica. Thorax sæpius brevis; pronoti collari sat discreto, rarius lato; mesonoti sulcis antice indicatis, dorsello angusto carinato; metathorace brevi, nucha fere nulla, plerumque polito, carina media, sæpissime stiam plica integra instructo. Alæ haud maculatæ stigmatate haud crasso, quam radio sæpius longiore, hoc clava vix discreta, rarius medio disci umbra fusca notatæ. Abdomen haud rotundum, sæpe ovatum, ventre convexo plerumque carinato, segmentis 1:o vix observando, 2:o magno, 3—6 subæqualibus, 8:o haud parvo, terebra apice conspicua, 2—4 lateribus serie transversa parce, 5—7 dense pubescentibus.

Pedes haud longi sat validi, subglabri, coxis ovatis, posticis basi externe haud pubescentibus sed apice fimbriis parce ornatis. Mesosternum sulco medio vix distincto. Species pleræque gallicolæ. Mares antennis, palpis et tibiis sæpe insignes.

Detta släkte skiljes genom den ej sylformiga antenn-klubban och genom ej puncterad metathorax med tydlig midtelköl från *Merisus*. Genom metathorax och antennerna afviker det hufvudsakligen från *Etroxys*. Från *Isocyrtus* skiljes det genom bakbens höfter, som ej vid basen på yttre sidan äro pubescenta.

Conspectus subgenerum.

- A) Stigma radio fere sesqui longius. Metathorax plica laterali distincta. Mas antennis clava nigricante.
- a) Caput vertice angusto, ocellis ♀ in lineam parum curvam dispositis. Thorax brevis. *Eutelus*.
- aa) Caput vertice lato, clypeo apice inciso vel truncato, ocellis magnis in triangulum dispositis. Thorax longus, collari margine acuto. Abdomen elongatum, triquetrum. *Platytermus*.
- B) Alæ stigmatæ radio haud vel parum longiore. Metathorax plica laterali nulla. Antennæ postannello minimo. Caput vertice et pronoti collari angustis.
- b) Antennæ paullo infra medium insertæ. *Amblymerus*.
- bb) Antennæ mox supra clypeum insertæ. Metathorax brevissimus. Valvula ventralis anum fere attingente. *Psilonotus*.

Subgenus *Eutelus*.

Caput transversum, pone oculos magnos angustatum, vertice angusto, ocellis parvulis in lineam fere curvam dispositis; clypeo transverso, superne subdiscreto; mandibulis sinistra 3-dentata, dente basali lato. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, flagello incrassato, pedicello

longo, clava ♂ nigra. Thorax latus, scutelli freno parum declivi, collari interdum magno; metathorace plica integra. Alæ flavescenti-hyalinæ, stigmatum tenui radio fere sesqui longiore. Mas tibiis intermediis interdum laminato-dilatatis, femoribus flavis.

Arterna af detta subgenus, som lefva i galläplen, skiljas hufvudsakligen genom smalare hjessa och kortare thorax från *Platytormus*, från de båda sista subgenera afviker det genom längre stigma i förhållande till radius och tydlig plica på metathorax.

- A) *Episterna mesothoracis punctulata*, superne lævia. Mas antennis scapo apice angustato, basin versus fortiter compresso-dilatato; tibiis intermediis laminato-dilatatae.

1. *E. tibialis*: Læte æneus, aureo vel cupreo-adpersus, antennis flagello rufescenti, postannello sequente parum minore, collari sat lato; ♂ tibiis intermediis apice externe lobo parvo rotundo atro ornatis. Long. 2—4 mill.

Platymesopus tibialis Walker. l. c. II. 352. 1.

Pteromalus sodalis Foerst.

Caput thorace paullo latius, latitudine sua duplo brevius, pone oculos magnos subangustatum, vertice angusto late emarginato; facie lata, subtilissime dense subrugosa, punctulis prope ocellos majoribus parce impressis; clypeo transverso, fere lunato, sinu medio lato minus conspicuo; genis buccatis, subtus depressis, oculis fere duplo brevioribus. Antennæ in linea oculorum inferiore insertæ, duplo magis ab oculo anteriore quam ab ore remotæ, basi parum distantes; articulo 1:o longo sed ocellum haud attingente, tenui, vix curvato, et 2:o testaceis, hoc postannello sesqui longiore, 3:o vix conspicuo, 4:o sat magno subrotundo sequente duplo angustiore, 5—10 sensim paullo crassioribus, obscure testaceis, 10:o fortius, 5:o vix transverso, clava ovata, apice obtusa. Thorax brevis

crassus, supra subglaber, parum convexus; pronoti collari haud lato, discreto, latera versus dilatato; mesonoto punctulis majoribus parce impressis et creberrime punctulato, sulcis vix antice inchoatis, quam dorsuli basi sesqui longiore; scutello magno sed apice vix declivi; metathorace polito subcyaneo viridi, plica integra parum arcuata, nucha vix nisi impressione apicali indicata, calli fimbria obsoleta; spiraculis magnis ovalibus. Alæ immaculatæ, hyalinæ, cellula costali lata; basali et speculo nudis, stigmatate tenui radio sesqui longiore, metacarpo hoc paullo longiore. Abdomen ovatum, supra depressum, subtus convexum, valvula ventrali medium haud superante; segmentis 2:o viridi nitente trientem occupante, 3—6 æqualibus cupreo-fasciatis 7:o paullo longiore, 8:o haud parvo triangulari. Pedes validi, ænei, tibiis fuscis, apice albidis subincurvis, compressis, tarsis tibia paullo brevioribus. Mesosterni epicnemialia lineæ polita subdiscreta, sulcus medius obsoletus; episterna punctulata, superne polita, vix nisi fovea ab epimeris discreta; metapleura sublævia; præsterna parva triangularia.

Mas differt: capite cyaneo, genis subtus magis depressis; antennis scapo stramineo, basin versus fortiter compresso-dilatato, flagello testaceo, basin versus fortius attenuato, clava magna atra; palpis maxillaribus articulo 3:o basi appendiculato; tibiis anterioribus fortiter dilatatis omnibus et femoribus stramineis, his intermediis et tibiis anticis vitta rubra, tibiis intermediis vittis 2 rubris ornatis, apice externe lobo rotundo atro instructis; tarsis intermediis brevibus; abdomine ovali cupreo, basi et apice viridi.

Fj sällsynt i södra Sverige; utkläckt ur flera slags galläpplen på Ek, men äfven fångad på pilevallar vid Lund.

2. *E. xanthocerus* (Dalm.): Æneus, postannello parvo, tibiis intermediis ♂ ante apicem externe lobo triangulari instructis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, sed femina antennis articulo 4:o 5:o parum majore, collari medio paullo latiore, abdomine longiore, valvula ventrali medium longe superante tibiis fere totis pallidis; mas antennis flagello basin versus minus attenuato, clava minore, abdomine fascia prope basin pallida, tibiis anticis parum dilatatis, intermediis vitta sanguineo rubra externe ante apicem lobo triangulari atro acuto ornatis bene distinctus.

Sällsynt; utkläckt ur *Cynips terminalis* i Skåne.

B) *Episterna mesothoracis* inferne vix punctata, sutura arcuata ab epimeris sat bene discreta. Mas tibiis intermediis simplicibus, antennis flagello minus abrupte basin versus angustato, funiculi articulo 4:o plerumque nigro.

3. *E. diffinis*: *Æneus*, postannello parvo, collari angusto; ♂ tibiis intermediis intus nigris, alis posticis maculis 2 magnis nigro-fuscis. Long. 2—3 mill.

Walk. 1. c. II. 358. 5.

E. tibiali capitis forma et mesonoti punctis parvis majoribus impressis abdomineque affinis, sed differt genis minus depressis, antennis articulo 5:o 4:o parum majore, mesopleuris inferne subsquamoso-punctatis, tibiis flavis, femoribus rufescentibus, antennis flagello supra fusco-testaceo; ♂ pedibus minus latis, tibiis intermediis margine interiore nigro-fusco, antennis flagello minus basin versus angustato, medio fusco-testaceo, scapo inferne haud abrupte compresso. Ab *E. xanthocero*, cui antennarum structura ♀ affinis, collari angusto, valvula ventrali medium haud superante mox discedit. Mas ab omnibus tibiis intermediis et alis posterioribus colore discedit.

Sällsynt i Skåne.

4. *E. collaris* m: *Æneus*, pedibus flavis, coxis æneis, collari lato; ♀ postannello sequenti nonnihil minore, ♂ conformi. Long. 2—4 mill.

E. dilectus et *immaculatus* Walk. l. c. II. 356.

Amblymerus amoenus Walk. l. c. II. 307.

Species a præcedentibus pronoti collari magno, margine antico arcuato, elevato, latera versus haud dilatato, fortius squamoso-punctato, discedens; ♀ *E. tibiali* statura similis, sed antennis articulo 5:o 6:o fere duplo minore, femoribus tibiisque læte flavis, posticis rarius fuscis, punctis majoribus vix conspicuis, mesopleuris sutura discretis; ♂ antennis scapo æqualiter subarcuato-compresso, funiculi articulis 1—6 parum latitudine discrepantibus, albidis; 4:o fusco, clava apice pallida, tibiis, etsi latis, simplicibus, abdomine fascia interdum pallida basali bene distinctus.

Utkläckt ur *Cynips terminalis*. Funnen i sydligare Sverige.

5. *E. heterotomus* m: Læte viridi-æneus, antennis articulo 5:o sequente, ♂ paullo angustiore, collari minus lato. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, sed collari, etsi lato, medio paullo angustiore, antennis ♀ articulo 5:o 4:o parum majore, ♂ quam 6:o nonnihil angustiore 8:o ut in *E. dilecto* fusco discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

6. *E. apicalis*: Læte æneus, antennis articulo 5:o sequente abrupte minore, ♂ funiculo flavo-ferrugineo, clava oblonga. Long. 2—3 mill.

Pteromalus apicalis Nees (forte).

E. heterotomo collaris structura similis et affinis, sed antennis ♂ funiculo rufo-testaceo, 8:o haud fusco, clava oblonga apice vix pallida, ♀ flagello crassiore, pilosello, pedicello longiore discedens.

Sällsynt; funnen vid Wittsjö i norra Skåne.

7. *E. punctiger* m: Viridis, pedibus antennisque pallidis, alis puncto fumato medio radii adhærenti. metathorace obsolete punctato. ♀ Long. 2—3 mill.

Species a præcedentibus capite minus transverso, antrorsum paullo angustato, genis longioribus sed parum buccatis, pronoti collari minus lato subtilius punctato, scutello vix convexo, metathorace haud polito, nucha magis distincta, abdomine longiore, ventre haud carinato, pedibus minus validis bene distincta.

Sällsynt; funnen i Småland.

8. *E. elongatus* m: Viridi-æneus, abdomine elongato, capite antrorsum angustato ♀. Long. 2—3 mill.

Præcedenti similis et affinis, capite adhuc magis antrorsum angustato, subtriangulæri, vertice angusto, abdomine ventre carinato thorace longiore, acuminato, clypeo apice medio fere truncato distinctus.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

Subgenus *Platytermus*.

Caput vertice lato, ocellis in triangulum dispositis Thorax longus, pronoti collari discreto, sat lato, medio acuto, latera versus dilatato; dorso dorsuli basi saltim duplo longiore; metathorace polito, plica laterali integra, parum arcuata. Alæ stigmatæ radio sesqui longiore. Abdomen elongatum, apice acuminatum, ventre carinato. Tibiæ semper, femora plerumque flavo-straminea. Corpus læte viride.

Detta subgenus står mycket nära föregående och afviker endast genom bredare hjessa, på hvilken ocellerna, som äro stora bilda en triangel, thorax är mera längsträckt, hvilket i synnerhet är märkbart på mesonotum. Hannarne inom första afdelningen äro normala, hos de 2 sista äro palpärna och stundom mellan benens tibier abnormt bildade.

- A) Clypeus apice medio late truncato. Antennæ articulo 5:o 4:o parum majore. Episterna metathoracis lævia, epimera vix punctata. Mas abdomine ovali-oblongo, macula vel fascia nulla dorsali, palpis tibiisque normalibus.

1. *P. decorus*: Viridis, antennis rufo-testaceis articulis 6—10 sensim latioribus, tibiis, femoribus interdum stramineis. Long. 2—3 mill.

Walk. l. c. II. 342. 10.

Caput thoracis latitudine, subtransversum, antrorsum paullo angustatum, genis sat longis sed subbuccatis, facie plana, punctis nullis majoribus impressis, clypeo subtransverso, striguloso; mandibulis pallidis, dextra dentibus 4 acutis, sinistra 3, basali lato truncato armatis. Antennæ breves, fere duplo magis ab ocello anteriore ac ab ore insertæ; articulo 1:o tenui, ocellum haud attingente, pallide flavo, 2:o oblongo-triangulari, supra fusco, 3:o vix conspicuo, 5:o 4:o parum majore, 6—10 sensim evidenter latioribus, 10:o fortiter, 6:o paullo transverso, subtus flavis, supra obscure testaceis, clava obtusa fusca, subtus pallidiore, sat magna. Thorax latitudine sua duplo longior, viridis, subglaber, creberrime æqualiter punctatus; pronoti collari medio marginato, sulcis mesonoti antice indicatis; scutello parum convexo, longo, apice vix declivi, sutura utrinque sat sinuata, dorsello haud angusto polito; metathorace parum declivi, cyaneo-viridi, polito, haud brevi, nucha margine elevato indicata, carina media minus quam plica laterali elevata, spiraculis fere rotundis, calli fimbria parca. Alæ subhyalinæ, stigmatē metacarpo longiore. Abdomen thorace longius, haud latius, triquetrum, elongatum, apice minus dense pubescens, postpetiolo trientem haud occupante, valvula ventrali medium haud superante. Pedes haud graciles, coxis ovatis compressis æneis, femoribus interdum fusco-viridibus, tibiis flavo-stramineis. Mesosterni sulcus medius obsoletus, episterna

bene distincta lævia, epimera parum punctata; præsterna haud parva, superne scuto triangulari elevato.

Mas differt: antennis scapo crassiore et brevior, annellis et funiculo ♀ conformibus, clava pallida, nigro-fusco limbata, abdomine viridi disco æneo vel aureo, femoribus semper stramineis, genis buccatis paullo brevioribus.

Ej sällsynt.

2. *P. brevicornis* m: Læte viridis, antennis articulo 6:o abrupte minore, femoribus flavis ♂ ♀. Long. 2 mill

Præcedenti simillimus sed minor, femoribus ♀ semper pallide testaceis, antennis brevioribus, articulo 2:o tumidulo, 6:o 7:o evidenter angustiore etsi 5:o multo latiore, 7—10 fortiter transversis, mesonoto magis planiusculo, pro-noti collari angustiore, medio minus acuto bene distinctus.

Sällsynt i södra Sverige.

3. *P. decipiens* m: Læte viridis, antennis postannello parvulo ferrugineis basi pedibusque stramineis, coxis corpori concoloribus ♀. Long. 2 mill.

Species a præcedentibus, capite antrorsum magis angustato, genis longioribus, pedibus minus validis præcipueque postannello majore, etsi sequente funiculi articulo abrupte angustiore discedens.

Sällsynt i Småland.

4. *P. specularis* m: Obscure viridis, mesopleuris totis punctatissimis, capite brevi. ♀ Long. 2 mill.

A præcedentibus mesopleuris totis punctatissimis etsi sutura divisis, metathorace haud polito, capite crassiore, genis buccatis brevibus, abdomine valvula ventrali medium

superante mox discedens; a *P. decipiente* antennis ut in *P. decoro* formatis bene distinctus.

Sällsynt i Småland.

- B) Antennæ ♀ postannello sequenti funiculi articulo conformi. Clypeus apice medio inciso. Episterna mesothoracis fere tota punctata. Mas palpis maxillaribus ante apicem processu tenui filiformi instructis, articulo ultimo maximo, compresso-ovali, antennis totis citrinis; fascia abdominis pallida.

5. *P. fasciculatus*: Viridis vel cyaneus, præstigmatis apice et radii basi infuscatis: ♂ tibiis intermediis externe ante apicem externe lobo triangulari nigro-ciliato instructis. Long. 2—4 mill.

Mesopobus fasciventris (Westw.) Walk. l. c. 355. 1.

Pteromalus trochilus Ratz. l. c. (♀)

Caput thoracis latitudine, antrorsum vix angustatum, genis tumidis, vertice lato, ocellis magnis rufis in triangulum dispositis; facie plana, confertissime subrugoso-punctata, punctis nullis majoribus prope ocellos; clypeo subtransverso, sinu medio angusto minus profundo, mandibulis sinistra 3-, dextra 4-dentata palpisque pallidis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ; articulo 1:o flavo testaceo longo sed ocellum haud attingente; 2:o ferrugineo, oblongo-triangulari, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5—10 sensim paullo latioribus, omnibus subtransversis, fusco-testaceis, subtus pallidioribus, clava magna apice obtusa. Thorax longus, supra fere glaber, creberrime subtiliter, haud squamoso-punctatus; pronoti collari margine acuto, medio angustiori, latera versus dilatato, haud angusto; mesonoti sulcis antice parum conspicuis; scutello magno apice parum declivi, dorsello haud angusto polito; metathorace polito, lucide viridi vel cyaneo, haud brevi, vix declivi, nucha tantum margine elevato indicata, carina

media et plica laterali elevatis, hac parum arcuata vix magis a spiraculis quam a carina remota, calli fimbria parca. Alæ haud latæ, hyalinæ, stigmatē tenui radio duplo longiore, hoc basi et præstigmatis apice fuscis. Abdomen thorace longius haud latius, elongatum, ventre carinato, apice acuminato; segmentis 2:o trientem haud occupante, 3—7 apice fasciis atro-purpureis ornatis. Pedes straminei, coxis viridi-æneis, apice, anticis limbo interiore etiam pallido. Mesosternum episternis supra lævibus, inferne punctatis; præsternis haud parvis, superne scuto triangulari discreto.

Mas differt: antennis scapo breviorē compresso, flagello citrino articulis brevioribus, punctis fuscis alarum magis conspicuis, pedibus intermediis lobo acuto triangulari nigro ciliato ante apicem instructis; abdomine medio cupreo, fascia ante basin pallida.

Ej sällsynt i Skåne på Ekåplen.

6. *P. simplex* m: Læte viridis, alis immaculatis, tibiis posticis calcari longo: ♂ tibiis intermediis simplicibus. Long. 2—4 mill.

Præcedenti simillimus, ♂ tibiis simplicibus, ♀ calcari postico tibiæ crassitie longiore, alis immaculatis bene distinctus.

Sällsynt; utkläckt ur gallåplen af *Cynips folii* från Bökebergs slätt i Skåne af Doctor G. F. Möller.

Subgenus *Amblymerus*.

Antennæ postannello parvo. Caput vertice angusto; mandibulis haud validis, dextra 4-dentata, sinistra 3-dentata dente apicali haud forcipato, basali obtuso; clypeo apice truncato; genis longis angustis. Pronoti collare angustum; metathorace brevi, plica laterali nulla. Alæ

superiores stigmatum radio parum longiore. Abdomen minus elongatum. Femora ♀ fusco-ænea.

Detta subgenus afviker från båda föregående genom hufvudet, som är föga bredare än långt, med smal hjessa och långa ej utspända kinder, proportionsvis kortare stigma och ej genomgående plica på metathorax.

A) Antennæ flagello fortiter incrassato, articulis transversis.

1. *A. crassicornis*: Obscure viridis vel cyaneus, fronte et thorace superne punctis majoribus impressis, femoribus ♀ fusco-æneis, ♂ stramineis. Long. 2--3. mill.

Amblymerus modestus Walk. l. c. II. 344. 9. (forte).

Eutelo tibiali minor et angustior. Caput thorace haud latius, subtriangulare, latitudine sua vix brevius; vertice angusto, ocellis haud magnis in arcum dispositis; fronte plana, epistomate levissime elevato, clypeo vix transverso, apice medio haud sinuato, mandibulis obscuris, palpis pallidis; genis longis, angustis haud buccatis. Antennæ breves, sat longe infra medium faciei insertæ; articulo 1:o haud longo, testaceo, 2:o triangulari supra æneo, 3:o vix observando, 4:o minimo, 5:o parvo, 6--10 transversis fusco-testaceis sensim latioribus, clava magna, apice obtusa. Thorax haud longus; pronoti collari medio angusto ibique minus discreto, latera versus dilatato; mesonoto punctis majoribus piligeris et scutello parce adpersis, hoc apice parum declivi, dorsello angusto; metathorace brevi, scutello saltem duplo brevior, polito, carina media distincta, plica et sulco spiraculari nullis, calli fimbria parca. Alæ hyalinæ, stigmatum haud angusto, metacarpo radio parum longiore. Abdomen triquetrum, apice minus acuminatum, valvula ventrali medium superante. Pedes sat validi, ænei, trochanteribus, femoribus apice tibiis tarsisque flavo stramineis. Mesosternum breve, sulco medio obsoleto, episternis lævibus, epimeris subsquamoso-punctatis, metapleuris fere lævibus, præsternis parvis.

Mas differt: antennis scapo brevior, flagello pallidior, genis minus angustis, femoribus pallide flavis, abdomine oblongo medio æneo.

Ej sällsynt.

B) Antennæ flagello tenuiore, annellis conspicuis. Coxæ posticæ et metasterni latera coerulea.

2. *A. Pedunculi* m: Viridi-cyaneus, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis, mesonoto subtilissime punctato ♀. Long fere 3 mill.

Præcedenti similis et affinis, sed capite antrorsum minus angustato, genis brevioribus, fronte medio convexuscula, superne punctis majoribus vix conspicuis; antennis tenuioribus altius, paullo supra lineam ocularem insertis, articulis 3:o vix conspicuo, 4:o parvo sed distincto, 6—10 sensim parum latioribus fusco-testaceis, articulo 6:o vix, 10:o transversis, clava longiore; mesonoti punctis majoribus setiferis vix conspicuis, pronoti collari medio magis discreto; pedibus metallicis, genubus, tibiis apice et basi, anticis fere totis pallidis, coxis posticis fere violaceis bene distinctus.

Sällsynt; Doctor G. F. Möller har fått den utkläckt ur *Cynips Pedunculi*, insamlade vid Tvedöra i Skåne.

3. *A. squamifer* m: Coerulescens, mesonoto subsquamoso-punctato, antennis scapo metallico. Long. fere 3 mill.

A. Pedunculi simillimus, sed antennis scapo nigro-coeruleo, mesonoto evidenter subsquamoso-punctato, alis stigmatate et radii clava paullo crassioribus, pedibus obscurioribus mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

Subgenus *Psilonotus*.

Caput subrotundum, vertice angusto; facie plana. Antennæ mox supra clypeum insertæ, postannello parvo,

flagello parum incrassato. Thorax longus, supra planiusculus, pronoti collari angusto, metathorace brevissimo. Abdomen fortiter compressum, valvula ventrali anum fere attingente.

Detta subgenus skiljes lättast från föregående genom antennerna, som äro fästade långt ned på pannan under ögonlinjen, genom platt mesonotum och starkt hoptryckt abdomen.

1. *P. aureolus* m: Aureo viridis, antennis pedibusque luteis, his basi viridibus. ♀ Long. 2 mill.

Caput thorace fere latius, subtransversum, antrorsum parum angustatum, pone oculos vix angustatum, vertice angusto, parum emarginato, ocellis in lineam parum curvam dispositis; fronte lata, aurea, plana, superne lævi, clypeo transverso, mandibulis pallidis; genis angustis sat longis. Antennæ basi subdistantes, fere infra lineam ocularem insertæ, luteæ, articulis 1:o longo sed ocellum haud attingente, 2:o fere triangulari, 3—4 vix conspicuis, 5:o parvo, 6—10 transversis subæqualibus, clava magna, præclava triplo longiore. Thorax longus, supra fere planus, glaber, subtilissime, haud squamoso-punctatus; pronoti collari medio acuto, minus lato, lateribus dilatato; mesonoti sulcis vix indicatis; scutello apice haud declivi, dorsello angusto; metathorace brevi, lævi, carina media vix conspicua, plica nulla, spiraculis parvis rotundis, calli fimbria fere nulla. Alæ sat amplæ, hyalinæ, apice rotundato ciliato, fractura sat distincta, stigmatæ tenui flavo, quam radio fere sesqui longiore. Abdomen thorace fere longius, sed angustius, æneum fere glabrum, segmentis 2—7 fere æqualibus. Mesosternum lateribus et epimera bene discreta subsquamoso-punctata. Pedes validi, breves, ænei, femoribus apice, tibiis tarsisque læte flavis.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

2. *P. viridulus* m: Obscure viridis, antennis pedibusque pro parte pallidis. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti similis et affinis, sed haud aureo-micans, pedibus antennisque obscurioribus, his funiculi articulis minus transversis, fronte vix planiuscula, subpunctata, vertice paullo latiore, ocellis in lineam magis curvam dispositis, stigmate paullo crassiore, radii clava minus tenui, metacarpo brevior bene distinctus.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

Genus *Roptrocerus* Ratzeburg.

Terebra anum longe superans. Antennæ funiculo crasso, articulo 1:o ♀ abrupte minore, clava haud subulata. Thorax supra læviusculus, metathorace brevissimo. Coxæ posticæ magnæ. Caput linea occipitali nulla.

Detta slägte afviker från alla inom gruppen genom terebran, som skjuter betydligt öfver abdomens spets. Härigenom skiljes det från *Chiropachides*, med hvilka det visar öfverensstämmelse; med hänseende till postannelli olika utveckling hos könen närmar det sig *Eutelus*.

De båda hithörande subgenera skiljas lätt genom antennernas olika insertion.

Conspectus subgenerum.

- A) Antennæ fere in medio faciei insertæ, hac punctis majoribus impressis. *Roptrocerus*.
 B) Antennæ paullo supra clypeum insertæ. *Anogmus*.

Subgenus *Roptrocerus*.

Caput fere globosum, vertice lato, facie superne fere lævi lateribus et inferne cum clypeo punctis majoribus parce impressis, hoc apice truncato. Mesonotum cum scutello fere læve; pronoti collare magnum sed haud discre-

tum. Alæ stigmatè tenui radio sesqui longiore, hoc clava parva. Abdomen ventre compresso, terebra fere duplo longius.

Detta subgenus skiljes lätt på ansigtet, som har grofva strödda puncter på sidorna och nedtill, genom antennerna, som äro fästade på midten af ansigtet och genom den jemförelsevis långa terebran. Härigenom får det en viss likhet med *Torymus*.

1. *R. mirus*: Æneo-viridis, antennis pedibusque pallidis, illis articulo 6:o subcylindrico, alis hyalinis. ♀ Long. 4 mill.

Amblymerus mirus Walk. l. c. II. 351. 27.

Caput fere thorace latius, pone oculos vix angustatum, vertice lato, medio vix emarginato; oculis ovato-rotundis, sat magnis; ocellis fere in triangulum dispositis; facie parum convexa, superne fere lævi, epistomate convexo, clypeo quadrato, apice medio late truncata, haud discreto et faciei lateribus punctis sat magnis parcius impressis; genis buccatis, haud brevibus, pone sulcum tenuem fere politis; mandibulis crassis, pallidis, apice haud forcipato, lateribus rectis. Antennæ articulo 1:o crasso, ocellum haud attingente et 2:o oblongo-triangulari flavis, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5:o sequentibus fere duplo angustiori, 6:o subcylindrico cum 7—10 crassitie æqualibus, clava parva apice obtusa. Thorax sat magnus, glabriculus, supra planiusculus fere lævis; pronotum magnum, antrosum sensim declive, sulco laterali nullo; mesonoti sulcis antice vix conspicuis; scutellum longum, apice haud declive, dorsello minus angusto; metathorace lævi, carina media tenui, plica nulla, spiraculis sat magnis rotundis a postscutello longe remotis. Alæ minus latæ, hyalinæ, cellula basali et speculo nudis, præstigmatè haud brevi, fractura distincta, stigmatè tenui quam radio fere duplo longiore, hoc clava tenui quam metacarpo paullo brevior. Abdomen thorace longius sed angustum, fere sessile, ven-

træ compresso pallido; segmento 1:o vix conspicuo, 2:o trientem haud occupante, 3:o brevi, 4—6 sensim majore, 7:o majore, 8:o parvo, terebra brunnea abdomine fere duplo brevior, recta, crassa. Pedes validi, testacei, coxis aneis, posticis subcyaneis, magnis oblongo-ovatis, compressis, femoribus crassis cyaneo-micantibus, tibiis rectis, tarsis sat longis. Mesosternum sulco medio tenuissimo, præsternis sat magnis, episternis bene discretis lævibus epimeris punctatis, ovalibus.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

2. *R. brevicornis* m: Viridis, pedibus antennisque pallidis, his funiculi articulis transversis. ♀ Long. fere 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed duplo minor, terebra paullo brevior, metathorace subpunctato, antennis articulo 2:o 6:o longiore, 6—10 sensim brevioribus, vix latioribus discedens.

Sällsynt; funnen i Dalarne.

Subgenus *Anogmus* Foerster.

Caput transversum. Antennæ infra lineam ocularem insertæ. Clypeus apice truncato, mutico. Thorax supra planiusculus, pronoti collaré minus lato. Coxæ posticæ late distantes. Terebra abdomine triplo brevior.

Från föregående slägte afviker *Anogmus* genom antennerna, som äro fästade strax ofvanför clypeus, genom ansigtet som saknar de grofva intryckta puncterna och genom de bredt åtskilda bakbens höfter, hvilka äro starkt hoptryckta. Sistnämde karakter skiljer äfven hannen från *Eutelus*, med hvilket slägte *Anogmus* visar mesta öfverensstämmelse.

1. *A. strobilorum* m: Viridis, antennis pedibusque pro parte pallidis, alis hyalinis: ♂ antennis funiculo testaceo, clava nigra. Long. 2 mill.

Caput thorace fere latius, antrorsum vix angustatum, subrotundum, vertice angusto, ocellis fere in triangulum dispositis; facie plana, subtilissime punctata, genis brevibus angustis, oculis sat magnis, glabris. Antennæ basi subdistantes, articulo 1:o ocellum haud attingente, testaceo, 2:o triangulari, supra æneo, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5:o sequente duplo angustiore, 6—10 fusco-testaceis transversis, clava fusca apice obtuse rotundata. Thorax longus, supra depressus subglaber; pronoti collari brevi, medio angustiore; mesonoto subtiliter punctato, sulcis antice subinchoatis; scutello magno depresso; metathorace brevi, carina media tenui, plica nulla, spiraculis rotundis a postscutello remotis. Alæ hyalinæ, longæ sed haud latæ, cellula costali angusta, stigmatе tenui quam radio sesqui longiore, hoc sub angulo sat acuto egrediente clava tenui. Abdomen thorace longius, valvula ventrali medium superante, segmentis 1:o vix conspicuo, 2:o trientem haud occupante. Pedes minus validi, breviusculi, testacei, femoribus medio fuscis, coxis æneis, posticis subcoeruleis. Mesosternum sulco medio tenui, mesopleuris bene discretis, epimeris lævibus; præsternis parvis.

Mas differt: antennis funiculo testaceo, clava nigricante, abdomine immaculato, oblongo, femoribus pallidis.

Sällsynt; utkläckt ur Grankottar.

Genus *Etroxys* Westwood.

Caput vertice medio rarissime acuto, oculis glabris; facie inferne haud prominente, mandibula sinistra plerumque 3-dentata, dente basali lato. Antennæ articulo 5:o sequente rarissime abrupte minore, plerumque magno, clava haud subulata. Coxæ posticæ margine postico basi haud pubescenti. Terebra anum haud vel vix superans. Abdomen haud rotundum, ♀ acuminatum* vel conicum. Tibiæ posticæ unicalcaratæ.

Detta slägte omfattar en mängd af arter, som kunna fördelas på flera subgenera, hvilka väl hvar för sig äro ganska skarpt begränsade, men för hvilka samtliga det är svårare att uppgifva bestämda karakterer. Från *Eutelus* skiljes *Etroxys* dels genom antennerna, hvilkas postannellus nästan utan undantag är större än pedicellus och som ytterst sällan äro fästade nedom midten af ansigtet och hvilkas antennsträng oftast är trådformig eller åtminstone omärkligt tilltjocknande emot spetsen; dels äfven genom metathorax, som sällan är polerad och ofta med tydligt utbildad nucha; hannarne äro ej utmärkta genom någon egendomlig utveckling af palper eller mellantibier. *Isocyrtus* har en i båda könen utmärkt karakter genom bakbenens höfter, som på yttre sidans bas äro pubescenta och mandiblerna äro likformiga, skarpt 4-tandade. *Pteromalus* har oftast båda mandiblerna 4-tandade, abdomen är ofta rund, ögonen ej sällan håriga, metathorax oftast punterad med tydlig plica, spiracula nästan utan undantag runda och ansigtet nedtill ej sällan starkt framskjutande. Lefnadssättet är föga känt, men några arter äro utkläckta ur galläplen.

Conspectus subgenerum.

- A) Clypeus apice medio dente armatus. Thorax longus, pronoti collare acute marginatum, lateribus dilatatum; metathorax plica abbreviata vel nulla. *Stenomalus*.
- B) Clypeus apice medio dente nullo sed sinuatus vel truncatus.
 - a) Alæ radii clava magna. Caput genis sæpe buccatis. Collare discretum medio acutum ibique haud angustum.
 - b) Metathorax brevis. Clypeus apice medio inciso. Episterna mesothoracis coxas attingentia. *Cecidostiba*.
 - bb) Metathorax haud brevis, sæpe plica, plerumque etiam costula transversa instructus. Caput et thorax sæpius rigido-pubescentia. *Cenacis*.
 - aa) Alæ radii clava parva vel mediocri. Caput interdum triangulare et oculis prominulis. Collare interdum haud vel parum discretum.
 - c) Caput triangulare, os versus angustatum, facie haud rigido-pubescente, oculis magnis, convexis, rotundis. Præsterna magna. Sulcus mesosterni distinctus. Spiracula rotunda a postscutello remota.

- d) Collare acutum.
- e) Vertex medio acuto. *Etroxys.*
- ee) Vertex medio haud acute marginato.
- f) Postannellus parvus. *Cricellius.*
- ff) Postannellus magnus. *Holcaus.*
- dd) Collare haud discretum. Abdomen valvula ventrali medium haud attingente. *Stinoplus.*
- cc) Caput genis plerumque buccatis, oculis haud prominulis. Sulcus sternalis obsoletus. Vertex medio haud acuto. Spiracula metathoracis sæpius magna ovalia. Collare medio haud vel vix acuto. Postannellus pedicello longior.
- g) Collare latum. Spiracula magna ovalia. Caput genis buccatis. Metathorax nucha plerumque constricta. Mandibula sinistra 3-dentata. *Habrocytus.*
- gg) Caput os versus angustatum. Collare medio angustum. Mandibula utraque 3-dentata. *Spintherus.*

Subgenus *Stenomalus.*

Caput os versus subangustatum, vertice sat lato haud acuto; palpis articulo ultimo subclavato, genis sat longis; clypeo medio dente acuto armato; mandibulis sat crassis, apice haud forcipato, externe haud sinuatis, sinistra dentibus 3, basali lato truncato, dextra 4 acutis armata. Antennæ in medio faciei insertæ, scapo sat longo, flagello sæpe ♀ incrassato, ♂ longo. Thorax longus; pronoti collari medio sat angusto, acute marginato, lateribus subteretibus dilatatis; dorso dorsuli basi duplo longiore; metathorace haud brevi sæpissime punctatissimo, plica basi distincta, apicem haud attingente, carina media elevata postice bifida nucham indicante. Alæ stigmatibus radio saltim sesqui longiore, hoc clava parva. Abdomen oblongum, ventre ♀ convexo vel obtuse carinato, ♂ oblongum plica ventrali sæpius pallida. Pedes sat validi. Præsterna magna triangularia. Mesosternum sulco medio

obsoleto, episternis politis margine antice subarcuato coxas haud attingentia. Corpus haud parvum sat læte metallicum fere glabrum, mesonoto squamoso-punctato.

Detta subgenus skiljes säkrast från alla följande genom clypei midteltand; stigmat är åtminstone hälften längre än radius; metathorax har en midtelköl, som klyfver sig i 2 grenar straxt framför den emarginerade spetsen; petiolus är knappt transversel hos ♀, längre hos hannen, som har antennsträngens leder långa, håriga.

1. *S. crassicornis* (Dalm.): Obscure viridis, antennis scapo flavo, tibiis pallide testaceis, flagello incrassato, metathorace punctatissimo, alis hyalinis: ♂ antennis scapo triente apicali compresso-dilatato. Long. 3—5 mill.

Pteromalus bellus Walk. l. c. III. 466. 104. (forte).

Pteromalus varians Nees (forte).

Caput thorace fere latius, pone oculos parum angustatum, vertice sat lato, os versus paullo angustatum, latitudine sua brevius, ocellis in lineam sat curvam dispositis; genis subbuccatis, clypeo subtiliter strigoso, facie leviter convexa, mandibulis piceo-ferrugineis, palpis maxillaribus articulo ultimo dilatato, sublunato-lineari. Antennæ nigræ crassæ, in medio faciei insertæ, basi parum distantes; articulo 1:o testaceo, ocellum fere attingente, 2:o fusco-piceo, 3:o et 4:o nigrofuscis haud parvis sed flagello arcte adpressis, hoc incrassato, rude pilosulo, articulis 5—10 sensim latioribus, 5:o haud, 10:o leniter transverso, clava minus discreta, apice oblique obtusa, haud parva. Thorax supra fere glaber, confertissime subsquamoso-punctato; pronoto lateribus sulco minus impresso; mesonoto sulcis antice conspicuis, scutelli freno declivi fortius punctato, dorsello angusto nitido; metathorace haud brevi, confertissime punctato, sulco spiraculari profundo, postice emarginato, nucha nisi carina postice furcata non

indicata, calli fimbria minus densa. Alæ sat longæ, hyalinæ, cellula basali et speculo nudis, stigmatè radio sesqui longiore, hoc quam metacarpo evidenter breviorè. Abdomen thoracis longitudine, subtus obtuse compresso-carinata, valvula ventrali medium haud superante; segmento 1:o æneo, lævi, vix transversò, 2:o smaragdino, apice truncato incisura media vix observanda trientem abdominis occupante, 3—7 sensim paullo longioribus, late cupreo-fasciatis, 8:o subconico. Pedes sat validi, breviusculi, ænei, genubus tibiisque pallide flavis, tarsis tibia brevioribus. Mesosternum lateribus et episterna subsquamoso-punctata, metapleura haud lævia, præsterna magna punctulata triangularia.

Mas differt: antennis corporis fere longitudine, articulo 1:o æneo, vel subtus pallido, triente apicali compresso-acuto, 2:o breviorè subtransverso, 5—10 longis linearibus, breviter fusco-hirtulis, clava longa minus distinctè articulata, femoribus anterioribus pallidis, abdomine oblongo, fere lineari, cupreo, basi apiceque viridi, macula ventrali pallida interdum pellucènte.

Den allmännaste arten öfver hela Skandinavien; jag har fått den utkläckt ur Bedeguar.

2. *S. subfumatus* m: Cupreus, antennis subincrassatis, scapo tibiisque rufis, alis fumato-hyalinis. Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, colore magis cupreo, antennis minus validis, alis leniter fumatis, tibiis rufis, vel fuscis, abdomine fasciis viridibus, ♂ antennis articulo 10:o fere transversò, femoribus æneis discedens.

Sällsyntare än föregående.

3. *S. rugosus* m: Læte viridis, abdomine ovato, fasciis aureo-æneis, metathorace rugoso, plica medium attin-

gente: ♂ antennis dimidio apicali compresso-dilatato. Long. 3—5 mill.

S. crassicorni iterum similis et affinis, sed ♀ abdomine latiore, pulchre viridi et aureo-fasciato, ventre minus convexo, antennis minus incrassatis, metathorace rugoso, plica medium attingente, femoribus rufis: ♂ antennis flagello fusco, minus hirtio, scapo dimidio apicali lenissimo compresso-dilatato, metathorace vix rugoso, sed plica abbreviata, abdomine viridi, disco medio æneo macula pellucente pallida, femoribus anterioribus pallide testaceis, posticis rufescentibus bene distinctus.

Ej allmän i södra Sverige; jag har träffat den på Pilevallar vid Lund.

4. *S. Muscarum*: Gracilis viridis, antennis filiformibus, basi pedibusque flavis: ♂ coxis anterioribus flavis. Long. 2—3 mill.

Pteromalus Muscarum Walk. Catal. pag. 42.

Pteromalus Thessalus Walk. Mon. Chalc. I. 268.

Pteromalus larvarum Nees l. c. II. 95. 3.

Pteromalus psittacinus Foerst. 86.

Pteromalus seladonius Foerst. 177. (3).

Species a præcedentibus corpore cum pedibus graciliore; ♀ capite antrorsum magis angustato, genis vix buccatis, antennis scapo ocellum fere superante, annellis distinctis, funiculi articulis crassitie subæqualibus, longis, metathorace dense punctato, sulco spiraculari postice minus profundo, alis hyalinis, stigmatibus flavo quam radio fere duplo longiore, abdomine elongato, thorace haud longiore, subtus haud compresso-carinato, viridi vel cyaneo, fasciis atrocoeruleis ornato, femoribus stramineis, rarius æneo-

tinctis; ♂ coxis anterioribus flavo-stramineis, abdomine semper macula pallida mox discedens.

Temligen allmän.

Subgenus *Cecidostiba*.

Caput genis buccatis, clypeo subdiscreto apice medio inciso; mandibula sinistra 3-dentata, dente basali lato, dextra 4-dentata, dente basali acuto. Antennæ fere in medio faciei insertæ, haud longæ. Collare discretum margine antico acuto. Alæ radii clava magna rotunda. Metathorax brevis, carina distincta, spiraculis parvis rotundis, haud punctatus. Abdomen parum compressum, apice magis minusve acuminatum. Episterna mesothoracis lævia magna, ad coxas usque descendens. Præsterna parva. Corpus minus lucide metallicum, capite mesonotoque punctis majoribus setigeris adpersis. Victus in gallis quercinis.

Detta subgenus känns lättast på den oftast smalt inskurna clypeus, stor rund radialklubba, alltid kort metathorax och hvasskantadt collare.

1. *C. rugifrons* m: Viridis, facie lateribus mesonotoque crebre subrugoso-punctatis, antennis pallidis, basi tibiisque stramineis. Long. 3—4 mill.

Species a sequentibus antennis pallidis capitis thoracisque sculptura subrugosa distincta. Caput thoracis latitudine, pone oculos haud angustatum, vertice sat lato, ocellis magnis in lineam sat arcuatam dispositis, facie plana confertius subrugoso-punctata, scrobe antennali lata vage impressa sublævi, genis buccatis, clypeo superne subdiscreto subtransverso, mandibulis flavis, palpis pallide testaceis. Antennæ flavescentes, articulo 1:o medio subcompresso-dilatato, ocellum haud attingente, 2:o oblongo-triangulari, 3—4 parvis, 5—10 subtransversis, sensim vix latioribus, clava apice obtusa. Thorax sat robustus, col-

lari medio minus lato, sed lateribus dilatato, mesonoto sat crebre subrugoso-punctato, scutello apice declivi, metathorace freno fere brevior, spiraculis a postscutello sat remotis. Alæ hyalinæ, cellula basali et speculo nudis, præstigmate haud brevi, stigmate radio vix longiore, minus tenui, metacarpis radii fere longitudine. Abdomen thorace longius, haud latius, viridi-æneum, fasciis cupreis, valvula ventrali medium superante, segmentis 1:0 vix conspicuo, 2:0 trientem haud occupante, 3—7 fere æqualibus vel sensim paullo longioribus; basi vix, apice magis pubescens, ventre subcompresso-carinato. Pedes straminei, coxis et femoribus ultra medium æneis, his sat crassis, tibiis posticis leniter incurvis. Mesosternum lateribus crebre, epimeris subtilius punctatis, metapleuris fere lævibus, sulco sternali obsoleto.

Mas differt: antennis funiculi articulis longioribus, haud hirtis, scapo et pedicello brevioribus, præstigmate et stigmate crassis, abdomine oblongo macula nulla pallida.

Utkläckt ur *Cynips terminalis*, möjligen Ratzeburgs *Pteromalus leucopezus*.

2. *C. collaris* m: Ænea, antennis brevibus crassis, collari lato, tibiis et femoribus testaceis, his ♀ æneis. Long. 2—3 mill.

Species a præcedente capite crassiore, ocellis in triangulum dispositis, antennis obscurioribus, flagello incrassato, articulis transversis, fronte thoraceque punctis setas nigras gerentibus adpersis sed haud rugosis, epistomate convexo, pronoti collari latiori, alis stigmate sat crasso quam radio sesqui longiore, hoc clava ovali-rotunda, abdomine cupreo, basi læte viridi, valvula ventrali medium haud attingente, femoribus ♂ flavis mox discedens.

Utkläckt ur *Cynips terminalis* och *folii* från Skåne och Öland.

3. *C. truncata* m: Viridis, clypeo apice truncato, radii clava minus crassa. Long. 2—4 mill.

Species aliena clypeo apice haud inciso et radii clava haud rotunda, sed pronoti collari acuto, episternis magnis, epimeris subtiliter punctatis, fronte thoraceque punctis majoribus adpersis ab *Habrocyto* discedens. A præcedentibus stigmatate sat tenui, radio hoc parum brevior, clava ovali, tibiis basin versus ♀ semper, ♂ sæpe fuscis, abdomine magis compresso, postice conico producto, alis interdum umbra fusca transversa sub radii clava, coxis posticis ♀ sæpius cyaneis, antennis flagello fusco vel testaceo haud incrassato, articulis haud vel vix transversis distincta.

Ej sällsynt; utkläckt ur *Cynips terminalis* och *folii*.

Subgenus *Cænacis* Foerst.

Caput genis haud compressis, rarius buccatis, clypeo strigoso, apice medio emarginato vel inciso. Antennæ fronti medio insertæ, scapo sæpius metallico, anello 2:o distincto, flagello filiformi vel incrassato. Thorax collari margine antico acuto, mesonoti sulcis antice vix inchoatis; metathorace haud brevi, spiraculis sæpissime rotundis, plerumque costula transversa, carina media et plica instructo. Alæ radii clava magna vel mediocri, præstigmatate sat longo, nervo basali pilosello. Abdomen basi parce apice densius pubescens, ventre parum compresso-carinato. Epimera mesothoracis subsquamoso-punctata. Corpus sæpe thorace et facie pube rigida albida parce vestitum, femoribus æneis, abdomine ♂ immaculato.

Detta subgenus står mycket nära *Cecidostiba* och afviker endast genom längre metathorax med oftast tydlig tvärribba i eller bakom midten; epimera mesothoracis äro starkare puncterade, hufvud och thorax utan synbara större intryckta puncter. Från *Habrocytus* skiljes det genom skarpkantadt collare, i allmänhet star-

kare utvecklad radial-klubba och mindre spiracula. Från *Isocyrtus* kännes det på de ej vid basen pubescerade bakhöfterna.

A) Caput vertice sat lato, genis buccatis, clypeo apice medio inciso. Spiracula rotunda. Alæ radii clava magna. Antennæ scapo flavo. (Species gallicolæ.)

1. *C. grandiclava* m: Æneo-viridis, metacarpo radio vix longiore, metathorace haud punctato. Long. 3—5 mill.

Pteromalus capitatus Ratz. (forte).

Pteromalo puparum statura similis. Caput thorace fere latius, pone oculos haud angustatum, vertice lato, ocellis in lineam sat curvam dispositis, oculis subovatis; facie sat lata, plana confertim punctata; genis haud strigosis sat latis minus longis; clypeo vix discreto, strigoso, apice medio inciso; mandibulis piceo-testaceis, apice vix forcipato, sinistra 3-, dextra 4-dentata. Antennæ scapo ocellum haud attingente, flavo, pedicello postannelli longitudine, annellis minimis, funiculo obscure testaceo, articulis sensim, vix perspicue latoribus, 1:o haud, 6:o leniter transverso, clava haud magna apice obtusa. Thorax obscure æneus, sat robustus, supra nigro-pilosellus, sed punctis majoribus adpersis haud conspicuis; pronoti collari sat lato, haud rugoso, latera versus vix dilatato; mesonoto confertissime subtiliter subsquamoso-punctato, scutello convexo, freno declivi, dorsello polito; metathorace sat longo, haud punctato, nitido, postice angustato, costula transversa elevata mox pone medium distincta, spiraculis subrotundis haud magnis. Alæ hyalinæ, interdum disco medio umbra fusca magna, præstigmata sat crasso, stigmata haud tenui quam radio parum longiore, hoc clava magna rotunda. Abdomen thorace parum longius, subovatum, apice minus productum, ventre obtuse carinato, valvula ventrali medium superante, postpetiolo fere smaragdino, apice truncato incisura media lenissima. Pedes sat validi ænei, trochanteribus, femorum apice tibiisque

pallide testaceis, his basin versus sæpe fuscis, posticis incurvis, calcari haud brevi. Mesosternum sulco medio obsoleto, præsternis parvis, epimeris et lateribus subsquamoso-punctatis, episternis lævibus fere usque ad coxas descendentibus; metapleuris fere lævibus.

Mas differt: antennis flagello filiformi, vix pilosello, capite et præstigmatè latioribus, ocellis in triangulum dispositis, abdomine oblongo, cupreo, basi viridi, plica ventrali distincta, alis cellula basali fere tota pubescente.

Temligen sällsynt i medlersta och södra Sverige; utkläckt ur *Cynips Gemmæ*.

2. *C. punctulata* m: Obscure æneo-viridis, metathorace punctulato, metacarpo radio sesqui longiore. Long. 3—4 mill.

Præcedenti simillima, sed metathorace paullo breviorè, costula transversa minus discreta, sed subpunctato, radii clava minus rotunda, metacarpo evidenter longiore, abdomine ♀ magis elongato, antennis flagello ♂ pilosello minus longo discedens.

Sällsynt i medlersta Sverige.

B) Caput genis haud vel vix tumidis, antrorsum subangustatum, vertice haud lato, clypeo apice medio emarginato. Antennæ plerumque scapo toto vel basi excepta æneis, flagello obscuro. Postpetiolus apice haud inciso.

a) Antennæ scapo sat longo æneo, flagello filiformi. Præsterna sat magna. Facies lata parce albido pubescens.

3. *C. spiracularis* m: Cuprea, alis stigmatè radio longiore, hoc clava magna, spiraculis magnis ovalibus ♀. Long. fere 5 mill.

Statura *Dinarmi scabriculi*, corpore cupreo, thorace facieque pube rigida albida parce vestitis. Caput thorace

fere latius, pone oculos subangustatum, vertice haud lato, ocellis in curvam dispositis, oculis nigris, subovatis, genis haud brevibus, vix buccatis; facie plana, confertim punctata, clypeo apice medio emarginato, mandibulis sat magnis, apice haud forcipato. Antennæ longæ, filiformes, articulo 1:o olivaceo-æneo, basi pallido, 2:o æneo, subtriangulari, 3—4 parvis, 5—10 crassitie æqualibus, fuscis, sensim brevioribus, præclava haud transversa, clava haud lata, oblonga. Thorax supra subdepressus, cupreus, confertim sat fortiter punctatus; pronoti collari haud lato medio paullo angustiore, scutello convexo, freno declivi, dorsello vix polito haud angusto; metathorace sat magno, postice angustato, sat concinne punctato, carina distincta, plica tantum fovea basali indicata, sulco spiraculari profundo, costula transversa nulla, spiraculis ovalibus. Alæ hyalinæ, stigmatibus minus crasso, metacarpo vix longiore, hoc radio fere sesqui longiore, clava majuscula rotunda. Abdomen elongatum, sed postice haud conico-productum, æneo et aureo-fasciatum, apice dense, basi lateribus parce haud teniter albido-pubescentibus, segmento 2:o apice late rotundato integro, trientem vix occupante. Mesosternum sulco medio tenui, præsternis sat magnis, triangularibus, episternis vix politis, inferne ab epimeris haud discretis. Pedes mediocres, ænei, tibiis rufis, medio fuscis, piloselli.

Sällsynt; funnen på Gottland.

4. *C. pilosella* m: Obscure olivaceo-ænea, albido-pilosella, metathorace spiraculis subrotundis, genibus, tibiis apice tarsisque basi rufescentibus ♀ Long. 3—5 mill.

Præcedenti statura et punctura simillima, sed antennis scapo adhuc longiore, ocellum superante, flagello nigro-fusco, capite thoraceque olivaceo-æneis, vix nitidis, sed pube densius albida vestitis, alis densius pubescentibus, radii clava majore, metathorace plerumque costula ante medium distincta, spiraculis minoribus subrotundis, tibiis

obscurioribus, dorsello punctatissimo, mesosterni lateribus subcoeruleis distincta.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

- aa) Antennæ flagello subincrassato, articulis bene discretis.
Thorax minus albido-pilosellus.

5. *C. crassicornis* m: Obscure viridi-ænea, genubus tarsisque basi pallidis, metathorace punctatissimo, costula transversa in medio, alis radii clava magna. Long. fere 4 mill.

Caput thorace vix latius, pone oculos subangustatum, vertice haud lato, ocellis in lineam curvam dispositis; antrosum subangustatum, confertim punctatum, facie pube albida rigida parcius vestita, genis sat longis, haud buccatis. Antennæ nigræ, articulo 1:o ocellum haud attingente et 2:o oblongo æneis, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5--10 sensim latioribus, nigris, 5:o vix, 10:o fortius transverso, pube brevi fusca rigida vestitis, clava parva, obtusa, oblique subacuminata, Thorax sat robustus, supra fere glaber, olivaceo-viridis, confertissime punctatus; collari medio haud angusto, latera versus dilatato; scutello convexo, subtilius punctato, freno declivi, dorsello haud polito; metathorace sat magno, postice angustato, confertissime subtiliter punctato, costula transversa in medio sat elevata, spiraculis subovalibus. Alæ hyalinæ, stigmatum haud tenui fusco quam radio sesqui fere longiore, hoc clava magna rotunda, quam metacarpo paullo brevior. Abdomen thorace fere brevius, haud latius, subovatum, ventre obtuse carinato; æneum postpetiolo viridi-nitente. Mesosternum lateribus et epimera subsquamoso-punctata, præsternis mediocribus. Pedes sat validi, ænei, tibiis basi et apice, tarsis basin versus pallidis.

Sällsynt; funnen vid Ringsjön i Skåne.

6. *C. squamifera* m: Obscure olivaceo-viridis, antennis scapo tibiisque pallidis, his medio late fuscis, alis stigmatē tenui radio sesqui longiore, hoc clava mediocri ♀. Long. fere 3 mill.

Præcedenti metathoracis forma et sculptura similis, sed antennis scapo fere toto flavo, flagello minus crasso, mesonoto parce albido-hirtulo fortiter squamoso-punctato, alis stigmatē tenuiore, radii clava minus lata, tibiis fuscis, basi apiceque pallidis mox discedens; a *C. grandiclava* metathorace punctulato, genis vix buccatis, radio clava minore, stigmatē angustiore distincta; a *C. punctulata* metathorace longiore, costula transversa medio sat elevata, mesonoto fortius squamoso-punctato, freno subtilissime punctato, postpetiolo apice late rotundato integro facillime distinguenda.

Sällsynt på Gottland.

7. *C. parvi-clava* m: Obscure viridis, antennis scapo basin versus, tibiis basi et apice pallidis, alis stigmatē tenui quam radio sesqui longiore, hoc clava parvula. ♀ Long. fere 3 mill.

C. crassicorni antennarum structura, metathoracis forma et sculptura simillima, sed antennis scapo dimidio fere basali pallido, scutello minus convexo, spiraculis subrotundis, alis stigmatē tenui quam radio saltim sesqui longiore, hoc clava multo minore, abdomine magis attenuato mox discedens; a *C. squamifera* mesonoto subtilius punctato, alarum stigmatē et radii clava multo minoribus mox distincta.

Sällsynt vid Lund.

8. *C. planiscuta* m: Coerulescens, pedibus gracilioribus, scutello subdepresso, alis stigmatē radio sesqui longiore, hoc clava mediocri ♀. Long. 3 mill.

Species ab affinibus, capite vertice angusto sed antrosum vix angustato, facie lata et mesonoto parcius albido-pubescentibus; antennis scapo basin versus pallido, flagello fusco, apicem versus incrassato; pronoti collari medio sat angusto, scutello subdepresso subtiliter, mesonoto fortius subsquamoso-punctatis; metathorace producto, subtiliter sed sat concinne punctato, costula fere ante medium sita; alis hyalinis stigmatibus haud crasso quam metacarpo vix longiore, hoc quam radio fere sesqui longiore, clava mediocri; abdomine elongato, subtus parum convexo, femoribus medio fuscis tibiisque pallidis discedens.

Sällsynt i Lappland.

Subgenus *Etroxys* Westwood.

Caput subtriangulare, oculis magnis prominulis, vertice medio acuto, clypeo medio mutico, mandibulis haud forcipatis, 3-dentatis, dente basali lato, truncato. Thorax collari medio angusto sed acuto, mesonoto sat longo; metathorace spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis. Alæ stigmatibus radio longiore, hoc clava parva, cellula costali angusta. Abdomen elongatum, postpetiolo truncato fovea basali fere nulla. Pedes sat graciles. Mesosternum sulco medio tenui sed distincto, præsternis sat magnis.

Detta subgenus skiljes lätt på hjessan, hvilken i midten liksom collare är skarpkantad, genom långspetsad abdomen och triangulärt hufvud med utstående ögon.

Hannarne hafva mörkare ben och abdomen nästan jemnbred, härigenom erinra de ganska mycket om *Trigonoderus*. Möjligen lefva de parasitiskt på träinsecter.

1. *E. elongatus* m: *Æneus*, ventre pedibusque pallidis, his basi æneis, antennis fortius incrassatis, ♂ albido-hirtis, linearibus. Long. 2—4 mill.

Pteromalus compressus Walker (forte).

Caput thorace paullo latius, antrorsum fortius angustatum, genis teretibus sat longis, sulco tenui, vertice pone ocellos acuto, emarginato, his fere in triangulum dispositis; facie leniter convexa, scrobe antennali sat magna sed parum determinata, epistomate convexo, fere obtuse carinato, clypeo subdiscreto, apice rotundato-truncato; oculis rotundis rubris, prominulis. Antennæ in medio faciei insertæ, crassæ, nigræ, articulo 1:o compresso-dilatato. ocellum vix attingente, 2:o æneo subtriangulari, 3—4 distinctis, flagello sensim incrassato, articulis pube brevi adpressa rigida quasi striatis, clava magna oblonga, postannello haud transverso fere triplo longiore. Thorax latitudine sua fere triplo longior, supra glabriculus, minus fortiter punctatus; pronoto antice subdeclivi, collari acuto medio sat angusto, latera versus dilatato; mesonoti sulcis antice obsoletis, dorso dorsuli basin saltem duplo longiore; scutello fortius convexo, freno declivi, dorsello haud angusto; metathorace haud brevi, vix declivi, apicem versus subangustato ibique truncato, nucha nulla, subtiliter punctato, carina media distincta, plica fovea parva basali tantum indicata, sulco spiraculari obsoletiore, spiraculis parvis rotundis. Alæ longæ sed angustæ, apice minus late rotundato ciliato, cellula costali angusta, basali et speculo parvo nudis, nervo basali pilosello, stigmate tenui vix metacarpo longiore, radio clava parva sub angulo sat acuto egrediente metacarpo fere duplo brevior. Abdomen elongatum, ventre pallido compresso; segmento 1:o brevissimo vix conspicuo, 2:o apice truncato lacte viridi, 3:o parvo, 4—7 sensim longioribus, 8:o compresso elongato, terebra anum paullo superante, spiculis crassis, valvula ventrali trientem basalem superante. Pedes graciles calcaribus brevibus, testacei, coxis posticis conico-ovatis basi viridi-æneis. Mesosternum sulco medio distincto, præsternis sat magnis triangularibus, mesopleuris margine anteriore subcurvato, epimeris bene discretis punctatis.

Mas differt: antennis scapo brevi æneo, pedicello fere transverso, annellis vix discretis, funiculi articulis bene discretis, albido-hirtulis, elongatis, crassitie æqualibus, clava conico-elongata; capite brevior; abdomine lineari cupreo, apicem versus subdilatato, supra plano, macula parva prope basin pallida, ventre pallido, plica angusta haud alta; coxis æneis, femoribus fuscis.

Ej sällsynt; utbredd från Skåne till Lappland.

2. *E. breviusculus* m: Virescens, antennis scapo pallide testaceo, pedibus concoloribus, minus gracilibus, abdomine minus elongato. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, thorace subtilius squamoso-punctato, scutello minus convexo, metathorace plica basi et apice indicata, mesonoti sulcis ad medium fere ductis, abdomine crassiore sed brevior, basin versus superne piceo-testaceo, segmentis 3:0 4:0 longior, 4--6 brevissimis, 7:0 quadrato, 8:0 triangulari distinctus.

Sällsynt i Småland.

3. *E. longicauda* m: Viridis, antennis basi pedibusque flavis, abdomine apice valde conico-elongato ♂ ♀. Long. 2--4 mill.

E. elongato iterum similis et affinis, sed major, magis læte viridis, antennis fortius incrassatis, clava majore, suturis obliquis, vertice fere ad oculos usque acute marginato, mesonoto subtilius punctato, abdomine basin versus supra piceo-viridi, segmentis 2 ultimis valde elongatis, compressis, terebra anum evidenter superante discedens.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Subgenus *Cricellius*.

Caput subtriangulare, transversum, antrorsum subangustatum; clypeo apice mutico; mandibulis apice haud

forcipato, epistomate haud convexo. Antennæ funiculo articulo 1:o abrupte minore. Thorax præsternis sat magnis, collari discreto margine æuto sulco mesosterni tenui sed distincto. Alæ stigmatibus radio longiore, hoc clava parva.

I mesosternum, vingar, collare och hufvud öfverensstämmande med *Ectoxys*, men afvikande genom antennerna, hvilkas postannellus är mycket liten, ringformig. Härigenom kommer det nära *Eutelus*, men skiljes genom puncterad metathorax, radius utgående under en ganska spetsig vinkel och nästan dubbelt så kort som metacarpus, mesosternum med tydlig fast fin fåra, præsterna puncterade ganska stora triangulära, mesopleura i framkanten något bågböjda, spiracula små runda, ocellerna stora.

1. *C. decipiens* m: Coerulescens, antennis scapo, tibiis basi et apice palide testaceis, alis subhyalinis, abdomine subovali, ventre parum convexo. ♀ Long. fere 3 mill.

Corpus coerulescens, sat nitidum, fere glabrum. Caput thoracis latitudine, pone oculos subrotundos prominulos angustatum, vertice angusto, medio emarginato, haud acuto, ocellis fere in triangulum dispositis; facie planiuscula, clypeo haud discreto, apice medio truncato, epistomate haud convexo, genis sat longis haud compressis nec buccatis. Antennæ in medio faciei insertæ, basi fere contiguæ; articulis 1:o compresso-subdilatato, ocellum anteriorem haud attingente, 2:o breviter triangulari, 3:o vix conspicuo, 4:o et 5:o parvis subæqualibus, 6—10 crassitie subæqualibus, fuscis, omnibus transversis, clava apice obtusa, quam præclava fere triplo longiore. Thorax supra subdepressus, coerulescens, crebre minus fortiter punctatus; pronoti collari bene discreto, margine antico truncato, lateribus subdilatato, medio minus angusto; mesonoti sulcis antice parum conspicuis; scutello minus convexo, dorsello sat angusto; metathorace subtiliter punctato, haud brevi, carina media minus distincta, plica et sulco spiraculari parum discretis, spiraculis parvis rotundis, a

postscutello remotis. Alæ haud latæ, subhyalinæ, cellula costali sat angusta, stigmatе tenui quam radio haud sesqui longiore, metacarpo longo. Abdomen subovale, thoracis latitudine, supra depressum, subtus parum convexum, apice haud productum, postpetiolo trientem vix occupante, apice truncato. Pedes mediocres æneo-coerulescentes, tibiis fuscis apice cum genubus pallide testaceis. Mesosternum coeruleum, sulco medio tenui integro, lateribus et epimeris subsquamoso-punctatis, episternis bene discretis margine anteriore subarcuato, præsternis sat magnis triangularibus punctulatis, metapleuris haud lævibus.

Sällsynt; funnen i Småland.

Subgenus *Holcæus*.

Caput subtriangulare, vertice emarginato haud acuto; clypeo apice medio truncato mutico. Antennæ postannello magno. Alæ stigmatе radio longiore. Abdomen elongatum, ventre compresso, valvula ventrali brevi. Thorax elongatus, collari medio acuto.

Detta subgenus står mycket nära *Etroxys* och afviker endast genom hjessan, som ej är skarpkantad i midten.

A) Antennæ flagello valido, apice incrassato.

1. *H. dichrous* (Dalm.): *Æneus*, minus nitidus, antennis basi pedibusque flavis, his ♂ fusco-æneis, apice pallidis. Long. 3—4 mill.

Statura corporis et antennarum structura a sequentibus mox discedens. Caput triangulare, latitudine sua paullo brevius, pone oculos magnos ovato-rotundos angustatum, vertice haud lato, medio sat fortiter emarginato, ocellis magnis fere in triangulum dispositis; facie parum convexa coerulescenti, scrobe antennali sat magna sed vage impressa; clypeo parum discreto, apice fere emargi-

nato-truncato, epistomate convexo; mandibulis 3-dentatis. dente basali lato, apicali haud forcipato; genis haud buccatis, sat longis. Antennæ crassæ, faciei medio insertæ, articulis 1:o flavo-testaceo, compresso-dilatato, ocellum anteriorem fere attingente, 2:o oblongo-triangulari, 3—4 parvis sequenti arcu adpressis, 5—10 sensim latioribus, pube adpressa rigida vestitis, 5:o crassitie sua paullo longiore, 10:o subtransverso, clava magna, apice oblique obtuse acuminata, suturis obliquis. Thorax latitudine sua saltem duplo longior, minus nitidus, obscure viridis, crebre, minus fortiter punctatus, subglaber; pronoti collari acuto, medio angusto, latera versus dilatato; dorso dorsuli basi saltem duplo longiore; scutello sat convexo, freno declivi, dorsello haud angusto; metathorace haud brevi, punctulato, carina media elevata, sulco spiraculari haud profundo, spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis. Alæ subhyalinæ, longæ sed angustæ, apice ciliatæ, cellula basali angusta, stigmatum tenui, metacarpo radio fere duplo longiore, hoc clava parva sub angulo sat acuto egrediente. Abdomen thorace angustius sed multo longius, ventre compresso-carinato, apice valde attenuato, basi piceo-virido, lateribus et subtus pallide testaceo; segmentis 1:o vix conspicuo, 2:o læte viridi-testaceo, trientem haud occupante, apice truncato, fovea basali vix conspicua, 3:o brevi, 4—6 sensim paullo majoribus, 7:o et 8:o maximis, hoc compresso, terebra anum superante. Pedes graciles pallide testacei, coxis posticis ovato-conicis basi viridibus. Episterna mesothoracis margine antico subcurvato; præsterna sat magna, triangularia punctata.

Mas differt: antennis scapo æneo et pedicello brevioribus, funiculo articulis albido-hirtulis, crassitie æqualibus, sensim brevioribus, haud transversis, clava apice acuminato, alis radio sub angulo minus acuto egrediente, metacarpo paullo brevioribus; abdomine atro-violaceo, macula pallida pellucida, fere lineari, apice subdilatato, plica

ventrali distincta; coxis et femoribus aeneis, tibiis saltim posticis fuscis.

Temligen sällsynt i medlersta och södra Sverige.

- aa) Antennæ flagello filiformi, pilis brevibus subexsertis ornato. Abdomen valvula ventrali brevissima, segmento ultimo dorsali cristato-compresso. Alæ stigmatè radio sesqui longiore. hoc clava magna rotunda.

2. *H. Tormoides* m: Coerulescens, gracillimus, alis hyalinis. Long. 2--3 mill.

Species valvula dorsali longissima, lineari, compressa *Torymum* simulans. Caput thorace fere latius, pone oculos angustatum, vertice angusto, medio emarginato haud tereti, ocellis magnis in lineam sat curvam dispositis, oculis ovato-rotundis, prominulis, facie lata plana, epistomate haud convexo, clypeo haud discreto, apice medio truncato; mandibulis margine externo subsinuato dextra 4-dentata; genis sat longis haud latis, teretibus. Antennæ tenues in medio faciei insertæ, basi fere contiguæ, fuscae, articulo 1:o aëneo vel subtus pallido, ocellum superante, 2:o subtriangulari, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5—10 crassitie æqualibus, latitudine longioribus, sensim brevioribus, 10:o vix transverso, pilis brevibus exsertis parcius vestitis, clava haud magna, oblonga. Thorax longus, gracilis, supra fere glaber, coeruleo- vel viridi-æneus, subtilius punctatus; pronoti collari acuto, medio angusto, latera versus dilatato; mesonoti dorso dorsuli basi plus quam duplo longiore, scutello convexo, freno minus angusto; metathorace brevi sed haud declivi, punctatissimo, carina media distincta, spiraculis parvis a postscutello remotis. Alæ amplæ hyalinæ, cellula costali minus lata, stigmatè tenui quam radio sesqui longiore, hoc clava sat magna rotunda. Abdomen thorace multo longius, paullo angustius, ventre compresso, coerulescens, medio aëneum, parum pubescens; segmentis 2:o læte viridi, apice truncato, fovea basali nulla,

3:o parvo, 4—6 sensim longioribus, 7:o oblongo maximo, 8:o lineari rude pubescenti; valvula ventrali medium femorum haud attingente. Pedes graciles, testacei, coxis æneis, posticis ovato-cylindricis, femoribus plerumque medio fusco-æneis, tibiis intermediis calcari haud longo. Mesosternum sulco tenui distincto. præsterna sat magna punctulata, episterna margine anteriore subcurvato lævia, epimera squamoso-punctata.

Mas differt: capite brevior, antennis scapo brevi, funiculi articulis parcius albido-hirtis, tibiis posticis fuscis, abdomine sublineari postice latiore, plica ventrali tenui.

Sällsynt.

Subgenus *Stinoplus*.

Caput subtriangulare, transversum, pone oculos prominulos angustatum, vertice angusto, haud acuto, facie plana, clypeo apice truncato, mandibulis haud validis, utraque 3-dentata, dente basali lato truncato. Antennæ filiformes, postannello magno. Thorax collari haud discreto. Alæ stigmatæ radio sesqui longiore. Abdomen elongatum, valvula ventrali trientem vix superante.

Detta subgenus afviker från alla föregående inom denna subtribus genom pronoti collare som ej är afsatt utan fullkomligt aftrindadt. Härigenom skiljes det äfven från *Habrocytus*, hvaraf några arter annars i habitus komma det ganska nära.

1. *S. militaris* (Dalm.): Læte viridis, antennis scapo basin versus tibiis femoribusque stramineis. Long. 2—4 mill.

Caput thorace haud latius, antrorsum angustatum, oculis ovato-rotundis, prominulis, vertice medio tereti, ocellis in lineam parum curvam dispositis; facie lata plana, glabricula coerulea, subtilissime dense punctata, epistomate haud convexo, clypeo omnium subtilissime strigoso; man-

dibulis margine externo recto, genis longis, teretibus, haud buccatis. Antennæ in medio faciei insertæ, basi parum distantes, sat crassæ; articulo 1:o ocellum haud attingente, stramineo, superne æneo, 2:o breviter triangulari, 3:o vix observando, 4:o parvo, 5—10 crassitie æqualibus, vix longitudine decrescentibus, 10:o parum transverso, clava haud magna, obtuse ovata. Thorax oblongus, coccineus vel læte viridis, supra fere glaber, dense subtilissime, vix squamoso-punctatus; pronoto brevi, antrorsum declivi, fere verticali, collari haud discreto; mesonoti sulcis antice vix indicatis, dorso dorsuli basi saltim duplo longiore; scutello sat convexo, freno declivi, dorsello haud angusto, polito; metathorace brevissimo, fere lævi, carina media distincta, spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis. Alæ amplæ hyalinæ, apice sat lato ciliato, cellula costali haud augusta, basali et speculo nudis, stigmatibus minus tenui flavo quam radio sesqui longiore, hoc sub angulo minus acuto egrediente, clava haud magna, subrotunda, metacarpo haud brevi. Abdomen elongatum, thorace longius, vix latius, læte viride, vix cupreo-fasciatum, segmentis 1:o brevissimo, 2:o apice truncato, fere aureo, fovea basali haud profunda, 3:o parvo, 4—7 sensim longioribus, 7:o latitudine sua longiore, 8:o elongato-triangulari, ventre parum compresso-carinato, valvula ventrali trientem basalem haud superante. Pedes minus graciles, straminei, coxis totis et femoribus posticis interdum basi viridi-æneis. Mesosternum sulco medio tenui sed distincto, præsternis sat magnis punctatis, episternis lævibus, margine anteriore subarcuato.

Mas differt: antennis scapo brevioribus, magis compresso, funiculi articulis longioribus, sat dense griseo-pilosis pedicello brevioribus, metathorace minus brevi, abdomine oblongo fere lineari viridi, postpetiolo fovea longiore, capite thoraceque læte coeruleis.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

2. *S. aureolus* m: *Æneus*, aureo-tinctus, antennis scapo pedibusque fere totis testaceis. ♀ Long. 3—4 mill.

Præcedenti simillimus, sed æneus, capite, scutello pectorisque lateribus aureo-tinctis, antennis scapo longiore, ocellum fere attingente, funiculi articulis paullo longioribus, fronte prope ocellos et mesonoto antice punctulis parce impressis, alis minus vitreis, ventre interdum basi sordide testaceo, femoribus plerumque fuscis, rarius cum coxis anticis testaceis discedens.

Funnen på pil vid Lund och Helsingborg; möjligen lever den i galläplen på Saliciner.

Subgenus *Habrocytus*.

Caput genis sæpius buccatis, clypeo apice medio emarginato vel subinciso, mutico; vertice haud acuto; mandibulis plerumque apice forcipato externe sinuatis, sinistra 3-dentata, dente basali lato, dextra 4-dentata; oculis haud prominulis. Antennæ in medio faciei insertæ, funiculo sæpius æquali postannello magno, pedicello plerumque longiore. Metathorax spiraculis sæpius magnis, oblongis vel ovalibus, nucha plerumque distincta, carina, sæpissime plica et sulco spiraculari instructus. Collare sæpe latum, semper discretum, margine antico rarius acuto. Alæ stigmatibus haud crasso, radii clava parva vel mediocri. Abdomen ♀ semper apice productum, sæpius conicum. Mesosternum sulco medio obsoleto, præsterna plerumque parva. Caput et thorax punctis majoribus haud adspersa.

Detta subgenus innehåller flera arter, som afvika från hvarandra mer eller mindre i vingnervver, abdomens och thoracis form, så att man skulle kunna ännu vidare sönderdela det i flera subgenera. Från *Cænacis* och *Cecidostiba* skiljes det genom radii klubba, som ej är ovanligt starkt dilaterad samt genom hufvud och thorax, som hvarken hafva större glest stående puncter eller hvitaktig styf pubescens. Från *Etroxys* och närstående subgenera afviker det dels genom hufvudet som ej är märkbart afsmalnande bakom de föga utstående ögon, dels genom hjessan som aldrig är skarp i mid-

ten, dels äfven genom otydlig fåra på mesosternum och sällan skarpkantadt collare, hvilket deremot alltid, i motsats mot *Stinoplus* är tydligt afsatt.

Lefnadssättet hos de flesta är okänt, men troligen lefva de parasitiskt i galläplen.

A) Caput vertice lato, genis buccatis; mandibulis validis, apice forcipato, externe sinuatis. Antennæ flagello haud incrassato. Thorax crassus collari lato, margine haud acuto, latera versus haud dilatato, rude rugoso-punctato, dorso dorsuli basi haud sesqui longiore; metathorace brevi, fortiter declivi, rarius punctulato, nucha distincta, sæpe strictura transversa et costula indicata, spiraculis maximis oblongis postscutello contiguus. Alæ stigmatæ, radio et metacarpò longitudine subæqualibus, n. basali ♀ glabro. Abdomen ♀ compressum, postice magis minusve conico-productum. Mesosternum sulco medio obsoleto, præsternis parvis, haud punctatis. Corpus sæpe magnum, minus lucidum.

a) Metathorax haud vel vix punctulatus. Abdomen ♂ macula nulla pallida.

1. *H. albipennis*: Coeruleus, ano aureo, alis vitreis, apice haud ciliatis, genubus tibiisque stramineis, his medio fuscis, clypeo apice medio anguste emarginato. Long. 3—6 mill.

Pteromalus albipennis Walk. l. c. III. 198. 93.

Pteromalus coeruleus Dalm.

Species corpore magno, colore cyaneo alisque apice haud ciliatis insignis. Caput thoracis latitudine, subtransversum, antrorsum haud angustatum, vertice medio emarginato, ocellis in lineam parum curvam dispositis; facie plana subtiliter crebre punctata, epistomate haud convexo, clypeo dense subtilissime strigoso, apice medio sinuatim haud late inciso, mandibulis piceis; genis sat longis, buccatis, haud latis. Antennæ minus longæ, filiformes, in medio faciei insertæ, basi fere contiguæ, articulo 1:o viridi-æneo, basi vix pallido, 2:o æneo, subtriangulari 5:o

breviore, 3:0—4:0 brevissimis arcte funiculo contiguus, 5—10 crassitie æqualibus, longitudine sensim paullo decrescen-
tibus, fuscis, vel brunneis, 10:0 transverso, clava præclava
duplo longiore, haud magna, apice obtusa. Thorax cras-
sus, confertim subtiliter squamoso-punctatus fere glaber,
cyaneo-viridis; pronoti collari lato, margine antico arcuato,
rude punctato-rugoso; mesonoto sulcis medium attingen-
tibus, dorso dorsuli basi vix sesqui longiore; scutello
minus convexo, freno declivi vix fortius punctato, dorsello
angusto verticali; metathorace brevi, fortiter declivi, po-
stice in nucham constricto, carina instructo sed medio
strictura nuchæ interrupta, plica laterali profunda medio
fere angulatim flexuosa, sulco spiraculari profundo sed
brevis, postice in impressione prope nucham laterali con-
tinuato, spiraculis maximis, valde obliquis fere linearibus,
callo laterali lato sed parce fimbriato. Alæ vitreæ, apice
lato haud ciliato, parce pubescentes, costa fere nuda, cel-
lula basali, speculo magno et nervo basali nudis, stigmatibus
costa paullo brevioribus, haud crasso quam radio vix longi-
ore, pallide testaceis, hoc clava parva, metacarpo radio
vix longiore. Abdomen thorace longius, postice conico-
productum, læte cyaneo-viride, segmentis coeruleo-fasciatis;
fortiter compressum, thorace angustius, latitudine sua al-
tius; segmentis 1:0 vix conspicuo, 2:0 magno, trientem
vix occupante, apice late rotundato, lateribus parce, 3—4
uniseriatim pubescentibus, 3—6 parvis, sensim paullo lon-
gioribus, 7:0 magno quadrato, 7:0 conico viridi-aureo;
valvula ventrali abdominis medium vix, fere apicem fe-
morum attingente. Pedes validi, æneo-virides, trochanteribus,
genubus tibiis, his sæpe medio fuscis, tarsisque al-
bido-testaceis, ungue, ut in plerisque nigro fusco. Meso-
sternum lateribus et epimera magna subsquamoso-punctata,
sulco medio obsoleto, laterali antice indicato; præsterna
parva impunctata.

Mas differt: antennis funiculi articulis vix longioribus
sed pube longa grisea dense vestitis, clava longiore, me-

tathorace costula transversa stricturam nuchæ determinante sæpe nulla, hac paullo longiore, abdomine oblongo, segmentis 2:o magna fovea medium superante, 3:o sæpissime sub 2:o occulto, 4—5 medio cupreis, plica ventrali sat magna ænea, tibiis totis pallidis.

Temligen allmän öfver hela Sverige.

2. *H. beryllinus* (Dalm.): Cyaneo-viridis, antennis scapo viridi basin versus tibiisque flavo-albidis, his interdum medio fuscis, abdomine apice subconico-producto, ano viridi-aureo. Long. 3—4 mill.

Præcedenti clypei, metathoracis structura, alis et sculptura similis, corpore duplo minore, vertice et genis paullo angustiore, illo transversim magis convexo, abdomine apice minus conico-producto, antennis ♂ funiculi articulis brevioribus tantum discedens.

Ej sällsynt i medlersta Sverige, sparsamt i Skåne.

3. *H. Trypetæ* m: Æneus, minus nitens, alis costa ciliata, metapleuris punctulatis, antennis scapo ocellum attingente, basi pedibusque pro parte pallidis. Long. 3—6 mill.

Pteromalus cupreus Walker et Nees (forte).

Magnitudo et statura *H. albipennis*, fere adhuc major et abdomine apice magis conico attenuato; capite vertice et genis latioribus, illo transversim haud convexo; antennis scapo ocellum attingente, subtus vel basi pallido, clypeo apice haud inciso sed evidenter sinuato; thorace obscure viridi vel æneo, scutello cum freno fortius squamoso-punctatis; alis haud vitreis apice et costa tota ciliatis; abdomine æneo, segmentis intermediis fere totis cupreis; metathorace carina media ♀ brevi postice dentato-elevata, sed ante media costula transversa obliqua interrupta, me-

tapleuris sat concinne punctatis; antennis funiculo longiore, abdomine cupreo, basi apiceque virescenti discedens.

Ej sällsynt; utkläckt ur *Trypeta Serratula*.

4. *H. dentifer* m: Obscure viridis, minus nitens, vertice transversim convexo, ocellis fere in triangulum dispositis, metathorace carina media basi dentato-elevata. Long. 3—5 mill.

Præcedenti simillimus, capite vertice minus lato sed transversim et facie convexis, ocellis fere in triangulum dispositis; antennis scapo plerumque toto metallico ocellum haud attingente medio levissime dilatato apice attenuato; vertice et thorace antice magis perspicue nigropilosellis; metathoracis carina media brevissima sed dentato-erecta, tibiis medio fere semper fuscis; ♂ antennis funiculo brevior, scapo medio levissime dilatato discedens.

Sällsyntare än föregående; träffas oftast på tistlar.

5. *H. obscurus* (Dalm.): Cupreus, mesonoto cum scutello fortiter squamoso-punctatis, tibiis nigro-fuscis, basi apiceque pallidis, abdomine minus conico, lateribus cupreis. Long. 3—4 mill.

Statura et fere magnitudo *H. beryllini*, sed corpore obscure æneo vel cupreo, tibiis semper medio late fuscis vel nigris, antennis flagello interdum brunneo, clypeo apice medio emarginato, mesonoto præcipueque scutello fortius squamoso-punctatis, metathorace adhuc brevior et magis declivi, alis haud vitreis, clava radii sæpe nigro-fusca, abdomine lateribus cupreo distinctus; ab *H. dentifero* metathorace structura ut in *H. albipenni*, abdomine ♀ minus conico-producto, sculptura scutelli fortiore bene distinguendus.

Temligen sällsynt.

6. *H. glabriculus* m: Viridis, sat nitidus, antennis scapo fere toto tibiisque flavo-albidis, abdomine parcius pu-

bescente basi fere glabro, metathorace minus brevi, carina haud dentato-elevata. ♀ Long. 4—5 mill.

H. *Trypetæ* statura, magnitudine, genis buccatis haud plane teretibus, thoracis sculptura, alis hyalinis, metacarpo radio paullo longiore, abdomine fortius conico-producto affinis, sed magis virescens, abdomine haud cupreo-fasciato, segmentis 5—7 parcius, 2—4 vix pubescentibus; antennis scapo fere ocellum superante, testaceo, apice æneo, funiculi articulis minus crassis sed longioribus, clava conica quam præclava haud transversa subcylindrica duplo longiore; metathorace minus brevi, magis nitido, carina basali medium fere attingente haud dentato-elevata, costula transversa in medio sita bene distinctus; ab H. *albipenni* clypeo apice medio emarginato, colore haud cyaneo, alis costa et apice ciliatis, scutello cum freno fortius squamoso optime distinguendus.

Sällsynt i Luleå Lappmark.

aa) Metathorax evidentius subtiliter, sat concinne punctatus. Mas abdomine macula pallida pellucete.

7. H. *ochrocerus* (Dalm.): Viridi-æneus, antennis ferrugineis scapo et tibiis fere totis flavescentibus, metathorace brevi, stigmate radio haud longiore: ♂ antennis funiculi articulis longioribus densius longius pubescentibus, femoribus anterioribus basi, posticis ultra medium æneis. Long. 3—4 mill.

H. *obscurus* statura et abdominis forma similis, sed paullo major, magis æneus; antennis scapo ocellum haud attingente, flavo, apice æneo, flagello brunneo-ferrugineo, crasso, præclava transversa, scutello crebre minus fortiter, freno grossius squamoso-punctatis; metathorace brevi, nucha trientem haud occupante, ad plicam distinctam usque punctulato, carina vix, costula haud elevata; alis hyalinis stigmate flavo radio vix longiore, abdomine viridi medio

parum cupreo, compresso, apice parum conico-producto: ♂ macula pellucida a præcedentibus optime distinguendas.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland.

8. *H. fasciatus* m: Virescens, antennis brunneis scapo tibiisque flavis, stigmate radio paullo longiore. Long. 3—5 mill.

Species a præcedentibus alis stigmate radio paullo longiore; ab *H. ochrocero* antennis scapo ocellum attingente, flagello minus crasso, collari minus lato, freno vix fortius quam scutelli dorsulo punctato, metathorace carina distincta, nucha fere dimidium occupante, punctulata, spiraculis haud maximis, abdomine apice fortiter conico-producto, segmentis 3—7 apice fascia cupreo-purpurea ornatis; ♂ antennis scapo et flagello longiore, macula pallida abdominis maiore bene distinctus; ab *H. acutigena* genis haud compressis, ab *H. radiali* collari latera versus haud ampliatis, plica metathoracis haud æqualiter arcuata sed medio subangulata optime distinguendus.

Sällsynt; funnen på Öland.

- B) Caput genis buccatis, fortius compressis; metathorax haud brevis, nucha distincta, costula transversa nulla; clypeus apice medio late emarginatus, haud incisus. Alæ hyalinæ stigmate radio haud longiore, hoc clava parva. Præsterna parva.

9. *H. Cioni* m: Virescens, antennis brunneis scapo tibiisque flavis, metathorace substrigoso-punctato, abdomine minus conico-producto: ♂ antennis flavis, abdominis macula pellucida. Long. 3—5 mill.

Statura fere *H. Trypetæ*, genis fortius compressis ab omnibus præcedentibus mox distinctus. Caput thoracis latitudine, viride, confertissime punctatum, subglabrum, pone oculos ovatos haud angustatum, vertice lato, medio parum emarginato, ocellis magnis rufis in lineam minus

curvam dispositis; fronte plana, epistomate haud convexo, clypeo crebre strigoso, apice fere æqualiter 3-sinuato, mandibulis piceo-testaceis, dente apicali forcipato, margine externo sinuato, sinu mandibulari profunde fere semicirculari; genis buccatis sed sat fortiter compressis, haud longis, sat latis; scrobe antennali vix indicata. Antennæ medio faciei insertæ, basi fere contiguæ, brunneæ minus crassæ; articulo 1:o flavo lineari ocellum fere attingente, 2:o 5:o minore, 3—4 parvis, fortiter transversis funiculo arcte adpressis, 5—10 crassitie plane æqualibus, sensim parum brevioribus, 10:o leniter transverso, clava ovato-conica postannello paullo longiore. Thorax crassus, supra fere glaber, crebre confertim punctatus, collari rugoso-punctato, latitudine æquali sed minus lato; mesonoto sulcis antice conspicuis, scutelli freno convexo, declivi vix fortius quam dorsulo punctato, dorso dorsuli basi fere sesqui longiore; metathorace minus brevi, declivi, nucha distincta, costula nulla, carina media distincta, haud lævi sed fere strigoso-punctato, plica integra, æqualiter arcuata, spiraculis magnis, sulco spiraculari distincto, callo magno sed fimbria parca. Alæ fere vitreæ, cellula costali lata parum pilosa, basali et speculo magno cum nervo basali nudis; stigmate pallido radio haud longiore, hoc metacarpi fere longitudine. Abdomen thorace parum longius vix angustius, apice minus conico-producto, æneum segmento 2:o læte viridi, apice late rotundato, 3—6 parvis, 7:o majori, 8:o breviter conico; ventre compresso, valvula ventrali medium abdominis et femorum apicem paullo superante. Pedes sat validi, coxis et femoribus æneis, trochanteribus tibiisque pallide flavis.

Mas differt: antennis funiculi articulis cylindricis pallido-pilosulis, abdomine viridi, medio æneo, ventre plicato, medio pallide pellucente, segmento 3:o sub 2:o occulto, femoribus anterioribus flavidis.

Sällsynt; utkläckt ur *Cionus*; funnen i Småland af framlidne Prof. Boheman.

10. *H. acutigena* m: Obscure virescens, antennis scapo basi tibiis apice et basi pallidis, metathorace concinne punctato. Long. 3–5 mill.

Præcedenti genis compresso-acutis affinis, sed minor, abdomine ♀ magis conico-producto, fasciis atro-purpureis, antennis flagello tenuiore, scapo æneo, basi pallido, pro-noti collari lato, margine antico elevato sed haud acute marginato, latitudine æquali, metathorace longiore, punctura concinna, forma et sculptura plane *Pteromali puparum*, carina fere nulla, costula nulla, nucha haud brevi, punctulata, spiraculis maximis; ♂ antennis fere testaceis, flagello longiore, pilosulo, abdomine oblongo, macula media pallida, tibiis posticis medio fuscis, vel interdum ut femoribus anterioribus flavis bene distinctus.

Ej sällsynt.

11. *H. parvinucha* m: Obscure viridis, antennis scapo basi tibiis apice et basi pallidis, metathorace punctato, nucha brevi. Long. 3–4 mill.

H. acutigenæ sculptura metathoracis et colore similis, sed minor, capite genis minus latis, minusque fortiter compresso-acutis, facie superne nitidiore et paullo convexiore, ocellis in lineam magis curvam dispositis, metathorace nucha brevior, trientem haud occupante, abdomine minus conico-elongato distinctus.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg och Båstad.

- C) Alæ stigmatum radio evidenter longiore, hoc clava parva. Thorax collari minus lato, latera versus dilatato, metathorace haud brevi, parum declivi, punctatissimo, nucha distincta, costula nulla, plica continue arcuata, lateribus haud angulatim flexuosa, sulco spiraculari sat profundo. Præsterna parva. Pedes sat validi. Mas abdomine macula pallida pellucente.

12. *H. crassinervis* m: Virescens, antennis scapo tibiisque flavis, his medio vix fuscis, alis præstigmate crasso, stigmate haud tenui, abdomine minus conico. Long. 3—4 mill.

Magnitudo et statura fere *H. beryllini*. ab omnibus stigmate præcipueque præstigmate crassis distinguendus. Caput thoracis latitudine, pone oculos ovatos lenissime angustatum, vertice minus lato, medio emarginato, ocellis in lineam minus curvam dispositis; fronte plana creberrime punctata, clypeo medio minus late sinuato; mandibulis apice forcipato, externe sinuatis, genis haud compresso-acutis, sat buccatis, minus latis. Antennæ brunneæ, filiformes, sat crassæ; articulo 1:o flavo ocellum attingente, 2:o subtriangulari 5:o brevior, 3—4 minimis, 5—10 crassitie æqualibus, sensim longitudine paullo decrescen-
tibus, clava haud lata, conico-ovata, postannello subcylindrico paullo longiore. Thorax sat crassus, virescens, minus nitidus, fere glaber, subtiliter crebre punctatus; pronoti collari medio paullo angustiore, mesonoti sulcis antice indicatis, dorso dorsuli basi sesqui longiore, scutello sat convexo, freno declivi vix fortius quam scutello punctato, dorsello aureo, angusto; metathorare haud brevi, concinne punctato, nucha punctulata, trientem apicalem occupante, carina obsoleta, costula transversa nulla, plica subarcuata distincta, sulco spiraculari distincto, spiraculis sat magnis ovalibus, calli fimbria minus densa. Alæ hyalinae, costa et apice ciliatae, cellula basali et speculo sat magno nudis, nervo basali parce pilosulo, cellula costali sat lata. Abdomen thorace vix longius haud angustius, apice minus conico-productum, ventre carinato sed parum compresso, valvula ventrali medium attingente, segmentis dorsalibus 2:o late viridi, 3—7 apice cupreo fasciatis. Pedes aenei, trochanteribus pallidis, femoribus apice tibiisque pallide flavis, his posticis medio vix obscurioribus.

Mas differt: antennis tibiisque flavis, femoribus anterioribus concoloribus, stigmate et præstigmate adhuc crassioribus.

Sällsynt; funnen vid Båstad och Helsingborg.

13. *H. radialis* m: Virescens, antennis scapo tibiisque flavis, alis hyalinis stigmate tenui radio fere sesqui longiore. ♂♀ Long. 3—4 mill.

H. crassinervi alis stigmate radio fere sesqui longiore colore et statura affinis, sed præstigmate et stigmate tenui, antennis ♂ flagello longiore, abdomine ♀ magis conico-elongato discedens; ab *H. fasciato* metathorace longiore, plica lateribus concinne arcuata nec angulatim flexuosa, prouti collari latera versus dilatato, capite pone oculos leniter angustato, valvula ventrali apicem femorum attingente distinguendus.

Ej sällsynt öfver hela Sverige.

14. *H. chlorogaster* m: Lætius viridis, abdomine fere aureo, parum conico-elongato: ♂ antennis aurantiacis, femoribus totis pallidis. Long. 3—4 mill.

Præcedenti similis et affinis, femoribus flavis, antennis scapo ocellum fere superante, abdomine apice parum elongato: ♂ antennis flagello aurantiaco bene distinctus.

Sällsynt; funnen vid Lund.

- D) Caput vertice minus lato, clypeo apice emarginato. Thorax longus, præsternis sat magnis punctatis, dorso dorsuli basi saltim duplo longiore, dorsello haud angusto polito. Alæ stigmate radio sesqui longiore. Collare medio angusto ibique acute marginato, latera versus dilatato. Abdomen conico-elongatum valvula ventrali femorum apicem haud attingente. Tibiæ totæ flavæ.

15. *H. dolichurus* m: Læte viridis, antennis tibiis femoribusque flavis, his interdum medio fuscis, metatho-

race declivi punctatissimo, nucha brevissima: ♂ scapo apice compresso-dilatato. Long. 3—5 mill.

Species a præcedentibus ♀ valvula ventrali brevi, ♂ antennis scapo apice dilatato distincta, a sequentibus thoracis præsternis minus magnis optime distinguenda. Caput thorace fere latius, pone oculos ovato-rotundos parum angustatum, vertice minus lato, antrorsum vix angustatum, ocellis in lineam sat curvam dispositis; facie planiuscula, scrobe antennali obsoleta, epistomate haud convexo, clypeo subtilissime strigoso, apice medio sat late emarginato, mandibulis margine exteriori sinuato, apice sat forcipato; genis buccatis sed haud latis, fere teretibus. Antennæ tenuiores, medio faciei insertæ, basi parum distantes, brunneæ, articulo 1:o lineari, testaceo vel apice fusco-æneo, ocellum fere attingente, 2:o oblongo-subtriangulari, 3—4 brevissimis fortiter transversis funiculo arcte adpressis, 5—10 crassitie æqualibus, bene discretis, sensim paullo brevioribus, 10:o haud transverso, clava haud magna, præclava duplo longiore. Thorax longus, supra leniter convexus, fere glaber, sat læte viridis; pronoti collari medio sat acuto, latera versus dilatato, mesonoti sulcis antice inchoatis, dorso dorsuli basi duplo longiore, ante suturam sinuatam scutelli sat fortiter squamoso-punctato; scutello crebre et subtiliter, freno vix fortius punctato, dorsello medio polito haud angusto; metathorace haud brevi, postice angustato, punctatissimo, nucha brevi sed distincta, trientem haud occupante, carina medio obsoletiore, costula transversa nulla, plica integra, subarcuata, sulco spiraculari distincto, spiraculis minus ovalibus. Alæ hyalinæ, præstigmatæ haud brevi, stigmate metacarpo paullo, quam radio sesqui longiore, hoc clava parva cellula costali et speculo sat magno nudis, nervo basali parce pilosello. Abdomen thorace longius, viride fere cyaneum, compresso-carinatum, valvula ventrali medium haud attingente, segmentis 2:o fovea basali haud magna apice late truncato,

3--6 sensim paullo majoribus, 7:o quadrato, 8:o conico-elongato. Pedes minus validi, testacei, coxis æneis, femoribus, præsertim posterioribus medio interdum fusco-æneis. Mesosternum haud breve, episternis sat fortiter squamoso-punctatis, præsternis mediocribus.

Mas differt: antennis pilosulis, scapo apice evidenter compresso-dilatato, femoribus totis flavis, abdomine oblongo, macula media sat magna pellucida.

Funnen vid Lund på Pil.

16. *H. simulans* m: Læte æneo-virens, antennis scapo tibiis femoribusque flavis his ♀ interdum medio fuscis, abdomine elongato, ventre minus compresso: ♂ abdomine macula media pallida, scapo simplice. Long. 2--3 mill.

Species *Stenomalo muscarum* simillima, sed capite antrosum vix angustato, clypeo apice medio emarginato mutico, scutello magis convexo, episternis mesothoracis fortius squamoso-punctatis, coxis omnibus ♂ æneis distincta; a præcedente stigmate longiore, collari medio angustiore ibique acute marginato, nucha metathoracis tantum carina media apice bifida indicata, abdomine minus compresso-carinato, præsternis evidenter majoribus et punctatis mox discedens.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

17. *H. læviusculus* m: Læte æneo-virens, antennis scapo pedibusque flavis, coxis æneis, metathorace lævi. Long. ♂♀ 3 mill.

H. simulanti simillimus, metathorace lævi, carina, plica et sulco spiraculari nullis in utroque sexu tantum distinctus.

Sällsynt i Skåne och Halland.

18. *H. Caprea*: Læte viridis, antennis flavis, scapo femoribus tibiisque læte testaceis, metathorace brevi, haud declivi, abdomine valde elongato; ♂ antennis pilosulis, scapo simplici. Long. 3–4 mill.

Cynips Caprea Lin. Fauna Sv. Ed. II. 1533.

Pteromalus excrescentium Ratz. (forte).

Statura omuino *H. dolichuri* sed lætius viridis, abdomine apice magis compresso-elongato, valvula ventrali trientem basalem vix attingente, postpetiolo fovea basali nulla, metathorace brevior, haud declivi, nucha brevi sed constricta, carina media sat alte elevata, metacarpo radio fere duplo longiore, antennis flagello testaceo, tenuiore, præclava subcylindrica, scapo ♂ simplice ocellum fere superante bene distinctus.

Sällsynt; utkläckt af galläpplen på *Salix Caprea* af Prof. Boheman och Doctor G. F. Möller.

19. *H. longicauda* m: Læte viridis, antennis flavis, scapo femoribus tibiisque læte testaceis, metathorace polito, plica et sulco spiraculari nullis, abdomine valde elongato. ♀ Long. 4 mill.

H. Caprea statura, colore, magnitudine abdomineque simillimus, sed metathorace adhuc brevior, nucha nulla sed apice submarginato, sulco spiraculari et plica nullis tantum discedens.

Sällsynt i medlersta Sverige.

- E) Caput et thorax punctura confertissima haud squamosa. Dorsellum et mesopleura tota punctatissima, metathorace brevi, punctulato, carina media elevata. Alæ cellula costali postice pubescente. stigmatum radio sesqui longiore, hoc clava parva. Abdomen elongatum, compressum.

20. *H. punctipleura* m: Seladonius, antennis brunneis, scapo femoribus tibiisque flavis. ♀ Long. 4 mill.

Species transitum ad *Dinotum* formans, sed alis radii clava et præstigmate haud magnis, coxis posticis basi intus haud pubescentibus. Caput thoracis latitudine, pone oculos haud angustatum, vertice lato, ocellis fere in triangulum dispositis, facie plana, scrobe antennali obsoleta. clypeo apice medio emarginato, haud discreto; genis buccatis sat latis, teretibus. Antennæ haud crassæ, in medio faciei insertæ, basi parum distantes, brunneæ; articulo 1:o lineari ocellum attingente, 2:o oblongo-triangulari supra æneo, 3:o distincto, 4:o minus parvo, 5—10 crassitie æqualibus, sensim brevioribus, clava haud magna, quam præclava vix transversa duplo longiore. Thorax pulchre viridis, sed minus splendens, supra convexus, fere glaber, punctura acuta densa subtiliore haud squamosa; pronoti collari sat lato, discreto margine antico acuto parum arcuato, latera versus vix dilatato; mesonoti sulcis medium fere attingentibus, dorso dorsuli basi fere duplo longiore, scutello apice subdeclivi, dorsello haud angusto, punctatissimo; metathorace brevi, punctatissimo, carina media distincta, nucha et plica nullis. Alæ hyalinæ, præstigmate haud crasso, stigmate radio sesqui longiore, Abdomen thorace longius, angustius, compressum, ventre fortiter carinato, valvula ventrali medium superante, postice fortiter elongatum, cupreum. Mesosternum sulco medio obsoleto, præsternis sat magnis punctatis, episternis totis punctulatis sed sutura ab epimeris bene discretis. Pedes haud validi testacei, coxis æneis.

Sällsynt; funnen vid Stockholm.

- F) Caput genis buccatis, clypeo fere æqualiter 3-sinuato. Thorax collari discreto, metathorace declivi, nucha et plica distinctis. Alæ præstigmate sat longo, radii clava haud parva. Præsterna parva. Abdomen compressum, postice productum.

21. H. *Bedeguaris* m: Cupreus, antennis scapo, genubus, tibiis apice pallidis, abdomine fasciis atro purpureis. Long. 3—5 mill.

Statura plane H. *Trypetæ*, alis præstigmate et radii clava majoribus tantum discedens. Caput thorace fere latius, subtransverso-rotundum, antrorsum haud angustatum, pone oculos subovatos haud angustatum, vertice sat lato medio emarginato, ocellis in lineam sat curvam dispositis, facie plana, lata, superne squamoso-punctata, clypeo vix discreto, striguloso, apice fere æqualiter 3-sinuato, mandibulis validis, apice forcipato, margine externo sinuato; genis buccatis sat latis, haud compresso-acutis. Antennæ medio faciei insertæ, basi fere contiguæ, brunneæ; articulo 1:o lineari testaceo, ocellum attingente, 2:o subtriangulari, 3—4 minimis funiculo arcte adpressis, 5—10 crassitie æqualibus, sensim brevioribus, 5:o cylindrico, 10:o fere transverso, clava haud magna nec lata quam præclava duplo longiore. Thorax crassus, supra cupreus vel æneus, fere glaber, confertim subsquamoso-punctatus; pronoti collari sat discreto, minus lato, margine haud acuto, latera versus vix dilatato; mesonoti sulcis antice inchoatis, dorso dorsuli basi sesqui longiore, scutello sat convexo, freno declivi vix fortius punctato, dorsello angusto, transversim carinato; metathorace sat brevi declivi, punctulato, nucha distincta, medium fere attingente, carina media obsoleta, plica profunda, medio fortius angulata, spiraculis magnis oblongis postscutello arcte contiguis, sulco spiraculari profundo, calli fimbria parca. Alæ fumato-hyalinæ, præstigmate sat longo, stigmate radio vix longiore, hoc clava majuscula subrotunda, cellula basali et speculo magno nudis. Abdomen thorace paullo angustius sed longius, postice conico-productum, ventre compresso-carinato, cupreo-anneum, postpetiolo læte viridi, valvula ventrali medium vix attingente. Pedes sat validi, ænei, tibiis basi apiceque albidis medio fuscis. Mesosternum sulco medio obsoleto, præsternis parvis, episternis lævibus bene discretis.

Mas differt: corpore lætius æneo, antennis flagello ♀ conformi sed obscure flavo et paullo longius pubescenti,

tibiis totis et femoribus anterioribus apice late testaceis, abdomine ovali, viridi, disco medio purpureo-cupreo, plica ventrali distincta medio pallida.

Sällsynt; utkläckt ur Bedeguar.

- G) Caput genis buccatis. Thorax collari sat lato, bene discreto, latera versus dilatato; scutello depresso; metathorace sat longo, haud declivi, plica angulata et sulco spiraculari distinctis, punctulato. Alæ stigmatè radio parum longiore, clava parva. Abdomen depressum, postice haud productum, ventre parum carinato.

22. *H. aureolus* m: Læte cupreus, antennis pedibusque flavis, abdomine aureo, purpureo-fasciato ♀. Long. 3—4 mill.

Caput thorace fere latius, pone oculos haud angustatum, vertice sat lato, ocellis in lineam sat curvam dispositis; facie plana, confertim punctata, clypeo vix discreto, apice 3-sinuato, mandibulis sat validis apice forcipato; genis buccatis sat latis. Antennæ haud tenues, brunneo-testaceæ, articulo 1:o læte flavo, ocellum attingente, lineari, 2:o subtriangulari 5:o brevior, 3—4 brevissimis funiculo arcte applicatis, 5—10 sensim paullo brevioribus, crassitie æqualibus, 5:o subcylindrico, 10:o leviter transverso, clava haud magna, quam præclava duplo longiore haud angustiore. Thorax sat robustus, supra glabriculus, æneus, vel læte cupreus, confertissime subsquamoso-punctatus; pronoti collari medio haud angusto bene discreto sed margine haud acute elevato, latera versus subdilatato; mesonoti sulcis ad medium usque sat distinctis, dorso dorsuli basi sesqui longiore; scutello subdepresso, freno haud declivi, dorsello angusto aureo; metathorace haud brevi fere horizontali, punctulato, nucha distincta sed medium haud occupante, costula transversa nulla, carina media minus elevata, plica profunda in medio angulatim flexuosa, sulco

spiraculari profundo, crenulato, spiraculis sat magnis subovalibus postscutello contiguus. Alæ hyalinæ, nervo basali, speculo magno et cellula basali nudis, præstigmate tenui haud crasso, stigmate pallido tenui quam radio parum longiore, hoc clava parvula. Abdomen subovatum, thorace vix latius, parum longius, apice haud conico-producto, ventre parum carinato, valvula ventrali medium attingente, segmentis aureis, 2:0 haud magno, fovea basali distincta, 3--5 fere æqualibus, 7--8 paullo longioribus. Mesosternum sulco medio tenuissimo, laterali antice indicato, præsternis haud parvis sublævibus, episternis bene discretis, lævibus. Pedes sat crassi, læte flavi, coxis æneis, tibiis apice tarsisque stramineis.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

H) Caput genis buccatis. Antennæ infra medium faciei insertæ, annellis sat magnis. Thorax collari discreto, metathorace polito, nucha sat magna.

23. H. *Saxeseni*: Viridi-aureus, antennis pedibusque flavis, antennis ♂ scapo dilatato. Long. 4--5 mill.

Pteromalus Saxeseni Ratz. l. c. I. 203. 40.

Species antennarum insertione et structura a præcedentibus mox discedens. Caput thorace paullo latius, antrosum haud angustatum, vertice sat lato, pone oculos haud angustatum, ocellis sat magnis in lineam curvam dispositis; facie plana, confertissime punctata, aurea, clypeo superne linea arcuata subdiscreto, apice medio sinuato, mandibulis validis, pallidis, dente apicali forcipato, externe sinuatis, sinistra 3-dentata, dente basali sat lato truncato, dextra 4-dentata, dente basali obtuso; genis buccatis, latis, haud compresso-acutis. Antennæ fere in linea oculorum inferiore insertæ, basi parum distantes, brunneæ, longæ, articulo 1:0 pallide testaceo lineari, ocel-

lum fere attingente, 2:0 solito longiore, 3:0 parvo sed distincto, 4:0 vix transverso, 5—10 crassitie æqualibus, sensim brevioribus, 10:0 cylindrico, clava conico-acuminata, postannello parum longiore. Thorax sat robustus, supra læte æneus, subglaber, lateribus aureo-purpureis; pronoti collari sat discreto, latera versus subdilatato, margine haud acuto; mesonoto creberrime subsquamoso-punctato, sulcis antice distinctis, dorso dorsuli basi sesqui longiore, scutello minus convexo, freno paullo declivi, dorsello angusto; metathorace haud brevi fere horizontali, polito, nucha distincta trientem occupante, carina media elevata, plica magna lateribus parum angulatim flexuosa, sulco spiraculari distincto, spiraculis magnis, oblongis. Alæ hyalinæ, nervo basali speculo magno et cellula basali nudis, cellula costali lata, præstigmatè tenui haud longo, stigmatè pallido tenui radio fere sesqui longiore, hoc clava parva angusta. Abdomen oblongo-ovatum, thorace fere latius et paullo longius, apice haud conico-producto, ventre parum convexo, valvula ventrali medium haud superante, segmentis aureis, purpureo-fasciatis, 2:0 haud longo, 3—6 subæqualibus, 7—8 paullo longioribus. Pedes sat validi, læte flavi, coxis æneis, anterioribus apice et intus pallidis. Mesosterni sulcus obsoletus, præsterna haud magna, læviuscula.

Mas differt: antennis fere in medio faciei insertis, articulo 1:0 subcompresso-dilatato, apice angustiore, pedicello et annellis brevioribus, funiculi articulis pilosulis, capite thoraceque læte viridibus, abdomine angusto, viridi, macula magna pellucida.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

- I) Caput pone oculos vix angustatum, clypeo apice medio subinciso. Thorax collari discreto, metathorace haud brevi, punctulato, nucha distincta. Alæ stigmatè radio clava paullo longiore. Mas coxis anterioribus pallidis.

24. H. *Hieracii*: Viridi-coeruleus, postpetiolo cyaneo, antennis brunneis, genubus tibiisque testaceis: ♂ antennis luteis, abdomine macula pallida. Long. 3 mill.

Pteromalus aurantiacus Ratz. l. c. III. 242. 82. (forte).

Species ab affinibus clypeo apice medio inciso, postpetiolo cyaneo, metathorace punctulato, nucha distincta, optime distinguenda. Caput thorace fere latius, antrorsum haud angustatum, subtransversum, vertice sat lato, ocellis fere in triangulum dispositis, facie plana clypeo haud discreto, apice medio inciso, mandibulis apice minus forcipato, margine externe fere recto, dextra 4-, sinistra 3-dentata, dente basali lato truncato; genis buccatis sat latis haud longis. Antennæ in medio faciei insertæ, brunneæ, articulo 1:o testaceo ocellum haud attingente, 2:o breviter triangulari, 3—4 minimis, 5—10 sensim paullo brevioribus, crassitie fere æqualibus, 10:o transverso, 5:o latitudine vix longiore. Thorax sat robustus, supra convexus, fere glaber, viridi-coeruleus, confertissime subtiliter subsquamoso-punctatus; pronoti collari discreto, haud angusto, latera versus paullo dilatato; mesonoti sulcis antice conspicuis, dorso dorsuli basi fere duplo longiore, scutello sat convexo, freno declivi; metathorace haud brevi, parum declivi, confertim punctulato, nucha medium fere attingente, plica arcuata distincta, carina media parum elevata, sulco spiraculari parum profundo, spiraculis haud magnis subovalibus. Alæ hyalinæ, cellula costali lata, basali, speculo magno et nervo basali nudis; præstigmate tenui brevi, stigmate pallido tenui quam radio paullo longiore, hoc clava mediocri. Abdomen thorace fere longius, apice subproducto, ventre minus convexo carinato, valvula ventrali medium vix attingente, coeruleo-viridi, postpetiolo cyaneo, fovea basali sat magna. Pedes haud graciles coxis et femoribus subcoeruleis, trochanteribus, tibiis tarsisque albo-testaceis. Mesosterni sulcus medius

obsoletus, præsterna parva impunctata, episterna discreta lævia.

Mas differt: coxis anterioribus fere totis cum femoribus flavis, abdomine oblongo macula magna pellucente.

Sällsynt; utkläckt ur *Gynips Hieracii* et *Tragopoginis*.

Anm. Denna art står mycket nära *Pteromalus Papaveris* Foerster.

Subgenus *Spintherus*.

Caput subtriangulare, antrorsum angustatum, genis longis teretibus, vertice angusto, clypeo apice truncato; mandibulis haud validis, utraque 3-dentata. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, postannello pedicello vix longiore. Thorax collari medio angusto vix discreto, metathorace impunctato, brevi, carina distincta. Alæ stigmatate tenui radio vix longiore. Abdomen triquetrum, valvula ventrali medium longe superante.

I habitus, till hufvud och collare lik *Amblymerus* men skild genom starkare postannellus och trådformig antennsträng. Från *Habrocytus* afvikande genom hufvudet, som är afsmalnande framåt, föga bredare än långt, smala långa kinder, ej märkbart afsatt, smalt collare, kort ej puncterad metathorax.

1. *S. obscurus* m: Obscure æneus, alis hyalinis, pedibus parum pallido-variegatis. Long. 2—3 mill.

Caput thorace haud latius, latitudine sua vix longius, vertice angusto, ocellis in lineam parum curvam dispositis, facie plana epistomate lenissime convexo, clypeo sinu laterali obsoleto, apice medio truncato, mandibulis palpisque obscuris, genis angustis, oculis ovatis. Antennæ nigræ, basi fere contiguæ, articulo 1:o æneo, basi pallido, 2:o, subtriangulæ, 3—4 minimis, 5—10 crassitie æqualibus,

sensim vix brevioribus, clava parva, postannello subquadrato duplo longiore. Thorax brevis, supra glaber, convexiusculus, obscure æneus, dense et subtilissime punctatus; pronoti collari medio valde angusto, latera versus dilatato; mesonoti sulcis antice vix conspicuis, dorso dorsuli basi vix sesqui longiore; scutello adhuc subtilius punctato, dorsello angusto; metathorace brevi, carina distincta, sed plica nulla, spiraculis parvis. Alæ subhyalinæ, speculo sat magno cellulaque basali nudis, nervo basali pilosulo, stigmate tenui quam radio vix longiore, hoc clava parva. Abdomen thorace paullo angustius, triquetrum, apice haud conico-producto, valvula ventrali trientem apicalem attingente. Pedes haud graciles, ænei, genubus, interdum tibiis totis tarsisque basin versus pallidis. Mesosternum breve, lateribus subcoeruleum, præsternis parvis, episternis punctatis discretis.

Mas differt: antennis scapo toto æneo, flagello articulis bene discretis, sat dense breviter griseo-hirtis, abdomine immaculato, corpore magis coeruleo, genubus tibiisque stramineis.

Ej sällsynt på sandmarker i medlersta och södra Sverige.

Genus *Isocyrus* Walk.

Caput antrorsum rarius angustatum, genis plerumque buccatis, mandibulis acute 4-dentatis, clypeo apice medio dente nullo armato. Antennæ plerumque in medio faciei planiusculæ insertæ, flagello ♀ subincrassato, postannello ♀ haud abrupte minore, clava apice haud subulata. Thorax collari discreto et margine antico acuto, metathorace haud brevi, plerumque carina et plica instructo. Alæ radio clava haud magna, stigmate haud crasso. Abdomen apice haud conico producto, ventre rarius compresso, segmento 2:o sæpissime, callo metathoracis semper et coxæ posticæ basi posteriore dense pubescentibus.

Detta slägte skiljes genom den täta behåringen på sidorna af metathorax, på basen af bskbenens höfter och oftast äfven på postpetiolus. Thorax har alltid collare skarpt afsatt och hvasskantadt; antennklubban är ej sylformigt tillspetsad, hvarigenom det skiljes från *Merisus*; ifrån *Etroxys* afviker det genom bakbenens och metathorax' täta pubescens, från *Eutelus* dessutom genom postannellus, som är lika stor eller föga mindre än följande led i antennsträngen.

Conspectus subgenerum.

- A) Oculi hirtuli. Metathorax longus, nucha magna punctata. Abdomen segmento 2:o basi glabro, 8:o haud parvo.

Isocyrtus.

- B) Oculi glabri. Abdomen segmento 2:o fimbria laterali densa, haud magno, 3:o parvo.

- a) Caput vertice haud lato, oculis subovatis. *Trichomalus*.

- aa) Caput breve, crassum, vertice lato, oculis rotundis prominulis. Antennæ ♂ funiculi articulis alternis albis.

Polycelis.

Subgenus *Isocyrtus*.

Caput magnum, vertice lato, clypeo apice medio truncato; genis buccatis, mandibulis validis, oculis hirtulis. Mesonoti sulci ad medium usque bene discreti: metathorace nucha magna punctata. Alæ immaculatæ. Abdomen segmento 2:o maximo, et 3:o sat magno lateribus subglabris. Pedes minus validi. Mas abdomine subrotundo, plica ventrali nulla.

Detta subgenus afviker från de båda öfriga genom abdomen, hvars 2:a segment nästan saknar pubescens och liksom 3:e äro starkt utvecklade och hos ♂ rund utan ventral-plica. Till habitus står det nära *Pteromalus* men skiljes genom bakbenens höfter, hvilka på yttre sidan vid basen äro pubescenta; bildar äfven en öfvergång till *Sphegigastrides*, dit Walker hänförde det. De båda arterna äro för öfrigt så betydligt afvikande, att de skulle kunna anses som typer för 2 subgenera.

A) Caput linea occipitali pone ocellos distincta. Mas oculis maximis granulatis, genis subcompressis.

1. *I. marginatus* m: Æneus, femoribus, tibiis antennarumque scapo pallidis. Long. 3—4 mill.

Caput magnum, pone oculos haud angustatum, vertice lato, emarginato, ocellis fere in triangulum dispositis, facie plana, scrobe antennali haud profunda, clypeo transverso, haud discreto, substrigoso, mandibulis validis, tuberculo basali magno, genis buccatis compressis. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, basi parum distantes; articulo 1:o flavo, tenui ocellum haud attingente, 2:o 5:o sesqui longiore, 3:o parvo sed distincta, 4:o hoc duplo majore, 5—10 sensim vix latioribus, vix brevioribus, bene discretis, clava parva quam præclava transversa vix duplo longiore. Thorax sat crassus, supra æneus, creberrime sat fortiter punctatus, parce griseo-pilosulus; pronoti collari haud lato sed acute marginato, latera versus paullo dilatato; mesonoti sulcis haud latis sed acute impressis, fere ultra medium productis; scutello parum convexo; metathorace scutello fere longiore, punctatissimo, nucha subglobosa fere ad medium extensa, carina media parva sed plica, sulco spiraculari minus profundo fere contigua, subarcuata ad nucham usque extensa, spiraculis haud parvis subovalibus, calli fimbria longa grisea. Alæ subhyalinæ, cellula basali et speculo magno nudis, stigmate tenui quam radio paullo longiore, hoc clava parva. Abdomen viridi-æneum haud fasciatum, supra subdepressum, ovatum, thorace fere longius, haud angustius, ventre parum convexo, basi inter coxas compresso-retracto; segmento 1:o haud transverso sed in nucha occulto, 2:o magna, apice late rotundato, lateribus pilis 2—3 instructo, 3:o medium superante sat magno et 4:a serie transversa parce pubescenti, 5—6 brevissimis, 7—8 paullo majoribus. Pedes rufi, coxis parvis æneis. Mesosternum postice pubescens,

antice sulco distincto, præsternis parvis, mesopleuris et epimeris punctatis.

Mas differt: capite thorace multo latiore, oculis maximis convexis granulatis, facie inferne pubescenti, margine ciliato; antennis flagello testaceo, tenui, clava apice fusca longiore, abdomine rotundo.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

[B) Caput oculis subrotundis, vertice medio linea occipitali haud distincta.

2. I. *dentifer* m: Æneus, femoribus tibiisque rufis: ♂ viridis, antennis flavis clava atra. Long. 3—4 mill.

Præcedenti statura similis, vertice medio immarginato, callo metathoracis densius fimbriato et ante apicem dente armato mox discedens. Caput thorace vix latius, pone oculos subprominulos subangustatum, vertice haud lato ocellis parvis in lineam vix curvam dispositis; genis longis haud compressis. Antennæ paullo infra medium faciei leviter convexæ insertæ, nigræ, articulo 1:o æneo, basi pallido ocellum fere attingente, 2:o 5:o longiore, 3:o parvo sed distincto, 4:o hoc majore, flagello sensim leviter incrassato, 5—10 sensim brevioribus, 10:o evidenter 5:o vix transverso. Thorax crassus, æneus concinne punctatus; pronoti collari margine antico acuto, mesonoti sulcis distinctis, dimidiatis, scutello parum convexo, dorso dorsuli basi sesqui longiore; metathorace punctulato, nucha distincta, callo dense longe fimbriato. Alæ subhyalinæ stigmatate tenui radio paullo longiore, hoc fere curvato clava parva quam metacarpo vix brevior. Abdomen æneoviride, ovatum, supra planum, subtus parum convexum, segmento 1:o nigro æneo, sulco medio exarato, 2:o maximo, dimidium occupante et 3:o mediocri glabris, 4—6 brevissimis, 7:o paullo majore, 8:o triangulari parvo. Pedes sat graciles, rufescentes, coxis parvis æneis, femoribus medio

fuscis. Mesosterni epimera et metapleura punctata, præsterna parva.

Mas differt: capite latiore; antennis longioribus flavis, scapo longissimo ocellum superante, 5—10 æqualibus subcylindricis vix nisi tenuissime pilosulis, clava nigra apice obtusa majuscula; thorace capiteque viridibus, hoc genis inferne productis, mandibulis tuberculo basali maximo nigro, facie inferne albido-ciliata, femoribus totis pallidis; abdomine rotundo, macula media cuprea; alis stigmate paullo crassiore.

Sällsynt; funnen i Skåne vid Wallerup af Doctor G. F. Möller vid Ringsjön af författaren.

Subgenus *Trichomalus*.

Caput oculis subovatis glabris. Antennæ fere in medio faciei insertæ. Abdomen segmento 2 basin versus lateribus cum callo metathoracis et coxæ posticæ basi extus dense pubescentibus, postpetiolo haud magno.

Från föregående slägte afviker *Trichomalus* genom abdomen hvars 2:a segment har en pubescerad fläck vid baseu på hvarje sida och 3:e ej stort i jemförelse med de följande segmenten; genom ögonen, som ej äro finhåriga samt genom antennerna, hvilka oftast äro fästade midt på pannan.

a) Metathorax cum nucha magna punctatus. Abdomen ♀ fasciis nullis. Antennæ ♂ scapus simplex.

1. *T. punctinucha* m: Æneus petiolo sulco medio, antennis crassis basi pedibusque fere totis rufescentibus: ♂ antennis flagello dense haud breviter pallido-pubescente. Long. 3—4 mill.

Caput thorace fere latius, pone oculos vix angustatum, vertice angusto, ocellis in lineam vix curvam dispositis; fronte plana, clypeo vix discreto, apice late rotun-

dato-truncato, mandibulis externe sinuatis, apice forcipato, utraque acute 4-dentata, genis vix buccatis, haud latis, pone sulcum tenuem aureis lævibus. Antennæ in medio faciei insertæ, basi parum distantes, articulo 1:o lineari, flavo, apice interdum æneo, ocellum haud attingente, 2:o æneo 5:o longiore, 3:o parvo, 4:o hoc paullo majore, 5—10 bene discretis, sensim leniter incrassatis, 5:o latitudine sua vix longiore, 10:o transverso, clava distincte articulata, suboblique acuminata, haud magna postannello fere duplo longiore. Thorax sat crassus, supra cupreus, parum convexus, confertissime subtilius punctatus, parce griseo-pilosulus; pronoti collari limbo postico polito, bene discreto margine antico acuto, minus angusto, latera versus dilatato; mesonoei sulcis antice distinctis, dorso dorsuli basi fere duplo longiore, scutello subdepresso, freno haud declivi, dorsello polito angusto; metathorace vix declivi, scutello haud brevior, punctatissimo, nucha subglobosa fere dimidium attingente, plica leviter arcuata et carina media distinctis, spiraculis haud magnis, subovalibus, calli fimbria fere usque ad plicam densa. Alæ subhyalinæ, apice late rotundato ciliato, cellula costali sat lata basali et speculo magno nudis, nervo basali parce pilosulo, præstigmati brevi, stigmati haud crasso radio paullo longiore, hoc clava parva quam metacarpo parum brevior. Abdomen thorace fere latius, haud longius subovatum, apice haud conico-producto, obscure olivaceo-æneum, fasciis nullis; segmentis 1:o in nucha fere occulto sed haud transverso, supra sulco medio impresso, 2:o tridentem haud occupante, fovea basali distincta, 3—6 sensim brevioribus, 7:o paullo majore, 8:o parvo; ventre convexo sed haud carinato, valvula ventrali medium superante. Pedes haud validi, rufescentes, coxis ovatis viridi-æneis, femoribus medio sæpius fuscis. Mesosternum sulco medio tenui sed distincto, præsternis parvis lævibus, episternis bene discretis lævibus, epimeris sat fortiter, metapleuris subtilius punctatis.

Mas differt: corpore læte viridi, abdomine oblongo, macula nulla pallida, antennis scapo, pedicello et annellis brevioribus, flagello fusco-testaceo, pube dense vestito, articulis 5—10 crassitie æqualibus sed sensim brevioribus, clava conico-elongata, capite brevior, ocellis in triangulum dispositis majoribus.

Temligen sällsynt.

2. *T. frontalis* m: Æneus, antennis scapo pedibusque parum pallido-variegatis, fronte convexa: ♂ antennis flagello pilosulo. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, sed duplo minor, scrobe antennali majore, vertice transversim fortius convexo, ocellis majoribus fere in triangulum dispositis, facie leniter convexa, epistomate subelevato, clypeo magis discreto et nitido; antennis flagello fortius incrassato, postannello subtransverso, scapo æneo vel basin versus pallido; metathoracis nucha paullo brevior; femoribus æneis, tibiis ♀ sæpe concoloribus: ♂ antennis flagelli articulis brevioribus sed parcius longe piloculis, femoribus fusco-æneis, genubus anterioribus stramineis, abdomine sæpe medio atrocoeruleo distinctus.

Ej sällsynt.

3. *T. pallicornis* m: Viridis, capite lato, antennis fusco-testaceis, scapo pedibusque flavis, coxis æneis: ♂ antennis scapo apice abrupte dilatato, tibiis intermediis intus fuscis. Long. 3 mill.

Species a præcedentibus capite thorace latiore, vertice et genis latioribus, his inferne subcompressis, clypeo apice medio subsinuato, peristomio minore, mandibulis tuberculo basali majore; antennis flagello fusco-testaceo, articulis subtransversis, sensim vix latioribus, clava longiore conica; scutello magis convexo, nucha dimidium fere attingente;

abdomine ovato-acuminato, ventre minus convexo, femoribus flavis: ♂ antennis scapo stramineo, triente apicali abrupte compresso-dilatato, flagello parum pubescenti, abdomine macula prope basin pallida pellucente, femoribus tibiisque stramineis, tibiis intermediis interne apicem versus fuscis bene distincta.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

- aa) Metathorax haud punctatus, nucha sæpe parva. Abdomen ♀ fasciis sæpe atro-coeruleis ornatum. Antennæ interdum infra medium faciei insertæ. Mas abdomine interdum rotundo, scapo rarius fortiter compresso-dilatato.

4. *T. punctiger* m: Cupreus, stigmatè radio sesqui longiore, hoc clava fusco-umbrata, valvula ventrali abdominis elongatis triquetri medium longe superante: ♂ antennis scapo longo dilatato pedibusque stramineis, abdomine oblongo immaculato. Long. 2—3 mill.

Species ♀ valvula ventrali, ♂ abdomine immaculato, scapo longo, dilatato ab affinibus mox discedens. Caput fere triangulare, vix transversum, pone oculos subangustatum, vertice haud lato, ocellis sat magnis in lineam sat curvam dispositis; facie plana, scrobe haud profunda, clypeo apice late rotundato-truncato, mandibulis minus validis, genis sat longis, haud latis. Antennæ infra medium faciei insertæ, basi parum distantes, nigræ; articulo 1:o æneo, lineari, basi pallido, ocellum haud attingente, 2:o oblongo æneo 5:o longiore, 3:o parvo, 4:o paullo majore, 5—10 sensim incrassatis, haud validis, breviter pilosis, 5:o vix, 10:o evidenter transversò, clava haud parva, distincte articulata, apice acuminata. Thorax minus crassus, cupreus vel obscure viridis, fere glaber, confertim punctatus; pronoti collari medio haud lato, latera versus dilatato; mesonoti sulcis antice indicatis, dorso dorsuli basi fere duplo longiore, scutello haud brevi, sat convexo,

freno declivi, dorsello sat angusto; metathorace haud polito, carina et plica subarcuata distinctis, nucha breviuscula, furcula carinae apicali indicata, spiraculis haud magnis ovalibus. Alæ sat longæ, lenissime fumato-hyalinæ, cellula basali et speculo nudis, costali sat lata, præstigmatè minus brevi, stigmatè radio evidenter longiore, hoc puncto fumato clavæ majusculæ adhærenti. Abdomen thorace longius, fere angustius, triquetro-elongatum, virescens, fasciis apicalibus minus lucidis, valvula ventrali trientem apicalem fere attingente. Pedes sat graciles, ænei, trochanteribus, genubus, tibiis apice tarsisque basin versus pallidis. Mesosternum sulco medio tenui, latera subsquamoso-punctata, præsterna haud parva, episterna minus polita.

Mas differt: corpore viridi, nitente, capite breviorè, genis subbuccatis, ocellis in triangulum dispositis, antennis scapo stramineo, apicem versus evidenter dilatato, longo, ocellum fere superante, flagello pilosulo, testaceo, vix incrassato, clava magna; abdomine oblongo viridi, pedibus gracilibus stramineis coxis æneis.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

5. *T. laticeps* m: Viridis vel cyaneus, capite lato, metathorace polito, alis hyalinis stigmatè radio parum longiore, abdomine ovato: ♂ antennis flagello pilosulo, brevi, scapo haud dilatato, abdomine macula pallida. Long. 2—3 mill.

Species a *T. punctigero* corpore breviorè, læte viridi vel cyaneo, capite thorace latiorè, vertice lato, genis buccatis; antennis in medio faciei insertis, fuscis, scapo subtus vel basin versus pallido, flagello parum incrassato, postannello subtransverso; metathorace cyaneo, polito nucha brevi; abdomine breviorè, ovato, subtus parum convexo, cyaneo, fasciis æneo-aureis, femoribus fusco-æneis,

tibiis flavis: ♂ antennis scapo ocellum haud attingente, flagelli articulis fere transversis, abdomine macula pallida, femoribus stramineis præsternis parvis, spiraculis parvis discedens.

Temligen sällsynt i Skåne.

6. *T. fasciatus* m: Viridis, abdomine elongato, antennis haud crassis, scapo pedibusque flavis, metathorace lævi, stigmate radio sesqui longiore: ♂ antennis scapo superne dilatato, flagello longo, fusco, hirtulo. Long. 2—3 mill.

Præcedenti similis et affinis, sed capite antrorsum subangustato, vertice angustiore, clypeo apice evidentius emarginato; antennis flagello paullo longiore; metathorace longiore, nucha trientem occupante, alis stigmate radio sesqui longiore; abdomine fasciis lætis aureo-cupreis, magis elongato; femoribus flavis: ♂ antennis flagelli articulis fuscis, cylindricis, hirtulis, scapo apice compresso-dilatato bene distinctus.

Ej sällsynt i medlersta och södra Sverige.

7. *T. spiracularis* m: Æneus, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis, spiraculis magnis oblongis, abdomine elongato smaragdino, fasciis atro-purpureis ornato: ♂ antennis flagello vix pilosulo, haud longo, abdomine rotundo cyaneo, disco atro-coeruleo. Long. 3—5 mill.

Species a præcedentibus spiraculis metathoracis magnis, hoc lævi, nucha brevi, capite thorace vix latiore, antrorsum haud angustato, vertice angusto, ocellis parvis in lineam vix curvam dispositis, facie plana, genis buccatis, clypeo emarginato, mandibulis validis, externe fortius sinuatis; antennis in medio faciei insertis, scapo flavo vel apice æneo, pedicello longo, annellis funiculo arcte ad-

pressis, hoc crasso, sed articulis latitudine fere æqualibus; alis subfumato-hyalinis, nervo basali nudo, stigmatæ radio paullo longiore, hoc clava nigra rotunda haud parva, abdomine elongato, pulchre smaragdino, fasciis atro-coeruleis vel purpureis ornato, segmentis longitudine parum discrepantibus, ventre leniter convexo, pedibus rufescentibus, coxis æneis, femoribus interdum fusco-æneis, metapleuris haud punctatis: ♂ antennis scapo haud dilatato, funiculi articulis brunneis, subcylindricis pube haud exserta vestitis, abdomine rotundo, plica fere nulla, pedibus stramineis, coxis corpori viridi concoloribus discedens.

Temligen sällsynt i medlersta Sverige.

8. *T. levinucha* m: Æneus, capite thorace vix latiore, alis stigmatæ vix longiore, abdomine ovato-elongato: ♂ antennis scapo superne dilatato, funiculo, tenui, pilosulo, abdomine subrotundo. Long. 3—4 mill.

T. spiraculari simillimus, sed antennis pedicello brevior, ocellis haud parvis in lineam sat curvam dispositis, alis nervo basali pubescenti, metathorace spiraculis, etsi ovalibus, evidenter minoribus, abdomine minus elongato; ♂ antennis scapo longiore apicem versus dilatato, flagello fere incrassato, tenuiore, pilosello, abdomine ovali-rotundo, cyaneo medio atrocoeruleo, plica subdistincta haud pallida, femoribus anticis macula nulla basali nigricante discedens; a *T. laticipite* ♀ corpore majore, capite thorace vix latiore, funiculo validiore, abdomine longius ovato fasciis bene distinctis aureo-atris, ♂ abdominis forma et colore, antennarum structura optime distinguendus.

Sällsynt i Skåne.

9. *T. subnudus* m: Cupreus, coxis posticis basi externe fere glabris, antennis scapo pedibusque parum pallido-variegatis: ♂ antennis scapo simplice, flagello

pilosello, abdomine oblongo, pedibus rufescentibus.
♀ Long. 3—4 mill.

Statura *T. levinucha*, sed abdomine magis lateribus cupreo, antennis flagello minus crasso, brunneo, clava longiore. alis nervo basali nudo; ♂ antennis ut in *T. fasciato* formatis, sed articulis funiculi brevioribus, minus hirtis, pedibus rufescentibus, discedens; a *T. spiraculari* spiraculis minoribus, capite vertice crassiore, antennis flagello tenuiore leniter incrassato, abdomine minus elongato, femoribus tibiisque æneis, genubus tibiisque apice dilatioribus; ♂ abdomine oblongo virescente, macula pallida subpellucente basali; a *T. fasciato* genis buccatis, mandibulis validioribus, ♂ funiculi articulis minus longis, pedibus rufis, coxis æneis; ab omnibus coxis posticis basi externe vix pubescentis discedens; ab *Habrocyto* mandibulis 4-dentatis, collari acuto, metathorace polito diversus.

Sällsynt i Skåne.

10. *T. coxalis* m: Viridis, antennis infra medium insertis, scapo pedibusque cum coxis anticis pallidis: ♂ antennis scapo valde ovali-dilatato. Long. 2—3 mill.

Pteromalus Cyniphis Nees l. c. II. 93. 1. (mas).

Species ab affinibus ♀ capite ocellis in lineam vix curvam dispositis, parvis; antennis scapo lineari vix curvato, longius infra medium faciei planiusculæ insertis, pedicello longo, flagello tenui, apicem versus incrassato; alis stigmate radio parum longiore, interdum disco umbra medio magna fumata; abdomine ovato, acuminato, subtus parum convexo; pedibus rufescentibus, coxis anticis concoloribus: ♂ antennis scapo longo sed fortiter compresso, ovali-dilatato, pedicello longo, funiculo longo pilosello, angusto, fusco sensim fere incrassato, postannello haud abrupte minore, clava fusca, quam articulis funiculi 2 ultimis pallidis simul sumtis vix longiore; abdomine ovali-

rotundo, prope basin fascia lata rufescenti, pedibus ♀ concoloribus sed magis stramineis tibiis intermediis externe basi fuscis bene distincta.

Ej sällsynt i medlersta och södra Sverige.

11. *T. rufimanus* m: Viridis, antennis scapo pedibusque cum coxis anticis rufescentibus: ♂ antennis scapo simplice. Long. 2—3 mill.

Pteromalus Cyniphis Nees l. c. II. 93. 1. (femina).

T. coxali statura, colore et magnitudine simillimus, sed ♀ antennis fere in medio faciei insertis, pedicello minus longo, abdomine segmentis 3:o et 4:o lateribus totis glabris, 2:o minus longo: ♂ antennis scapo haud dilatato, funiculi articulo 1:o abrupte minori etsi haud annelliformi discedens.

Sällsynt i Skåne.

12. *T. æneicoxa* m: Cupreus, antennis scapo femoribus tibiisque rufescentibus: ♂ viridis antennis funiculo fusco apice pallido, postannello parvo, abdomine subrotundo, viridi, immaculato. Long. 2—3 mill.

T. rufimano similis et affinis, sed ♀ segmentis 3:o et 4:o pubescentibus, antennis flagello crassiore, scapo brevior, postannello transverso, coxis omnibus viridi-æneis: ♂ antennis scapo brevior, femoribus tibiisque late stramineis, abdomine immaculato, funiculi articulis brevioribus discedens.

Sällsynt i Skåne.

13. *T. pedicellaris* m: Viridis, antennis tenuibus, scapo femoribus tibiisque rufis: ♂ antennis scapo longo simplice, flagello tenui rufescenti clava fusca, abdomine subrotundo basi late rufo. Long. 2—3 mill,

T. coxali simillimus, sed antennis fere in medio faciei insertis, coxis omnibus æneis, ♂ scapo simplice, postannello sequenti minore mox discedens; a *T. æneicoxa* ♀ antennis pedicello longiore, flagello tenuiore abdomine magis ovato-acuminato, ♂ antennis scapo et pedicello longioribus, funiculo rufescenti tenuiore, abdomine fascia lata prope basin rufescenti ornato distinctus; a *T. rufimano* coxis anticis æneis, abdomine segmentis 3:o et 4:o utrinque serie piloso instructis optime distinguendus.

Sällsynt i södra Sverige.

Subgenus *Polycelis*.

Caput transversum, genis buccatis, oculis subrotundis prominulis. Alæ ♀ maculis nonnullis fumatis. Antennæ ♂ funiculi articulis alternis majoribus albis; tibiis intermediis ante apicem externe sublobato-dilatatis.

Detta släkte står närmast *Trichomalus*, men skiljes lätt, hannarne genom hvarannan led i antennsträngen större, hvarannan mindre och hvit samt genom mellanbenens tibier, som på yttre sidan äro dilaterade; honorna genom nästan runda utstående ögon, små oceller, bred hjessa, långa utspända kinder, fläckiga vingar, starkt utbildad metathorax med stor puncterad nucha. Att döma efter bildning af antenner och tibier hos hannen borde de hithörande arterna lefva i galläplen.

1. *P. conspersa*: *Ænea*, cupreo adpersa, alis maculis 4 fuscis ornatis, Long. 3--4 mill.

Pteromalus conspersus Walk. l. c. II. 486. 18.

Caput thorace paullo latius, latitudine sua fere duplo brevius, pone oculos vix angustatum, vertice lato, medio emarginato minus tereti, ocellis parvis in triangulum dispositis inter se minus quam ab oculis distantibus, his rotundis prominulis glabris; facie lata planiuscula confer-

tim punctulata, scrobe antennali parum discreta; clypeo vix discreto apice medio emarginato; genis longis sed buccatis subcompressis. Antennæ brunneæ longæ, in medio faciei fere in linea oculari insertæ, basi parum distantes; articulis 1:o longo, testaceo vel apice æneo, margine infero recto, supero subarcuato, 2:o sat longo, 3:o parvo sed distincto, 4:o majore, 5—10 sensim paullo latioribus subtransversis, clava parva oblique subacuminata. Thorax sat crassus, supra fere glaber, creberrime punctatus, æneus, cupreo adpersus; pronoti collari margine antico acuto; mesonoti sulcis ad medium usque bene discretis, scutello minus convexo apice declivi; metathorace magno, fere horizontali, punctata, carina media distincta, nucha punctata medium fere occupante, plica laterali integra profunda, pone medium subflexuosa, sulco spiraculari distincto, spiraculis haud magnis subovalibus. Alæ fere hyalinae, cellula costali lata, basali et speculo nudis, præstigmatate haud parvo, stigmatate radio fere sesqui longiore, hoc clava parva quam metacarpo vix brevior; maculis 4 fuscis fumatis ornatæ altera transversa radio adhærenti, ad medium disci extensa, altera apicali interne bene determinata, 2 inferioribus cum radiali triangulum formantibus. Abdomen thorace longius, ovato-elongatum, ante medium thorace fere latius, supra planum cupreum vel aureum, fasciis atrocoeruleis ornatum, subtus vix convexum, valvula ventrali medium haud attingente; segmentis 1:o haud transverso sed in nucha occulto 2:o apice late rotundato quam 3:o vix duplo longiore, 3—6 sensim paullo brevioribus, 7:o paullo majore, 8:o triangulari. Mesosternum lateribus subsquamoso-punctatis, episternis lævibus, epimeris sat fortiter, metapleuris subtilius punctatis, præsternis parvis; pronoti sulco laterali profundo. Pedes haud validi rufescentes, coxis æneis, femoribus sæpe, tibiis posticis interdum fusco-æneis.

2. *P. monospila* m: *Ænea*, alis macula discoidali fumata: ♂ coxis rufis, alis immaculatis. Long. 2—4 mill.

Præcedenti simillima sed minor, alis macula media discoidali libera sub radio: ♂ antennis flagello fusco et albo annulato compresso, coxis rufis, alis immaculatis facie inferne albo-fimbriata discedens.

Sällsynt i medlersta Sverige.

Genus *Pteromalus* Swederus.

Caput mandibulis 4-dentatis, sinistra rarissime 3-dentata, genis sæpe compressis, vertice interdum medio acuto; clypeo apice medio plerumque emarginato; oculis interdum hirtis, peristomio sæpe parvo. Antennæ sæpius infra medium faciei convexæ vel interdum protuberantis insertæ, scapo haud brevi, annellis plerumque bene distinctis, clava haud stylata. Thorax haud elongatus, pronoti collari sæpius discreto, sed margine antico haud acute reflexo; metathorace plerumque punctulato, plica sæpius integra, interdum abbreviata sed semper distincta instructo, spiraculis raro magnis, nucha plerumque brevi, calli fimbria sæpe magna. Alæ radio quam metacarpo interdum brevior vel æquali, stigmatum haud crasso, plerumque, ♂ semper immaculatæ: abdomen sæpe ♀ rotundum, ♂ ventre rarius plica instructo, fasciis nullis determinatis ornatum, segmento 8:o ♀ plerumque brevi, 2:o haud dense pubescente apice late rotundato. Pedes haud graciles, coxis posticis breviter ovatis, basi postice haud pubescenti.

Detta slägte innefattar endast ett fåtal arter, men hvilka äro inbördes så afvikande att de rättast böra anses som typer för särskilda subgenera. Deras gemensamma karakterer äro följande: Hufvudet har oftast kinderna breda och hoptryckta, ögonen äro stundom håriga, mandiblerna båda försedda med 4 tänder, ytterst sällan vänstra endast med 3, hjessan stundom i midten hvasskantad eller med tydlig occipital-linja, som likväl ej fortsättes nedtill. Antennerna hafva vanligen båda annelli tydliga stundom stora, post-

annellus hos *Meraporus* ringformig; de äro oftast fästade nedom midten af ansigtet, som är kullrigt, stundom starkt utskjutande nedtill. Thorax har pronoti collare sällan aftrindadt i framkanten; metathorax är oftast puncterad, alltid med tydlig plica, nuchan sällan starkt utbildad, spiracula oftast runda och små, calli fimbria oftast lång och ganska tät. Abdomen är på 2:a segmentet nästan utan pubescens, till formen oftast rund eller kort oval, sista segmentet merendels kort, buksidan ej hoptryckt, vanligen föga kullrig. Bakbenens höfter äro kort äggrunda, vid basen på yttre sidan ej pubescenta, hvarigenom detta slägte skiljes från *Isocyrtus*; från *Habrocytus* afviker det dels genom abdomens form, dels genom annelli, som äro starkare utvecklade och genom de stundom håriga ögonen. *Meraporus* öfverensstämmer med *Eutelus* i antenner, men metathorax är puncterad, mandiblerna 4-tandade. Troligen lefva de flesta arterna i fjärilpuppor.

Conspectus subgenerum.

- A) Oculi hirti. Antennæ incrassatæ. Vertex medio acuto.
- a) Alæ maculatæ cellula basali lata pubescente. Abdomen ♀ breviter ovatum. Unguiculi longi tenues. Tibiæ rigide setosæ. *Halizous.*
- aa) Alæ immaculatæ. Abdomen rotundum. *Trichoglenus.*
- B) Oculi glabri.
- b) Antennæ postannello parvo. *Meraporus.*
- bb) Antennæ postannello magno.
- c) Metathorax nucha magna subglobosa. Antennæ flagello filiformi. Abdomen ♀ ovato-acutum. Alæ metacarpo quam radio longiore.
- d) Alæ totæ pubescentes. Caput genis profunde excavatis. Metathorax nucha lævi. *Catolaccus.*
- dd) Alæ speculo magno. Metathorax nucha punctata. *Pteromalus.*
- cc) Metathorax nucha sæpius minima. Alæ metacarpo quam radio interdum brevior, rarissime longior. Abdomen ♀

plerumque rotundum. Antennæ infra medium faciei convexæ vel valde prominulæ insertæ.

- e) Metacarpus radio longior. Nucha brevis. Abdomen ovali-rotundum. Peristomium et vertex lata. *Diglochis.*
- ee) Metacarpus radio brevior vel æqualis.
- f) Abdomen oblongum.
- g) Vertex medio teres. Abdomen ♀ ovatum, subtus convexum. Alæ ♀ sæpe macula magna disci fumata. Antennæ ♀ clava parva pedicello brevior. *Arthrolytus.*
- gg) Vertex medio acuto. *Dibrachys.*
- ff) Abdomen rotundum. Genæ compresso-acutæ. Ala vitreæ, metacarpo radio brevior. *Cœlopisthus.*

Subgenus *Halizous.*

Urolepis Walk.

Caput oculis subrotundis, prominulis, hirtulis, linea occipitali ad tempora usque acute impressa, genis longis, mandibulis 4-dentatis. Antennæ paullo infra medium faciei convexæ insertæ, flagello in utroque sexu incrassato, conformi, annellis magnis. Thorax collari angusto, discreto, sulcis mesonoti fere integris. Alæ speculo fere nullo sed fumato, metacarpo radio longiore. Abdomen ♀ ovatum, ♂ rotundum plica ventrali nulla. Pedes rigido-pubescentes, unguiculis longis, pulvillo parvo.

Detta subgenus skiljes lätt på den skarpt intryckta occipital-linjen, de runda, utstående håriga ögonen, de nästan hela sulci mesonoti och de i båda könen incrasserade antennerna. Den enda kända arten lefver parasitiskt på en fluga vid hafskusten.

1. *H. maritimus*: *Æneus*, cupreo-tinctus, antennis scapo femoribus tibiisque rufis, his ♀ sæpe fuscis vel æneis. Long. 3—4 mill.

Ormocerus maritimus Walk. l. c. II. 169.

Pteromalus salinus Heyden Stett. Ent. Zeit. 1847.

Miscogaster Stygne Walk. Mon. Chalc. I. 201.

Caput thorace fere latius, pone oculos vix angustatum, vertice pone ocellos declivi, his sat magnis in triangulum dispositis, facie albido-puberula, clypeo apice rotundato-truncato, mandibulis piceo-ferrugineis, margine externo haud sinuato; genis longis, subbuccatis, superne compressis. Antennæ in linea oculorum infera insertæ, basi parum distantes, nigro-fuscæ, rigido-pubescentes; articulo 1:o ocellum attingente, lineari flavo, vel fere toto æneo, 2:o 5:o longiore, æneo, 3:o sat distincto, 4:o hoc duplo latiore sed 5:o evidenter angustiore, 5—10 sensim latioribus et brevioribus bene discretis, clava parva pedicello brevior, apice obtuse oblique acuminata. Thorax sat crassus, creberrime punctatus, supra æneus, cupreo-tinctus, pube vix perspicua vestitus; pronoto antice haud verticali, collari sat discreto; mesonoti sulcis haud latis sed argute ultra medium impressis, dorso dorsuli basi fere duplo longiore, scutello subconvexo, dorsello angusto; metathorace haud brevi, punctulato, nucha distincta, carina et plica integra arcuata bene discretis, spiraculis parvis subovalibus, calli fimbria magna. Alæ lenissime fumatæ, fere totæ pubescentes, pone nervum basalem macula fumata magis minusve extensa, præstigmate haud longo sed sat crasso, stigmate radio paullo longiore fusco, hoc clava mediocri. Abdomen thoracis latitudine, fere brevius, ovatum, viride, sat nitidum; segmentis 1:o brevissimo, 2:o trientem superante, margine postico late rotundato, 3—7 sensim brevioribus, 8:o parvo; ventre parum convexo. Pedes minus validi, coxis æneis, femoribus tibiisque obscure rufis, vel fuscis vel æneis, tarsis interdum concoloribus. Mesosternum lateribus punctatum, sulco medio tenui, præsterna haud magna, episterna vix polita, metapleura punctata.

Mas differt: antennis scapo, femoribus tibiisque ferrugineis, flagello minus crasso, obscure ferrugineo, abdomine rotundo, segmentis 4—8 interdum retractis.

Funnen vid hafskusten i Skåne.

Subgenus *Trichoglenus*.

Caput vertice medio acuto, oculis hirtis subovalibus. Alæ metacarpo radio paullo brevior, immaculatæ. Antennæ crassæ, flagello ♀ extrorsum fortiter incrassato, ♂ flavo fusiformi-lineari. Abdomen rotundum.

Detta subgenus afviker från föregående genom kort metacarpus, ej så skarpa sulci mesonoti, ofläckade vingar, rund abdomen och ej incrasserade antenner hos hannen. Från alla följande skiljes det genom ludna ögon. Närmast i habitus kommer det till *Coclopiethus*.

1. *T. complanatus*: Obscure æneus, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis: ♂ antennis crassis læte flavis. Long. 2—3 mill.

Pteromalus complanatus Ratz. l. c. I. 197. 20.

Pteromalus claviger Foerster (forte).

Pteromalus patulus Walker (forte).

Caput thorace fere latius, crassum, pone oculos haud angustatum, vertice lato, medio emarginato, linea occipitali distincta, ocellis fere in triangulum dispositis, oculis subovatis, genis brevibus compressis, versus peristomium parvum subito rotundato-angustatis; clypeo subdiscreto, haud transverso, apice truncato; facie convexa, scrobe antennali haud profunda sed distincta; mandibulis breviter rostrato-productis, externe sinuatis, 4-dentatis, dentibus acutis, apicali majore forcipato. Antennæ infra lineam ocularem insertæ, breves, clavatæ, articulo 1:o testaceo, lineari, ocellum haud attingente, 2:o oblongo, 3:o parvo

4—10 sensim latioribus, transversis, clava magna. Thorax confertim punctatus, brevis; pronoti collari haud lato subdiscreto; mesonoti sulcis ad medium usque distinctis; metathorace brevi sed vix declivi, punctulato, nucha fere nulla, carina media et plica distinctis, hac angulata, spiraculis parvis, subrotundis. Alæ fumato-hyalinæ, stigmatum radio sesqui longiore, hoc fere metacarpo brevior, cellula basali parce pubescenti, speculo parvo. Abdomen rotundum, thorace latius, ventre convexo, supra plano, postpetiolo medium occupante. Pedes rufescentes, femoribus et tibiis interdum fuscis, coxis viridibus.

Mas differt: capite genis antice elevatis, mandibulis basi tuberculatis thoraceque viridibus, antennis articulis 5—10 crassis, flavis, haud pilosis, sensim fere angustioribus, segmentis 4—8 subretractis.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland; jag har fått den utkläckt ur en puppa af *Liparis Salicis* tillsammans med *Coclopiethus omnivorus*.

Subgenus *Meraporus* Walk.

Peridesmia Foerster.

Antennæ utriusque sexus incrassatæ postannello parvo, scapo ocellum haud attingente. Thorax collari angusto, discreto, metathorace brevi punctulato, plica integra. Alæ cellula costali angusta, interdum brevissimæ. Abdomen ovatum, ♂ subrotundum. Caput ♂ impressione lyrata faciei et orbita posteriore lævigata.

Detta subgenus afviker från alla inom släktet genom antennernas 5:e led som i båda könen är liten nästan ringformig, hannen dessutom genom den lyrformiga ansigts-intryckningen. Från *Eutelus* skiljes det dels genom de 4-tandade mandiblerna, dels genom korta incrasserade antenner och puncterad metathorax.

1. *M. graminicola*: *Æneus*, crassus, antennis scapo pedibusque flavis, coxis corpori concoloribus. Long. 2 mill.

Walk. l. c. II. 299. 1.

Meraporus alatus Walk. l. c. II. 300. 2.

Caput thorace latius, vertice emarginato, haud acuto, ocellis parvis in triangulum dispositis, oculis magnis ovatis haud convexis; fronte superne punctis majusculis parce impressis; facie convexa, epistomate læviusculo, clypeo apice medio truncato, mandibulis haud validis, dentibus 4 tenuibus armatis, externe haud sinuatis, genis brevibus subbuccatis superne leniter compressis. Antennæ infra medium faciei insertæ, crassæ, articulo 1:o testaceo, lineari, 2:o oblongo æneo, 3:o vix conspicuo, 4:o parvo, 5:o hoc paullo majore sed quam 6:o abrupte angustiore, 6—10 sensim crassioribus, brevibus, fuscis vel testaceis, clava magna ovata. Thorax brevis, crassus, crebre subtiliter punctatus, supra convexus, antice punctis majoribus setigeris parce impressis; pronoti collari angusto; mesonoti sulcis tenuibus dimidiatis, dorso dorsuli basi vix sesqui longiore; metathorace brevi sed vix declivi, punctulato, carina et plica distinctis, nucha fere nulla, spiraculis parvis rotundis a postscutello remotis. Alæ subhyalinæ, interdum breves, stigmatе tenui quam radio parum longiore, hoc clava parva. Abdomen viride-æneum, ovatum, subtus convexum, valvula ventrali medium superante; segmentis 2:o trientem vix occupante fovea basali brevi sed profunda, margine postico late rotundato, 3--6 sensim brevioribus, 7:o paullo majore, 8:o brevi. Pedes sat validi, testacei, coxis viridi-æneis. Mesosternum lateribus punctatum, præsternis parvis, mesopleuris bene discretis.

Mas differt: capite fere majore, antennis testaceis, vix tenuioribus, orbita posteriore et impressione faciali lyrata lævigatis, abdomine rotundo, segmentis 4—8 sub-retractis.

Ej sällsynt öfver hela Skandinavien.

Subgenus *Catolaccus*.

Caput crassum, genis fovea magna supra mandibularum basin impressa, his validis. Antennæ filiformes. Alæ totæ pubescentes. Metathorax magnus, nucha distincta. Abdomen elongato-ovatum, fere compressum.

Detta subgenus, som i habitus står närmast *Metopon*, skiljes från öfriga genom kindernas djupa grop, trådformiga antenner, likformigt pubescerade vingar, starkt utbildad metathorax med stora spiracula och abdomen nästan lika bildad som hos *Habrocytus*.

1. *C. cavigena* m: Coerulescenti-niger, alis medio late fumatis, tibiis basi et apice pallidis, antennis flagello apice obscure testaceo. ♀ Long. 3—4 mill.

Caput magnum, latitudine sua paullo brevius, pone oculos ovatos glabros haud angustatum, vertice lato haud acuto, ocellis magnis in triangulum dispositis, genis buccatis sed sat longis, clypeo apice truncato, mandibulis piceis apice forcipato. Antennæ tenues in linea oculari infera, longe infra medium faciei leniter convexæ insertæ; articulo 1:o coeruleo-æneo lineari ocellum haud attingente, 2:o oblongo, 3:o parvo, 4:o hoc paullo majore, 5--10 sensim paullo brevioribus, crassitie æqualibus, clava oblonga quam præclava transversa duplo longiore. Thorax crassus, supra punctatissimus subglaber; pronoti collari haud angusto sat discreto sed margine antico haud acuto; mesonoti sulcis antice inchoatis, dorso dorsuli basi sesqui longiore, scutello subtriangulæ, dorsello angusto; metathorace declivi, sat longo, nucha fere globosa sublævi, carina media et plica subarcuata bene discretis, spiraculis magnis ovalibus, calli fimbria sat densa et longa. Alæ haud latæ nec longæ, subfumatæ, in medio obscuriores, stigmatæ radio et metacarpo longitudine fere æqualibus, cellula costali sat lata. Abdomen thorace longius, subtus convexo-compressum, apice acuminatum, segmentis 2--6 sensim brevioribus, terebra breviter exserta. Pedes sat validi,

æneo-coerulescentes, tarsis basin versus tibiis apice et basi albido-testaceis. Mesosternum lateribus punctatum, præsternis parvis, epimera vix nisi fovea ab episternis lævibus discretis.

Sällsynt i södra Sverige.

Subgenus *Pteromalus*.

Caput oculis glabris vertice medio rarius acuto, mandibulis validis 4-dentatis, clypeo apice medio emarginato. Antennæ fere in medio faciei insertæ, filiformes. Thorax supra minus convexus, metathorace punctato, nucha magna, ♀ subglobose. Alæ metacarpo radio longiore, speculo magno. Abdomen ♀ ovatum, ♂ oblongum vel rotundum.

I den starka utvecklingen af metathorax med den runda nuchan kommer detta subgenus närmast *Catolaccus*, men skiljes dels genom de ej urgröpta kinderna, dels genom den tydliga blottan på vingarne. Från följande subgenera afviker det hufvudsakligen genom tydligare utbildad nucha på metathorax, trådformiga antenner äggformig abdomen hos honan och ej kort metacarpus. Från *Ha-brocytus* genom tydligare annelli, kortare abdomen och 4-tandade mandibler. De kända arterna lefva parasitiskt i fjärlpupper.

A) Caput vertice plane tereti. Abdomen ♂ oblongum.

1. *P. Puparum*: Viridi-æneus, scutello convexo, antennis longis brunneis scapo pedibusque pro parte pallidis: ♂ abdomine aureo, antennis pedibusque flavis. Long. 3—4 mill.

Nees l. c. II. 127. 21.

Ichneumon puparum Lin. Fauna Sv. Ed. II. 1636.

Caput thorace fere latius, subtransversum, antrorsum vix angustatum, viridi-æneum, confertissime punctatum, pone oculos leviter angustatum, vertice medio emarginato,

ocellis sat magnis fere in triangulum dispositis; facie fere plana, scrobe antennali parum distincta, genis sat longis subbuccatis, leviter compressis, oculis subovatis subconvexis, clypeo apice medio emarginato. mandibulis dentibus 4 validis acutis armatis, apicali forcipato, externe sinuatis. Antennæ longæ, filiformes, in medio faciei insertæ, basi parum distantes, brunneæ vel fuscae, scapo lineari flavo, 2:o oblongo, 3:o parvo sed distincto, 4:o hoc paullo majore, 5—10 crassitie æqualibus, sensim paullo brevioribus, clava conico-elongata, præclava haud transversa. Thorax minus robustus, supra parum convexus, fere glaber, confertissime subsquamoso-punctatus; pronoti collari haud angusto, sat bene discreto sed margine haud acuto; mesonoti sulcis antice inchoatis, dorso dorsuli basi sesqui longiore; scutello postice declivi, dorsello angusto; metathorace sat longo, punctatissimo, nucha fere globosa, carina media nulla sed plica arcuata distincta, spiraculis haud parvis subovalibus in sulco spiraculari mox pone postscutellum sitis. Alæ subhyalinæ, cellula costali lata, basali et speculo magno nudis, stigmate tenui radio vix longiore, metacarpo hoc paullo longiore. Abdomen ovatum, supra planum, subtus leviter convexum, lateribus teretibus, viride, haud fasciatum, thorace fere brevius, vix latius, segmentis 1:o atrocoeruleo haud transverso sed in nucha occulto, 2:o fere dimidium attingente margine postico late rotundato, fovea basali sat magna et longa, 3—7 sensim brevioribus, 8:o parvo. Pedes minus validi, rufescenti-testacei, coxis viridibus, femoribus fusco-æneis, tibiis interdum concoloribus. Mesosternum lateribus punctatum, præsternis parvis, episternis sat bene discretis, lævibus, epimeris fortius, mesopleuris subtilius punctatis.

Mas differt: antennis tenuioribus, vix pilosulis, abdomine oblongo supra aureo, plica distincta, capite thoraceque lætius viridibus, femoribus tibiisque semper flavis.

Allmän från Skåne till Lappland i dagfjärilarnes puppor.

2. *P. planiscuta* m: Obscure æneus, antennis scapo, tibiis basi et apice pallidis, scutello depresso, metathorace carinato: ♂ femoribus basi fusco-æneis. Long. 3—4 mill.

Præcedenti statura et magnitudine simillimus sed magis obscurus, tibiis fusco-æneis, basi apiceque pallidis, metathorace carina media distincta, scutello depresso; ♂ femoribus basi fusca mox discedens.

Sällsynt i södra Sverige; utkläckt ur samma fjärlpuppa, hvarifrån föregående art framkommit.

3. *P. squamifer* m: Viridis, scutello convexo, mesonoto fortiter squamoso-punctato: ♂ tuberculo mandibularum basali maximo. Long. 3—4 mill.

P. puparum statura et magnitudine, sed antennis scapo flavo longiore, ocellum superante, metathorace carina media distincta, colore lætius viridi, femoribus tibiisque fusco-testaceis, ♂ oculis magis exsertis, abdomine viridi medio aureo, mandibulis tuberculo basali maximo, genis brevibus mox discedens; a *P. planiscuta* scutello fortiter convexo, ab utroque mesonoto fortiter squamoso-punctato optime distinguendus.

Sällsynt vid Lund. Möjligen *P. lepidotus* Ratz.

- B) Caput linea occipitali medio subdistincta. Mandibulæ dente basali truncato. Abdomen ♂ subrotundum.

4. *P. nidulans* (Foerster): Viridis, antennis funiculi articulis transversis, scapo pedibusque flavis, coxis eorpori concoloribus. Long. 2—3 mill.

Var. Alis abbreviatis postpetiolum vix superantibus, vel abdominis apicem fere attingentibus vel superantibus.

Pteromalus hemipterus Walk. l. c. III. 196. 91. (forte).

Species statura omnino, metathoracis forma et sculptura *P. puparum* similis et affinis, sed minor, lætius viridis, abdomine subcyaneo, segmentis 3—4 glabris, metathorace nucha brevior, carina media ♀ obsoleta, ♂ nulla, plica minus distincta, vertice latiore, antennis brevioribus, articulis 3:o parvo sed distincto, 5—10 sensim fere latioribus, haud crassis, subtransversis: ♂ abdomine rotundo viridi, antennis flagello tenui articulis subtransversis bene distincta.

Sällsynt i södra Sverige.

5. *P. submarginatus* m; Viridis, antennis funiculi articulis haud transversis, carina metathoracis distincta: ♂ antennis funiculi cylindricis hirtulis. Long. 3 mill

Præcedenti simillimus, sed paullo major, antennis funiculi nigri articulis crassioribus et longioribus, metathorace carinato, nucha majore: ♂ antennis funiculi articulis haud crassis sed latitudine sua longioribus, parce hirtulis optime distinguendus.

Sällsynt vid Helsingborg.

Subgenus *Diglochis*.

Caput magnum, crassum, vertice lato tereti, genis buccatis, haud compressis, clypeo apice medio inciso, peristomio maximo, mandibulis validis sed externe haud sinuatis, oculis glabris. Antennæ infra medium faciei insertæ, scapo longo subcurvato, annellis bene distinctis, flagello sat valido sed haud elevato. Thorax collari medio fere acuto, metathoracis nucha fere nulla. Alæ metacarpo radio longiore, hoc stigmate parum brevior. Abdomen ovali-rotundum. Mas mandibulis tuberculo basali maximo nigro, genis supra mandibulas elevatis, oculis prominulis.

Detta subgenus skiljes lättast på hufvudet med dess stora peristomium, starka mandibler, båda annelli nästan lika utvecklade, lång metacarpus, ovalrund abdomen, föga marquerad nucha på metathorax, hannen dessutom genom mandiblernas starka basal-tuberkel.

1. *D. omnivorus*: Viridis, subtilissime punctata, nitida, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis, alis hyalinis. Long. 3—4 mill.

Pteromalus omnivorus Walker (teste Reinhard).

Pteromalus saltans Ratz. (forte).

Pteromalo puparum crassior, abdomine ovali-rotundo, metathorace nucha fere nulla mox distincta. Caput thorace latius, pone oculos haud angustatum, vertice medio parum emarginato, oculis magnis ovalibus, minus convexis, clypeo apice medio anguste inciso, genis buccatis haud longis; fronte superne punctis nonnullis setigeris parce impressis, scrobe sat longa et profunda. Antennæ articulo 1:o testaceo, 2:o 5:o sesqui longiore, 5—10 crassitie æqualibus subtransversis sensim vix brevioribus, clava ovali haud magna. Thorax sat robustus, viridis, supra subtilissime præsertim scutello punctato, mesonoto antice punctis setigeris parce impressis, dorsello haud angusto, metathorace sat longo vix declivi, punctulato, nucha tantum linea elevata arcuata apicali indicato, carina media distincta, spiraculis subrotundis in sulco spiraculari sitis, Alæ hyalinæ, cellula costali lata, basali et speculo magno nudis. Abdomen æneum postpetiolo medium fere attingente, ventre convexo. Pedes fusci, coxis æneis, tibiis obscure testaceis.

Mas differt: capite thoraceque læte viridibus, antennis flagello tenuiore et longiore, pilosello, abdomine oblongo, subtus macula pallida, femoribus tibiisque pallide testaceis

Temligen sällsynt i södra och medlersta Sverige, utkläckt ur fjärl-puppor.

Subgenus *Arthrolytus*.

Caput vertice medio haud acuto, oculis sat magnis, ovatis, convexis glabris, clypeo apice truncato, mandibulis minus validis. Collare haud discretum. Alæ metacarpo radio vix longiore, disco ♀ sæpe macula magna fumata. Abdomen ovatum subtus convexum. Antennæ clava ♀ parva. Pedes crassi.

Detta subgenus afviker från *Diglochis* genom kortare metacarpus och anelli, mer eller mindre incrasserade antenner, äggformig abdomen hos ♀ och oftast aftrindadt pronotum.

A) Antennæ minus validæ sed flagello incrassato, ♂ articulis longis hirtis, infra medium faciei convexæ insertæ.

1. *A. punctatus* m: Obscure æneus, antennis basi pedibusque rufescentibus, alis ♀ macula magna disci fumata. Long. 3—4 mill.

Pteromalus maculipennis Walk. l. c. III. 191. 83 (forte).

Caput thorace fere latius, subtransversum, antrorsum vix angustatum, pone oculos magnos ovatos subangustatum, vertice minus lato, ocellis parvulis in lineam curvam dispositis; facie convexa, fortiter concinne punctata, scrobe antennali parum impressa; clypeo vix discreto, sinu laterali parvo, apice medio truncato, genis parum buccatis haud compressis; mandibulis 4-dentatis, dente apicali parum forcipato. Antennæ infra medium faciei insertæ; articulo 1:o testaceo, ocellum haud attingente, 2:o longo sed postannello brevior, annellis haud parvis sed flagello arcte adpressis, 5—10 sensim brevioribus et paullo crassioribus, 5:o basin versus attenuato longo quam 10:o transverso multo longiore, clava parva postannello brevior, apice oblique acuminata. Thorax sat crassus, supra convexus, obscure olivaceo-æneus, fortiter concinne punctatus, subglaber; pronoto haud plane verticali, collari

haud discreto; metathorace sat longo concinne punctato, nucha tantum linea apicali elevata indicato, carina media elevata, plica sat distincta vix arcuata, interdum costula transversa instructo. Alæ fere vitreæ, parum pubescentes, haud longæ nec latæ, cellula basali et speculo magno nudis, stigmatе tenui metacarpo sesqui longiore, radio sub angulo sat acuto egrediente, clava parva quam metacarpo vix breviorе, disco macula magna fumata ad radii clavam usque extensa et ad marginem inferum fere descendente. Abdomen cupreo-aureum, splendens, segmentis 2:o viridi, subtus interdum pallido et 3:o 4:o que fere glabris, 3—6 sensim brevioribus, 8:o parvo suberecto; ventre convexo sed haud compresso. Pedes validi rufescentes, coxis anterioribus interdum concoloribus. Mesosterni epimera punctata discreta, præsterna haud parva.

Mas differt: antennis corporis fere longitudine articulis 2:o breviorе, 5—11 linearibus nigris longe hirtis, clava 2-articulata elongato-acuminata; metathorace longiore costula transversa magis distincta, abdomine oblongo macula pallida, femoribus basi et coxis totis viridi-æneis.

Sällsynt men troligen utbredd från Skåne till Lappland.

B) Antennæ flagello valido longe infra medium faciei protuberantis insertæ. Abdomen segmento ultimo spiraculis ab apice longe remotis.

2. *A. albiscapus* m: Viridis, pedibus flavis, coxis posticis supra cyaneis, tibiis antennisque scapo albidis, abdomine aureo, alis macula magna disci fusca. ♀ Long. 3—4 mill.

Præcedenti statura similis, sed facie infra medium valde protuberante, antennis scapo longiore, albo, flagello validiore sed haud incrassato, thorace lætius viridi subtilissime punctato, collari multo angustiore, metathorace breviorе et magis declivi, costula nulla, alis limpidis, radio

sub angulo acutiore egrediente, stigmatе crassiore, pedibus præsertim femoribus adhuc validioribus, mandibulis externe sinuatis, apice forcipatis bene distinctus.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

C) Antennæ flagello haud valido sed incrassato. Alæ immaculatæ,

3. *A. rugifrons* m: Viridis, antennis scapo pedibusque pro parte pallidis, abdomine rotundo-ovato, ventre et basi sæpe pallidis. ♀ Long. 2—3 mill.

Species statura omnino *Merapori*, sed antennis postannello haud parvo, ab affinibus capite fortiter subrugoso-punctato, ocellis fere in triangulum dispositis, mandibulis haud validis; antennis infra medium faciei convexæ insertis, articulo 1:o toto vel subtus pallido, ocellum haud attingente, 2:o haud parvo, 3:o vix conspicuo, 4:o discreto, 5—10 sensim crassioribus, 5:o vix, 10:o fortius transverso, clava haud parva; thorace collari angusto, medio subacuto, scutello convexo, metathorace brevi sed haud declivi, punctato, plica et carina media distinctis; alis hyalinis, apice ciliato, speculo parvo, cellula basali postice pilosula; abdomine thorace fere latiore, subtus parum convexo, ventre et postpetiolo pro parte pallidis; pedibus minus validis, coxis æneis, femoribus tibiisque fusco-testaceis optime distinguenda.

Temligen sällsynt i norra och medlersta Sverige.

Subgenus *Dibrachys*.

Caput oculis glabris, genis et vertice latis, linea occipitali medio distincta, mandibulis 3—4-dentatis. Thorax collari medio acuto, metathorace haud brevi, punctato, nucha fere nulla. Alæ vitreæ, apice haud ciliato stigmatе tenui radio longiore, hoc quam metacarpo fere longiore. Abdomen oblongo-ovatum.

Genom bred hjessa, med tydlig occipital-linja skarpkantadt collare, långt stigma, kort metacarpus, aflång abdomen skiljes *Dibrachys* lättast från öfriga hithörande genera. I metacarpi förhållande till stigma visar det mesta öfverensstämmelse med *Coelopi-sthus*, men abdomen är långsträckt, antennernas annelli ej så starkt utvecklade och strängen finare. Från *Arthrolytus* skiljes det genast genom hjessans tydliga occipital-linja samt längre metacarpus i förhållande till stigmat.

Den första arten lefver i *Microgaster-puppor*.

A) *Mandibula utraque 4-dentata*.

1. *D. Boucheanus*: Nigro-æneus, antennis flagello tenui, scapo pedibusque pro parte pallidis, alis hyalinis: ♂ antennis flagello testaceo vix pilosulo. Long. 2—3 mill.

Pteromalus Boucheanus Ratz. l. c. I. 196. 19.

Pteromalus cavus Walk. (forte).

Caput thorace vix latius, clypeo apice medio haud inciso, mandibulis haud validis, peristomio parvo. Antennæ longe infra medium faciei protuberantis insertæ; articulo 1:o tenui testaceo, flagello haud duplo brevior, 2:o oblongo, 3:o vix conspicuo, 4:o sat magno sed funiculiculis articulis evidenter angustior, his sensim paullo brevioribus vix perspicue crassioribus. Thorax haud robustus, mesonoto sat fortiter subsquamoso-punctato, metathorace carina et plica minus distinctis. Alæ cellula basali et speculo nudis. Abdomen ablango-ovale, postpetiolo haud magno, ventre minus convexo. Pedes minus validi, coxis æneis, femoribus tibiisque flavis vel magis fuscis.

Mas differt: capite thoraceque viridibus, antennis flagello testaceo, filiformi, clava acuta, femoribus tibiisque pallidis.

Ej sällsynt.

- B) *Mandibulæ validæ, sinistra 3-dentata, dente basali haud lato. Vertex pone ocellos haud declivis.*

2. *D. acutus* m: Viridis, antennis scapo, femoribus tibiisque flavis: ♂ abdomine fascia basali pallida, antennis flagello testaceo, femoribus tibiisque stramineis. Long. 3—4 mill.

Species capite vertice pone ocellos haud declivi, medio cum temporibus et genis usque ad peristomium acutis; antennis nigris, scapo testaceo minus longo, articulo 2:o oblongo, 3:o parvo, 4:o sat magno sed funiculo arcte adpresso, hoc crasso, articulis crassitie æqualibus, sensim parum brevioribus, 5:o vix, 10:o evidenter transversus; metathorace punctato, carina media nulla; alis vitreis, apice haud ciliatis, cellula costali lata, stigmatum radio haud sesqui longiore; abdomine oblongo-ovato, subtus subdepresso, supra fasciis atropurpureis, postpetiolo viridipendente; pedibus gracilibus: ♂ antennis articulis 2:o longo, 3:o distincto, 4:o 5:o parum angustiore, 5—10 haud crassis, fere transversis, vix pilosulis, clava parva fusco-testacea optime distinguenda.

Sällsynt; funnen vid Lund.

Subgenus *Coclopisthus*.

Caput vertice et genis compresso-acutis latis. Antennæ flagello sat crasso, annellis haud parvis. Alæ vitreæ, apice haud ciliatæ, metacarpo radio brevior. Abdomen rotundum. Pedes sat validi.

Detta subgenus skiljes nästan endast på den runda abdomen ifrån *Dibrachys*, benen äro i allmänhet gröfre, båda annelli tydliga.

Foerster har afskilt några släkten från *Pteromalus*, men då han ej uppgifvit några typer, ej heller anmärkt de olika könen, så sväfvär man i ovisshet om, huruvida dessa genera äro grundade eller ej. *Peridesmia* är baserad på hannarne af *Meraporus*. *Pteromalus cephalotes* förenar alla de karakterer, som han uppgifvit för *Dibrachys*, *Coclopisthus* och *Diglochis*. Ty den eger det förstnämnda släktets väsendtliga karakter, en kort metacarpus och radius i förhållande till stigmat. Hjessan är starkt baktill urholkad och

annelli äro ovanligt utbildade såsom förhållandet skall vara med *Coelopisthus* och hannen har de utbildade kinderna, hvilka skola vara utmärkande för *Diglochis*.

A) Mandibula utraque 4-dentata. Facies inferne valde prominula.

1. *C. cephalotes*: Viridis, antennis annellis funiculi articulis fere conformibus, scapo pedibusque pro parte pallidis: ♂ temporibus postice angulato-prominulis. Long. 3—4 mill.

Pteromalus cephalotes Walk. (teste Reinhard).

Pteromalus deplanatus Nees (forte).

Caput thorace fere latius, occipite excavato, genis compresso-acutis, pone oculos vix angustatum, peristomio parvo. Antennæ longe infra oculos fronti valde prominulæ insertæ; articulo 1:o longo flavo, 2:o oblongo, 3:o haud parvo, 4:o vix transverso, 5—10 crassitie æqualibus, sensim brevioribus clava parva. Thorax fere glaber, subtiliter punctatus; collari medio acuto ibique angustiore; metathorace punctato, haud brevi, vix declivi, carina et plica arcuata instructo. Alæ stigmatē tenui metacarpo sesqui longiore. Abdomen thorace fere latius, postpetiolo apice late rotundato, subtus paullo convexo. Pedes sat validi, coxis æneis, femoribus tibiis magis minusve fuscis.

Mas differt: capite temporibus angulatum productis, thoraceque lætius viridibus, antennis flagello vix pilosulo paullo dilutiore.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland; utkläckt ur *Liparis Salicis*.

B) Mandibula sinistra 3-dentata, dente basali truncato.

2. *C. vitripennis* m: Æneus, antennis scapo femoribus tibiisque rufescentibus: ♂ mesosterno ante coxas intermedias fasciculato-piloso. Long. 4 mill.

Præcedenti alis, abdominis forma, metathoracis punctura et genis compressis affinis; sed major, facie inferne minus prominula, antennis flagello crassiore, annellis sat magnis sed funiculo arcte adpressis, mesonoti sulcis ad medium usque distinctis, alis cellula costali lata, stigmate radio vix longiore, pedibus pro portione minus validis et magis rufescentibus: ♂ antennis flagello testaceo, articulis longioribus pilosulis, abdomine ovali-rotundo, postpetiolo fascia pallida, femoribus tibiisque flavis, mesosterno ante coxas fasciculato-piloso mox discedens.

Sällsyntare än föregående.

Genus *Metopon* Walk.

Caput magnum thorace latius, genis sat buccatis, haud vel vix compressis; oculis glabris, clypeo haud discreto, apice medio sæpius emarginato vel bidentato, facie plana vel parum convexa; mandibulis 3-dentatis, sæpe validis subforcipatis. Antennæ fere in medio faciei insertæ, basi parum distantes, annellis sæpe distinctis, flagello ♀ apicem versus fortiter incrassato fere clavato vel lineari, ♂ funiculi articulis discretis sæpius pilosis vel verticillato-pilosis. Thorax crassus, pronoti collari medio acuto haud lato, scutello convexo, metathorace haud brevi, declivi, interdum costula transversa, plerumque plica instructo. Alæ stigmate haud lato radio parum longiore, hoc clava parva vel mediocri, metacarpo haud brevi; cellula basali interdum pubescenti. Abdomen rotundum, vel oblongum compressum, postpetiolo haud magno. Coxæ posticæ parvæ subovatae, margine postico basi haud pubescenti.

De få arter som höra till detta släkte skiljas väsendtligen genom mandiblerna, som båda äro 3-tandade, ofta starka nästan nåbbformigt utskjutande. Hufvudet är bredare än thorax, hjessan ej skarpkantad, ansigtet platt eller föga utskjutande; ögonen temligen stora, ej ludna, kinderna ganska breda; clypeus ej afsatt, i spetsen emarginerad eller beväpnad med 2 tänder. Antennerna äro fästade i midten af ansigtet eller föga nedom midten, aldrig i linje

med ögonens nedre kant; skäftet ej starkt, annelli oftast tydliga; utåt spetsen äro de hos honan antingen starkt incrasserade nästan klubblika, eller stundom trådformiga, hos hannen äro strängens leder tydligt åtskilda stundom kranshåriga. Thorax är robust, pronoti collare åtminstone i midten skarpkantadt; mesonoti sulci ej djupa, scutellen kullrig, dorsellum liten; metathorax nedsluttande, ej kort, stundom puncterad, oftast med plica någongång med tvärribba. Vingarne hafva stigmat ej incrasseradt, obetydligt längre än radius, hvars klubba är liten eller medelmåttig, metacarpus ej särdeles kort, basalfältet stundom pubescent. Abdomen är antingen rund eller hoptryckt hos honan, 1:a segmentet ej långt, glatt, 2:a medelmåttigt eller åtminstone ej ovanligt stort i förhållande till de följande. Benen hafva höfterna på sista paret små, äggformiga, på yttre sidan vid basen ej pubescenta.

Släktet *Spintherus* har äfven 3-tandade mandibler, men öfverstämmer närmast med *Habrocytus* i formen af metathorax och skiljes från *Metopon* genom hufvudet, som är afsmalnande framåt med långa ej utspända kinder och ej bredare än thorax.

Conspectus subgenerum.

- A) Antennæ ♀ fortiter incrassatæ, subclavatæ, maris verticillato-pilosæ. *Metopon*.
- B) Antennæ ♀ flagello crassitie æquali, maris pubescentes vel densius breviter pilosæ. Abdomen ♀ rotundum. *Dirhienus*.

Subgenus *Metopon*.

Psilocera Walk. *Eupsilocera* Westw. *Dichalysis* Foerst.

Caput clypeo apice emarginato-bidentato, genis pone mandibulas sæpe fovea impressa, his validis acute 3-dentatis, dente apicali forcipato. Metathorax declivis, haud brevis, costula sæpius instructus. Abdomen oblongum sæpe compressum, valvula ventrali sæpe medium superante. Antennæ ♀ flagello fortiter incrassato, clava subtus apice oblique truncato, maris filiformes, verticillato-pilosæ.

Från öfriga släkten skiljes *Metopon* genom antennerna, som hos ♀ äro starkt tilltjocknande mot spetsen; hos ♂ försedda med kransvis utstående hår.

Spintherus har väl äfven 3-tandade mandibler, men dessa äro svagare, hufvudet afsmalnande nedåt, med långa ej urholkade kinder, antennerna normala och kroppsbyggnaden i öfrigt närmast öfverensstämmande med *Habrocytus*.

Ann. Foerster uppgifver annelli vara 3 och äfven Walker har i sitt sista arbete afbildat en art som typ, hvilkas 3—5 antennleder äro små ringformiga, men i Entom. Magaz. omnämner han ej detta förhållande. Möjligen finnes någon mig obekant art, hvars 5:te led är ringformig, och på hvilken Foerster baserat sitt genus.

A) Fovea genalis distincta. Abdomen ♀ compressum, valvula ventrali medium longe superante. Alæ angustæ, abdominis apicem ♀ vix attingentes.

1. *M. crassispina*; Niger, parum æneo-micans, calcari postico crasso subarcuato, antennis basi, tibiis, interdum femoribus flavis, maris fusco-nigris, hoc clavæ articulo 1:o libero. Long 3—4 mill.

Caput thorace paullo latius, pone oculos angustatum, vertice haud angusto, ocellis minus elevatis in lineam curvam dispositis; oculis magnis, glabris, oblongo-ovatis, genis subbuccatis, versus peristomium haud latum rotundato-angustatis, subcompressis, pone mandibulas testaceas externe sinuatas fovea excavatis; facie haud prominula, superne leniter olivaceo-ænea, crebre et subtilius haud squamoso-punctata, fusco-pubescenti, supra clypeum spatio rotundo fere lævigato, hoc crebre strigoso, vix transverso, superne haud discreto, apice bidentato-plicato. Antennæ haud longæ sed crassæ, paullo infra medium, sed supra lineam ocularem insertæ, basi fere contiguæ, articulis 4 primis læte flavis, articulo 1:o lineari, recto, 2:o 5:o brevior, 3—4 sequenti arcte contiguis, transversis, 5—10 sensim brevioribus et multo latioribus, 5:o haud, 10:o fortiter transverso, clava magna postannello longiore. Thorax brevis, crassus, niger supra pilosellus vix, lateribus leniter olivaceo-æneus; pronoti collari medio angusto, lateribus dilatatis; mesonoti sulcis supra medium distinctis, scapulis

medio fere lævibus, dorso crebre squamoso-punctato, latitudine basali duplo brevior; scutelli sutura utrinque minus sinuata, convexo crebre et sat fortiter punctato, apice declivi, dorsello angusto; metathorace haud brevi, declivi, coeruleo-nigro, minus distincte punctato, costula ante medium et plica abbreviata instructo, ante nucham distinctam subglobosam constricto, sulco spiraculari profundo minus lato, spiraculis sat magnis subrotundis, calli fimbria densa et longa. Alæ breves et angustæ, apicem vix attingentes, hyalinæ, interdum sub stigmate subfumatæ, hoc haud crasso quam costa brevior, radio clava distincta quam stigmate paullo brevior, metacarpo fere stigmatis longitudine, præstigmate curvato radio brevior, cellula costali sat lata, speculo distincto. Abdomen thorace angustius, parum longius, compressum, splendens, fere aureo-micans, parum pubescens, segmentis 1:o in nucha suboculto, 2:o trientem occupante, 3—6 sensim brevioribus, 7—8 parce pilosis haud transversis; ventre carinato, valvula ventrali trientem apicalem attingente. Pedes flavi, sat validi, coxis parvis, posticis subovatis, æneis, femoribus interdum fusco-æneis, tibiis posticis calcari sat brevi sed crasso subcurvato; tarsis articulis 1—3 sensim brevioribus, 4:o abrupte minore. Pectus lateribus punctatis, epinemiis distinctis, præsternis parvis, episternis lævibus.

Mas differt: pedibus fere totis fuscis, antennis scapo concolore vel subtus obscure piceo-rufo, haud dilatato, pedicello transverso, annellis vix conspicuis, funiculi articulis 1—7 pilis exsertis verticillatis, sensim brevioribus, singulo a sequentibus isthmo discreto, 1:o latitudine sua fere duplo longior, 7:o transverso, clava parva subsolida, articulo 1:o nempe libero; tibiis posticis calcari tenuiore subrecto; abdomine late ovali supra depresso, haud splendente, subcupreo, subtus leviter convexo, plica vix conspicua, postpetiolo haud connato, petiolo paullo longior.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

2. *M. concolor*: Nigrum, vix æneo-micans, genubus, tibiis apice tarsisque basi obscure testaceis: ♂ antennis clavæ articulo 1:0 libero. Long. 3 mill.

Præcedenti statura et colore simillimum, sed fere duplo minus, antennis brevioribus, basi haud flavis, pedibus fere totis nigro-fuscis, metathorare nucha brevior, haud punctata, costula vix conspicua, abdominæ minus micante et compresso, mesothorace crebrius et subtilius punctato: ♂ antennis funiculi articulis brevioribus, 1:0 latitudine sua vix longiore, 7:0 fortiter transverso optime distinguendum.

Sällsynt; funnen på sandfälten vid Degeberga i Skåne och på Öland.

3. *M. punctifrons*; Nigrum, subcoeruleum, capite thoraceque fortiter concinne punctatis, antennis basi, femoribus tibiisque rufo-testaceis, ♂ nigro-fuscis, hoc clava subsolida. Long. 2—3 mill.

Species a præcedentibus capite præsertim fronte thoraceque fortius magis concinne punctatis, alis hyalinis, tibiis posticis calcari parvo recto: ♀ antennis annellis distinctis, ♂ funiculi articulis tantum 6 verticillato-pilosis bene distincta.

Sällsynt; funnen vid Båstad i Skåne.

- B) Caput vertice lato, genis buccatis, fovea nulla pone mandibulas. Alæ hyalinæ, radio curvato, apicem abdominis superantes, hoc valvula brevi.

4. *M. grandiclava*: Obscure virescens, antennis clava funiculo longitudine æquali femoribusque fuscis, basi tibiis tarsisque testaceis, alis hyalinis radio sat curvato. ♀ Long. 2 mill.

Pteromalus grandiclava Walk. l. c. III. 193. 86.

Species a præcedentibus colore olivaceo-viridi, antennis annellis vix conspicuis, clava maxima funiculo longitudine æquali, hoc articulo 1:o fere quadrato, 2--6 transversis sensim latioribus; genis fovea pone mandibulas vix impressa; pronoti collari medio paullo latiore: metathorace punctatissimo, carina fere nulla sed plica distincta, costula nulla; alis longis radio curvato; abdomine basi viridi-splendente ovato, subtus convexo sed haud compresso, valvula ventrali medium haud attingente mox discedens.

Sällsynt; ett exemplar är funnet vid Lindholmen i Skåne af Doctor G. F. Möller.

Anm. Möjligen passar Foerstes *Pt. claviger* bäst på denna art.

5. *M. punctatum*: Viride, antennis scapo concolore, clava funiculo duplo brevior, pronoti collari sat lato, bene discreto, genubus et tibiis testaceis, medio late fuscis.
♀ Long. 2 mill.

Præcedenti statura, metathoracis spiraculis parvis ovalibus, sulco nullo, capite pone oculos haud angustato, clypeo apice emarginato affine, sed paullo majus, mesonoto ante scutellum parcius sed fortiter squamoso-punctato, collari latiore margine antico acuto, postice polito, mandibulis minus validis, antennis fuscis, scapo obscure viridi fere ocellum anteriorem superante, flagello sat incrassato sed clava subtus excavata funiculo vix duplo longiore, anello 2:o bene distincto pedumque colore obscuriore certe distinctum.

Sällsynt; funnen vid Reften nära Lund.

6. *M. æneiscapus* m: Obscure virescens, mesonoto ante scutellum crebre subtilius punctato. ♀ Long. 2 mill.

Species præcedenti simillima, sed paullo minor, antennis scapo brevior, ocellum anteriorem haud attingente,

mesonoti sculptura subtiliore, tibiis fere totis fuscis tantum discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

Anm. På de till sista afdelningen hörande arter har jag ej kunnat se mandiblernas byggnad, men jag har ställt dem här på grund af antennernas form.

Subgenus **Dirhicus**.

Caput vertice haud lato, genis buccatis, rarius compressis, scrobe antennali haud vel parum discreta. Antennæ ♀ apicem versus haud clavato-incrassatae, ♂ breviter densius pilosellæ, annellis plerumque discretis. Pronotum collari medio haud lato sed sæpissime margine antico acuto; metathorax haud brevis, punctatus, spiraculis rotundis, costula nulla, plica perumque instructus. Alæ radio subcurvato. Abdomen ♀ rotundum, ♂ breviter ovale, segmento 3:o cum 2:o haud connato.

Detta slägte skiljes hufvudsakligen från föregående genom antennerna, hvilka hos ♀ äro fina, ej klubblikt incrasserade mot spetsen, hos ♂ ej kranshåriga; metathorax saknar tvärribba, men är försedd med en fälla vid sidorna, som ofta räcker ända till spetsen, nuchan är föga utbildad; abdomen är hos ♀ rund, ej kölförmigt hoptryckt, hos ♂ kort oval.

A) Antennæ flagello tenui. Mesonoti sculptura tenuis.

1. *D. subcoeruleus* m: Æneo-coerulescens, antennis scapo pedibusque maxima parte pallidis, ♂ obscuris, metathorace punctulato, plica integra fere recta. Long. 2—3 mill.

Statura fere *Coelopisthi*. Caput thorace paullo latius, parum pubescens, subtiliter punctatum, pone oculos subangustatum, genis teretibus, buccatis, sat longis, vertice angusto, ocellis magnis rufis in arcum dispositis, clypeo haud discreto, apice emarginato-truncato, peristomio haud lato; mandibulis minus validis, evidenter 3-dentatis,

dente apicali minus forcipato, externe parum sinuatis, oculis sat magnis subovatis. Antennæ fuscæ sat longæ, haud validæ, fere in medio faciei leniter convexæ insertæ; articulis 1:o testaceo, ocellum anteriorem attingente, pedicello æneo subtriangulari, 3—4 parvis sed bene discretis, 5—10 crassitie plane æqualibus, 5:o crassitie sua evidenter longiore, 10:o subtransverso, clava distincte articulata, acuminata, quam præclava fere triplo longiore. Thorax crassus, subcoeruleus, haud pilosulus, subtiliter dense, haud squamoso-punctatus; pronoti collari margine acuto, medio angusto, latera versus sat ampliata; mesonoti sulcis distinctis sed medium haud attingentibus; scutello convexo, freno declivi, dorsello angusto; metathorace parum declivi punctulato, sulco spiraculari nullo, carina vix conspicua, plica ad apicem usque producta, vix nisi postice arcuata, spiraculis haud parvis rotundis, calli fimbria distincta sed minus densa et longa. Alæ hyalinæ; speculo distincto, radio subcurvato, clava distincta, quam stigmate paullo brevior, hoc metacarpo vix longiore. Abdomen rotundum, æneum, postpetiolo apice truncato, late viridi; ventre parum convexo. Pedes ferruginei, coxis subcyaneis, posticis parvulis ovato-compressis, femoribus fuscis, calcari postico parvo. Mesosternum punctatum, episternis triangularibus lævibus; præsternis parvis.

Mas differt: antennis scapo fere toto metallico, pedicello brevior, flagello ♀ conformi sed paullo tenuiore et pilis brevibus parce ornatis, abdomine rotundo-ovali, disco medio late cupreo, tibiis fere totis fuscis.

Temligen allmän i medlersta och södra Sverige.

2. *D. heterotomus* m: Æneo-viridis, antennis infra medium faciei convexæ insertis, postannello ♀ parvo, basi pedibusque fere totis pallidis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti statura, magnitudine, sculptura subtilissima scutelli simillimus, sed viridi-æneus, antennis in linea

infera oculari insertis, pedicello pallido longiore, postannello quam articulo sequente subtransverso fere duplo angustiore et brevior, femoribus medio subinfuscatis: ♂ antennis flagello fusco-testaceo, postannello magno, scapo flavo; facie præcipue feminae punctis parce impressis bene distinctus.

Sällsynt: funnen vid Lund.

3. *D. sublaevis* m: Subcyaneus, pedibus crassis, antennis fuscis, basi pedibusque flavis, femoribus medio fuscis ♂♀. Long. 3—4 mill.

Statura omnino *D. subcoerulei*, sed adhuc crassior, capite genis magis buccatis, facie latiore fere plana, peristomio majore: antennis annellis bene discretis, flagello fusco-testaceo, pedicello longiore; thorace subtilissime punctato, metathorace medio punctulato, lateribus lævi, plica medium haud superante; collari medio haud acuto, metacarpo quam radio vix longiore; pedibus validis, tibiis anticis compresso-clavatis, intermediis margine interno sinuatis; ♂ antennis ♀ conformibus sed flagello testaceo parce breviter pilosello, abdomine plica distincta, subovali disco æneo distinctus.

Temligen sällsynt i medlersta och södra Sverige.

4. *D. subincrassatus* m.: Cyaneus, antennis basi pedibusque maxima parte pallidis, flagello ♀ lenissime incrassato, metathorace plica nulla. ♂♀ Long. 3 mill.

D. sublaevi simillimus, sed paullo minor et lætius cyaneus, antennis flagelli lenissime incrassati articulis brevioribus, metathorace medio crebrius et concinne punctato, plica tantum fovea basali indicata; ♂ flagelli fusci articulis brevioribus certe discedens.

Sällsynt; jag har endast funnit den på Öland.

B) Antennæ flagello crasso, articulis cylindricis. Thorax fortius punctatus.

5. *D. magnicornis* m: Viridi-æneus, antennis longis, basi pedibusque flavo-testaceis, ventre et macula disci interdum concoloribus. Long. 3—4 mill.

Species antennarum structura ab omnibus mox discedens. Caput vertice minus tereti; facie convexiuscula, crebre fortiter punctata, genis subcompressis, mandibulis validis, apice forcipato, externe sinuatis, clypeo apice medio late emarginato, peristomio haud magno. Antennæ in medio faciei insertæ, scapo testaceo, lineari, ocellum attingente, pedicello postannello brevior, annellis minimis, flagello crassitie æquali scapo triplo longiore, articulis ovali-cylindricis, clava fere solida præclava fere duplo longiore. Thorax sat crassus, fortiter crebre subrugoso-punctatus, pronoti collari medio angusto margine acuto, scutello convexo, freno fere discreto; metathorace haud brevi, declivi, punctato, carina vix vel parum elevata, plica brevi medium haud attingente. Alæ sat magnæ hyalinæ, radio subcurvato clava majuscula, quam stigmate fere longiore, metacarpo stigmate longiore, cellula costali sat lata, basali fere pilosula, speculo distincto. Abdomen rhombo-rotundum, æneum, postpetiolo medium occupante, ventre sæpe, interdum macula discoidali etiam rufescentibus. Pedes sat graciles rufo-testacei, coxis basi vel totis æneis, femoribus interdum basi fuscis.

Mas differt: antennis haud longioribus sed funiculi articulis bene discretis, pilis sat longis dense vestitis, scapo æneo et pedicello brevioribus, abdomine ovali plica distincta.

Sällsynt i södra, mindre sällsynt i norra Sverige.

Anm. Innan jag afslutar denna subtribus vill jag omnämna *Pteromalus abnormis* Bhn, hvars plats i systemet jag ej kunnat med någon visshet uppgifva, då mandiblerna ej blifvit undersökta. Måhända står den närmast *Trichoglenus*.

Pteromalus abnormis: Viridis, nitidus, sublævis, fronte antice lineola impressa, antennis crassis, basi pedibusque maxima parte flavis; ♂ antennis femoribusque totis flavis, alis medium abdominis haud superantibus. Long. 2 mill.

Pteromalus abnormis Bhn. Öfvers. af Vet. Acad. förh. XV. pag. 58.

Species statura fere *Isocyrti submarginati*. Caput thorace latius, pone oculos haud angustatum, vertice sat lato, medio marginato; genis subbuccatis, vix compressis, sulco nullo; ocellis haud magnis, in arcum fere dispositis; oculis magnis, glabris, ovato-rotundis, sat convexis; fronte superne fere lævi et ante ocellum sulculo impresso; scrobe parum distincta; facie infra medium protuberante, epistomate leniter elevato; clypeo apice haud inciso; peristomio parvo; mandibulis pallidis, haud validis, tuberculo basali distincto, margine laterali recto, dentibus parvis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, basi parum distantes, breves, crassæ, fuscæ, articulo 1:o flavo ocellum haud attingente, 2:o subtriangulæ, 3—4 vix conspicuis, 5—10 crassitie æqualibus, omnibus transversis, arcte contiguis, clava brunnea apice vix acuminata mediocri. Thorax brevis, crassus fere glaber; collari medio haud angusto, sat bene discreto; mesonoto nitido, subtiliter vix squamoso-punctato, sulcis distinctis medium attingentibus; scutello convexo, fere lævi, dorsello angusto, sutura utrinque minus sinuata; metathorace haud declivi, brevi, punctatissimo, carina media et plica integra distinctis, nucha fere nulla, calli fimbria minus densa. Alæ apicem abdominis longe superantes, hyalinæ, speculo distincto, cellula costali haud lata, stigmatæ tenui, radio vix longiore, hoc subrecto clava parva quam metacarpo paullo brevior. Abdomen thorace fere latius, ovato-rotundum, supra planum, subtus leviter convexum; segmentis 1:o transversis, 2:o trientem occupante, 3—6 transversim linearibus fere glabris. 7—8

paullo longioribus, pilosulis. Pedes sat validi, testacei, coxis æneo-coeruleis, femoribus fere totis fuscis. Mesosternum punctatum, episternis triangularibus lævibus bene discretis; præsternis parvis.

Mas differt: corpore supra magis nitido, thorace fere aureo, abdomine ovali-rotundo, plica nulla ventrali, antennis conformibus, haud pilosis, flagelli articulis flavis magis discretis, clava breviori, femoribus totis flavis.

Fünnen i Luleå Lappmark af framlidne Prof. Boheman, som erhöill några exemplar utkläckta ur svalbon, troligen ur någon Dipterpuppa.

Subtribus *Diparides*.

Caput fere globosum, palpis brevibus. Antennæ longæ, tenues, medio faciei insertæ. Thorax longus pronoto magno, sulcis mesonoti longis vel fere integris. Alæ stigmatè tenui quam radio longiore, hoc clava parva, cellula costali valde angusta. Abdomen petiolo haud transverso rufo. Pedes graciles, coxis subcylindrices rufis, tibiis posticis 1-calcaratis.

Denna afdelning skiljes lätt från alla föregående genom de långa, cylindriska höfterna, hvilka liksom abdomens petiolus äro röda, denna sednare ej transversel; hufvudet är nästan klotrundt, antennerna fina med långt skaft; vingarnes radius jemförelsevis kort, costalcellen smal; kroppen i allmänhet spenslig.

Conspectus generum.

- A) Petiolus coxis posticis brevior. Antennæ ♂ haud verticillato-pilosæ. *Panstenon*.
- B) Petiolus linearis, coxis longior. Postpetiolus maximus. Antennæ flagelli articulis liberis, parce verticillatis. *Dipara*.

Genus *Panstenon* Walker.

Pteromalus Nees.

Corpus viride, supra squamoso-punctatum. Pronoti collari medio acuto, sulcis mesonoti medium superantibus,

metathorace rugoso. Abdomen petiolo coxis posticis brevior. Antennæ annellis bene discretis, flagello filiformi, ♂ vix pilosello.

Detta slägte, som bildar en öfvergång till *Cleonymides* och äfven till Eulophiderna skiljes från följande såväl genom antennernas byggnad som äfven genom kortare petiolus.

1. *P. assimilis*: Viridis, antennis scapo pedibusque rufis, metathorace rugoso. Long. 2—3 mill.

Pteromalus assimilis Nees l. c. 116. 31. (verosimiliter).

Panstenon oxylus Walk. Mon. Chalc. I. 196.

Pteromalus omissus Foerst. l. c. 30. 257.

Statura elongata fere *Stenomali muscarum*, viridis, supra fere glaber, nitidus. Caput thorace fere latius, antrosum subangustatum, transversum, pone oculos vix angustatum, vertice sat lato, medio tereti, ocellis fere in triangulum dispositis; facie convexa, confertim punctata, clypeo subquadrato, sat discreto, apice truncato; mandibulis haud validis, brevibus, genis oculorum diametro brevioribus, sulco distincto, his glabris, sat magnis et prominulis, ovato-triangularibus. Antennæ faciei alte insertæ, basi paullo distantes, tennes nigro-fusæ; articulo 1:o lineari, haud in scrobe recepto, ocellum superante, testaceo, 2:o oblongo, 3—4 parvis sed bene discretis, 5—10 crassitie æqualibus, sensim paullo brevioribus, haud contiguis, 5:o cylindrico, 10:o fere transverso, vix pilosellis, clava parva apice obtusa. Thorax longus, viridis, supra sat fortiter crebre punctatus; pronoto superne inspecto haud transverso, collari medio bene discreto haud angusto; mesonoti sulcis tenuibus, distinctis, medium saltim attingentibus, scutello convexo, apice declivi, dorsello haud angusto; metathorace haud transverso, fortiter rugoso, carina et plica haud discretis, calli fimbria sat densa. Alæ longæ et angustæ, totæ pubescentes, ciliatæ, cellula costali an-

gustissima, costa stigmatē vix longiore, hoc metacarpo paullo longiore, tenui, radio sub angulo sat acuto egrediente, clava tenui, quam stigmatē triplo breviorē. Abdomen fere glabrum, ovale, lætē viride, ventre interdum rufescente, subtus parum convexum; segmentis 1:o rufo subrugoso, 2:o trientem saltem occupante fovea nulla, 3—8 æqualibus, ultimis angustioribus, terebra haud exserta. Mesosternum punctatum, episternis lævibus sutura anteriore subcurvata, metapleuris et præsternis magnis punctatis. Pedes graciles toti testacei.

Mas differt: antennis flagello pilosello, clava longiore acuminata, pedicello et abdomine breviorē hoc apice obtuso.

Sällsynt; funnen på fuktiga ängar vid Lund.

Genus *Dipara* Walker.

Caput scrobe antennali brevi sed profunda. Antennæ longæ, maris verticillato-pilosæ, articulis 4—13 æqualibus. Thorax scapulis discretis, metathorace subrugoso-punctato. Alæ postcosta 4—5 setosa, stigmatē radio fere longiore. Abdomen petiolo longo lineari. Corpus vix metallicum.

Detta släkte som i kroppsform och vingar står närmast *Panstenon*, skiljes lätt genom lång petiolus, långa håriga antenner, genomgående färor på mesonotum, afsatt frenum och föga metallglänsande kropp. Det bildar en vacker öfvergång till *Mymarides*, men har tydligt utbildade stigma, radius och metacarpus samt antennerna fästade på afstånd från ögonen.

1. *D. petiolata*: Nigra, vix coeruleo-micans, antennis scapo, petiolo pedibusque rufo-testaceis, femoribus et tibiis posterioribus interdum fuscis ♂. Long. 2—3 mill.

Walk. l. c. I. 373.

Statura gracilis, parum punctata, fere glabra, nigra vix subcoeruleo-micans. Caput thorace fere latius pone oculos subangustatum, vertice lævi, ocellis fere in trian-

gulum dispositis, facie convexa, clypeo sat discreto, oculis subrotundis, parum prominulis, mandibulis haud validis, genis vix buccatis. Antennæ corpore paullo longiores, nigrae, gracillimæ, basi paullo distantes, articulo 1:o testaceo, lineari, ocellum anteriorem superante, 2:o triangulari, subdilatato, 3:o minimo sed distincto, 4—10 crassitie fere æqualibus, sensim fere longioribus, ovali-linearibus, pilis exsertis parce verticillatis. Thorax longus, gracilis, pronoto magno, collari bene discreto, haud angusto, latera versus dilatato, margine anteriore acuto; mesonoto minus perspicue punctato, sulcis fere cum scutelli continuatis; scutello convexo, freno discreto, declivi, metathorace vix transverso, crebre fere rugoso-punctato. Alæ longæ, amplæ, longius ciliatæ, costa stigmatate fere brevior, cellula costali valde angusta, postcosta 4—5 setosa, radio brevi crasso, metacarpo hoc duplo longiore. Abdomen petiolo rufo longo lineari, reliquis segmentis vix brevior, 2:o maximo lævi, fovea basali nulla, 3—8 retractis. Mesosternum punctulatum, mesopleuris vix sutura divisus, præsternis sat magnis. Pedes graciles rufi, tibiis posterioribus interdum etiam femoribus fuscis.

Sällsynt i Skåne; ett exemplar är funnet i Juni vid Tvedöra af Doctor G. F. Möller, ett annat har jag påträffat vid Mölle fiskläge.

Sectio secunda MICROCENTRI.

Tibiæ anticæ calcari brevi, tenui, recto. Tarsi 4-articulati, rarissime 5- vel 3-articulati. Oculi sæpe hirtuli. Mandibulæ 2- vel 3-dentatæ, haud validæ. Palpi breves, labiales exarticulati. Antennæ funiculo plerumque 3—4, rarissime 5—6 articulato, annellis rarius distinctis. Alæ superiores costa stigmatate lineari tenui haud longiore, radio et metacarpo brevibus, hoc interdum nullo. Abdomen plerumque subsessile. Thorax collari rarius discreto, mesonoto sæpe sulcis integris, scutello interdum lineis late-

ralibus impressis, axillulis sæpe magnis, dorsello plerumque magno.

Denna andra afdelning af Pteromalinerne, som motsvarar i det närmaste *Entedon* Dalman, omfattar alla tetramererna och 2 släkten, som förut räknats till pentamererna, men hvilka öfverensstämma med de öfriga i den korta, raka sporren på framtibierna och den ej sinuerade metatarsus på frambenen. Kroppen är i allmänhet spenslig och af mindre fast konsistens än hos *Macrocentri*, hufvud och abdomen efter döden ofta infallna, sculpturen merendels svagare, starkast framträder den hos *Entedon*. Hufvudet har oftast smal hjessa, ögonen äro ej sällan ludna, pannfårorna ofta djupa men mindre markerade; clypeus sällan afsatt, ofta i spetsen helbräddad, sällan med inskärning i midten, stundom tandad såsom hos *Tetrastichus*; kinderna merendels smala ej skarpkantade; mandibeln äro ej starka, spetsen 2- eller 3-tandad, båda likformiga; labialerna fåledade, labialpalperna oledade. Antennerna äro typiskt 9-ledade, oftast fästade nedom midten af ansigtet, som är plattadt eller intryckt; skaftet är temligen långt, pedicellus merendels kort, annelli nästan utan undantag reducerade till en led, funiculus bestående af 2—4 leder, den sista ofta slutande sig tätt till klubban, som stundom har fria leder, den sista någongång med ett borst i spetsen. Thorax har pronotum ofta starkt utbildadt, collare någongång afsatt, men smalt; mesonotum har scapulæ ej sällan tydligt afsatta, fårorna någongång baktill gropformiga; scutellen har stundom intryckta dorsal-linjer, som löpa parallelt med fårorna; dorsellum oftast starkt utveckladt; metathorax ofta med midtelköl stundom äfven med plica och costula. Vingarne hafva i allmänhet costan kortare än stigmat, som ej är incrasseradt, radius och metacarpus nästan utan undantag korta, den sednare stundom försvunnen såsom hos *Tetrastichus*; postcostan har i allmänhet färre borst än pentamererna, præstigmat är oftast kort äfvensom tvärnerven. n. spurius utgående från midten af cubitus. Abdomen har oftast petiolus kort, terebran någongång utskjutande öfver abdomens spets. Mesosternum har nästan alltid delade mesopleura, præsterna oftast starkt utbildade. Benen äro i allmänhet spensliga, tarsernas leder nästan lika långa.

Conspectus tribuum.

A) Antennæ multi-articulatæ, funiculo 6-articulato. Tarsi ♀ pentameri.
Tetracampina.

B) Antennæ ad summum 9-articulati. Tarsi 4- vel 3-articulati.

- a) Tarsi 4-articulati.
- b) Pronotum magnum. Scutellum setis 4, 2 antice et 2 ante apicem instructum. Alæ præstigmatæ haud fracto, metacarpo distincto, postcosta setis pluribus ornata. Tibiæ posticæ interdum 2-calcaratæ.
- c) Abdomen sæpius petiolo distincto. Scapulæ bene discretæ. Antennæ infra medium insertæ, ♂ simplices. *Elachistina*.
- cc) Abdomen petiolo vix conspicuo, transverso, lævi. Scapulæ haud discretæ vel sulcis tenuibus.
- d) Coxæ posticæ maximæ valde compressæ. Caput semiglobosum, fronte parce fortiter punctata. Antennæ ♂ flabel-latæ. *Elasmina*.
- dd) Coxæ posticæ normales. Alæ metacarpo et radio haud brevibus. *Eulophina*.
- bb) Alæ præstigmatæ fracto, cellula costali angusta radio et metacarpo brevibus, hoc interdum nullo. Tibiæ posticæ calcar singulo. Antennæ ♂ simplices.
- e) Alæ postcosta bisetosa vel pictæ. Metapleura minima. Scutellum medio 2-setosum. *Entedonina*.
- ee) Alæ postcosta 1- 5-setosa. Metapleura triangularia haud parva. Metacarpus plerumque nullus. Scutellum postice 4-setosum. Corpus interdum haud metallicum. Scutelli sutura utrinque valde angulatim sinuata, sæpe lineis 2 dorsalibus impressis. Abdomen sessile. *Tetrastichina*.
- aa) Tarsi 3-articulati. Alæ pube in series plures distributa. *Trichogrammina*.

Af dessa grupper äro *Trichogrammina* lätt kända genom vingarnes behåring, som är ordnad i flera rader samt genom 3-ledade tarser; *Elasmina* med endast ett slägte skarpt skilda genom de enorma bakhöfterna och det halfrunda hufvudet med gles och grof punctur. *Tetracampina* med 2 släkten, som lätt skiljas genom 6-ledad antennsträng och 5-ledade tarser hos honan. De båda grupperna *Elachistina* och *Eulophina* hafva båda starkare utbildad radius och metacarpus än *Entedonina* och *Tetrastichina*, præstigmat är ej afbrutet vid postcostan, som alltid har flera borst, liksom 2 par dylika finnas på scutellen, 1 par vid basen det andra straxt före spetsen, costal-fältet är i allmänhet bredare, pronotum starkare utveck-

laddt. *Elachistina* har skarpt marquerade sulci mesonoti, scutellen oftast försedd med dorsal-linjer, dess sutur rak eller föga böjd på sidorna, antennerna hos ♂ ej greniga, metathorax utan fält, abdomen med tydlig petiolus. *Eulophina* har ofta greniga antenner hos ♂, dess scapulæ äro ej afsatta eller ock äro sulci mycket fina, abdomens skaft ej tydligt. *Entedonina* och *Tetrastichina* öfverensstämma deri att vingarnes costal-fält är smalt, postcostan ej jemnt bågliket öfvergående i præstigmat utan afbruten liksom vingarnes framkant ej är fullkomligt rak; deras pronotum är mindre, antennerna ej greniga hos hannen, bakbenens tibier med endast 1 sporre. Från *Tetrastichina* afviker gruppen *Entedonina* genom alltid metallisk kropp, stundom grof sculptur på thorax, oftast tydlig petiolus, ej så skarpt vinkelformigt böjd sutur på scutellen, oftast utvecklad metacarpus, 2 borst på midten af scutellen ock 2 på postcostan; endast *Astichus* gör undantag men skiljes dels genom fläckiga vingar dels genom de små metapleura, som är den säkraste karakteren för gruppen.

Tribus Tetracampina.

Caput antrorsum angustatum, oculis magnis, clypeo apice truncato, mandibulis bidentatis. Antennæ funiculo 6-, clava 3-articulata. Thorax longus, pronoto haud transverso, collari haud discreto; scapulis discretis. Scutello lineis dorsali nullis, sutura fere recta. Alæ angustæ, radio brevi, cellula costali angusta, metacarpo longo sed stigmatе breviorе. Abdomen subpetiolatum, subtus convexum. Pedes graciles, coxis longis, tibiis posticis 1-calcaratis, tarsis ♂ 5-articulatis. Corpus viride.

Denna grupp skiljes lätt från alla följande genom de mångledade antennerna. Den bildar sålunda öfvergången å ena sidan till *Eupelmus* och *Trigonoderus*, å andra sluter den sig mycket nära till *Elachistus*.

Conspectus generum.

- A) Mesopleura haud divisa. Sulci dorsi et dorsuli continui.
Tarsi ♂ 4-articulati. *Tetracampe*.
- B) Mesopleura divisa. Sulci dorsi et dorsuli haud continui.
Alæ ♂ stigmatе maximo, nigro, oblongo-ovali.
Platynochilus.

Genus **Tetracampe** Foerster.**Epiclerus** Hal.

Caput vertice sat lato. Antennæ scapo ♂ dilatato. Thorax scutello lævi, sulcis dorsi et dorsuli continuis. Alæ fere totæ pubescentes, longæ, haud latæ, metacarpo stigmatæ brevioræ, hoc radio fere triplo longioræ. Abdomen subpetiolatum, postpetiolo postice calloso-tumido. Mesopleura polita, sutura nulla divisa. Pedes ♂ tarsis 4-articulatis.

I habitus erinrar detta slägte ganska mycket om hannarne till *Eupelmus*. Från följande genus kännes *Tetracampe* lätt på den glänsande släta scutellen, som vid basen är lika bred som dorsum, hvars färor träffa in på samma punkt med scutellens färor samt på mesopleura, hvilka äro stora, glänsande utan spår till sutur i midten. Arterna lefva i äggen af Coleoptera, särskildt *Galeruca*

1. *T. impressa*: Viridis, genubus pallidis, tibiis fuscis, abdomine conico-elongato, antennis filiformibus, ♂ extrorsum, attenuatis, compressis. Long. 2--3 mill.

Foerst. l. c. 34. 1.

Entedon Panyas Walk. Mon. Chalc. 120. 129.

Caput thorace paullo latius, antrorsum angustatum, vertice lævi, emarginato, ocellis fere in triangulum dispositis, linea occipitali medio distincta; facie haud lata, scrobe antennali profunda sed ocellum haud attingente; oculis breviter ovatis, fere glabris, orbita posteriore subemarginata, genis haud angustis, clypeo haud discreto apice emarginato truncato, mandibulis fuscis. Antennæ infra medium faciei insertæ, nigræ, articulo 1:o æneo, ocellum haud attingente, 2:o subtriangulari, anello vix distincto, funiculo 6-articulato, articulis crassitie æqualibus, 1:o cylindrico, 2--6 sensim brevioribus, 6:o transverso, clava haud lata, 3-articulata. Thorax longus, pallide pubescens et parce albo-setosus; pronoto haud transverso, subconico-

rotundato, postice vix emarginato cum mesonoto tenuissime haud rugoso-punctato, hoc sulcis profundis, dorso pronoto fere brevior; scutello nitido fere polito postice 4-setoso, freno vix discreto, dorsello polito sat lato; metathorace convexo declivi, dense punctulato et griseo-pubescente, carina et plica nullis, calli fimbria densa. Alæ longæ sat angustæ, subhyalinæ, fere æqualiter pubescentes, costa stigmatæ fere brevior, postcosta 4—5-setosa, radio brevissimo unco distincto, metacarpo radio saltim duplo longiore. Abdomen conico-cylindricum, petiolo haud transverso, deflexo, segmento 2:o basi fovea impressa, tridentem haud occupante, 3:o longo, 4—7 sensim brevioribus, 8:o acuminato, terebra anum vix superante, 3—7 lateribus pilis parce vestitis. Pedes minus graciles, ænei, tibiis fuscis, anticis margine et genubus omnibus pallidis, tarsis basin versus vix infuscat, coxis posticis margine postico dense pubescente. Mesosternum longum, mesopleuris politis, metapleuris triangularibus totis griseo-pubescentibus, præsternis magnis.

Mas differt: antennis scapo compresso, dimidio basali subtus albido, flagello compresso, haud piloso, extrorsum attenuato, præclava haud transversa, abdomine ovali.

Sällsynt i södra Sverige.

2. *T. Galerucæ*: Viridis, antennis subincrassatis, pedicello et clava magna, metapleuris glabris: ♀ tibiis tarsisque rufescentibus, ♂ antennis scapo triangulari valde dilatato et funiculo apice cum pedibus totis pallidis. Long. 2 mill.

Pteromalus Galerucæ Boy. de Fonsc. l. c. pag. 302. no 2.

Nees l. c. 430. 48.

Tetracampe flavipes Foerst. l. c. 34. 2.

Entedon Temenus Walk. Mon. Chalc. 122. 131. (femina).

Species præcedenti alis, colore et sculptura similis sed longe diversa, corpore brevior, petiolo transverso, antennis longe infra medium faciei insertis, metapleuris glabris, præsternis parvis, metathorace medio lævi glabroque; femina antennis flagello submoniliformi, clava lata, pedicello longo; tibiis tarsisque rufis; mas antennis scapo laminato-triangulari et funiculi apice pallide testaceo, clava lata atra, pedibus cum coxis testaceis discedens.

Sällsynt i södra Sverige.

Genus *Platynochilus* Westwood.

Stenocera Walker. *Pteroncoma* Foerster.

Caput triangulare, scrobe ad ocellum producta, clypeo quadrato sat discreto, apice truncato. Antennæ anellis distinctis. Thorax longus, suturis omnibus tenuibus, sulcis scutelli fortiter convergentibus. Alæ radio metacarpo parum brevior, ♂ stigmate maximo inflato oblongo atro. Abdomen subsessile segmentis subæqualibus, dorso immersis, ventre parum convexo. Mesopleura divisa. Coxæ posticæ longæ. Corpus viride vel cyaneum, supra fere glabrum, punctatissimum. Tarsi in utroque sexu 5-articulati.

Detta släkte skiljes lätt från föregående genom de fina färrorna på mesonotum, som ej träffa in med scutellens sulci på samma punkt, genom tydligt delade mesopleura, längre bakhöfter, längre radius, kortare metacarpus, smalare hjessa, infallen abdomen, som nästan är sessil med ungefär lika långa segmenter, 5-ledade tarser; båda könen, hannen dessutom genom det ovanligt utvecklade stigmat.

1. *P. Erichsonii*: Viridis, trochanteribus, genubus tibiis apice alarumque nervis stramineis. Long. 3–4 mill.

Westw. Ent. Magaz. IV. 437.

Stenocera Erichsonii Walk. Mon. Chalc. 276. (ex parte).

Corpus elongatum, viride, fere smaragdinum. Caput triangulare, pone oculos angustatum, linea occipitali medio distincta, ocellis fere in triangulum dispositis, oculis magnis convexis fere glabris, genis teretibus sulco distincto, mandibulis palpisque fuscis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo viridi ocellum anteriorem attingente, in scrobe recepto, pedicello æneo oblongo, flagello vix incrassato, haud tenui, postannello fere, præclava sat transversa. Thorax cylindricus, supra depressus, creberrime, fere rugoso-punctatus, pronoto conico, autrorsum haud declivi, dorsello distincto, metathorace haud brevi, subpunctato, carina et plica nullis, spiraculis rotundis a postscutello longius remotis, calli fimbria sat tomentosa. Alæ longæ, minus latæ, apice ciliatæ, speculo magno, radio sub angulo acuto egrediente, clava uncinata, quam stigmatate saltim duplo brevior, metacarpo radio parum longiore, omnibus flavo-stramineis. Abdomen thorace vix longius, haud angustius, oblongo-ovale, cyaneum, apice aureo. Mesosternum punctulatum lateribus inferne et episternis lævibus. Pedes virides, coxis et femoribus concoloribus, genubus late et tibiis apice citrinis, his fusco-æneis, tarsis longis gracilibus fuscis.

Mas differt: antennis magis pilosulis, stigmatate costa triplo longiore alæ medium vix superante.

Sällsynt i Skåne.

2. *P. cuprifrons* m: Viridis fronte cuprea, femoribus flavis. Long. 2—3 mill.

Stenocera Derceto et *Erichsonii* Walker (ex parte).

Præcedenti similimus sed paullo minor, fronte superne cupreo-violacea, femoribus flavis, coxis interne testaceis, tibiis flavis externe fusco-nigris, mesopleuris totis punctatis bene distinctus.

Sällsynt i södra Sverige.

Ann. Walker beskriver 1. c. båda arterna med "caput cupreum", *Erichsonii* med "femora lutea aut viridia", så att han tydligt haft 2 arter för sig.

Tribus Elachistina.

Caput antrorsum subangustatum, vertice medio sæpe acuto, oculis haud raro hirtulis, clypeo apice haud denticulato. Antennæ infra medium faciei insertæ haud vel vix extrorsum incrassatæ, scapo sat longo, funiculo sæpius 4-articulato, clava plerumque 2-articulata. Thorax pronoto magno, collari rarissime discreto, metathorace carina media; sulcis mesonoti distinctis, scutello interdum lineis 2 dorsalibus impressis, setis 4 instructo. Alæ præstigmatæ haud fractæ, cellula costali sæpe lata, metacarpo distincto, radio haud brevissimo. Abdomen interdum petiolatum. Tibiæ posticæ calcaribus 2 vel 1 instructæ. Tarsi omnes 4-articulati.

Denna grupp sluter sig nära till föregående, från hvilken den genast skiljes på antennsträngen, som på sin höjd är 4-ledad. Närmast kommer den intill *Eulophina*, men kännes lättast på de djupare färvorna på mesonotum, rät eller mindre starkt böjd sutura scutelli, stundom skaftad abdomen. Från *Intedonina* och *Tetrestichina* afviker den genom bredare costalfält, ej brutet præstigma, i allmänhet längre radius och 4 borst på scutellen.

Conspectus generum.

- A) Alæ metacarpo quam radio longiore. Antennæ funiculo 4-articulato. Abdomen petiolo magis minusve distincto.
 - a) Tibiæ posticæ calcaribus longissimis. Vertex medio et collare acuta. *Euplectrus.*
 - aa) Tibiæ posticæ calcaribus 1 vel 2 brevibus. Collare haud discretum. Thorax pronoto subconico.
 - b) Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Scutellum lineis 2 dorsalibus.
 - c) Thorax pictus. Scutelli sutura recta. *Stenomesis.*

- cc) Thorax haud pictus. Corpus saltem caput metallicum. *Elachistus.*
- cc) Tibiæ posticæ 2-calcaratæ. Corpus haud metallicum. Scutellum lineis dorsalibus nullis. *Miotropis.*
- B) Abdomen subsessile. Scutellum lineis 2 dorsalibus impressis. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ.
- d) Corpus alatum æneum, sæpe pictum. *Cirrospilus.*
- dd) Pedes validi. Tibiæ posticæ calcari longo. Mas oculis fere nullis, alis abbreviatis. Antennæ mox supra clypeum insertæ. *Melittobia.*

Genus **Euplectrus** Westwood.

Pteromalus Svederus.

Caput triangulare vertice acuto, thorace angustius. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo longo, funiculo 4-articulato. Thorax collari discreto, metathorace carina media alte elevata sutura scutelli recta. Abdomen petiolo sat longo, rotundum, postpetiolo magno. Pedes sat validi, tibiis posticis calcaribus longissimis. Mesopleura integra. Corpus haud metallicum, capite thoraceque coriaceis parce rude pubescentibus et setis longis parcis instructa.

Detta slägte skiljes lätt från öfriga på de ovanligt långa sporrarne, tydligt afsatt collare, skarpkantad hjessa, temligen lång petiolus och glest långraggig thorax.

1. *E. bicolor*: Niger, capite antice, pedibus antennisque flavis, abdomine ventre plagaque discoidali rufis; scutello creberrime strigoso, scapo ♂ subdilatato. Long. 3—4 mill.

Pteromalus bicolor Svederus Acta. Holm. 1795. 204. 2.

Elachistus albiventris Spinola Ann. Mus. VII. 151.
Nees l. c. 146. 17.

Euplectrus maculiventris Westw. Lond. and Edinb. Phil. Mag. Series III, 1. 2. 128.

Eulophus bicolor Walker Mon, Chalc. 173. 61.

Statura brevis crassa. Caput antrorsum fortiter angustatum, nigrum, pone oculos glabros subrotundos prominulos angustatum, vertice angusto, lævi, ocellis magnis in arcum dispositis, facie lata lateribus subtiliter subrugosa, inferne testacea, clypeo haud discreto apice rotundato. Antennæ in linea oculari insertæ, basi sat distantes testacæ, sat longæ et crassæ, scapo ocellum superante, funiculi articulis haud transversis, clava 2-articulata. Thorax latus, pronoto mesonoto angustiore, haud brevi, collari discreto, coriaceo; mesonoto sulcis minus latis, coriaceo; scutello setis 2 prope basin et 2 ante apicem instructo, creberrime strigoso, lineis dorsalibus nullis, sutura scutelli plane recta; dorsello magno polito; metathorace lævi, carina alte elevata, basi in spatium triangulare excavatum furcata, calli fimbria densa et longa, plica nulla, Alæ sat longæ, parum pubescentes, apice breviter ciliatæ. leniter fumatæ, postcosta 4—5-setosa, costa stigmatæ fere brevior, metacarpo radio paullo longiore, hoc stigmatæ triplo brevior. Abdomen petiolo nigro subrugoso haud transversa sed deflexo, postpetiolo dimidium fere occupante margine postico sat rotundato. Pedes rufo-testacei, coxis posticis magnis ovatis, late distantibus, calcari interiore metatarsum longum superante. Mesosternum politum, præsterna magna, mesopleura haud divisa, metapleura magna glabra et lævia.

Mas differt: antennis magis pilosulis, scapo dilatato, facie inferne pedibusque anticis albidis, abdomine apice obtuso.

Ej sällsynt öfver hela Sverige.

2. *E. læviscuta* m: Niger, facie concolore, antennis pedibusque pallidis, scutello lævi, lineis 2 dorsalibus

impressis, abdomine petiolo lineari, sublævi ♀. Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed capite immaculato, facie fere lævi; antennis flagelli articulis superne fuscis, magis compresso-dilatatis, quadratis; pronoti collari margine antico magis elevato; scutello lævi, utrinque linea impressa; metathorace carina media basi haud triangulariter dilatata; alis metacarpo radio saltem duplo longiore; abdomine magis rotundo-obovato, petiolo longo, lineari fere lævi, fascia postpetioli minore pallida; pedibus posticis coxis nigro-piceis, femoribus superne infuscatis bene distinctus.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Genus *Stenomesus* Westw.

Caput vertice lato, linea occipitali fere completa. Antennæ funiculo 4-articulato. Thorax pronoto haud brevi, collari haud discreto, scutello lineis 2 dorsalibus impressis. Abdomen petiolo brevi, postpetiolo magno. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Mesopleura divisa, sutura anteriore curvata. Thorax pallido-variegatus.

Detta släkte skiljes lätt från närstående genom nästan fullständig occipital-linja, rak sutura scutelli, med 2 dorsallinjer på dorsulum, endast 1 sporre på bakbenens tibia och trefärgad thorax.

1. *S. rufescens*: Nigro- rufo- et citrino-variegatus, metathorace carina media excavata, utrinque dilatata, capite ♂ nigro. Long. 2—3 mill.

Ichneumon rufescens Rossi Fauna Etrusc. Mont. app. II. 113. 94.

Eulophus rufescens Nees l. c. II. 161.

Stenomesus pulchellus et *maculatus* Westw. London and Edinb. Phil. Mag. III. 343.

Cirrospilus Acesius Walk. Ann. Nat. Hist. 200.

Elachestus maculatus Walk. Mon. Chalc. I. 193.

Species colore concinna. Caput thorace angustius, triangulare, pone oculos angustatum, vertice lato, lævi, ocellis in triangulum dispositis; scrobe sat longa, clypeo apice integro subrotundato, genis sat longis; oculis fere glabris, sat prominulis, triangulari-ovatis, orbita posteriore subsinuata; rufum, vertice lateribus subcitrinis, macula quadrata ocellari aliaque laterali temporali nigris. Antennæ sat longæ nigrae, in linea infera oculari insertæ; basi sat distantes, scapo ocellum superante, subtus testaceo, funiculi articulis sensim brevioribus, ultimo haud transverso, clava 2-articulata, acuminata, quam præclava paullo longiore. Thorax sat longus, supra setis nigris paucis erectis; pronoto rufo medio superne macula quadrata nigra; mesonoto punctatissimo, minus nitido, pronoto latiore, rufo, scapulis citrinis; scutello sulcis basi fortiter convergentibus, rufo, axillis et axillulis politis nigris, freno haud discreto, dorsello sat magno; metathorace lævi, fimbria calli densa et longa, medio spatio angusto, basi fortius, apice minus dilatato, e costis elevatis formato. Alæ subhyalinæ, disco medio interdum umbra fusca ornatae; postcosta 6—8-setosa, apice ciliato, cellula basali nuda, costa stigmatum vix brevior, hoc radio fere triplo longiore, clava parva unco minuto, metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen ovatum, subtus leniter convexum, supra planum, terebra anum vix superante; segmentis 1:0 deflexo, brevi, 2:0 dimidium fere occupante, margine postico rotundato, disco rufescenti, 3—7 sensim brevioribus. Pedes minus validi, rufescentes, femoribus anticis medio fuscis. Mesosternum rufum, medio subtus nigrum, mesopleuris antice curvatis, lævibus, sutura bene distincta divisus, epineniis sat discretis, præsternis haud parvis.

Mas differt: antennis scapo fere albido subdilatato, flagello longiore, magis piloso, capite nigro; macula pro-

noti ad medium fere dorsi extensa, dorsulo piceo; femoribus anticis nigro-fuscis, tibiis intermediis longis apice subdilatato nigro, abdomine rufescenti, postice nigro.

Ej sällsynt i medlersta och södra Sveriges löfskogar.

Genus *Elachistus* Spinola.

Caput æneum, vertice medio mox pone oculos haud glabros subacuto vel tereti, plerumque antrorsum fortius angustatum. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, flagello rarissime incrassato, funiculo 4-articulato, clava biarticulata. Thorax pronoto magno, conico-semigloboso, collari haud discreto; mesonoti dorso brevi; scutello lineis dorsalibus impressis, lævi vel dense punctulato, sutura recta vel utrinque sinuata, dorsello haud angusto, lævi; metathorace carina media acuta. Alæ metacarpo radio evidenter longiore, hoc clava parva sed unco acuto. Abdomen petiolo lævi, plerumque brevi, postpetiolo haud magno. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ, Mesosternum lateribus lævibus, sutura mesopleurali antice fortiter arcuata. Corpus nigrum, immaculatum, thorace interdum, capite semper metallico.

Detta slägte öfverensstämmer närmast med *Stenomesus* i mesosterni bildning och sporrarne på bakbenens tibier, men hjessan är aftrindad eller endast i midten bakom ocellerna skarpkantad, hufvudet metalliskt och liksom thorax utan gul teckning, postpetiolus kortare och kölen på metathorax enkel. Från *Miotropis* afviker det dels genom metalliskt ej gultecknad hufvud dels äfven genom tydliga dorsal-linjer på scutellen och hufvudsakligast genom endast 1 sporre på bakbenens tibier.

- A) Sulei dorsi et dorsuli haud continui. Mesonotum æneum, sutura scutelli recta, hoc dense, sed haud fortiter punctulato. Abdomen petiolo haud transverso. Alæ metacarpo radio haud duplo longiore. Oculi parcius breviter pubescentes. Flagellum haud incrassatum. Vortex medio acutus.

1. *E. petiolatus* m: Viridis, antennis scapo, mandibulis pedibusque testaceis, abdomine rotundo, ventre ma-

culaque dorsali rufescenti, petiolo basi constricto, latitudine longiore, alis hyalinis. Long. 2—3 mill.

Eulophus artæus Walker Mon. Chalc. 172. 60. (forte)

Elachestus lateralis Nees l. c. 144. 13. (forte).

Eulophus carinatus Ratz. l. c. II. 172. 2. (verosimiliter).

Corpus haud angustum, capite thoraceque viridibus, pallido-pubescentibus et parce setosis. Caput thorace angustius, antrorsum fortiter angustatum, læve, scrobe sat profunda triangulari, clypeo apice rotundato, mandibulis testaceis, apice bifidis, genis brevibus, oculorum diametro multo brevioribus. Antennæ haud longæ, in linea infera oculari insertæ, basi distantes; articulo 1:o testaceo, ocellos magnos in triangulum fere dispositos albidos, haud plane attingente, pedicello supra fusco-æneo, anello vix conspicuo, funiculo haud incrassato, breviter pilosello fusco vel testaceo, articulis transversis, clava 2-articulata, acuta, quam præclava haud duplo longiore. Thorax sat crassus, supra sat nitidus, viridis, dense subtilissime fere rugoso-punctatus; pronoto mesonoto angustiore, semigloboso, antice medio fovea, utrinque plicata, instructo; mesonoto dorso pronoto brevior, scutello sutura recta, dense subtiliter concinne punctulato, sulcis basi sat convergentibus, dorsulo lineis impressis lateribus, postice divergentibus et in freno arcuatim conjunctis, dorsello magno polito; metathorace haud brevi, lævi, sulco spiraculari vage impresso, carina media alta, basi lunato-dilatata, calli fimbria sat densa et longa. Alæ hyalinæ, apice minus late rotundato, speculo sat magno, cellula costali lata; postcosta 6-setosa, costa stigmatate fere longiore, radio clava parva, unco minuto, quam stigmatate haud duplo brevior, metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen subrotundum, æneo-virens, subtus maculaque ante medium magis minusve extensa rufescenti, supra planum, subtus vix convexum, terebra anum parum superante, petiolo nigro sub-

rugoso-punctato, basi constricto, latitudine sua longiore postpetiolo brevi. Pedes sat graciles, testacei, coxis posticis ovato-oblongis interdum macula basali viridi. Mesosternum læve, mesopleura magna, antice curvata, divisa, epicnemiis distinctis, præsternis magnis lævibus.

Mas differt: antennis flagello testaceo, magis pilosis, scapo et pedicello brevioribus, abdomine apice obtuso.

Ej sällsynt.

Ann. Nees' beskrifning på *E. lateralis* och *tardulus* passar bra på denna art med hänseende till thorax, som säges vara "distincte tricollis", men abdomens färg och "petiolus pallidus" öfverensstämmer närmast med *Eulophus gonippus*. Walker citerar vid sin art Nees' *Eulophus dimidiatus*, som antagligen kommer nära *E. ramicornis*.

2. *E. æneiscapus*: Virescenti-æneus, pedibus rufis, abdomine subrotundo, petiolo haud brevi. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, capite superne minus lævi, antennis nigris, scapo æneo, pronoto paullo fortius punctato, antice fovea vix conspicua, alis speculo minore, metacarpo et radio brevioribus, abdomine petiolo latitudine sua parum longiore, pedibus rufescentibus coxis posticis æneo-viridibus tantum distinctus.

Sällsynt; funnen vid Trelleborg af Doctor G. F. Möller.

3. *E. opaculus* m: Æneus, antennis scapo pedibusque testaceis, coxis æneis, femoribus posterioribus superne fuscis, abdomine ovato-rotundo. ♀ Long. 3 mill.

E. petiolato iterum similis et affinis, thorace subtilius punctato, subcoeruleo-æneo, capite antrorsum minus angustato, mandibulis haud pallidis, antennis scapo æneo, flagelli articulis vix crassioribus, abdomine ovato-rotundo, petiolo paullo brevioris forsitan distinctus.

Sällsynt i Skåne.

B) Caput triangulare, vertice medio acuto, oculis dense et sat longe pubescentibus. Antennæ apicem versus haud incrassatæ. Thorax pronoto mesonoti dorso vix longiore, scutelli sutura utrinque sinuata, sulcis cum sulcis dorsi haud continuis. Alæ speculo fere nullo, radio sub angulo sat acuto egrediente, metacarpo longo. Abdomen haud rotundum, petiolo transverso.

a) Scutellum politum. Abdomen oblongo-ovatum.

4. *E. inunctus*: Niger, capite virescenti-æneo, antennis scapo subtus pedibusque testaceis, alis fumato-hyalinis, dorso mesonoti coriaceo, abdomine ovato. Long. 2—3 mill.

Nees l. c. 143. 15.

Eulophus Argissa Walker Mon. Chalc. 172. 59. (forte).

Entedon cristatus Ratzeburg l. c. II. 163. 13.

Species structura omnino *E. petiolati*, sed longior, antennis funiculi articulis sensim brevioribus, sed omnibus crassitie sua longioribus, oculis dense longe hirtis, capite semper æneo, thorace nitore pingui vix metallico, pronoto et mesonoti dorso subtiliter punctulato, scapulis lævibus; scutello polito, sutura utrinque arcuata, lineis dorsalibus impressis, postice arcuatim confluentibus, alis speculo fere nullo, cellula costali minus lata, radio et metacarpo longis, abdomine oblongo-ovato, macula basali picescenti ab affinibus bene distincta.

Mas differt: antennis scapo æneo pedicelloque brevioribus, funiculi articulis haud longioribus, sed compressis, dense et longe griseo-hirtis.

Ej sällsynt öfver hela Sverige.

5. *E. sublævis* m: Niger, thorace fere æneo, mesonoti dorso sublævi, antennis præclava transversa. Long. 2—3 mill.

Eulophus geniculatus Ratz. l. c. I. 168. 25. (forte).

Entedon deplanatus Ratz. l. c. III. 208. 22. (forte).

Præcedenti simillimus, sed capite brevior; antennis scapo brevior, apicem versus subdilatato, æneo vel basi pallido, funiculi articulis brevioribus, præclava transversa; mesonoti dorso sublævi, scutelli sutura utrinque magis arcuata, pedibus basi præsertim ♂ obscurioribus discedens

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

6. *E. viridulus* m: Capite thoraceque viridibus, antennis scapo pedibusque pallidis. Long. 2—3 mill.

Species scutello polito præcedentibus affinis, sed capite thoraceque læte viridibus, hoc pronoto paullo fortius subrugoso-punctato, scutelli sutura minus fortiter utrinque sinuata; ♂ antennis scapo longo pallido, apice dilatato oblique truncato, funiculi articulis minus longis et dense pallide hirtis bene distincta.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland.

aa) Scutellum haud politum. Abdomen breviter ovatum.

7. *E. punctiscuta* m: Ænescens, pedibus pallidis, coxis basi femoribusque superne fuscis, facie utrinque ante ocellos punctis paucis impressis. ♀ Long. 2 mill.

Species corpore latiore, thorace capiteque subolivaceo-æneis, hoc brevi, superne ante ocellos punctulis paucis impressis; antennis funiculo crasso, articulo 1:o quadrato, ultimo transverso; thorace creberrime subtiliter punctulato, scutello sutura minus arcuata, subtilissime sed sat crebre fere strigoso-punctato; abdomine late ovato, pedibus pallidis, coxis basi æneis, femoribus superne fuscis bene distincta.

Sällsynt; en hona funnen vid Ringsjön i Skåne.

8. *E. Lapponicus* m: Niger, fere æneo-micans, abdomine subrotundo, genubus, tibiisque apice sordide rufis. ♀ Long. 2 mill.

E. punctiscuta magnitudine, statura et antennarum structura simillimus, sed facie superne obsolete punctata, mesonoto minus creberrime subtilissime punctato, pedum colore obscuriore, abdomine fere rotundo discedens.

Sällsynt; funnen i Luleå Lappmark.

- C) Caput genis subbuccatis, fortiter transversum, vertice medio tereti. Antennæ flagello apicem versus incrassato, articulis transversis. Thorax sulcis dorsi et dorsuli continuis. Scutelli sutura fere recta. Alæ metacarpo radio paullo longiore. Abdomen breviter ovatum, fere sessile.

9. *E. olivaceus* m: Olivaceo-æneus, minus nitidus, genubus, tibiis tarsisque rufescentibus, scutello punctatissimo. ♀ Long. 2 mill.

Species corpore coacto, capite genis parum angustatis, oculis subglabris; antennis longius infra oculos insertis, nigris, flagelli articulis transversis sensim latioribus, thoraceque æneo-olivaceis, dense subtilissime punctatis, pronoto magno, quam mesonoti dorsi sesqui longiore, hoc dorsuli basi haud latiore; alis radio quam metacarpo paullo brevioribus; abdomine subovali fere sessile, basi plaga nulla pallida, pedibus haud gracilibus, coxis femoribusque longe ultra medium fusco-æneis bene distincta.

Sällsynt; funnen på Öland och vid Holmeja i Skåne.

10. *E. nigritulus* m: Subcoeruleus, femoribus apice tibiis tarsisque rufescentibus, scutello polito. ♀ Long. 2 mill.

Entedon nigritulus Zett. Ins. Lapp. 430. 5.

Præcedenti magnitudine et statura simillimus, sed antennis funiculi articulo ultimo clavæ magis contiguo; tho-

race subcoeruleo, vage subtilius punctato, scutello polito
mox discedens.

Sällsynt; funnen på Öland och i Lappland.

Genus *Miotropis*.

Caput subtransversum, antrorsum minus angustatum, vertice medio tereti, oculis glabris. Thorax pronoto collari haud discreto, mesonoti dorso haud longiore, hoc sulcis cum dorsuli sulcis haud continuus, scutello lævi, sutura fere recta, linea nulla laterali impressa, metathorace crista acuta, saltim basi canaliculata. Alæ metacarpo radio sesqui longiore. Abdomen subsessile, postpetiolo apice truncato trientem occupante. Pedes sat validi, tibiis posticis apice 2-calcaratis. Mesosternum lateribus læve, mesopleuris antice sat curvatis, sutura obliqua bene divisis. Corpus haud metallicum, saltim capite flavo-notato.

Detta slägte, som i färgteckning sluter sig närmast till *Stenomesium*, skiljes lätt såväl genom ej synlig occipital-linja, som äfven genom glatt scutell, hvilken saknar dorsal-linjer; från *Elachistus* afviker det genom 2 sporrar på bakbenen, gultecknad hufvud och längre postpetiolus.

1. *M. sulcicrista* m: Nigra, rufo- et flavo-picta, metathoracis carina media sulco exarata. Long. 3—4 mill.

Eulophus 4-fasciatus Ratz. l. c. III. 204. 1. (forte).

Eulophus Erse Walk. Mon. Chalc. 177. 67. (forte).

Species pictura *Stenomesium* simulans. Caput thorace paullo angustius, os versus angustatum, pone oculos leviter angustatum, vertice minus lato, ocellis fere in triangulum dispositis, scrobe sat profunda, genis teretibus, oculorum diametro vix brevioribus; flavum, macula magna ocellari quadrata et occipite nigris, orbita interiore late straminea. Antennæ sat longæ et crassæ, nigræ, basi distantes; articulo 1:o ocellum anteriorem attingente, subtus

præsertim basin versus pallido, 2:o triangulari, 3:o vix conspicuo, 4—7 crassitie æqualibus, pilosulis, 7:o diametro paullo longiore, clava biarticulata, acuminata quam præclava haud duplo longiore. Thorax supra subdepressus, parce tenuissime pubescens; pronoto mesonoti dorso haud longiore, hoc crebre minus distincte punctato, scapulis lævibus; scutello lævi apice marginato, setis ordinariis nigris, dorsello magno; metathorace carina media sulco exarata, calli fimbria sat densa et longa. Alæ fere hyalinæ, pubescentes stigmatæ radio duplo longiore, hoc quam metacarpo fere duplo brevior unco parvo instructo, postcosta 4—5 setosa, cellula costali sat lata. Abdomen breviter ovatum, supra depressum, subsessile, subtus leniter convexum, terebra anum vix superante. Mesosternum læve, præsternis magnis. Pedes sat validi.

Variat: pronoto nigro, vel lateribus, interdum etiam limbo posteriore pallido; mesonoto rufo-flavo, sæpe macula magna subquadrata dorsi anteriore et puncto scapulari nigro, vel nigro toto; scutello rufo, vel puncto medio nigro vel toto nigro; metathorace nigro, vel superne rufescenti; abdomine superne nigro, vel limbo rufo, ventre rufo vel nigro; pedibus totis rufescentibus, vel coxis nigris, femoribus et tibiis superne vitta fusco-nigra vel fere totis nigro-fuscis; mesosterno rufo, macula media nigra, vel nigro, macula infra alas semper pallida.

Mas differt: antennis paullo magis pilosis articulis fere longioribus, abdomine ovali, colore sæpe obscuriore thoracis et abdominis.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Ann. Reinhard upptager (Berl. Ent. Zeit. II. 21. 55) *Eulophus 4-fasciatus* Ratz. (Ichn. d. Forstinsecten III. 204.) såsom synonym med *Stenomesus rufescens*, men dermed synes ej öfverensstämma följande uttryck l. c. "Schildchen ohne Spur von Nähten, — alles glatt und spiegelblank".

2. *M. simplex* m: Nigra, facie inferne et orbita interiore citrinis, alis subhyalinis, metathoracis carina simplice.
♂♀ Long. 3—4 mill.

Præcedenti simillima, corpore nigro, metathoracis carina sulco nullo exarata, antennis articulis paullo brevioribus, pedibus parum pallide variegatis tantum discedens.

Sällsynt; funnen vid Ringsjön i Skåne.

3. *M. 4-notata* m: Nigra, orbita interiore utrinque punctis 2 magnis citrinis, alis nigro-fumatis, apice dilutioribus. ♀ Long. 4 mill.

Species a præcedentibus pedibus fere totis obscuris, orbita interiore maculis 2 parvis citrinis subrotundis ornata, alis obscuris bene distincta.

Sällsynt i Småland.

Genus *Cirrospilus* Westwood.

Eulophus Nees.

Caput transversum, antrorsum minus angustatum, vertice haud lato, oculis parce pubescentibus, minus prominulis, genis haud brevibus, sulco distincto, clypeo apice haud denticulato. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, basi distantes, funiculo 2-, clava 3-articulata. Thorax supra subdepressus, pronoto haud brevi sed transverso, collari haud discreto; mesonoto dense subtiliter punctato, sulcis profundis cum dorsuli lineis continuis; scutello depresso, lineis dorsalibus apicem versus leniter convergentibus, postice immarginato, sutura utrinque fortiter fere angulatim curvata, dorsello magno; metathorace haud brevi, carina media distincta, calli fimbria haud parca. Alæ costa stigmatis fere longitudine, radio haud brevi, quam metacarpo parum vel haud brevior, postcosta 5—6-setosa, cellula costali sat lata. Abdomen subsessile, ovatum, supra depressum, subimmersum, ventre parum con-

vexo. Mesosternum pleuris bene divisis, lævibus, antice sutura sat curvata, præsterna magna triangularia punctata. Pedes postici tibiis 1-calcaratis, coxis externe granulatis. Corpus plerumque metallicum et pallido-variegatum.

Detta slägte skiljes lätt från alla föregående genom antennerna, hvilka hafva funiculus 2-ledad, emedan den 3:e leden sluter sig intill och bildar klubban, som derigenom blir 3-ledad. Dessutom har scutellen sidolinjerna baktill någon konvergerande men flyta ej tillsammans i spetsen och dess sutur är starkt nästan vinkligt sinuerad vid hvarje sida.

I habitus äfvensom i färgernas fördelning har det påfallande likhet med *Tetrastichus*, men kännes dock dels genom den endast 2-ledade antenn-strängen, dels genom vingarne, hvilka hafva tydligt utbildad metacarpus och bredare costalfält, äfvensom genom scutellen, som har 2 borst nära basen de andra 2 vid spetsen och hvars sutur ej är så starkt vinkligt böjd, dorsal-linjerna belägna längre åt sidorna, så att de träffa in på samma punkt med mesonoti sulci.

Foerster uppgifver att *Cirrospilus* skulle sakna fårör på mesonotum och i detta fall öfverensstämma med *Eulophus*. Antingen är således hans slägte ej identiskt med Westwoods, eller har han ej riktigt observerat mesonoti byggnad.

1. *C. pictus*: Æneo-viridis, antennis brevibus, metathorace lævi, fascia thoracis vel scapulis cum pedibus fere totis stramineis. Long. 2—3 mill.

Eulophus pictus Nees l. c. 165. 16.

Eulophus arcuatus Foerst. l. c. 41. 8. Ratz. l. c. II. 163.

Cirrospilus Thasus Walk. Ann. Nat. Hist. 1838. I. 309.

Caput thorace paullo angustius, viride, vertice angusto, ocellis in lineam curvam dispositis, antrorsum vix angustatum, interdum facie tota vel inferne et orbita pallide citrinis. Antennæ breves, in linea infera oculari insertæ, scapo sat longo, subcompresso-dilatato, pedicello oblongo, flagello subincrassato, subtus interdum pallido, anello parvo sed distincto, postannello crassitie sua parum longiore, clava ovata, sat magna. Thorax latus, vi-

ridis, supra fere glaber, creberrime subtiliter haud squamoso-punctatus; pronoto antrorsum angustato, interdum linea laterali pallida; mesonoto fascia subarcuata ante scutellum pallide citrina, rarius tantum scapulis et punctis 2 medio citrinis; dorsello magno sæpe cupreo; metathorace lævi, carina dorsello vix longiore. Alæ hyalinæ, speculo distincto, metacarpo radio fere brevior hoc clava et unco parvis, præstigmate metacarpi longitudine, n. spurio haud distincto. Abdomen ovatum cupreum, postpetiolo brevi, rarius lateribus maculis vel punctis pallidis ornatum. Pedes sat validi, straminei, coxis anticis interdum concoloribus, posterioribus æneis, tibiis anticis intus fusco-striatis, intermediis annulo medio nigro, femoribus posticis annulo prope basin nigricante.

Ej sällsynt.

2. *C. elegantissimus*: Viridis, scapulis citrinis, metathorace punctulato. ♂♀ Long. 2—3 mill.

Westw. Phil. Mag. III. Ser. I. 128.

Eulophus 4-maculatus Foerst. l. c. 41. 6.

Eulophus flavo-maculatus Ratz. l. c. I. 164. (♂).

Eulophus punctatus Ratz. l. c. II. 165.

Præcedenti magnitudine et statura simillimus, sed antennis longioribus, vix incrassatis, pronoti lateribus et scapulis cum pedibus stramineis, metathorace paullo longiore, punctulato, rarius medio lævi distinctus.

Mas differt: antennis paullo longioribus et magis pubescentibus, dimidio anteriore abdominis rufo-testaceo, capite pectoreque antice flavo-stramineis.

Ej sällsynt öfver hela Sverige.

3. *C. vittatus*: Pallide citrinus, thorace vitta media, suturis et metathorace viridi-æneis, abdomine vitta lata dentata ænea. Long. 1—2 mill.

Walk. Ann. Nat. Hist. 1838. I. pag. 308.

Eulophus lineatus Foerst. l. c. 41. 10.

Entedon lineatus Ratz. l. c. III. 209.

Species parva, capite macula ocellari ænea, antennis brevibus, thorace vitta media, metathorace brevi, plerumque etiam suturis et puncto axillari viridi-æneis, segmentis 2—6 fasciis æneis, ♂ 3:0 interdum etiam 5:0 macula fusco-ænea, capite antennisque longioribus immaculatis.

Sällsynt i södra Sverige.

4. *C. immaculatus* m: Cupreus, trochanteribus, genubus, tarsis tibiisque albis, his basin versus fuscis. ♀ Long. 2 mill.

Species *C. picto* magnitudine, antennis, metathorace brevi lævi simillimus, sed cuprea, magis nitida, thorace subtilius punctato, pedum colore mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Wittsiö i norra Skåne.

5. *C. unipunctus*: Niger vix violaceo-micans, aurantiaco maculatus, scutello medio nigro. ♀ Long. 3 mill.

Eulophus 1-punctus Nees l. c. 165. 15.

A præcedentibus corpore vix metallico, capite aurantiaco, occipite et macula faciali nigris; antennis fuscis, subtus pallidis, præclava latitudine sua longiore; mesonoto subopaco, dense subtilissime punctato, sulcis postice, axillis et scutello aurantiacis, nigro-maculatis, hoc lineis dorsalibus obsoletis, dorsello parvo, metathorace lævi; alis metacarpo radio haud brevi fere longiore; abdomine magis oblongo; pedibus minus validis, albido-testaceis, coxis saltim posticis fuscis, femoribus supra leniter infuscatis mox distinctus.

Sällsynt i Skåne; funnen vid Herrevadskloster af Doctor G. F. Möller, vid Ringsjön af författaren.

6. *C. subviolaceus*: Fascia thoracis aurantiaca basin scutelli et dorsi occupante, metacarpo radio longiore. ♀ Long. 3 mill.

Species corpore sat longo, capite flavo-citrino, occipite et macula ocellari subviolaceo-nigris; antennis sat longis, fuscis, subtus pallidis, præclava latitudine sua sesqui longiore; thorace subviolaceo-nigro, nitidulo, subtilissime punctulato, cingulo aurantiaco, axillis puncto violaceo-nigro, metathorace lævi, carina dorsello longiore; alis subfumato-hyalinis, metacarpo setoso radio longiore; pedibus haud validis, pallidis, basi, interdum macula femorum anteriorum fusca; abdomine pallido, apicem versus fusco.

Sällsynt i Småland.

7. *C. caudatulus* m: Subviolaceus, fascia ante scutellum aurantiaca, terebra metatarsi longitudine, metacarpo radio longiore. ♀ Long. fere 3 mill.

Præcedenti simillimus, fascia basin scutelli haud occupante, metacarpo brevior, terebra longiore discedens.

Sällsynt i Skåne.

Genus *Melittobia* Westwood.

Caput rotundum, vertice haud lato, immarginato; fronte ante ocellos linea transversa impressa, his in lineam parum curvam dispositis, oculis ♂ tantum puncto nigro laterali indicatis; clypeo apice medio subinciso; peristomio lato, mandibulis sat crassis. Antennæ mox supra clypeum insertæ, scapo ♂ valde compresso-dilatato, apice profunde sinuato, pedicello in angulo supero inserto brevi. Thorax haud robustus, pronoto vix transverso, collari haud discreto, mesonoto cum scutello planiusculis, dorsello valde angusto, metathorace sat brevi. Alæ ♂ breves abdominis basin vix superantes. Abdomen subrotundum. Pedes validi, haud longi, coxis posticis magnis, compresso-ovatis,

tibiis posticis femoribus haud longioribus, calcari metatarsi longitudine, hoc haud brevi.

Då jag endast har fragmenter af en art, som bör tillhöra detta slägte, kan jag ej uppgifva alla dess karakterer. Till habitus och genom de grofva benen med lång sporre tyckes den sluta sig nära till *Euplectrus*, men afviker väsentligen genom hufvudet, som ej är afsmalnande framtill och försedt med en intryckt tvärlinja straxt framför ocellerna, genom endast en sporre på bakbenens tibier och genom antennerna, som äro fästade straxt ofvanför clypeus, hvilken i spetsen har en liten inskärning i midten.

1. *M. Osmice* m: Pallida, fere glabra et lævis, abdomine rotundo. ♂ Long. 2 mill.

Funnen i Skåne och utkläckt ur en *Osmia*-hanne.

Tribus *Elasmina*.

Caput semiglobosum, fronte parcius fortiter punctata. Antennæ funiculo 3-articulato. Thorax pronoto brevi, scapulis haud discretis, scutello depresso, dorsello membranaceo-albido. Alæ angustæ, stigmata longo, radio brevissimo fere punctiformi, metacarpo distincto. Abdomen sessile, ventre compresso. Pedes sensim longiores et validiores, postici coxis maximis scutatis, tibiis apice 2-calcaratis. Mas antennis 3-ramosis.

Denna grupp afviker från alla genom bakbenens starkt utbildade, nästan sköldformiga höfter, genom kort knoppformig radius och långt stigma i de smala vingarne, genom pannan som är kullrig med stark punctur samt genom 3-greniga antenner hos hannen. Genom sistnämde karakter sluter den sig till *Eulophina*, ehuru för öfrigt i hela byggnaden väsentligen afvikande derifrån. Den crinrar äfven något om *Colotrechnus* bland pentamererna särskilt med afseende på den korta radius och i viss mån äfven om *Ormyrus*.

Genus *Elasmus* Westwood.

Aneure Nees.

Caput antrorsum subangustatum, vertice acuto, oculis subovatis, ocellis in triangulum dispositis. Antennæ infra

medium faciei insertæ, scapo ocellum haud attingente, flagello haud incrassato. Thorax punctura obsoleta, scutelli sutura tenui, metathorace carina nulla, apice haud declivi. Alæ costa stigmate brevior, cellula costali angustissima. Abdomen triquetrum, terebra vix prominula. Tibiæ posticæ subtus spinulosæ. Mesosternum læve, episterna haud discreta, epimera fere triangularia. Corpus nigrum, supra metallicum.

Arterna lefva parasitiskt på *Microgaster*.

1. *E. viridiceps* m: Subcoeruleus, capite viridi, profunde punctato, alis fumatis. Long. 3 mill.

Caput thorace angustius, viridi-æneum, vertice acuto, ocellis haud magnis; facie parce profunde punctata, scrobe brevi, clypeo apice mutico, mandibulis pallidis, dente basali lato; genis oculis duplo brevioribus, his glabris subovalibus. Antennæ nigro-fuscae, sat longæ, infra lineam ocularem insertæ, basi distantes; articulo 1:o subtus testaceo, medium faciei haud superante, 2:o triangulari, 3:o vix conspicuo, 4—6 crassitie æqualibus, sensim parum brevioribus, 6:o latitudine sua longiore, clava 3-articulata, præclava haud duplo longiore. Thorax longiusculus, compressus; pronoto brevi, sublunato; mesothorace subcoeruleo, parce nigro-piloso, punctis haud magnis, oblique impressis; scutello subquadrato, apice rotundato, plano, setis, 2 basalibus, 2 apicalibus instructo; dorsello albido, elongato-triangulari; metathorace viridi, fere lævi, coxis posticis superne conspicuis. Alæ longæ, totæ pubescentes, apice ciliato semicirculariter rotundato, sub stigmate, præsertim postice fumatæ, metacarpo brevi sed radio subsessili duplo longiore. Abdomen elongatum, thorace longius, acuminatum, nigrum, basin versus picescens, fere glabrum, nitidum, segmentis ultimis pilosulis longis, 2:o 3:o vix duplo longiore. Pedes nigricantes, antici genibus et tibiis albido-testaceis, posticis coxis et femoribus, dense

subtilissime strigosis, tarsis tibia longioribus. Mesosternum glabrum, præternis magnis, episternis haud discretis, epimeris vix nisi subtilissime punctulatis late triangularibus.

Sällsynt i Lappland.

2. *E. fumipennis* m: Supra subcoeruleus, alis fumatis, antennis præclava haud transversa. ♀ Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, capite fusco-æneo, antennis minus longis, etsi præclava haud transversa, dorsello paullo brevior, abdomine minus acuminato, thorace vix longiore discedens.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

3. *E. albipennis* m: Subcoeruleus, antennis brevibus, præclava transversa, alis albidis. Long. 2—3 mill.

Elasmus flabellatus Westw. Phil. Mag. I. c. III. pag. 343. (forte).

Aneure scutellaris Nees l. c. 195. 2. (forte).

Præcedenti statura, colore et magnitudine similis et affinis, sed alis haud fumatis, antennis flagello pilosello, fere incrassato, præclava latitudine sua brevior; ♂ antennis funiculi apice et ramis subplumatis, his ex articulis 3—5 brevissimis enascentibus, longis fuscis.

Sällsynt i medlersta och södra Sverige.

Tribus Eulophina.

Corpus metallicum. Caput scrobe antennali ad ocellos usque extensa, subtriangulari, vertice haud acuto clypeo apice mulico, mandibulis dente basali lato. Antennæ funiculo 3—4-articulato, ♂ sæpe ramosæ. Pronotum collari haud discreto. Mesonotum scapulis haud discretis vel sulcis tenuissimis; scutello sutura haud angulata, setis 4, 2 prope basin, 2 ante apicem instructo; metathorace

sæpius carina media instructo. Alæ metacarpo radio haud brevior, hoc sat longo, præstigmatè haud fracto, postcosta 5—8-setosa. Abdomen subsessile. Pedes coxis posticis normalibus, fortiter punctatis, tibiis 2- vel 1-calcaratis. Mesopleura sutura bene divisa.

Denna grupp öfverensstämmer med *Elachistina* i scutellens 4 borst, af hvilka 2 vid basen, 2 närmare spetsen, i vingarne, hvilka hafva præstigmat ej brutet, tydligt utbildad metacarpus och jemförelsevis lång radius samt i starkare utbildad metathorax; men den skiljes genom mesonotum, hvars scapulæ ej alls äro afsatta, eller sulci dorsi fina träffande in på midten af axillæ, genom abdomen som har ytterst kort skaft, genom i allmänhet kortare pronotum och ej skarpkantad hjessa. Scutellen har sällan dorsal-linjer. Metapleura äro ej små. Bakbenens höfter på yttre sidan oftast grofkornigt puncterade.

De flesta hithörande arter tyckas lefva parasitiskt på bladminnare, särdeles af småfjärilar och Coleoptera.

Conspectus generum.

A) Scutellum lineis dorsalibus nullis.

a) Antennæ fronti medio insertæ, scapo longo ocellum superante. Antennæ ♂ 3-ramosæ. Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Scapulæ haud discretæ. Scutellum sutura utrinque minus sinuata. *Hemiptarsenus*.

aa) Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo ocellum haud superante. Tibiæ posticæ plerumque 2-calcaratæ.

b) Mesonotum sulcis completis.

c) Antennæ ♂ 3-ramosæ. Abdomen elongatum. *Teleogmus*.

cc) Mesonotum sulcis sat profundis. Clypeus apice exciso.

Olinx.

bb) Mesonotum scapulis haud discretis.

d) Tibiæ posticæ evidenter 2-calcaratæ.

e) Abdomen ♀ elongatum. Caput oculis magnis glabris. Alæ præstigmatè radio evidenter longiore, hoc quam stigmatè saltim triplo brevior. Antennæ ♀ funiculo 4-articulato,

- articulis haud transversis, compressis, ♂ simplice subtus pallido, 5-articulato. *Sympiezus.*
- ee) Alæ radio quam stigmatē haud triplo breviorē. Antennæ ♂ 3-ramosæ, rarissime simplices.
- f) Thorax crassus. Antennæ funiculo ♀ 3-articulato infra lineam ocularem insertæ, ♂ interdum simplices. Pedes validi. Abdomen in utroque sexu ovale vel rotundum. Alæ metacarpo quam radio vix longiorē. *Cratotechus.*
- ff) Thorax haud robustus. Pedes minus validi. Abdomen ♀ subtus parum convexum elongatum vel ovatum, apice acuminatum. Antennæ ♂ 3-ramosæ.
- g) Antennæ ♀ flagello fusiformi-compresso, ♂ ramis brevibus. Thorax dense subtiliter punctatus. Alæ ♀ fumatæ. *Microplectron.*
- gg) Antennæ ♀ flagello haud fusiformi-compresso.
- h) Antennæ funiculo ♀ albo, subserrato, brevi, ♂ ramis brevibus. Alæ disco macula lata fumata. Thorax supra depressus. *Microlycus.*
- hh) Antennæ ♀ funiculo nigro, longo, ramis ♂ longis. Alæ metacarpo radio evidenter longiorē. *Eulophus.*
- dd) Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Metathorax carina media. Antennæ ♀ funiculo et clava 3-articulatis. Alæ hyalinæ, metacarpo radio parum longiorē. Tibiæ metallicæ, basi et tarsis basi albidis. *Necremnus.*
- B) Scutellum utrinque linea dorsali impressa. Antennæ funiculo et clava ♀ 3-articulatis. Alæ hyalinæ.
- i) Tibiæ posticæ 2-calcaratæ. Metathorax carina et plica distinctis. *Diglyphus.*
- ii) Tibiæ posticæ 1-calcaratæ. Metathorax vix carinatus. Scutelli lineæ profundæ. Antennæ ♂ simplices. *Solenotus.*

Genus *Hemiptarsenus* Westwood.

Caput fere semiglobosum, vertice sat lato, antrorsum fortius angustatum, ocellis in triangulum dispositis, oculis magnis convexis. Antennæ longæ, in medio faciei, longe

supra lineam ocularem insertæ, funiculo 4-articulato, articulo 1:o lineari, ocellum anteriorem longe superante, præclava haud transversa. Thorax longus, pronoto vix transverso; mesonoto cum scutello fortiter crebre punctato, hoc sutura utrinque minus sinuata, scapulis haud discretis; metathorace punctatissimo, rarius carina instructo, costula nulla. Alæ angustæ, stigmatæ costa fere longiore, metacarpo radio longiore, cellula costali angusta. Abdomen subovatum, petiolo conspicuo. Pedes sæpe graciles, tibiis posticis unicalcaratis. Antennæ maris triramosæ, ramis longis plumatis. Episterna mesothoracis bene discreta, sutura anteriore minus curvata; præsterna magna triangularia, punctatissima. Corpus gracile, parum pubescens, antennis ♀ clava sæpe nivea.

Detta slägte skiljes lättast från alla de öfriga genom antennerna, hvilka äro fästade högt upp på pannan med skaftet långt, räckande betydligt öfver den främre ocellen, genom endast 1 sporre på bakbenens tibier, smala vingar och gracil kroppsform.

A) Antennæ ♀ clava nivea. Metathorax punctatissimus, carina nulla. Coxæ ♀ albæ.

1. *H. fulvicollis*: Viridis, thorace fulvo-maculato, antennis scapo subtus pedibusque albidis, femoribus tibiisque fusco-lineatis ♀. Long. 2—3 mill.

Westw. Loudon's Mag. Nat. Hist. VI. 123.

Eulophus fulvicollis Walk. Mon. Chalc. 190. 85.

Species concinna. Caput dense subtilissime punctatum, facie obscure coerulea, fronte et vertice subcyaneis, genis oculis pubescentibus duplo brevioribus, clypeo apice mutico. Antennæ nigræ, scapo subtus albo, funiculis articulis sensim fere latioribus, præclava latitudine sua saltem duplo longiore, clava 2-articulata nivea. Thorax supra fere glaber, confertim punctatus, pronoto obscure coeruleo, mesonoto ante tegulas, axillis lateribus scutelloque fere ad medium fulvo-aurantiacis; dorsello et meta-

thorace punctatissimis, hoc lætius virescenti, medio haud producto, spiraculis a postscutello remotis. Alæ hyalinæ, postcosta 8—10 setosa, metacarpo radio duplo longiore, hoc clava parva quam stigmatē fere triplo breviorē, metacarpo radio paullo breviorē, cellula basali et speculo glabris, cubito evidenter subflexuoso. Abdomen ovato-elongatum, rufescens, basi et apice viridi, postpetiolo brevi. Pedes pallidi, parum pubescentes, coxis anticis albidis, intermediis macula basali viridi, femoribus superne fuscis, tibiis longis, externe fuscis; tarsis articulis 1—3 sensim brevioribus. Mesosternum rufum antice punctulatum, episternis lævibus, epimeris oblongo-triangularibus. Variat thorace immaculato, coxis albidis, femoribus tibiisque pallide testaceis immaculatis.

Sällsynt i Skåne.

2. *H. albicoxa* m: Viridis, pedibus sat crassis, coxis albidis, alis medio sub stigmatē fuscis, interdum abbreviatis. Long. 2 mill.

Eulophus Anementus Walk. l. c. 191. 87.

Hemiptarsenus fulvicollis mas Westw. l. c.

Elachestus pulcherrimus Foerst. l. c. 40. 10. (verosimiliter).

Eulophus Tarandus Foerst. l. c. 44. 32. (forte).

A præcedente capite cyaneo, inferne saturate coerulesco; antennis scapo superne magis arcuato, flagelli articulis minus longis; thorace breviorē, mesonoto latitudine sua duplo breviorē; alis medio subfumatis, interdum medium abdominis vix attingentibus, metacarpo radio haud sesqui longiorē, postcosta parcius setosa; abdomine breviorē; pedibus validioribus, coxis albis, intermediis basi viridibus, femoribus testaceis, anterioribus superne striga fusca; scutello cupreo, vel violaceo vel viridi, sculptura fere intricato-sericea discedens.

Mas differt: antennis ramis 3 tenuibus, parce plumatis sat longis, articulo 1:o subtus pallido ocellum superante, thoracis sculptura subtiliore, alis hyalinis, longis, pedibus gracilioribus sed colore ♀.

Sällsynt i södra Sverige.

B) Antennæ ♀ clava nigra. Metathorax longus, carina plerumque et plica abbreviata instructus. Petiolus distinctus.

3. *H. unguicellus*: Viridis, pedibus variis, abdomine viridi vel lateribus rufescentibus.

Entedon unguicellus Zett. Ins. Lapp. 427. 7.

Eulophus Gonippus Walk. Mon. Chalc. 132. 11.

Elachestus pellucens Foerst. l. c. 39. 3. (♀).

Eulophus alcicornis Foerst. l. c. 43. 24. (♂).

Eulophus Antilope Foerst. l. c. 43. 27. (♂).

Eulophus 6-radiatus Foerst. l. c. 44. 29. (forte).

Eulophus harmocerus Foerst. l. c. 44. 35. (forte).

Elachestus fusciventris Nees l. c. 145. 14. (forte).

Species colore pedum, abdominis, antennarum scapo scutelloque varians, petiolo abdominis magis conspicuo, ♂ pallido ab omnibus hujus tribus optime distinguenda. Caput thorace angustius, cyaneum, læve glabrum, oculis subpubescentibus, magnis prominulis, vertice lato. Antennæ fere supra medium frontis insertæ, basi minus distantes, articulo 1:o ocellum longe superante, funiculo 4-articulato, articulis sensim paullo brevioribus, haud latioribus, 4:o crassitie sua longiore, clava 2-articulata nigra quam præclava paullo longiore. Thorax longus gracilis, supra fere glaber, confertim fortiter punctatus; metathorace haud transversa, pone coxas subproducto, crebre et concinne punctato, plerumque carina media integra et plica paral-

lala abbreviata instructo. Alæ longe ciliatæ, cellula costali angusta, metacarpo radio fere duplo longiore, hoc sub angulo sat acuto egrediente, clava et unco distinctis, quam stigmatæ fere triplo brevioræ, cellula basali et speculo nudis, postcosta 5—6-setosa. Abdomen subovatum, thorace fere brevius, petiolo sat distincto. Pedes minus graciles, tarsis posticis articulis sensim longitudine decre-scentibus. Mesosternum antice punctatum, episternis fere lævibus sutura anteriore minus fortiter curvata, epimeris, metapleuris et præsternis punctatissimis.

Variat antennis scapo viridi, vel subtus flavo-albido, flagello nigro vel fusco; scutello viridi vel cupreo-violaceo; alis fumato-hyalinis, vel puris; abdomine rufo, basi apiceque viridi, vel vitta media ænea, vel viridi, lateribus rufescentibus, vel toto viridi; pedibus totis flavo-albidis vel coxis viridibus, apice pallidis, femoribus rufo-testaceis vel superne fuscis, petiolo rufo vel æneo.

Mas differt: antennis sat tenuibus, articulo 1:o viridi, vel subtus pallido, parum dilatato, 2:o transverso, 3—5 sensim longioribus, singulis ramum parcius plumatum, 5:o fere e medio emittentibus, 6:o 5:o vix sesqui longiore, clava 6:o vix brevioræ, petiolo haud transverso. Variat pedibus totis pallidis, vel coxis basi et vitta femorum fuscis, tibiis posterioribus interdum triente apicali nigro-fusco.

Ej sällsynt.

Genus *Teleogmus*.

Eulophus Nees.

Caput clypeo integro, vertice angusto, antrorsum parum angustatum. Antennæ infra medium faciei planiusculæ insertæ, funiculo 4-articulato, ♂ 3-ramosæ, scapo ocellum anteriorem haud superante. Thorax pronoto brevi, mesonoto sat fortiter punctato, scapulis discretis, sed sul-

cis tenuibus. Alæ stigmatæ radio saltim duplo longiore. Abdomen elongatum. Pedes sat validi, tibiis posticis 2-calcaratis.

Detta slägte skiljes lätt från *Eulophus*, med hvilket det visar mesta öfverensstämmelse på de tydligt afsatta scapulæ. *Olinæ* har visserligen äfven scapulæ afsatta, men dels har sistnämde genus mycket djupare sulci mesonoti, dels är clypeus i midten utskuren ofta brungul till färgen, så att någon förvexling dem emellan ej bör kunna ega rum. Scutellen har inga intryckta linjer, antennerna hos hannen äro i spetsen glest långhåriga.

1. *T. xanthostomus*: Viridis, antennis scapo subtus, pedibus fere totis sæpe etiam facie pro parte stramineis, metathorace fere lævi: ♂ antennis apice pilosis, ramis plumatis. Long. 2—4 mill.

Eulophus xanthostomus Nees l. c. 169. 23.

Eulophus frontalis Nees l. c. 161. 11. (forte).

Caput thorace vix angustius, genis brevibus, oculis glabris subovatis magnis duplo brevioribus; vertice angusto, ocellis in lineam parum curvam dispositis; facie punctatissima, plerumque inferne et orbita interiore, rarius exteriore stramineis. Antennæ longæ, vix supra lineam ocularem insertæ; articulo 1:o compresso-dilatato, subtus albido, 2:o triangulari, 3:o vix conspicuo, 4—7 compressis, subtus pallidis vel fuscis, 4:o crassitie sua sesqui, 7:o parum longiore, clava postannello brevior. Thorax sat robustus, supra parum convexus, nitidus, parce albido-pubescentis, setis longis ordinariis albidis biseriatis; pronoto transverso, mesonoto paullo angustiore, hoc cum scutello minus grosse, sed crebre punctatis, dorsello magno; metathorace apice haud producto, subtilissime punctato, plica nulla, carina rarius instructo, calli fimbria densa. Alæ longæ, amplæ, hyalinæ, interdum puncto fusco radii clavæ adhærente ornatæ; stigmatæ basin versus lenissime incrasato, quam radio triplo longiore, hoc clava et unco distinctis, metacarpo radio duplo longiore quam præstigmatæ

parum longiore; cellula costali lata, postcosta 8- 9-setosa, basali et speculo nudis, cubito pone nervum basalem flexuoso, n. spurio postice linea nuda indicato. Abdomen ovato-elongatum, postice acuminatum. Pedes sat validi, tibiis posticis calcaribus sat longis, tarsis articulis 2 primis longitudine aequalibus, 3—4 brevioribus. Mesosternum et pleura ferè lævia, his sutura haud profunda arcuata, epinemiis nullis.

Variat corpore supra viridi vel subcyaneo, abdomine cupreo vel viridi, subtus interdum pallido; facie tota impicta; mesosterno cupreo-purpureo; pedibus stramineis, coxis anticis totis et posterioribus apice concoloribus vel viridi-æneis; femoribus posticis macula superne, vel posterioribus fere totis æneis.

Mas differt: facie et antennis scapo æneis, his funiculi articulis 1—3 ramos longos plumatos e basi emittentibus, 4:o longissimo et clava parce sed sat longe pilosis; coxis et femoribus æneis.

Þj sällsynt från Skåne till Dalarne.

2. *T. arcticus* m: Cupreo- et purpureo-variegatus, metathorace plica angulata et carina instructo. ♀ Long. 4 mill.

Statura et sculptura fere *Eulophi pectinicornis*, a præcedente capite antrorsum magis angustato, facie lævi, atrovioacea, inferne cyanea, medio subtilissime punctata, oculis dense pubescentibus; metathorace longiore, lævi, carina media et plica infra medium angulata evidenter elevatis, costula nulla; abdomine brevior; alis radio longiore; mesosterno antice punctulato, mesopleuris sutura fortius impressa et magis arcuata; pedibus fusco-æneis, trochantaribus, tibiis anticis margine anteriore, posterioribus ultra medium tarsisque basi pallide flavis.

Sällsynt; funnen i Luleå Lappmark.

Genus *Olinx* Foerster.*Cyniphoctonus* Reinh.

Caput vertice sat lato, clypeo apice medio inciso. Antennæ ♂ simplices, funiculo 3-articulato. Thorax scapulis sulcis profundis discretis. Alæ stigmati radio parum longiore, hoc clava magna, sub angulo minus acuto egrediente, plerumque fasciis 2 fuscis ornatæ. Abdomen subsessile, subtus carinatum. Pedes validi, tibiis posticis bicalcaratis. Præsternum distinctum, transverso-triangelare. Mesopleura sutura anteriore haud curvata.

Detta slägte skiljes från alla inom gruppen genom scapulæ, som äro afsatta medelst djupa sulci, hvilka träffa axillæ på insidan om midten, genom ovanligt starkt utbildad radius och jämförelsevis kort stigma.

Arterna lefva parasitiskt i galläplen på Ek.

1. *O. Gallarum*: Viridis, antennis brunneis, genubus tibiisque stramineis. Long. 2--3 mill.

Ichneumon Gallarum Lin. Fauna Sv. 409. 1638.

Eulophus Gallarum Nees l. c. 170. 24.

Entedon scianeurus Ratz. l. c. I. 164.

Caput thoracis latitudine, vertice sat lato, ocellis fere in triangulum dispositis, linea transversa versus oculos rotundos prominulos rubros ducta; genis buccatis sulco longo distincto; facie præsertim inferne punctis majoribus, setas nigras gerentibus, parcius impressa, clypeo apice inciso; mandibulis sat validis, dente basali latissimo, rufis. Antennæ in medio faciei insertæ, basi distantes; articulo 1:o subcompresso, pallido, 2:o triangulari, anello vix conspicuo, funiculi articulis fuscis vel rufescentibus, 3:o subtransverso, crassitie fere æqualibus, clava 2-articulata, apice obtusa. Thorax sat robustus, viridis, sat nitens, dense omnium subtilissime punctatus et seriebus mesonoti

dorso juxta sulcos punctorum majoribus; scutello magno, convexo, dorsello magno, sutura utrinque sat fortiter sinuata; metathorace fere lævi, carina basi fere dentato-elevata dorsello haud longiore, sulco spiraculari externo sat profundo. Alæ fere hyalinæ, costa stigmatè paullo longiore, cellula costali lata, basali et speculo nudis, stigmatè radio fere duplo longiore, hoc clava magna versus discum inflexa, metacarpo radio fere brevior. Abdomen oblongum, apice acuminatum, valvula ventrali medium superante. Pedes ænei, trochanteribus, genubus, tibiis tarsisque pallide citrinis. Mesosternum antice cum metapleuris et epimeris omnium subtilissime dense punctatum.

Mas differt: antennis funiculo 4-articulato, pilosello, clavæ nempe articulo 1:o libero, et scapo breviorè obscurioribus.

Temligen allmän i medlersta och södra Sverige; utkläckt ur *Cynips terminalis*.

2. *O. fulvicrus* m: Viridis, alis 2-fasciatis, metathorace dense subtilissime punctato, scutello lineis 2 discoloribus, tibiis luteis. ♀ Long. 3 mill.

Eulophus fumatus Ratz. l. c. III. 205. 5. (forte).

Præcedenti simillimus, sed major, abdomine brevior, metathorace dense punctulato, carina basi haud elevata, alis fasciis 2 fuscis, altera sub radio, altera sub stigmatidis origine, radio longiore, quam stigmatide haud duplo brevior, tibiis fulvo-luteis, scutello, medio fere aureo, lateribus linea haud impressa sed discolore, subcyanea discedens.

Ej sällsynt i södra Sverige men endast honor.

3. *O. rotundiventris* m: Viridis, abdomine subrotundo, alis fasciis 2 fuscis, tibiis citrinis. ♀ Long. 2—3 mill.

O. fulvicruri alis, clypeo et antennarum insertionem ferrugineis affinis, sed minor, antennis funiculi articulis

brevioribus, tibiis flavo-citrinis, abdomine subrotundo, metathorace medio fere lævi scutello haud cyaneo-bilineato discedens; ab *O. Gallarum* abdomine rotundo, alis bifasciatis, radio longiore, antennis brunneis brevioribus distinctus.

Sällsynt i Småland.

Genus *Sympiezus*.

Caput oculis magnis, glabris, genis brevibus, facie punctatissima clypeo apice medio haud inciso, vertice angusto. Antennæ scapo compresso-dilatato, æneo ocellum haud superante, funiculo longo, compresso, 4-articulato, ♂ 5-articulato subtus pallido haud ramoso. Thorax scapulis haud discretis, scutello linea nulla laterali, metathorace lævi, carina media integra, plica posteriore sed costula nulla instructo. Alæ hyalinæ, præstigmate longo, basin versus lenissime incrassato, quam radio brevi saltem triplo longiore. Abdomen elongatum. Pedes sat validi, tibiis posticis 2-calcaratis, tarsis articulis 1—2 elongatis, 3—4 brevibus.

Detta slägte står mycket nära *Eulophus*, hannarne skiljas lätt på antennsträngen, som är 5-ledad, ej grenig. Honorna hafva stora, ej håriga ögon, vingarne äro klara med præstigmat längre än radius, som är jemförelsevis kort, stigmat är långt, något tilltjocknande mot basen och 3 gånger så lång som radius, metathorax utan punctur, abdomen särdeles långsträckt.

1. *S. sericeicornis*: Viridis, subtus et abdomine coerulescens, genubus fuscis, tarsis basi albidis. Long. 1—4 mill.

Eulophus sericeicornis Nees l. c. 168.

Eulophus Eneugamus Walk. Mon. Chalc. 160.

Entedon laticornis Ratz. l. c. II. 163.

Species pedibus æneis, tarsis basi albidis mox distincta. Caput thorace vix angustius, vertice angusto, ocellis in lineam parum curvam dispositis; facie superne violacea, ante ocellos linea transversa impressa, scrobe lineari, inferne furcata; genis oculis duplo brevioribus. Antennæ longæ et validæ, longe infra medium faciei, mox supra lineam ocularem insertæ, basi distantes; articulo 1:o viridi-æneo, subcompresso, 2:o breviter triangulari, 3:o vix conspicuo, 4—7 fortiter compressis nigris, sensim brevioribus, 7:o latitudine sua longiore, clava 2-articulata, postannello brevior. Thorax sat latus, pronoto mesonoto paullo angustiore, hoc fere glabro, confertim subtiliter punctato; scutello vix subtilius punctato; metathorace apice haud producto, nitido, impunctato, carina integrâ et plica posteriore medium attingente ibique abrupte desinente evidenter elevatis. Alæ amplæ vitreæ, longæ, haud angustæ, cellula costali lata, basali et speculo magno nudis, metacarpo radio fere duplo longiore, hoc sub angulo sat acuto egrediente, nervo spurio linea nuda indicato, n. cubitali pone n. basalem vix flexuoso. Abdomen sessile elongatum, apice acuminatum, atro-coeruleum, basi viride, postpetiolo apice rotundato. Mesosternum atroviolaceum, antice, epimeris et metapleuris subtiliter creberrime punctatis, sutura pleurali antice vix curvata, præsterna fortiter punctata. Pedes nigro-ænei, genibus fusco-rufis, tarsis basi albis.

Mas differt: corpore minore, antennis funiculo articulis 5 subtus pallidis, 3 primis brevibus æqualibus, 4:o et 5:o longioribus.

Ej sällsynt i Skånes löfskogar, sparsamt i Småland.

2. *S. punctipleura* m.: Viridis, tibiis anterioribus testaceis. Long. 2—4 mill.

Præcedenti simillimus, sed facie subcyanea, inferne purpurascenti, tibiis anterioribus testaceis, pectore vi-

ridi, mesosterno antice cum pleuris fortius punctatis discedens.

Þj sällsynt i norra och medlersta Sverige.

Genus *Cratotechus*.

Eulophus Auctorum.

Caput antrorsum fortiter angustatum, peristomio parvo, vertice angusto, oculis sat magnis. Antennæ infra oculos faciei inferne prominulæ insertæ, funiculo 3-articulato, ♂ simplices vel 3-ramosæ. Scapulæ haud discretæ. Mesonotum breve, scutello lineis nullis dorsalibus impressis. Metathorax punctatus, carina et plica instructus. Alæ radio haud brevi. Abdomen rotundum vel ovale supra immersum, subtus convexum, apice obtuso. Pedes validi, tibiis posticis 2-calcaratis.

Detta slägte skiljes lättast från alla öfriga genom den undersåtsiga kroppen, de grofva låren, den ovala eller runda abdomen, som hos båda könen är trubbig i spetsen samt genom antennerna, som äro fästade nedom ögonlinjen på ansigtets nedre del, hvilken är framstående.

1. *C. Larvarum*: Viridis, alis interdum umbra fusca discoidali, antennis flavis, scapo pedibusque cum coxis anticis stramineis, abdomine ovali, basi sæpe pallido: ♂ antennis simplicibus vel ramis 3 debilibus, parcius plumatis haud longis ornatis. Long. 3—4 mill.

Ichneumon larvarum Lin. Fauna Sv. 1637.

Eulophus ramicornis Nees l. c. 152. 1.

Eulophus larvarum Nees l. c. 157. 7. Walk. Mon. Chalc. 125. 1.

Eulophus Euedoreschus Walk. Mon. Chalc. 188. 85.

Eulophus bombycicornis Ratz. l. c. I. 161.

Eulophus Phalaenarum Ratz. l. c. I. 166.

Eulophus fumatus Ratz. l. c. II. 156.

Entedon larvarum Zett. Ins. Lapp. 429. 1.

Species ab affinis coxis anticis stramineis, abdomine ovali, axillulis superne haud discretis optime distinguenda. Caput fortiter transversum, ocellis in lineam vix curvam dispositis, facie subtilissime punctata, linea nulla transversim impressa ante ocellos; genis haud brevibus, oculis glabris, convexis, ovato-rotundis. Antennæ testaceæ basi distantes, articulo 1:o ocellum haud attingente, subcompresso-dilatato, funiculi haud compressi articulis crassitie fere æqualibus, sensim paullo brevioribus, præclava subtransversa, clava 3-articulata apice obtusa, quam postan-nello haud longiore. Thorax robustus, supra fere glaber, dense subtiliter punctatus; metathorace brevi, concinne subtilissime punctato, carina media dorsello paullo longiore, plica postice indicata sed medium haud attingente. Alæ hyalinæ, fere vitreæ, disco interdum umbra subfumata, stigmate radio haud duplo longiore, hoc quam metacarpo parum brevior, cellula costali lata, basali et speculo nudis, nervo cubitali pone n. basalem vix flexuoso. Abdomen sessile, ovale cupreo-violaceum, fascia basali pallida, postpetiolo magno, supra immersum, subtus convexum, valvula ventrali trientem apicalem attingente. Pedes validi, straminei, coxis posterioribus æneis; tarsis posticis articulo 1:o 2:o fere brevior, 4:o 3:o paullo longior. Mesosternum epinemiis nullis dense subtilissime punctatum, episternis lævibus sutura anteriore minus curvata.

Mas differt: antennis funiculi articulis sensim paullo longioribus, pubescentibus, interdum singulis ramum haud longum, molliter plumosum emittente.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland. Den lefver i Noctua larver.

2. *C. æneicoxa* m: Viridis, coxis æneis, antennis testaceis scapo pedibusque stramineis, abdomine ovali: ♂ antennis 3-ramosis. Long. 3 mill.

Præcedenti statura et magnitudine simillimus, sed coxis omnibus æneis, metathoracis plica longiore, alis macula nulla discoidali, præstigmate radio longiore, hoc metacarpi longitudine, quam stigmate duplo brevioris discedens.

Sällsynt; utkläckt ur en *Harpyia*-larv från Reften nära Lund. Papporna svartbruna.

3. *C. longicornis* m: Viridis, antennis longis fuscis, scapo pedibusque stramineis, coxis posticis viridibus. ♀ Long. 3 mill.

C. Larvarum alarum nervis, statura et magnitudine similis et affinis, sed antennis supra fuscis, longioribus et tenuioribus, præclava crassitie sua sesqui longiore, capite adhuc fortius os versus angustato, thorace minus lucido, abdomine ventre et macula prope basin pallidis, pedibus minus validis, episternis haud politis, coxis anterioribus totis, posticis apice stramineis bene distinctus.

Sällsynt i medlersta Sverige.

4. *C. opaculus* m: Obscure æneus, antennis fuscis, scapo genubus, tibiis tarsisque obscure rufis, axillulis discretis. ♀ Long. 3 mill.

Species antennarum structura *C. Larvarum* similis, sed corpore subopaco, obscure olivaceo-æneo, antennis flagello et femoribus fere totis fuscis, metathorace dense sed concinne punctato, abdomine ventre et macula basali obscure rufis, alis lenissime fumatis metacarpo radio sesqui longiore, axillulis scutelli superne linea impressa a dorsulo discretis a præcedentibus mox discedens.

Sällsynt i medlersta Sverige.

5. *C. angularis* m: Obscure viridis, ungue longo crasso, antennis subincrassatis, abdomine rotundo, ♂ antennis simplicibus, ventre apice spinuloso-muricato. Long. 2—3 mill.

Species antennis subincrassatis, haud validis, scapo et pedicello longo stramineis; axillulis discretis; alis stigmatate radio saltem duplo longiore, metacarpo radio evidenter longiore; abdomine rotundo; pedibus validis stramineis, coxis posticis viridibus, femoribus anticis supra fuscis, ungue longo et crasso, ♂ antennis longius et densius pilosulis, funiculo 4-, clava 2-articulata femoribus omnibus fuscis, abdomine subtus apice margine spinulis nigris muricato mox distincta.

Ej sällsynt i södra Sverige.

Genus *Microplectron* Dahlbom.

Entedon Zett.

Antennæ paullo supra clypeum insertæ, flagello ♀ compresso-fusiformi, ♂ ramis 3 brevibus instructo. Oculi magni glabri. Alæ fumatæ, cellula costali angusta metacarpo radio vix longiore. Mesonotum subtiliter punctatum. Pedes sat validi, tibiis posticis 2-calcaratis. Metathorax sublævis carina, sed plica nulla instructus. Abdomen oblongum.

Detta släkte skiljes lättast på antennerna, hvilka hos ♀ äro starkt tenformigt hoptryckta, hos hannen med 3 korta grenar, genom aflång abdomen, fin köl men ingen fälla på metathorax, genom de korta vingarne, som hafva smalt costalfält, radius utgående under ganska spetsig vinkel med tydlig, snedt inåtriktad klubba.

Den enda kända arten lefver i *Lophyrus*-puppor.

1. *M. fuscipennis*: Obscure olivaceo-æneus, antennis nigris, scapo pedibusque albidis, femoribus et ♂ coxis fusco-æneis, alis fumatis, basi hyalinis: ♂ antennis scapo metallico. Long. 2—3 mill.

Entedon fuscipennis Zett. Ins. Lapp. 427. 9.

Eulophus Lophyrorum Ratzeburg l. c. I. 162. 6.

Caput thorace fere latius, dense subtilissime punctatum, vertice angusto, ocellis fere in lineam transversam dispositis, oculis magnis, convexis, albidis, subovato-rotundis, genis vix buccatis duplo longioribus. Antennæ fere infra lineam ocularem insertæ; articulo 1:o albo, lineari, ocellum anteriorem attingente, 2:o oblongo-triangulari, funiculi articulis sensim latioribus et brevioribus, 4:o fere transverso clavæ 2-articulatæ sat contiguo. Thorax minus robustus, supra obscure olivaceo-æneus, minus nitidus, dense subtilissime punctatus, fusco-pilosellus, scapulis haud discretis, scutello linea nulla laterali impresso, dorsello magno, metathorace haud producto, sublævi, carina dorsello paullo longiore. Alæ abdomen haud superantes, angustæ, radio sub angulo acuto egrediente, clava versus discum subinflexa; fumatæ, apice dilutiores, basi hyalinæ, præstigmatæ haud magno, nervo spurio haud conspicuo, cubitali vix flexuoso. Abdomen subsessile, subovatum, thorace haud brevius, æneum. Pedes sat validi, albidotestacei, femoribus fuscis; tarsis posticis articulis longitudine fortius decreascentibus, 1:o 3:o duplo longiore, hoc ungue æquali, coxis posticis oblongis minus fortiter punctatis. Mesosternum subtilissime punctatum, episternis lævibus, sutura anteriore haud curvata.

Mas differt: antennis metathoracem haud superantibus, articulo 1:o æneo, 2:o haud transverso, funiculi articulis 3 primis singulis ramum brevem, parce plumosum emittentibus, 4:o clava haud longiore, coxis æneis, alis minus fumatis.

Sällsynt i barrskogar från Skåne till Lappland.

Genus *Microlycus*.

Caput subrotundum, antrorsum parum angustatum, vertice angusto. Antennæ breves infra oculos hirtos in-

sertæ, clava 3-articulata, acuta, funiculo ♀ brevissimo et ♂ 3-articulato, hoc ramis brevibus. Thorax supra subdepressus, scápulis haud discretis, sculptura subtilissima fere rugoso-punctata, scutello linea laterali nulla; metathorace brevi, plica nulla, carina tenui. Alæ stigmatè radio duplo longiore, hoc quam metacarpo parum breviorè, disco postice ♀ macula magna fusca. Abdomen ovatum, subsessile. Pedes sat validi, tibiis posticis femoribus vix brevioribus.

Detta slägte skiljes lätt på antennerna, hvilkas klubba i båda könen är äggrund tillspetsad 3-ledad, strängen hos ♀ kort, hos ♂ med korta grenar, genom ludna ögon och temligen tjocka ben.

1. *M. heterocerus* m: Obscure æneus, parum nitidus, antennis ♀ albo-maculatis, pedibus fusco et pallido-variegatis. Long. 2 mill.

Corpus parvum, obscure olivaceo-æneum, parum nitidum. Caput thorace paullo angustius, ocellis in lineam parum curvam dispositis, facie dense subtilissime punctata. Antennæ articulo 1:o supra curvato, sat longo, fusco, basi et apice albo, 2:o sat longo æneo, funiculi articulis transversis, sensim brevioribus, albidis, clava nigra ovata funiculo longiore et latiore. Thorax supra parce tenuiter nigro-pilosulus, dorsello sat magno. Alæ abdomen parum superantes, cellula costali sat angusta, nervo spurio haud discreto. Abdomen æneum, magis nitidum. Pedes ænei, tibiis fuscis, basi apiceque cum tarsorum basi pallide testaceis. Mesosternum sublæve, mesopleuris sutura anteriore parum curvata.

Mas differt: antennis scapo paullo breviorè, æneo subtus obscure testaceo, funiculo articulis sensim longioribus, ramos pilosos crassos, 1:m scapi longitudine emittentibus, alis hyalinis.

Sällsynt; funnen på Öland.

Ann. Foersters *E. breviramulis* hör antingen hit eller till *Microplectron*.

Genus *Eulophus* Geoffroy.

Caput antrorsum magis minusve angustatum, vertice angusto, oculos hirtis vel glabris, ocellis in lineam parum curvam dispositis, clypeo apice haud inciso. Antennæ longæ, haud infra lineam ocularem, sed infra medium faciei insertæ; scapo ocellum anteriorem haud superante, funiculo 4-articulato, haud fusiformi, articulo ultimo interdum ♀ clavæ 2-articulatæ contiguo, ♂ ramis 3 plumosis vel rigido-hirtis instructo. Thorax scapulis haud discretis; scutello sutura utrinque sat fortiter sinuata, linea laterali nulla impressa; dorsello magno; metathorace interdum plica, rarius costula, sæpissime carina instructo. Alæ abdomen superantes, plerumque amplæ, ♀ rarius fasciis fuscis ornatae, n. spurio sæpe conspicuo, postcosta multisetosa. Abdomen petiolo semper fortiter transverso, sæpe elongatum, apice acuminatum. Pedes haud graciles, tibiis posticis 2-calcaratis.

Detta slägte, som innefattar de flesta arterna inom gruppen, kan endast förväxlas med *Sympiezus*, hvars honor dock skiljas på metathorax, hvilken saknar punctur och hvars vingar äro klara, hannarne hafva enkla antenner, då deremot *Eulophus* hannarne alltid hafva 3-greniga antenner. *Necremnus* står äfven mycket nära, men dess arter hafva 3-ledad antennsträng, kort metacarpus och endast 1 tydlig sporre på bakbenens tibia.

- A) Metathorax plica integra, infra medium angulata et costula transversa obliqua. Mesosternum sutura pleurali antice fortius arcuata et impressa; præsterna superne fere lævia. Alæ ♀ haud fasciatæ. Antennæ paullo supra lineam ocularem insertæ. Oculi hirti, ovati.

1. *E. pectinicornis*: Cupreus vel viridis, antennis scapo subcompresso, pedibus variis, thorace cum scutello fortiter punctato, parce piloso et setoso, metathorace

impunctato, costula infra medium sita: ♂ antennis plumatis, clava haud pilosa. Long. 2—4 mill.

Nees l. c. 153. 2.

Ichneumon pectinicornis Lin. Fauna Sv. 1647.

Eulophus pennicornis Ratz. l. c. I. 160. 1.

Eulophus viduus Ratz. l. c. I. 161. 2.

Eulophus dendricornis Ratz. l. c. I. 161. 5. (forte).

Eulophus subcutaneus Ratz. l. c. III. 202. 4.

Eulophus barbarus Foerst. l. c. 42. 15. (♀).

Eulophus tarandicornis Foerst. l. c. 43. 23. (♂).

Eulophus plumicornis Foerst. l. c. 43. 25. (♂).

Eulophus fusicornis Foerst. l. c. 44. 30. (forte).

Species colore et magnitudine valde varians. Caput thorace angustius, transverso-triangulari pone oculos subangustatum, vertice parce nigro-piloso, oculis pubescentibus, ovato-triangularibus; ocellis in arcum sat curvatum dispositis; facie levi, coerulea inferne subcyanea, genis haud buccatis, brevibus. Antennæ paullo supra lineam ocularem insertæ, longæ nigrae; articulo 1:o ocellum anteriorem attingente, aëneo, vel subtus albido, 2:o haud brevi, 3:o vix conspicuo, 4—7 crassitie æqualibus, compressis, præclava latitudine sua longiore, clava 2-articulata. Thorax supra parce pilosus et pallido-setosus; pronoto transverso, mesonoto angustiore, hoc cum scutello fortiter subsquamoso-punctato, dorsello sat magno; metathorace lævi, postice medio producto, nucha distincta, carina media dorsello saltem triplo longiore, et plica integra in medio angulata fortiter elevata. costula transversa fere in medio areas 4 determinante. Alæ longæ et sat latæ, hyalinae vel lenissime infuscatæ, cellula costali lata, basali

et speculo nudis; stigmate metacarpo paullo longiore, hoc quam radio duplo longiore, præstigmate sat longo, n. spurio sat distincto, cubito pone cellulam basalem parum flexuoso. Abdomen ovato-oblongum, apice acuminatum, postpetiolo haud magno viridi. Pedes sat validi femoribus pilosis, tibiis posticis femoribus longioribus, tarsis articulis 2 primis elongatis, 2 ultimis brevibus æqualibus. Mesosternum cum pleuris lævibus, sutura pleurali antice fortiter arcuata, epinemiis distinctis; præsternis superne lævibus.

Variat thorace viridi vel cupreo; abdomine viridi-æneo vel obscure violaceo, ventre, interdum macula dorsali magis minusve extensa pallidis; pedibus totis testaceis, vel coxis et femoribus cum apice tibiæ fuscis, tarsis albidis apice fuscis.

Mas differt: antennis scapo breviori compresso-dilatato, pedicello parvo transverso, funiculi articulis griseo-fuscis, 1--3 sensim longioribus, singulis e basi ramum longum, tenuem plumatum emittentibus, 4:o clava sesqui longiore, abdomine sæpe plaga pallida, pedibus plerumque obscurioribus, costula interdum obsoleta.

Erj sällsynt från Skåne till Lappland.

2. *E. tridentatus* m: Viridis, facie subtilissime punctulata, pedibus stramineis, metathorace subpunctato, costula ante medium sita. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti similis et affinis, capite antrorsum parum angustato, genis subbuccatis, facie dense subtilissime punctata; antennis in linea oculari insertis, brevioribus, articulo 1:o compresso-dilatato, viridi, basi subtus pallido, funiculi articulo 1:o crassitie sua parum, 4:o vix longiore; thorace minus piloso; metathorace breviori, haud lævi, plica prope costulam, ante medium sitam, et carina subelevatis; alis stigmate radio tantum duplo longiore, hoc

sub angulo minus acuto egrediente; abdomine brevior, ovato, pedibus stramineis, coxis fere totis viridibus; mesosterno antice punctulato mox discedens.

Sällsynt; ett exemplar är funnet vid Tvedöra i Skåne af Doctor G. F. Möller.

3. *E. punctiscuta*: Virescens, scutello minus crebre fortiter punctato, metathorace lævi, costula in medio sita, pedibus pallide variegatis, alis cellula costali minus lata. Long. 2 mill.

Species *E. pectinicorni* simillima, sed duplo minor, facie cyanea; antennis brevioribus, præclava fere transversa, alis præstigmatæ brevior, cellula costali angustior, scutello pro portione fortius etsi minus crebre punctato: ♂ antennis ramis brevioribus tantum discedens.

Sällsynt i Skåne.

4. *E. strigiscuta* m: Viridis; mesonoto minus fortiter punctato, scutello subtiliter strigoso, metathorace brevi, costula ante medium sita, pedibus pallido-variegatis. Long. 2 mill.

Statura et antennis fere *E. tridentati*, mesonoto læte viridi, minus fortiter punctato, scutelli dorso substrigoso-punctato, metathorace brevi, haud punctato, costula ante medium sita, sed carina media et plica medio haud dentato-elevata, mesosterno antice lævi, corpore minore; ♂ antennis funiculi articulis 3 primis haud brevibus, ultimo clava haud sesqui longiore bene distinctus.

Sällsynt i barrskogar; funnen vid Vittsiö i Skåne och vid Ryd i Småland.

5. *E. monilicornis*: Viridis, antennis crassis, carina metathoracis basi spinoso-elevata. ♀ Long. 3 mill.

Entedon monilicornis Zett. Ins. Lapp. 430. 6.

Species capite latitudine sua duplo brevior, antrorsum fortiter angustato, facie fere lævi, viridi; antennis scapo viridi-æneo, funiculo crasso, articulis parum compressis, latitudine sua vix longioribus, æqualibus; thorace viridi, minus fortiter punctato; metathorace brevi, haud punctato, plica angulata, carina basi in spinam acutam elevata; alis cellula costali lata, præstigmate magno, metacarpo radio fere duplo longiore, stigmate hoc saltim duplo longiore; pedibus albo-stramineis, coxis viridibus, femoribus anterioribus basi, posticis ultra medium fusco-æneis bene distincta.

Sällsynt; ett exemplar funnet i Lappland af Prof. Zetterstedt.

6. *E. longulus*: Viridis, pedibus pallido-variegatis, metathorace haud brevi, impunctato, costula ante medium sita. Long. 3—4 mill.

Entedon longulus Zett. Ins. Lapp. 430. 4.

E. pectinicorni simillimus, corpore semper viridi, facie æneo-violacea, inferne subcyanea; antennis scapo semper metallico, funiculo crassiore, præclava fere transversa; mesonoto crebrius sed minus fortiter punctato; metathorace sat longo, sed apice minus producto, costula longe ante medium sita; alis radio paullo longiore sub angulo minus acuto egrediente; abdomine viridi disco æneo; pedibus æneis, trochanteribus, femoribus apice, tarsis basi tibiisque subcitrinis, his apice late fusco; mesosterno antice subpunctato, sutura pleurali minus fortiter curvata, præsternis totis punctatis: ♂ antennis funiculi articulis 3 primis longioribus, ramis minus dense plumatis, tibiis fere totis fuscis, scutello semper viridi mox discedens.

Sällsynt i södra Sverige, mera talrikt förekommer den i Lappland och medlersta Sverige.

7. *E. Tischbeinii*: Viridis, pedibus stramineis, posticis basi viridibus, metathorace carina basi subdentato-

elevata, antennis funiculo ♀ articulo 4:o clavæ arcte contiguo, ♂ ramis haud plumatis, sed aspero-muricatis. Long. 3—4 mill.

Ratz. l. c. II. 154.

Species colore pedum, metathoracis carina basi dentato-elevata, antennarum in utroque sexu structura ab omnibus mox discedens.

Sällsynt; funnen på pil vid Lund.

B) Metathorax costula nulla, plica basin haud attingente vel nulla.

a) Alæ cellula costali lata, præstigmate magno, cubito pone n. basalem flexuoso, ♀ fasciis 2 nigro-fuscis ornatae. Caput oculis magnis glabris, ocellis in verticis margine postico acuto sitis. Tarsi articulis 2 primis elongatis, 3—4 brevibus æqualibus. Metathorax medio fere levis.

8. *E. bifasciatus* (Dalm.): Obscure coeruleus, antennis scapo ♀ subtus pallido, metathorace punctulato, carina et plica abbreviata instructo. Long. 3—4 mill.

Entedon nubeculatus Ratz. l. c. II. 158. 2 (forte).

Eulophus Artæus Walk. Mon. Chalc. ex parte.

Statura et magnitudo omnino *Sympiczi*, alis ♀ bifasciatis, antennis ♂ 3-ramosis mox distinctus. Caput coeruleo-æneum, genis angustis, facie dense subtilissime punctata. Antennæ sat longæ et validæ, fere in linea oculari insertæ; articulo 1:o subtus pallido, funiculo compresso, 4-articulato, articulo ultimo haud transverso, clava 2-articulata. Thorax supra obscure coeruleus, sat crebre et fortiter punctatus; metathorace viridi, obsoletius punctato, carina tenui et plica postica medium attingente instructo. Alæ hyalinæ, fasciis 2 nigro-fuscis fere integris, altera sub stigmatis basi, altera sub radio sitis, hoc sub angulo sat acuto egrediente quam metacarpo fere duplo brevior,

stigmato radio fere triplo longiore, n. spurio sat distincto. Abdomen lanceolato-ovatum, atro-violaceum, postpetiolo viridi. Pedes ænei, femoribus apice, tibiis tarsisque fere stramineis, his anticis intus, posterioribus triente apicali nigro-fuscis, tarsis albidis, apice fuscis. Mesosternum coeruleum, antice punctatum, episternis lævibus, sutura anteriore fere recta, epimeris et metapleuris subtilissime dense punctatis, præsternis totis fortius punctatis.

Mas differt: alis immaculatis, antennis scapo dilatato æneo, funiculi articulis 3 primis ramis minus dense plumatis ornatis, clava haud pilosa quam præclava paullo brevior, metathorace fere lævi.

Ej sælsynt i norra och medlersta Sverige, sælsyntare i Skåne.

9. *E. punctifrons* m: Viridis, antennis scapo metallico, facie superne punctis nonnullis majoribus impressis. Long. 3—4 mill.

Præcedenti simillimus, sed antennis scapo metallico, facie utrinque juxta oculos superne parce punctata, thorace toto viridi, mesosterno subtilius punctato, pleuris fere lævibus, metathorace evidentius punctato, sed plica vix indicata, alis fascia anteriore minus obscura, abdomine æneo vel cupreo, basi viridi distinctus.

Sælsynt i Lappland.

10. *E. subcontiguus* m: Obscure coerulco-æneus, pedibus citrino-variegatis, metathorace medio lævi, antennis funiculi articulo ultimo clavæ arcte contiguo. Long. 2—3 mill.

Species a præcedentibus antennis funiculo 3-articulato, scapo metallico basi pallido, metathorace nitido fere aureo-viridi, medio lævi, carina subtili, plica nulla; alis fasciis minus latis, metacarpo radio vix sesqui longiore, hoc sub angulo minus acuto egrediente, coxis posticis mi-

nus fortiter rugoso-punctatis, tarsis articulo 1:o 2:o fere longiore, cum tibiis citrinis, apicem versus fusco-æneis: ♂ colore similis sed thorace viridi.

Sällsynt; funnen vid Lund och Helsingborg.

Ann. Jag har funnit en haune vid Fogelsång i Skåne, som tyckes böra höra till denna afdelning. Den afviker från alla förut beskrifna genom gul clypeus och kan i korthet på följande sätt diagnoseras:

Viridi-æneus, clypeo flavo, pedibus pallide testaceis, coxis posterioribus viridibus, femoribus posticis et tarsis apice fuscis, antennis apice et ramis 3 plumatis, alis cellula costali laud lata, præstigmatæ et radio brevibus.

aa) Alæ ♀ laud fasciatæ. Metathorax plica nulla. Tarsi postici articulis 2 primis elongatis, æqualibus.

b) Metathorax lævissimus, ♀ carinatus. Abdomen ♀ lanceolatum.

11. *E. stramineipes* m: Viridis, antennis scapo subtus pedibusque stramineis: antennis apice pilosis. Long. 2—4 mill.

Eulophus lævissimus Ratz. l. c. II. 157. 12. (forte).

Species alis et antennarum structura *E. pectinicorni* similis, sed corpore viridi, metathorace medio lævi, carina subtili; abdomine longo lanceolato, interdum fascia prope basin pallida; mesosterno antice crebre punctato, pleuris lævibus sutura fere recta. pedibus stramineis, basi æneis, tarsis articulis 2 primis elongatis, 3:o 4:o æquali brevi: ♂ antennis apice subplumato-pilosis, abdomine macula magna pellucida pallida, coxis omnibus viridibus, femoribus posticis fusco-æneis pronoto et scutello cupreis, ab affinis mox discedens.

Temligen sällsynt; från Skåne till Dalarne.

bb) Metathorax punctatissimus, haud carinatus, apice medio haud productus. Oculi hirti. Alæ cubito pone nervum basalem evidenter flexuoso.

12. *E. atmopterus*: Cupreus, antennis scapo subtus pedibusque fere totis flavis, alis sæpe ♀ lineola transversa fusca radio adherenti ornatis. Long. 2–3 mill.

Entedon atmopterus Ratz. l. c. III. 205. 4.

Eulophus superior Foerster l. c. 42. 16. (forte).

Species metathorace in utroque sexu punctatissimo haud carinato, obscure viridi; ♀ facie violacea, haud lævi, vertice valde angusto; mesothorace sat fortiter punctato; alis stigmatibus radio triplo longiore, præstigmatibus et cellula basali sat magnis; abdomine ovato-oblongo, æneo, disco antice pallido; mesosterno antice et epimeris punctulatis, episternis lævibus, sutura anteriore vix curvata, pedibus pallidis, coxis omnibus femoribusque anterioribus æneis: ♂ antennis scapo haud dilatato subtus testaceo, flagello apice fere æque ac ramis plumosis, femoribus omnibus supra macula fusca notatis, scutello lætius viridi, abdomine macula magna pellucida.

Sällsynt i södra Sverige.

13. *E. viridulus* m: Viridis, antennis scapo subtus pedibusque pallide flavis, coxis anterioribus æneis, alis immaculatis. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti statura, antennis funiculo compresso 4-articulato, mesonoto sulcis antice indicatis affinis, sed corpore viridi, vertice minus angusto, ocellis in lineam curvam dispositis, alis immaculatis, pedibus pallide flavis, coxis anterioribus et femoribus anticis superne interdum fusco-æneis distinctus.

Sällsyntare än föregående.

Genus *Necremnus*.*Eulophus* Nees.

Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo ocellum anteriorem haud superante, funiculo et clava 3-articulatis, maris 3-ramosæ. Thorax subtiliter crebre punctatus, mesonoti sulcis nullis, metathorace medio fere lævi, carina medio instructo, plica nulla vel postice indicata. Alæ hyalinæ, immaculatæ, metacarpo radio haud vel parum longiore, cubito pone nervum basalem haud flexuoso, n. spurio haud conspicuo. Scutellum linea nulla laterali impressa. Abdomen ovatum ventre haud pallido, subsessile. Pedes metallici, tarsis et tibiis basi albis. Mesosternum sutura pleurali parum curvata.

Detta släkte står mycket nära *Eulophus* och skiljes hufvudsakligen genom vingarne, hvilkas metacarpus är kort samt genom tibierna hvilka endast hafva 1 sporre på bakbenen samt liksom tarserna äro vid basen hvita.

1. *N. leucarthros*: Viridis, vel cupreus, metacarpo radio paullo longiore, fronte subtilissime punctata: ♂ antennis ramis haud plumatis, sed aspero-pilosulis. Long. 2—3 mill.

Eulophus leucarthros Nees l. c. 172. 26. (verosimiliter).

Eulophus Hippias Walk. l. c. (forte).

Caput transversum, subtriangulare, vertice angusto, oculis glabris, genis sat brevibus haud buccatis; facie plana, dense subtilissime punctata, superne punctis nullis majoribus impressis. Antennæ in linea oculari insertæ, basi parum distantes; uigræ, articulo 1:o æneo, lineari, 2:o oblongo-triangulari, metallico, 3:o vix conspicuo, 4—7 parum vel vix compressis, 4:o crassitie sua sesqui longiore, 6:o quadrato, clava 3-articulata postannello haud longiore. Thorax minus robustus, supra subdepressus, fere glaber, sat nitidus, viridis vel cupreus; pronoto brevi lu-

nato, mesonoto dense subtiliter haud squamoso-punctato; metathorace apice haud producto, medio fere lævi, carina distincta haud alte elevata. Alæ hyalinæ, cellula costali haud angusta, præstigmatæ radii longitudine, hoc quam stigmatæ duplo brevioræ, metacarpo radio paullo longioræ, nervo cubitali pone n. basalem haud flexuoso, spurio haud conspicuo. Abdomen subsessile, ovatum, subtus parum convexum. Pedes minus validi, aenci, tibiis tarsisque basi albidis, illis posticis calcari singulo armato, his articulis 1—3 sensim brevioribus. Mesosternum antice obsolete punctatum, mesopleura sutura anteriore vix curvata, præsterna fortiter punctata.

Mas differt: antennis funiculi articulis 3 primis ramos haud plumosos sed tantum aspero-pilosulos emittentibus, carina metathoracis obsoleta.

Den allmännaste arten i Skåne på sandbackar; utbredd öfver hela Sverige.

2. *N. punctifrons* m: Viridis vel cupreus facie utrinque superne juxta oculos punctis paucis majoribus impressis: ♂ antennis ramis plumatis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, facie punctis juxta oculos superne majoribus impressis, metacarpo radio haud longiore; antennis ♂ ramis plumatis mox discedens.

Sällsynt; funnen på Ölands och Skånes sandfält.

Genus *Diglyphis*.

Caput oculis hirtis. Antennæ funiculo 3-articulato, scapo ocellum haud superante. Abdomen ovatum. Scutellum utrinque linea minus distincta impressa. Metathorax carina et plica obliqua integra. Alæ immaculatæ, cubito pone nervum basalem evidenter flexuoso.

Detta slägte har mycken habituel likhet med *Necremnus* men skiljes dels genom 2 sporrar på bakbenens tibia, dels genom tyd-

ligt böjd cubitus straxt bakom n. basalis samt slutligen genom en svagt intryckt sidolinja på scutellen. Från *Eulophus* afviker det dels genom sistnämnde karakter, dels äfven genom endast 3-ledad antennsträng, emedan den 4:e leden liksom hos *Necremnus* sluter sig intill klubban, hvilken derigenom blir 3-ledad, samt genom plican, som är hel men ej vinkelformigt böjd.

1. *D. aneiscapus* m: Virescenti-ænea, scapo antennarum metallico, tibiis fuscis ♀. Long. fere 3 mill.

Statura fere *Necremni*, sed pedibus aliter coloratis. Caput transverso-triangulare, vertice angusto, oculis ovato-rotundis, subprominulis, genis angustis, haud brevibus; facie plana, dense et subtiliter punctata, scrobe antennali bene determinata; vertice angusto, ocellis in lineam curvam dispositis. Antennæ in linea oculari insertæ, scapo viridi tenui, pedicello oblongo-triangulari, funiculo haud compresso, articulo 1:o crassitie sua sesqui longiore, 2:o et 3:o æqualibus quadratis, clava postannello paullo brevior. Thorax supra fere glaber, virescenti-æneus, confertim punctatus; metathorace subdeclivi, fere lævi, carina et plica oblique versus spiracula ducta distincte elevatis. Alæ subhyalinæ, celula costali sat lata, basali et speculo nudis, præstigmatæ radii longitudine, metacarpo radio sesqui longiore, stigmatæ radio sub angulo minus acuto egrediente duplo longiore. Abdomen ovale aneum, basi viride. Pedes minus validi, ænei, tarsis testaceis, apice cum tibiis fuscis, his basi apiceque pallidioribus, tarsis posticis brevibus, articulis fere æqualibus. Mesosternum antice et epimera punctata, episterna lævia, sutura anteriore vix curvata; præsterna et coxæ posticæ sat fortiter punctata.

Sällsynt i norra och medlersta Sverige.

2. *D. rugifrons* m: Læte viridis, antennis scapo tibiis tarsisque pallide testaceis. ♀ Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillima, sed corpore lætius virescenti, antennis scapo testaceo, fronte subrugoso-punctata, metathorace subpunctato coloreque pedum dilutius bene distincta.

Sällsynt med föregående.

Genus *Solenotus*.

Caput antrorsum angustatum, facie sæpe immersa. Antennæ funiculo 2-, clava 3-articulata, 3 simplices, scapo ocellum anteriorem haud superante, æneo. Thorax supra depressus, pronoto breviter conico, mesonoto sulcis nullis, scutello sutura utrinque angulatim sinuata, dorso lineis 2 impressis distinctis, metathorace polito, haud carinato. Pedes haud validi parum pallido-variegati.

Detta släkte skiljes från alla föregående genom tydlig sidofära på scutellen, genom korta antenner, hvilkas sträng är 2-ledad och klubba 3-ledad. I habitus står det närmast *Cirrospilus* men scapulæ äro ej afsatta.

1. *S. viridis* m: Læte viridis, genubus, tibiis apice tarsisque basin versus flavo-stramineis, alis hyalinis. Long. 2 mill.

Statura fere *Cirrospili*, læte viridis, interdum fere aureus, scutello interdum cupreo, Caput thorace vix angustius, vertice angusto. Antennæ breves nigræ, scapo tenui, metallico, pedicello oblongo-triangulari, annello parvo, flagello vix incrassato, postannello crassitie sua paullo longiore, præclava quadrata, clava postannello longiore. Thorax fere glaber, dense subtilissime punctatus, dorsello et metathorace politis. Alæ hyalinæ, fere totæ pubescentes, postcosta multisetosa, stigmatæ radio duplo longiore, metacarpo radio paullo longiore. Abdomen subovale viride, subsessile. Pedes metallici, genubus, tarsis basin versus, tibiis basi apiceque flavo-stramineis, his interdum 3-annulatis, tarsis articulis longitudine subæqua-

libus. Mesosternum læve, sutura pleurali vix curvata, præsterna confertissime punctata.

Mas differt: antennis funiculi densius et paullo longius pubescentibus, abdomine immaculato.

Ej sällsynt.

Tribus *Entedonina*.

Caput os versus angustatum, genis haud buccatis; oculis sæpissime hirtis, scrobe antennali plerumque in medio faciei furcata, ramum versus oculos emittente, vertice sæpius acuto, mandibulis apice 2- vel 3-dentatis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, basi parum distantes, scapo ocellum rarissime superante, annello sæpe distincto, interdum funiculi articulo 1:o conformi, clava 1- 2-articulata, ultimo apice plerumque setigero, maris magis pubescentes sed haud ramosæ. Thorax sat latus; pronoti collari sæpe discreto sed plerumque angusto; mesonoti sulci sæpissime postice foveiformes sed minus discretæ; scutello postice 2-setoso sutura haud angulata; metathorace sæpe carina et plica instructo. Alæ stigmatate longo quam costa semper longiore; postcosta sæpissime setis 2 longis ornata, metacarpo interdum nullo plerumque cum radio brevi, cellula costali sæpius angusta, basali et speculo nudis, radiali rarius linea setosa indicata. Abdomen petiolo sæpius distincto, interdum longo. Pedes minus pilosi, tibiis posticis 1-calcaratis, tarsis articulis longitudine subæqualibus. Metapleura parva.

Denna grupp afviker från *Eulophina* och *Elachistina* genom scutellum, som saknar de 2 främre borsten, genom postcostan, hvilken har 2 långa svarta uppstående borst. Endast släktet *Astichus* gör undantag, men skiljes lätt genom honans fläckiga vingar och hannens sågade antenner. Från *Tetrastichina* skiljes den genom stigmat i framvingarne, som sträcker sig långt öfver midten af framkanten, genom metacarpus, som oftast är tydligt utbildad fastän kort genom scutellen, som saknar dorsal-linjer och hvars

sutur ej är så starkt vinkelformigt böjd, i allmänhet mindre skarpt markerade sulci mesonoti, svagare utvecklade metapleura, oftast långt eller tydligt skaftad abdomen och i allmänhet mera utvecklad metathorax.

Conspectus generum.

A) Alæ haud pictura insignes, postcosta semper 2-setosa. Antennæ ♂ haud serratae.

a) Caput durum, facie post mortem haud immersa, vertice et collari acutis. Alæ metacarpo et radio brevibus subæqualibus. Antennæ scapo sæpissime metallico. Mesonotum sæpius sculptura profunda subsquamosa. Metathorax sat magnus, carina instructus.

b) Caput scrobe antennali sæpissime simplice, oculis integris. Metathorax plica nulla. Abdomen petiolo tenui, haud rugoso-punctato, dorso haud convexum. Genua pallida.

Entedon.

bb) Caput scrobe furcata, utrinque ramum versus oculos emarginatos emittente. Genua sæpius metallica. Metathorax plica distincta. Abdomen dorso plerumque convexo.

Pleurotropis.

aa) Caput facie sæpissime post mortem immersa. Alæ metacarpo interdum radio longiore, rarissime nullo. Abdomen petiolo sæpe longo, dorso vix convexum. Antennarum scapus et pedes maxima parte sæpius pallida.

Derostenus.

B) Postcosta 4-5-setosa. Alæ pictura insignes. Antennæ ♂ serratae.

Astichus.

Genus *Entedon* Dalman.

Caput oculis hirtulis, subovatis, orbita interiore haud emarginata, genis sat longis, vertice emarginato acuto, fortiter punctato, clypeo apice rotundato, mandibulis sat longis et validis, apice acute 2-dentatis; scrobe antennali angusta, sæpe linea nitida indicata, rarissime superne furcata. Antennæ scapo metallico, ocellum ante-

riorem haud attingente, anello parvo, funiculo 3-articulato magis minusve metallice micante, pube haud tenui, griseo dense vestito, clava 2-articulata, articulo ultimo parvo, setigero; maris densius et longius pilosis, clavæ articulo 1:o interdum libero. Thorax sat robustus, cum scutello magno fortiter squamosus, pronoto antice medio emarginato, collari angusto sed discreto; mesonoti sulcis medio obsoletis, postice foveiformibus; metathorace plerumque lævi, carina sulco inclusa distincte elevata, plica et costula nullis, apice haud producto, striga impressa laterali a spiraculis versus callum ducta, hoc fimbria parca. Alæ costa sat distincta interdum crassa, quam metacarpo multo longiore, hoc radio fere sessile æquali, basi glabræ, cellula costali sat lata, postcosta et præstigmatate setis 2 nigris longis instructis. Abdomen fere sessile, petiolo rarissime rugoso-punctato, latum, plerumque ovato-rotundum, dorso haud, ventre leviter convexo, plica ventrali ♂ distincta, terebra anum vix superante. Pedes breves sat validi, coxis posticis ovatis parvis, ænei tibiis basi et apice cum tarsis brevibus basi niveis, vel albido-testaceis, rarissime fuscis. Mesosternum medio punctulato, sulco haud conspicuo, antice lateribus fortiter crebreque punctatum; episternis politis, sutura antica vix nisi splendore discreta; metapleura parva brevia, superne basi fossula lineari oblique profunde impressa; præsterno distincto, triangulari. Corpus metallicum, viride, vel cupreum, haud parvum.

Detta slägte skiljes från *Pleurotropis* genom ögonen, som ej äro urringade på insidan, genom metathorax, hvilken saknar plica. Intryckningen vid basen är skarp på hvarje sida och böjer sig på andra sidan om spiracula utåt mot callus, äfven intryckningen inom spetsen är skarpt marquerad. Abdomen är ej kullrig på ryggsidan utan snarare insänkt, dess petiolus oftast kort och ej puncterat.

- A) Caput ocellis in lineam curvam dispositis. Alæ disco late subfumatæ, costa et præstigmatate ♀ modice, ♂ fortiter incrassatis. (*Pleuropachys*).

1. *E. costalis*: Virescenti-æneus, genubus, tibiis apice tarsisque basi pallidis. Long. 2—3 mill.

Dalman Uppställn. af Pterom. i Vet. Acad. Handl. 1820. Tab. VIII. fig. 51, 52.

Elachestus costalis Nees l. c. 143. 11.

Eulophus discolor Nees l. c. 172. 27. (forte).

Entedon martialis Foerst. l. c. 42. 14.

Species ab omnibus ocellis in curvam dispositis, alis disco late fumatis, costa crassa discedens. Caput transverso-triangulare, antrorsum fortiter angustatum, viride, fortiter squamosum, inferne subtilius punctatum; setis paucis verticinis erectis ornatum; genis sat longis, angustis, clypeo haud discreto, peristomio sat magno, mandibulis piceo-brunneis; vertice angusto, late emarginato, ocellis in lineam curvam dispositis a verticis margine parum remotis, oculis subhirtis ovato-triangularibus; facie planiuscula scrobe antennali parum impressa, simplice. Antennæ paullo supra lineam ocularem insertæ, æneæ, scapo tenui viridi, ocellum anteriorem haud plane attingente, pedicello oblongo-triangulari, supra setulis paucis nigris ornato, anello parum conspicuo; funiculo vix perspicue incrassato, articulo 1:o crassitie sua sesqui longiore, 3:o 4:o subæquali quadrato, clava ovata, apice vix setigera quam postannello brevior. Thorax crassus, fere glaber setis paucis instructus, viridis fortiter squamoso-punctatus; mesonoto sulcis anticis vix impressis, medio deletis; scutello sutura utrinque haud angulatim sinuata, freno declivi, dorsello haud magno, marginibus elevatis, subtilius punctato; metathorace læte viridi, fere lævi, sutura basali utrinque impressione sat profunda, extrorsum oblique ducta, intra apicem etiam fortiter impresso, calli fimbria parce setosa. Alæ minus amplæ, apice late æqualiter rotundatæ, disco late fumatæ; cellula costali minus lata,

stigmatum quam costa paullo longiore et præstigmatum crassius, metacarpo radio brevior, hoc clava magna fere sessili unco distincto, præstigmatum minus elongato, nervo basali et cubito basi nudis vix perspicuis, spurio nullo. Abdomen petiolo tenui brevi lævi, ovato-rotundum thorace fere latius, viride, postpetiolo trientem haud superante. Pedes breves validi, æneo-virides, coxis posticis parvis, ovatis, supra gibbosis, femoribus superne pone medium oblique subimpressis, tibiis basi rufescentibus calcari sat crasso, tarsis tibia brevioribus, basi rufescentibus, articulis superne inspectis parum longitudine discrepantibus. Mesosternum viride, epimeris punctulatis.

Mas differt: alis fere hyalinis, præstigmatum et costa crassioribus, antennis magis pilosis, scapo valde dilatato, clavæ articulo 1:o libero, corpore magis cyaneo, abdomine ovali-rotundo.

Ej sällsynt.

- B) Ocelli in triangulum dispositi. Alæ hyalinæ stigmatum haud crasso. Abdomen ovatum vel ovato-rotundum. Caput scrobe antennali simplice. Antennæ ♂ clavæ articulo 1:o haud libero.

2. *E. squamosus* m: Viridis, antennis scapo basi, genubus, tibiis apice tarsisque albidis, his ungue nigro, fronte mesonotoque fortiter squamoso-punctatis. ♀ Long. 3 mill.

Statura, colore et sculptura præcedenti simillimus, sed alis disco etiam hyalinis; stigmatum tenuiore, præstigmatum longiore, antennis scapo basi pallido, ocellis in triangulum dispositis, genubus, tibiis apice tarsisque albidis, funiculi et tarsorum posticorum articulis sensim brevioribus, fronte et mesonoto multo fortius punctatis mox discedens.

Sällsynt på Gottland och i Skåne.

3. *E. subovatus* m: Viridis, genubus, tibiis dimidio apicali tarsisque albidis, ungue nigro, abdomine ovato-rotundo postice æneo. ♂♀ Long. 3 mill.

E. squamoso simillimus, antennis scapo basi haud pallido, tibiis anticis margine anteriore, posterioribus dimidio apicali albidis, tarsis posticis articulis longitudine subæqualibus, sculptura frontis et mesonoti minus profunda, metacarpo radio brevior optime distinguendus.

Sällsynt i Skåne och på Öland.

4. *E. subimpressus* m: Viridi-æneus, scrobe antennali superne in plagam politam triangularem dilatata, genubus, tibiis apice tarsisque basin versus albidotestaceis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, sed abdomine brevior, alis nervis nigris, scrobe superne dilatata, tibiis apice minus late pallidis, oculis minus hirtis; ab *E. squamoso* frontis et mesonoti sculptura minus profunda, calcari postico crasso, antennis clava longior, scapo haud pallido, alarum nervis crassioribus nigris; mas corpore subcyaneo, minus fortiter punctato, antennis scapo sat dilatato optime distinguendus.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

5. *E. tenuitarsis* m: Cyaneo-viridis, genubus, tibiis apice tarsisque basin versus sordide albidis, his tenuibus. ♀ Long. 3 mill.

E. subimpresso abdominis forma et scrobe antennali simillimus, sed antennis tenuioribus, præclava latitudine sua longior, clava magis attenuata, alis nervis tenuioribus fusco-testaceis, præstigmatum brevior, calcari postico et tarsis tenuioribus, his posticis articulis 1—3 sensim

evidenter brevioribus, 3:o latitudine sua saltim duplo longiore, ocellis verticis margini fere contiguus discedens.

Sällsynt; funnen i Dalarne.

6. *E. fuscitarsis* m: Virescens, genubus, tibiis apice sordide albidis, tarsis fusco-testaceis, postannello brevi.
♂ ♀ Long. 2 - 3 mill.

E. tenuitarsi similimus sed paullo minor, antennis postannello latitudine sua vix longiore, 3:o articulo sequenti subæquali, tarsis articulis longitudine subæqualibus mox discedens.

Sällsynt.

7. *E. parvicar* m: Viridis, genubus, tibiis calcari parvo, dimidio apicali tarsisque albidis, his ungue nigro.
♂ ♀ Long. 2 mill.

Statura, colore *E. subovati*, sed fere duplo minor, abdomine brevior, tibiis posticis calcari brevior et tenuiore, tarsis articulo 1:o haud longior, alis medio subfurnatis, longius ciliatis, præstigmate brevior optime distinguendus.

Sällsynt; funnen på Ölands sandfält.

8. *E. punctatus* m: Viridis, metathorace punctulato, genubus tibiisque summo apice pallidis, tarsis fuscis longiusculis. Long. fere 3 mill.

Species a præcedentibus corpore paullo graciliore, metathorace dense punctulato, pedibus minus validis, vix pallido-signatis tarsis tenuibus gracilioribus antennis longioribus, præclava haud transversa mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Ringsjön i Skåne.

9. *E. cyanellus*: Viridis, genubus tibiisque apice albidis, antennis subincrassatis, capite thoraceque fortiter punctatis. Long. 2 mill.

Zett. Ins. Lapp.

Species corpore parvo sed punctura capitis et thoracis profunda, vertice transversim subconvexo, scrobe antennali simplice, antennis flagello apicem versus subincrassato, tarsis brevibus, oculis parum hirtis, abdomine fere ovato rotundo, ocellis margini verticis fere contiguis, genubus et tibiis summo apice albidis discedens.

Ej sällsynt.

10. *E. metatarsalis* m: Viridis, fortiter punctatus, genubus anguste pallidis, tarsis fuscis, posticis articulo 1:o 2:o brevior. ♀ Long. fere 3 mill.

Species corpore longiore, metathorace lævi, capite thoraceque fortiter squamoso-punctatis, antennis sat longis et tenuibus, præclava latitudine sua fere longiore, genubus vix nisi anguste pallidis, tarsorum articulo 1:o 2:o brevior distincta.

Sällsynt; funnen på Öland.

- C) Abdomen elongatum. Caput scrobe antennali haud superne furcata. Pedes minus validi, genubus, tibiis apice sat late tarsisque albidis, his ungue nigro. Alæ hyalinæ, stigmatibus haud crasso. Mas antennis clavæ articulo 1:o libero.

11. *E. longiventris* m: Viridis, confertim punctatus, ocellis in lineam curvam dispositis, calcaribus tenuibus ♀. Long. 4 mill.

Species scrobe antennali simplice, abdomine elongato, tarsis articulis tenuibus, articulo 1:o 3:o sesqui longiore, alis hyalinis, præstigmatibus haud crasso, longo, tibiarum

posticarum calcari tenui ocellisque in lineam parum curvatam dispositis ab omnibus discedens.

Sällsynt i Småland.

12. *E. elongatus* m: Viridis, facie inferne aurea, ocellis in triangulum dispositis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti abdomine elongato affinis, sed multo minor, ocellis in triangulum dispositis, facie et mesonoto fortiter squamoso-punctatis, abdomine elongato apice acuminato, pedibus gracilibus, metathorace haud lævi, alis cellula costali haud lata, præstigmate minus longo; ♂ antennis scapo sat dilatato, clavæ articulo 1:o libero distinctus.

Ej sällsynt i Skåne och på Öland.

- D) Caput scrobe antennali furcata, ramum tenuem versus oculos emittente. Alæ hyalinæ stigmatē tenui. Antennæ clavæ ♂ articulo 1:o libero.

13. *E. Cioni*: Viridis, genubus, tibiis apice late tarsisque basi albidis, ocellis in lineam curvam dispositis, abdomine ♀ elongato. Long. 2—3 mill.

Species, antennis scapo tenui longo, curvato, flagello haud incrassato, præclava latitudine sua sesqui longiore, clava oblonga, metathorace lævi, capite ocellis in lineam curvam dispositis, et thorace sat fortiter punctatis, alis hyalinis, cellula costali sat lata, præstigmate haud brevi, abdomine elongato-ovato, pedibus sat gracilibus: ♂ antennis articulo primo clavæ crassitie sua haud longiore et funiculo dense breviter hirta, scapo sat dilatato, abdomine ovali, thorace magis cyaneo, tibiis apice latius albidis ab affinibus optime distinguenda.

Sällsynt i medlersta Sverige. Utkläckt ur *Cionus Scrophulariæ* af framlidne Prof. Dalman.

14. *E. albicrus* m: Viridis, abdomine elongato tibiis tarsisque albidis, ungue nigro, antennis præclava brevi. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti statura, sed fere duplo minor, facie medio atrovioacea fortius punctata; antennis brevioribus, funiculi articulo 1:o crassitie sua vix longiore, præclava subtransversa, mesothorace fortius squamoso-punctato, alis apice magis ciliatis, abdomine atro-violaceo, basi apiceque viridi; pedibus viridibus, tibiis tarsisque albidis, his ungue nigro bene distinguendus.

Sällsynt; funnen på Gottland.

15. *E. cionobius* m: Æneo-virescens, genubus tibiis tarsisque albidis, abdomine breviter ovato. ♂♀ Long. 2 mill.

Species a præcedentibus corpore minore, antennis postannello crassitie sua vix longiore, præclava transversa, clava ovato-rotunda, abdomine breviter ovato, genubus, tibiis apice late tarsisque albidis, his ungue fusco mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Ringsjön i Skåne. Utläckt ur *Cionus Scrophulariæ*.

E) Abdomen petiolo crasso punctato. Mas macula abdominis pellucida. Caput serobe antennali simplice.

16. *E. punctiscapus* m: Atro-violaceus, fronte superne fortiter punctata, alis hyalinis, genubus, tibiis apice tarsisque basi albidis: ♂ funiculo 3-articulato, abdomine oblongo. Long. 2 mill.

Species petiolo transitum ad *Pleurotropidem* formans, sed metathorace, sulco sternali, alis haud fractis, pedum colore, oculis integris certe hujus generis. Caput atro-coeruleum, facie et vertice virescente circa ocellos fortiter cribrato-punctatis, genis sat longis, oculis hirtulis. An-

tennæ funiculo pilosulo tenui, æquali, 3-articulato. Thorax medio viridis, sat fortiter punctatis. Alæ cuneiformes, præstigmatæ et cellula costali sat magnis. Abdomen breve, subrotundum, apice subacuminatum, postpetiolo trientem superante. Pedes breviusculi.

Mas differt: antennis scapo dilatato, funiculo crasso, 3-articulato, dense et sat longe griseo-piloso, præclava fere transversa; thorace abdomineque subcyaneis, hoc oblongo, macula disco magna pellucida; tibiis apice latius albidis.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

Genus *Pleurotropis*.

Caput vertice lato, ocellis in triangulum dispositis, oculis maximis plerumque hirtis, orbita interiore evidenter præsertim feminae emarginatis, ovato-triangularibus; genis brevissimis, temporibus distinctis, vertice margine postico acuto; mandibulis parvis. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo ♂ dilatato, funiculo 3-rarissime 4-articulato, articulo 3:o rarissime clavæ contiguo, hac 2-articulata, articulo 1:o ♂ sæpe libero. Thorax confertim punctatus, pronoto collari minus angusto, sæpissime discreto, margine antico acuto; mesonoti sulcis rarissime acute insculptis integris, plerumque medio interruptis, postice sæpius impressione foveiformi indicatis; scutello sutura utrinque minus arcuata, dorsulo magno, dorsello parvo, angusto; metathorace carina et plica huic parallela integra instructo, callo laterali sæpissime 1-2-setoso. Alæ margine anteriore haud recto, stigmatæ costa evidenter longiore, cellula costali minus lata, metacarpō et radio brevissimis, nervo basali plerumque pilosulo. Abdomen petiolo crasso, punctato, basi superne medio squamoso-elevato, subtus bidentato instructum, postpetiolo sæpe magno et sequentibus fere semper dorso convexis. Pedes

minus validi, virides vel ænei, genubus haud albidis, rarissime tibiis vel femoribus pallidis, coxis sublævibus. Mesosternum sulco medio distincto, medio foveiformi instructum.

Detta slägte skiljes lätt från *Intedon* genom ögonen, som äro urbräddade på insidan och stora, kortare kinder, pronoti collare oftast bredare, mesonoti sulci stundom skarpare inskurna, metathorax med tydlig plica, längre stigma i framvingarne, hvilkas framkant ej är rak utan något bruten vid præstigmat, genom abdomen, hvars tjocka punterade petiolus alltid är tydligt och hvars dorsalsegmenter sällan äro platta utan vanligen lika kullriga som buksidan, genom tydlig fåra på mesosternum, rhombiskt præsterium samt mindre grofva ben med nästan släta bakhöfter.

A) Alæ ♀ macula subovata fusco-nigra sub radio ornatae. Collare haud discretum. Metathorax carina basi ligulato-excavata. Tibiæ et genua pallida. Mas abdomine medio pellucido.

1. *P. bimacularis* (Dalm.): Obscure olivaceo-viridis, femoribus apice, tibiis tarsisque rufescentibus, funiculo ♀ 4-articulato, articulo nempe 1:o clavæ libero. Long. 2—3 mill.

Eulophus maculatus Foerst. l. c. 42. 12. (forte).

Species antennis moniliformibus, funiculo 4-articulato, collari haud discreto, oculis parum emarginatis a reliquis mox discedens. Caput triangulare transversum, superne nitidum, læve, vertice acuto, ocellis in triangulum dispositis, facie inferne obsolete punctata, clypeo lævi; genis mandibularum basi paullo longioribus; oculis hirtis, orbita interiore parum emarginata. Antennæ longe infra medium insertæ, scapo tenui æneo, 2:o oblongo quam postannello paullo longiore, anello parvo sed distincto, 4—7 æqualibus fere rotundis, ultimo præcedente haud brevior, ovato, acuto. Thorax sat fortiter subsquamosopunctatus; pronoto sub occipite recepto; mesonoto sulcis antice anguste impressis, deinde deletis, basi foveiformi-

bus; dorsello parvo, angusto transverso; metathorace haud brevi, declivi, lateribus punctulato, calli fimbria sat densa et longa; carina basi ligulato-excavata, ante medium furcata, ramum utrinque versus plicam emittenti, hac tenui, basi in spatium politum triangulare dilatata, fovea apicali utrinque profunde impressa. Alæ longæ, subfumatæ, macula obovata vel lunata transversa sub radio, alteraque minore versus medium inferne ornata; stigmatæ costa fere duplo longiore, cellula basali fere tota pubescente speculo parvo, radio et metacarpo brevissimis. Abdomen oblongo-ovatum, acuminatum, fere glabrum, apicem versus parce pilosellum; segmento 1:o deflexo, crasso, punctato, 2—7 longitudine parum discrepantibus; dorso convexo æneo, sat nitido, lateribus teretibus. Pedes sat graciles, ænei, femoribus apice, tibiis tarsisque rufescentibus, his posticis articulis longitudine subæqualibus, ungue fusco-nigro. Mesosternum sulco medio punctulato, medio haud foveolato-dilatato, antice punctatissimum, epicnemii linea polita indicatis; episternis lævibus vix nisi nitore a sterno discretis, epimeris sutura crenata; metapleura parva; præsterna magna punctata.

Mas differt: corpore parvo, abdomine medio pellucido, vertice igneo: antennis scapo longo dilatato subtus testaceo, funiculo subtestaceo hirtulo: alis immaculatis, femoribus vix nisi basi obscure æneis.

Ej sällsynt; af hannen har jag endast sett ett exemplar, taget i en ekelund vid Törringe nära Malmö.

Ann. Foerstes beskrifning l. c. passar med undantag af "Beine rothgelb".

- B) Alæ ♀ haud maculatæ. Collare discretum acutum, minus angustum. Antennæ ♀ funiculo 3-, ♂ 4-articulato. Mesonoti sulci haud integri. Abdomen ♂ macula nulla pallida petiolo punctatissimo. Oculi ♀ sat profunde, ♂ leniter intus emarginati. Genæ breves. Pedes ænei, tarsis fuscis vel albidis.

- a) Oculi ♀ interne fortiter emarginati. Abdomen ♂ epipleuris inflexis, ventre latissimo, petiolo ♀ transverso.

2. *P. nigritarsis* m: Coeruleo-viridis, facie ♀ obscure ænea, tarsis nigro-fuscis, antennis ♀ brevibus incrassatis, ♂ longis hirtis. Long. 3—4 mill.

Species hujus sectionis maxima, tarsis nigro-fuscis, facie ♀ medio subopaca fusco-ænea distincta. Caput breviter triangulare; supra crassum, ocellis in triangulum dispositis, vertice acuto fortius emarginato, punctatissimo, occipite atro-coeruleo, subtilissime dense punctato, linea media lævi; facie obscure ænea dense punctata, haud nitida, infra oculos lævi; his tempora haud occupantibus, hirtis, magnis, orbita posteriore leniter, interiore fortius emarginata; genis brevissimis, haud angustis. Antennæ supra lineam ocularem insertæ, scapo tenui æneo-viridi, ocellum haud attingente, pedicello triangulari, anello parvo, conspicuo, flagello brevi, incrassato, articulo 4:o crassitie sua sesqui longiore, 5:o quadrato, 6:o clavam formante, hac postannello haud longiore, articulis longitudine sensim decrescentibus, ultimo vix setigero. Thorax minus fortiter punctatus, viridis, pronoti collari acuto; mesonoti sulcis antice anguste incisis, postice vix foveiformibus; metathorace carina alta apicem haud attingente sed pone medium furcata, ramum utrinque apicem versus emittente, plica recta bene discreta, elevata, callo laterali 1—2-setoso. Alæ subhyalinæ, nervis ut in specie præcedente, sed cellula basali et speculo nudis, nervo basali tamen pilosulo. Abdomen elongato-ovatum, supra convexum; segmento 1:o transverso crasso, punctato, 2:o trientem occupante viridi lævi, postice coeruleo punctato-substrigoso, 3—8 subæqualibus, atrocoeruleis, parce griseopilosulis. Pedes ænei, coxis posticis externe politis, tarsis fuscis, articulis longitudine subæqualibus. Mesosternum sulco medio in foveam rotundam dilatato.

Mas differt: corpore cyaneo viridi; antennis scapo, compresso-dilatato, pedicello parvo transverso; funiculi articulis 4 dense et longe griseo-hirtis, crassitie sua saltem sesqui longioribus, clava solida acuminata; abdomine petiolo longiore, segmentis dorsalibus ultimis subretractis, anterioribus margine inflexo, quo segmenta ventralia lata fiunt; pedibus gracilioribus.

Ej sällsynt i Skåne på Pil.

3. *P. nitifrons* m: Viridis, facie et mesopleuris fere aureo-nitidis, antennis ♀ parum incrassatis, abdomine convexo elongato. Long. 3 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, facie medio viridi, fere aureo-micante, scutelli dorsulo fortius squamoso-punctato, tarsis pallidis, postpetiolo viridi apice lævi, segmentis reliquis æneo-viridibus, vix atro-coeruleo-fasciatis, antennis ♀ longioribus apicem versus vix incrassatis, præclava libera, ♂ funiculi articulis minus longis, parcius et brevius hirtis optime distinguendus.

Ej sällsynt öfver hela Sverige.

4. *P. planiventris* m: Coeruleo-viridis, vertice pone ocellos atrocoeruleo sublævi, abdomine ♀ elongato, supra depresso. Long. 2—3 mill.

Species ab omnibus vertice fere lævi atrocoeruleo, ocellis magnis, thorace minus fortiter punctato, ♀ antennæ funiculi articulis tenuibus, parce pilosis, æqualibus subquadratis, abdomine supra depresso: ♂ antennæ articulis latitudine sua paullo longioribus dense hirtis bene distincta.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

- aa) Abdomen ♀ petiolo haud transverso, ♂ segmentis dorsalibus ventralia obtegentibus.

5. *P. brevicornis* m: Viridis, tarsi albidis, antennis ♀ submoniliformibus, clava subarticulata, ♂ funiculi articulis subquadratis. Long. 2 mill.

Species a præcedentibus corpore parvo, petiolo abdominis latitudine sua longiore, hoc brevior postpetiolo medium attingente, sculptura pro portione corporis fortius subsquamosa, antennis articulis 4--6 æqualibus subrotundis, clava subarticulata, articulo ultimo parum brevior setigero: ♂ abdomine pleuris haud anguste inflexis, funiculi articulis subquadratis optime distinguenda.

Ej sällsynt från Skåne till Lappland.

- C) Mesonotum sulcis integris, postice foveiformibus. Postpetiolus magnus.

- b) Antennæ ♀ haud incrassatæ. Scutellum disco polito, vel strigoso, rarissime apice vage subsquamoso-punctato. Antennæ ♂ funiculo 4-articulato.

- c) Scutellum disco medio haud politum. Abdomen convexum vix subdepressum. Pedes ænei, tarsi pallidis.

6. *P. cribrifrons* m: Colore coeruleo, viridi, vel æneo, facie ♀ fortiter punctata atro-violacea, abdomine ♀ brevi, ♂ pleuris inflexis, hoc funiculi articulis oblongis parum hirtis. Long. 2 mill.

Species ab affinis corpore parvo, capite thoraceque viridi, cyaneo vel atrocoeruleo, scutello postice vage subtiliter squamoso-punctato, basin versus substrigoso, vertice pone ocellos fere lævi, facie medio atro-violacea, fortiter rugoso-punctata, antennis parvis, funiculi articulo ultimo clavæ sat arcte contiguo, abdomine depresso subrotundo, alis n. basali nudo postpetiolo medium attingente, pedibus æneis, tarsi pallidis: ♂ antennis funiculi articulis crassitie sua sesqui longioribus, minus hirtis, vertice

et scutello atro-coeruleis, abdomine pleuris inflexis, segmentis ventralibus latis bene distincta.

Sällsynt i Skåne och på Öland i ekskogar.

7. *P. strigiscuta* m: Subcoerulea, abdomine elongato ♂ pleuris haud inflexis, scutello creberrime strigoso: antennis funiculi articulis smaragdinis hirtis subquadratis. Long. 2 mill.

Species vertice sublævi, scutello crebre evidenter strigoso, occipite linea medio lævi, abdomine ♀ convexo elongato, segmentis 3—6 sensim longioribus, terebra apice crassa subprominula, antennis præclava libera: ♂ subquadratis pulchre smaragdinis, hirtis, abdomine ♂ segmentis ventralibus latis ab affinis mox distincta.

Sällsynt; funnen i Skåne vid Herrevadskloster af Doctor G. F. Möller, vid Helsingborg på ek af författaren.

cc) Scutellum disco medio saltim basi polito.

8. *P. polita*: Fere aureo-viridis, facie medio et scapulis atro-coeruleis, alis subfumatis, disco medio umbra fusca, scutello polito, abdomine supra subdepresso, antennis præclava oblonga. ♂ ♀ Long. 3 mill.

Elachistus politus Ratz. 1. c. II. 174. 4.

Species capite genis minus brevibus, vertice subtiliter punctato, antennis funiculi tenuis articulis æqualibus, crassitie sua sesqui longioribus; mesonoti sulcis profundis cum scutelli sulcis continuis, his fere ut in *Elachisto* sitis, sed postice haud conniventibus; metathorace plica subangulata, carina medio sulco exarata; abdomine ovato, postpetiolo medium haud attingente: ♂ antennis haud crassis minus hirtis, vertice lævi, aureo-igneo optime distinguenda.

Temligen sällsynt.

9. *P. crassicornis* m: Viridis, antennis crassis, scutello vage punctato, disco basi lævi, alis hyalinis. ♀ Long. fere 3 mill.

Præcedenti affinis, sed vertice crassiore, crebrius subtiliter punctato, antennis funiculi articulis crassis subquadratis, scutello basi medio lævi, sulcis lateralibus nullis, alis hyalinis, abdomine elongato-ovato, dorso convexo mox discedens.

Sällsynt; ett exemplar funnet vid Röstånga i Skåne.

ccc) Scutellum vage subsquamoso-punctatum. Antennæ scapo pedibusque flavis.

10. *P. flaviscapus* m: Viridis, antennis tenuibus, scapo, femoribus, tibiis tarsisque testaceis, alis subfumato-hyalinis, abdomine brevi, postpetiolo maximo. ♀ Long. 3 mill.

Species capite antrorsum fortiter angustato, genis minus brevibus, vertice fere lævi, antennis scapo longo flavo, flagello filiformi, haud crasso, mesonoto et scutello postice sat fortiter subrugoso-punctatis, hoc sutura recta; abdomine petiolo latitudine sua duplo longiore, postpetiolo maximam partem abdominis occupante, ovali, rotundo, supra convexo, femoribus gracilibus, tibiis tarsisque flavis ab omnibus mox discedens.

Sällsynt i Småland.

bb) Antennæ ♀ incrassatæ, funiculo utriusque sexus 3-articulato. Abdomen postpetiolo magno, ♂ pleuris inflexis, segmentis ventralibus latissimis. (*Rhopalotus*).

11. *P. cothurnata*: Viridis, abdomine ovato-rotundo, vertice confertissime subtiliter punctato, ♂ lævi, hoc supra aureo-igneo, antennis ♀ clava maxima. Long. 2—3 mill.

Elachestus cothurnatus Nees l. c. 141. 8.

Elachestus gradualis Nees l. c. 142. 9. (forte).

Species vertice ♀ confertissime subtiliter punctato, abdomine ovato, petiolo fere transverso, subtus basi 3-dentato, antennis ♀ funiculi articulis sensim paullo latioribus, postannello quadrato, præclava transversa, clava maxima, apice oblique extus excavato, postpetiolo medium haud superante: ♂ antennis funiculi articulis æqualibus, parum hirtis, quadratis, extrorsum fusco-testaceis, vertice lævi et thorace supra igneis, abdomine læte viridi, segmentis ventralibus 2:0 et 7:0 maximis, hoc semicirculari bene distincta.

Sällsynt i södra Sverige.

12. *P. clavigera* m: Viridis, thorace sat fortiter subsquamoso-punctato, vertice sublævi, abdomine elongato-ovato, convexo, antennis clava maxima funiculo longiore. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti tarsis pallidis, metathoracis carina sulco exarata, mesonoti sulcis postice fortiter convergentibus affinis, sed minor, abdomine elongato atrocyaneo, basi cyaneo, vertice fere lævi, antennis clava adhuc majore funiculo fere longiore, hoc articulis transversis, alis hyalinis longius ciliatis mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

13. *P. substrigosa* m: Atrocoerulea, vertice lævi, abdomine elongato-ovato, antennis flagello sensim incrassato, scutello strigoso, medio lævi. ♀ Long. 2 mill.

P. clavigero abdominis forma affinis, sed antennis clava quam præclava parum majore apice setigero, vertice toto lævi, alis cellula radiali subindicata, mesonoto

obsoletius punctato, scutello substrigoso, longitudinaliter medio lævi certe distinctus.

Sällsynt; funnen på sandfälten vid Gualöf i Skåne och på Öland.

14. *P. brachycerus* m: Fere aureo-viridis, abdomine ovali-subrotundo, postpetiolo maximo; ♂ supra viridi-cyanus. Long. 2 mill.

Species a præcedentibus antennis minus incrassatis, clava ovato-acuminata quam præclava fere duplo longiore, mesonoti sulcis minus distinctis, scutello crebre, basi substrigoso-punctato mox discedens. A *P. brevicorni* abdomine postpetiolo trientem apicalem attingente, antennis crassioribus, colore supra fere aureo, ♂ antennis funiculo 3-articulato, occipite linea media nulla impressa, carina metathoracis sulcata diversus.

Sällsynt i Skåne.

D) Antennæ funiculo 4-articulato. Scapulæ discretæ. Abdomen petiolo longo, postpetiolo maximo.

15. *P. tetratomus* m: Viridis, antennis crassis, tarsis pallidis, vertice dense subtiliter, thorace fortiter squamoso-punctatis. ♀ Long. 3 mill.

Species antennis longis crassis, funiculi articulis bene discretis, crassitie sua paullo longioribus, clava acuminata abdomine ovato, postpetiolo medium superante, postice utrinque sinuato, petiolo latitudine sua duplo longiore, deflexo mox distincta.

Sällsynt i Småland.

Genus *Derostenus* Westwood.

Caput facie post mortem plerumque immerso, vertice rarius acuto, lævi, oculis plerumque magnis et hirtis, or-

bita interiore sæpius emarginata, scrobe antennali sæpe furcata, ramum utrinque versus orbitam interiorem emitte-
tente. Antennæ longe infra medium faciei insertæ, scapo sæpe toto vel pro parte pallido, annello sæpius distincto, interdum funiculi articulis conformi, hoc 3-articulato, clava rarius utriusque sexus 2-articulata. Thorax pronoti collari interdum discreto margine antico acuto; mesonoti sulcis minus distinctis, postice latis foveiformibus, sculptura minus forti, rarius subsquamosa; metathorace sæpe carina, rarius plica instructo. Alæ amplæ subcu-
neiformes, stigmatæ costa multo longiore, radio brevi, metacarpis hoc plerumque evidenter longiore, rarissime nullo. Abdomen plerumque post mortem immersum, haud raro petiolo longo, saltem haud brevi, maris sæpius macula pellucida. Pedes minus validi, femoribus et tibiis sæpius totis vel pro parte pallidis.

Detta slägte skiljes från *Pleurotropis* genom i allmänhet svagare integumenter, så att hufvud och abdomen efter döden merendels blifva infallna, hvarigenom deras form förändras till oigenkänlighet. Antennernas skaft är merendels liksom benen af en blekgul eller nästan hvitaktig färg; hjessan är sällan skarpkantad slät, ansigtets antennfära är ofta klufven i 2 grenar liksom hos *Pleurotropis*. Thorax har pronoti collare stundom ej skarpt afsatt, mesonoti sulci äro oftast i midten obestämda och baktill gropformiga, sculpturen mindre stark ofta nästan försvinnande, färgen merendels lifligt grön eller blå med guldskimmer. Vingarne hafva oftast metacarpus längre än radius, ytterst sällan är den afbruten straxt bakom stigmat, postcostan alltid med 2 svarta långa borst. Abdomen är aflång eller rundad, sällan kegelformig, skaftet ofta långt och smalt. Benen äro spensliga.

Westwood grundade slägtet på en art, som han kallade *gemmeus*. Det är svårt att afgöra hvilkendera af närmast beskrifna arter bör hänföras till detta species, ty Walker beskriver som hanne och hona af den Westwoodska arten 2 hannar, som äro så olika att de borde hänföras till olika genera. Samma förhållande är det med Nees, hvilken såsom skilda kön beskriver 2 hannar under *Elachestus fenestratus* och *albipes*, så att man har föga ledning af de föregående författarnes beskrifningar. Af anmärk-

ningen under *Entedon auronitens* III. pag. 206 ser man att Ratzeburg sammanblandat nästan alla hithörande arter, hvilka lefva parasitiskt på små bladminerande fjärilar. Jag har derföre i de flesta fall föreslagit nya namn, helre än att använda de äldre, om hvilka man altid stannar i ovisshet till hvilka arter de rätteligen böra hänföras.

Sectio 1. Metacarpus distinctus.

Divisio 1. Scutellum sulco medio nullo.

Cohors 1. Abdomen petiolo magis minusve distincto, sæpe longo instructum. Oculi emarginati, maximi hirti. Femora et tibiæ plerumque pallida, albida vel testacea. Alæ metacarpo radio haud breviores. Flagellum haud fusiforme.

A) Abdomen petiolo crassitie sua longiore, ♀ rotundum, ♂ macula media pellucida. Antennæ clava haud libera, annello sæpe magno, interdum fere funiculi æqualis articulo 1:o conformi. Metathorax carina, plica et costula instructus. Alæ metacarpo radio longiore. Femora et tibiæ pallide testacea, vel ♀ fere albida. Vertex medio et pronoti collare distinctum acuta.

a) Vertex medio incisura profunda, tempora dense fusco-tomentosa. Oculi dense hirti. Ocelli posteriores externe cum anteriore linea impressa connexi. Antennæ annello sat magno, scapo pedibusque albidis, ♂ pallide flavis, scapo metallico (*gemmeus* Autt.).

1. *D. conformis* m: Aureo-viridis, antennis annello magno, scapo pedibus cum coxis intermediis albidis: ♂ antennis scapo æqualiter compresso-dilatato. Long. 2 mill.

Species a sequentibus annello articulo 1:o funiculi fere conformi, scapo æqualiter dilatato, ♀ scutello basi fere lævi optime distinguenda. Caput magnum, thorace paullo latius, vertice emarginato, acuto, sed margine medio incisura sat profunda subinterrupto, superne aureo-

nitido, ocellis magnis fere triangulum acutum formantibus; oculis maximis, dense pulchre hirtis, inferne granulatis; orbita interiore emarginata, inferne mandibularum basin attingentibus, his haud validis apice bidentatis, temporibus tomento griseo dense sat longe ornatis; facie cuprea vage subreticulata, scrobe fere ad ocellum anteriorem extensa, ibique ramum abbreviatum, sub angulo fere recto egredientem, versus oculos utrinque emittente. Antennæ mox supra clypeum insertæ, basi parum distantes, articulo 1:o lineari, tenui, albido, 2:o triangulari, 3:o sive anello magno, 4—6 subæqualibus, fere rotundis nigris leniter transversis, clava biarticulata, articulo ultimo minore. Thorax sat robustus, viridis vel cyaneus, subglaber, vage punctatus; pronoti collari angusto, sed bene discreto, margine acuto fere recto; mesonoti sulcis dimidiatis, postice foveiformibus; scutello sutura utrinque leniter flexuosa, antice medio fere lævi; metathorace declivi, postice angustato, carina media mox pone medium furcata, ramum utrinque, costulam formante, versus plicam emittente. Alæ amplæ, cuneiformes, hyalinæ, stigmatate costa multo longiore, metacarpo radio fere duplo longiore, hoc sub angulo fere recto egrediente, clava distincta. Abdomen rotundum, supra fere planum subtus leniter convexum, petiolo lineari, coxas posticas superante, subtus ante medium angulato-dilatato punctatissimo, postpetiolo sat magno. Pedes graciles, albidi, coxis posticis tenuibus, fere cylindricis, externe punctulatis, fimbria cum callo metathoracis 1—2 setosa. Mesosternum antice spatio punctato, sulco medio tenui, mesopleuris lævibus, epimeris parvis.

Mas differt: corpore supra aureo, antennis scapo æneo, æqualiter e basi ad apicem compresso-dilatato, flagello articulis longioribus magis hirtulis, abdomine macula magna pellucida disco antice ornato.

Temligen sällsynt i medlersta och södra Sverige.

2. *D. levifrons* m: Cyaneus, antennis anello mediocri, scapo ♂ triente apicali dilatato, facie medio ♀ fere lævi. Long. 2 mill.

Præcedenti simillimus, sed minor, antennis anello funiculi articulo 1:0 duplo minore, scapo ♂ æneo basi haud attenuato, triente apicali abrupte compresso-dilatato, facie fere lævi mox discedens.

Funnen vid Helsingborg.

3. *D. punctiscuta* m: Cyaneus, anello parvo, scapo ♂ compresso, basin versus angustato, scutello basi substrigo-punctato. Long. 2 mill.

D. levifronti simillimus, ♀ facie vage reticulata, scutello basi evidenter punctato, antennis ♂ scapo æneo, basi obscure testaceo, sensim dilatato-compresso, a *D. conformi* anello parvo, ♀ scutello basi evidenter punctato discedens.

Temligen sällsynt.

- aa) Vertex medio incisura nulla. Ocelli linea impressa haud connexi. Tempora haud tomentosa. Oculi mandibularum basin attingentes, maximi. Collare discretum acutum. Coxæ metallicæ. Metathorax carina et nucha instructus.

4. *D. pilicoxa* m: Viridis vel aureus, femoribus basi fusco-æneis, petiolo longo, coxis posticis longe fimbriatis, antennis scapo basi pallido, anello distincto. Long. fere 3 mill.

Species hujus divisionis maxima, antennis basi distantibus scapo æneo basi pallido, anello majusculo, funiculo piloso, articulis haud transversis, clava libere 2-articulata; metathorace carina elevata, plica postice tantum et costula nucha indicatis; abdomine petiolo punctato longo, postpetiolo fovea basali longa, coxis posticis fimbria densa et longa, femoribus præsertim posticis basi æneis, cete-

rum cum tibiis tarsisque pallide testaceis; facie dense subtilissime punctata, aurea, scrobe antennali superne ramum obliquum tenuem versus oculos emittente: ♂ scapo compresso subtus pallido, flagello magis hirtio, corpore supra magis aureo ab affinibus optime distinguenda.

Temligen sällsynt i medlersta Sverige.

5. *D. latipennis* m: Viridis, coxis concoloribus, pedibus albidis, facie lævi, annello parvo, clava solida. Long. 2 mill.

Præcedenti petiolo longo, metathorace et alis similis et affinis, sed his apice latioribus, facie haud punctata, plerumque viridi; antennis scapo ♀ plerumque albo, annello parvo, clava haud articulata; thorace cum scutello fortius subrugoso-punctato; femoribus totis albidis vel ♂ subtestaceis; coxis posticis fimbria parca corpore ♂ semper superne aureo-violaceo discedens.

Ej sällsynt.

6. *D. aurifrons* m: Viridis, facie aurea, dense subtilissime punctata, femoribus albidis, anticis supra fusco-æneis, petiolo haud longo. ♀ Long. 2 mill.

Species petiolo brevior, pronoti collari angustiore, humeris haud prominulis transitum ad sectionem sequentem formans; sed oculis mandibularum basin attingentibus, petiolo haud transverso huic divisioni associanda; antennis omnino et facie punctatissima *D. pilicoxa* similima, femoribus pallide testaceis, anterioribus supra nigro-fuscis, vertice lateribus tereti, coxis posticis fimbria parca, metathorace brevior, nucha nulla mox distincta.

Funnen vid Helsingborg.

- B) Thorax collari haud discreto. Abdomen rotundum petiolo longo, sæpe coxas posticas superante. Vertex medio acu-

tus, incisura media nulla. Genæ breves sed distinctæ, oculis nempe mandibularum basin haud attingentibus. Antennarum ♀ scapus et pedes sæpissime albida vel pallide testacea. Metathorax plica et costula nulla. Abdomen ♂ macula nulla pellucida.

7. *D. filicornis* m: Viridis, antennis, clava libera, annello magno, scapo subtus pedibusque albidis, facie lævi. Long. 2--3 mill.

Species ab affinis capite facie haud punctata, scrobe furcata, ramum oblique versus oculos emittente; antennis annello sat magno transverso, funiculi articulis haud transversis, subæqualibus, clava libere 2-articulata, articulo ultimo ovato setigero; mesonoti dorso sat fortiter subrugoso-punctato; metathorace lævi, carina tantum tuberculo acuto basali indicata; alis dense pubescentibus, metacarpo radio duplo longiore, apice late oblique rotundato; abdomine petiolo sublævi, crassitie sua paullo longiore, coxis viridibus, posticis cum callo metathoracis sat dense longe fimbriatis discedens.

Sällsynt i södra Sverige.

8. *D. punctifrons* m: Viridis, antennis scapo subtus pedibusque albidis, facie dense subtilissime punctata, clava 2-articulata. Long. 2 mill.

Præcedenti similissimus, sed paullo minor, antennis extrorsum subattenuatis, annello minore, mesonoti dorso subtilius punctato, coxis posticis et callo metathoracis parcius fimbriatis, facie aurea vel viridi-cyanea dense subtilissime usque ad ramum scrobis furcæ punctata: ♂ antennis scapo dilatato subtus luteo, antennis flagello paullo longiore et densius piloso mox discedens.

Ej sällsynt.

9. *D. petiolatus* m: Viridis, pedibus cum coxis anterioribus flavis, petiolo longo punctatissimo, facie scrobe haud furcata. Long. 3 mill.

Species antennis clava libere biarticulata, præclava longa, anello distincto; facie polita, scrobe antennali simplice; thorace cum scutello fortius rugoso-punctato; metathorace haud lævi, carina vix indicata; abdomine petiolo coxas posticas superante, deplanato, punctatissimo; pedibus flavis, tenuibus, coxis posticis fimbria sat densa, apice pallidis: ♂ antennis scapo valde dilatato, subtus luteo, flagello longe et dense hirtio, abdomine ovali ab affinibus bene distinguenda.

Temligen sällsynt i Skåne.

10. *D. punctiscapus* m: Viridis, petiolo longo punctatissimo, facie scrobe furcata. Long. 2—3 mill.

Præcedenti abdominis petiolo dense subtilissime punctato, longo deplanato affinis, sed pedibus adhuc tenuioribus albido-testaceis, coxis posticis fimbria minus densa; facie scrobe antennali ramum subtilissimum versus oculos emittente, antennis flagello minus longo, clava ♀ fere solida, ♂ libere 2-articulata, thorace subtilius punctato: ♂ antennis scapo fere toto luteo, flagello minus longo minusque dense hirtio, metathorace lævi, pedibus fere albidis bene distinctus.

Sällsynt i Skåne.

11. *D. crassiscapus* m: Viridis, antennis funiculo crasso 3-articulato, petiolo crasso punctato fere transverso: ♂ antennis scapo æneo, basi summa pallida. Long. 2—3 mill.

Species capite fortiter transverso, crasso, facie aurea fere lævi, scrobe superne furcata, vertice ad oculos usque

acuto; antennis anello distincto, funiculo crasso, præclava fere transversa, clava solida; mesonoto subtiliter fere sericeo-punctato, dorsello lunato-elevato, metathorace haud lævi, carina basi saltim distincta, subexcavata; abdomine petiolo crasso latitudine sua vix longiore; pedibus albidis, minus tenuibus: ♂ antennis scapo valde dilatato, æneo, basi vix pallido, flagello longo, hirtio, præclava latitudine sua sesqui longiore, clava solida acuminata, petiolo paullo longiore optime distinguenda.

Temligen sällsynt.

Cohors 2. Abdomen ♀ ovatum vel elongatum, rarius subrotundum, petiolo semper brevi et tenui. Genæ distinctæ. Antennæ scapo ♀ interdum toto metallico. (*Chrysocharis*).

C) Antennæ scapo pedesque cum coxis niveæ. Vertex politus, aureus. Abdomen ♂ macula pellucida.

12. *D. niveipes* m: Cyaneo-viridis, collari discreto, metacarpo brevi, flagello ♂ niveo. Long. 2 mill.

Species corpore parvo, antennis basi pedibusque niveis, collari angusto sed discreto, metacarpo et radio brevissimis, abdomine ovali; ♂ macula prope basin pellucida, hoc antennis totis niveis ab omnibus mox discedens.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

13. *D. chrysostomus* m: Aureo-viridis, metathorace lævi, collari haud discreto. Long. 2 mill.

Præcedenti statura, colore, alis cuneatis, facie tota dense subtilissime punctata, scrobe medio sub angulo recto fere furcata affinis, sed collari haud discreto, metathorace lævi, ♂ antennis flagello nigro mox discedens.

Sällsynt i ekskogar.

- D) Antennæ scapo haud niveo, subtus ♂ luteo. Oculi magni, dense hirti, mandibularum basin haud attingentes. Facies

dense punctata, scrobe fere in medio furcata. Pronotum collari distincto, acuto. Alæ metacarpo radio duplo longiore, hoc sub angulo subacuto egrediente. Coxæ posticæ fimbria fere nulla. Abdomen ♂ macula nulla pellucida.

14. *D. boops* m: Aureo-viridis, abdomine subovato, oculis maximis dense hirtis, antennis scapo subtus pedibusque maxima parte niveis. ♀ Long. 2 mill.

Species capite vertice lateribus tereti, dense punctatissimo, facie aureo-viridi, scrobe ad ocellum haud continuata, alis cuneatis, abdomine subovato, oculis dense hirtis, facie angusta ab affinis optime distinguenda.

Temligen sällsynt.

15. *D. elongatus* m: Cyaneo-viridis, abdomine elongato-ovato, antennis scapo subtus pedibusque fere totis albidis. Long. 2 mill.

Præcedenti simillimus, sed abdomine longiore, vertice aureo postice metathoraceque lævibus, mesonoto minus concinne punctato: ♂ antennis scapo subtus luteo, funiculi 3-articulato, articulis haud longis nec dense hirtis discedens. Variat pedibus albidis, coxis posticis viridibus, vel omnibus æneis, femoribus albidis, interdum posticis, rarius omnibus supra nigricantibus.

Ej sällsynt vid Lund på *Salix fragilis*.

16. *D. nigricrus* m: Cyaneo-viridis, antennis scapo basi subtus, genubus, tibiis apice tarsisque albis, abdomine elongato. Long. 2 mill.

D. elongato abdominis forma et habitu simillimus, sed pedum colore, thorace fortius punctato antennis longioribus, funiculi articulis sensim paullo brevioribus, ultimo crassitie sua sesqui longiore mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

E) Antennæ scapo in utroque sexu metallico. Tibiæ anticæ margine plerumque fusco. Prothorax collari haud discreto. Abdomen ovatum vel ovato-rotundum, petiolo brevi, tenui ♂ macula nulla pellucida. Coxæ posticæ fimbria fere nulla. Antennæ ♂ flagelli articulis longis dense et longe hirtis.

17. *D. heterotomus* m: Cyaneo-viridis, femoribus tibiisque albo-stramineis, his margine antico fusco, antennis funiculo ♀ 3-, ♂ 4-articulato. Long. 2—3 mill.

Species pedum colore, antennis funiculo ♀ sat crasso, clava ♂ libere 2-articulata, abdomine ♀ breviter ovato, collari haud discreto, facie scrobe ad ocellum usque producto, ramum versus oculos emittente, genis sat brevibus, metacarpo radio paullo longiore, femoribus tibiis tarsisque albis, tibiis anticis margine anteriore, tarsis anticis totis, posticis apice nigrofuscis mox discedens.

Ej sällsynt.

18. *D. æneiscapus* m: Viridis, femoribus apice, tibiis tarsisque albidis, mesonoto fortius subrugoso-punctato, antennis funiculo in utroque sexu 3-articulato. Long. 2 mill.

Præcedenti similis et affinis, capite triangulari, genis longioribus, antennis clava solida, thorace fortius punctato, metacarpo radio sesqui longiore, femoribus æneis bene distincta.

Ej sällsynt.

19. *D. scutellaris* m: Viridis, scutello purpureo-violaceo, pedibus albidis, coxis æneis, ungue fusco. ♀ Long. 2 mill.

Species a præcedentibus femoribus, tibiis totis tarsisque albidis, ungue fusco, scutello subtiliter punctulato,

purpureo-violaceo, alis radio clava cum unco majoribus, genis haud brevibus distincta.

Sällsynt i södra Sverige.

Cohors 3. Abdomen subsessile, terebra subprominula, ♂ immaculatum, petiolo brevi, sæpius membrana pallida a postpetiolo sejuncto, hoc fovea basali brevi fere nulla. Caput vertice angusto haud acuto, mandibulis sat validis, 3-dentatis, clypeo apice producto subdiscreto, oculis integris. Antennæ scapo longo, tenui, vix curvato, ♂ haud vel parum dilatato, funiculo parce longe piloso. Thorax fere lævis, pronoto subconico, collari haud discreto, metathorace brevissimo, lævi. Alæ hyalinæ longe ciliatæ, metacarpo brevi radio fere sessili, clava maxima oblonga, unco sat longo, cellula radiali interdum indicata. Pedes sæpe graciles, coxis posticis angustis. (*Omphale*).

b) Pedes elongati, postici metatarso ungue multo longiore. Abdomen elongatum.

20. *D. Salicis*: Smaragdinus, pedibus fusco et pallido-variegatis, alis cellula radiali indicata, abdomine valde elongato. Long. 2—3 mill.

Omphale Salicis Halid. in Ent. Mag. I. 333. 1.

Eulophus subulatus Nees l. c. 167. 19. (femina).

Species corpore smaragdino, supra sublævi, glabro, antennis scapo subtus pallido, longo, pedicello haud parvo, annello vix conspicuo, funiculo nigro, 3-articulato, articulis sensim brevioribus, præclava oblonga, clava solida, pilis longis exsertis parce ornatis; metathorace carina medio elevata; alis minus latis, apice rotundatis, cellula radiali linea pilosa, e clavæ unco egrediente, indicata; abdomine valde elongato, apice piloso, ventre basi compresso-dilatato, valvula trientem basalem haud superante; pedibus elongatis, fuscis, trochanteribus, tibiis basi et apice cum tarsis pallidis, his pilosulis: ♂ antennis scapo parum compresso viridi, basi pallido, flagello pilis longis

verticillatis, abdomine segmento 2:o angusto optime distinguenda.

Allmän på *Salix* öfver hela Sverige.

21. *D. radialis* m: Smaragdinus, cellula radiali indicata, pedibus pallidis, abdomine sat elongato. Long. 2 mill.

Præcedenti corporis colore, alis et abdomine simillimus, hoc vero paullo brevior, alis apice latius rotundatis, pedibus totis pallidis, ventre et pectore interdum pallidis antennis paullo brevioribus discedens.

Sällsynt i Skåne.

22. *D. versicolor*: Viridis, violaceo-varians, pedibus totis pallidis, abdomine elongato, cellula radiali haud indicata. ♀♂ Long. 2—3 mill.

Eulophus versicolor Nees l. c. 169. 22. (femina).

Statura *D. Salicis*, alis cellula radiali haud indicata, pedibus totis testaceis, scutello et pectore subviolaceis mox distinctus.

Temligen allmän på *Salices*.

23. *D. varipes* m: Viridis, scutello haud polito, cellula radiali haud indicata, pedibus pallido-variegatis. ♀ Long. 2 mill.

Eulophus tabidus Nees l. c. 108. 20. (forte).

Species præcedenti alis affinis, sed abdomine minus elongato, antennis brevioribus, pedibus brevioribus fusco et pallido-variegatis, scutello haud polito sed subtilissime punctato-striato distinctus.

Sällsynt i ekskogar.

bb) Abdomen breve, subovatum. Pedes postici minus elongati, metatarso ungue brevior, parum pallido-variegati. (*Secodes*).

24. *D. coactus*: Obscure violaceo-cupreus, alis vitreis, trochanteribus, genubus, tibiis apice tarsisque fusco-testaceis. ♂ ♀ Long. 2 mill.

Entedon coactus Ratz. l. c. II. 167.

Species corpore obscure violaceo-cupreo, metathorace et basi abdominis viridi, hoc subtus parum convexo haud compresso, facie aureo-viridi, ocellis in lineam vix curvam dispositis; thorace dense subtilissime punctato; alis vitreis, radii clava magna, cellula radiali linea pilosa, ex unco radii egredinete, indicata; antennis funiculi articulis haud longis, ♂ verticillatis mox distincta.

Sällsynt i Skåne. Utläckt ur *Cecidomyia Fagi*.

25. *D. clypealis* m: Viridis, clypeo flavo, genubus pallidis, alis cellula radiali haud indicata. ♀ Long. 2 mill.

Species ab omnibus clypeo cum mandibulis flavis, alis vitreis, cellula radiali haud indicata, antennis funiculi articulo 3:o clavæ arcte contiguo, pedibus metallicis, genubus sordide albidis mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Lund.

Cohors 4. Antennæ scapo longo et flagello fusiformi laminato-compressis. Alæ cuneiformes, cellula radiali indicata, fascia arcuata, interdum etiam limbo apicali nigricantibus ornatæ. Abdomen subsessile breviter ovatum, subtus parum convexum. Oculi emarginati, hirti. Genæ breves. (*Closterocerus*).

26. *D. formosus*: Cyaneus, alis fascia pone medium arcuata, pedibus æneis, tibiis anterioribus tarsisque obscure testaceis, ♀ Long. 2 mill.

Closterocerus formosus Westw. Loudon's Mag. Nat. Hist. VI. 420.

Statura, capite, pronoti collari *D. boopi* affinis, antennarum structura, alis paullo ante radium fascia tenui fusca, mesonoto atrocoeruleo, scutello pulchre cyaneo, mox discedens. A sequente antennis longioribus, alarum fascia distinctus.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

27. *D. 3-fasciatus*: Cyaneus, alis fasciis 3 nigricantibus, anteriore parva, pedibus æneis, tibiis anterioribus margine antico obscure rufescenti, tarsis posticis articulis 2:o 3:o que sordide albidis. Long. 2 mill.

Closterocerus 3-fasciatus Westw. l. c. VI. 420.

Eulophus bifasciatus Nees l. c. 156. 6.

Præcedenti simillimus, alis limbo apicali lato, fascia integra arcuata radiali alteraque anteriore sed latiore et utrinque abbreviata minus determinata nigricantibus, mesonoto cum scutello pulchre cyaneo confertissime et sat concinne punctatis, flagello brevior; ♂ antennis magis pilosis, mesonoto aureo-viridi, mox discedens.

Sällsynt i södra Sverige.

Anm. Vid Helsingborg har jag funnit ett exemplar af Ratzeburgs *Entedon lunatus*, men då det blifvit till större delen förstördt kan jag endast gissningsvis ställa det bredvid *D. boops*. Det skulle kunna karakteriseras på följande sätt:

"Viridis, alis fascia tenui radiali, genubus, tarsis tibiisque albis, his annulo nigro prope basin."

Divisio 2. Scutellum sulco medio profundo. (*Holcopelte*).

c) Petiolus tenuis vix transversus.

28. *D. obscurus*: Virescenti-æneus, antennis scapo pedibusque flavis, alis longe ciliatis, metacarpo radio brevior. ♀ Long. 2 mill.

Elachestus obscurus Foerst. l. c. 40. 15.

Species *Omphale* affinis, capite viridi, genis longis, antennis funiculo 3-articulato, parce piloso, thorace sculptura subtili, abdomine ovato-rotundo, subtus parum convexo, coxis posticis longis mox distincta.

Funnen vid Lund.

cc) *Petiolus crassus*.

29. *D. sulciscuta* m: Coerulescens, abdomine conico-ovato, viridi, antennis scapo basi, trochanteribus, genubus, tibiis apice tarsisque basi sordide rufis, vertice polito. ♀ Long. 2 mill.

Species insignis, capite vertice acuto, scrobe antennali furcata et alis radio cum metacarpo brevibus, corpore duro, petiolo crasso transitum ad *Pleurotropidem* formans; oculis haud emarginatis glabris, genis haud brevibus, facie polita, subcoerulea nitida, antennis funiculo 4-articulato, tenui, parce piloso, mesonoto antice gibboso, pronoto sub occipite occulto, sulcis mesonoti profundis, hoc subtilius punctato, scutello postice fortiter punctato, alis basi nudis, vitreis, pedibus haud validis ab affinis mox discedens.

Ett exemplar funnet vid Helsingborg.

Sectio 2. Alæ metacarpo pone stigma abrupto. Collare haud discretum. Clypeus apice haud rotundato-producto.

30. *D. parviclava* m: Coeruleus, genubus tarsisque basi pallidis, alis vitreis, basi nudis, radio fere nullo. ♀ Long. 2 mill.

Species *D. coacto* similis et affinis, thorace lævi, glabriculo, pronoto sutura fere inconspicua, scutello et abdominis basi subcaneis, hoc breviter ovato, alis parce pubescentibus, apice late rotundatis longe ciliatis, radio fere nullo crasso, antennis funiculo tenui parce piloso, 3-articulato ab affinibus optime distinguenda.

Sällsynt; funnen vid Holmeja i Skåne af Doctor G. F. Möller, på Öland af författaren.

31. *D. abruptus* m: Viridis, radio haud brevi, antennis minus tenuibus, funiculi articulo 3:o clavæ arcu contiguo. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti metacarpo nullo affinis, sed radio sat longo, capite triangulari, mesonoto omnium subtilissime punctato, genubus late, tarsis basi tibiis fere totis pallidis bene distinctus.

Sällsynt; funnen vid Båstad.

32. *D. lucens*: Viridis, splendens, politus, antennis sat crassis, alis radio brevi. Long. fere 2 mill.

Eulophus lucens Nees l. c. 175. 32. (forte).

A præcedente corpore polito, splendente, minore, antennis tenuibus, funiculo 3-articulato, alis radio brevioribus etsi distincto, pedibus æneis, tarsis basi pallidis, abdomine et thorace angustioribus: antennis ♂ flagelli articulis magis pilosis mox discedens.

Funnen vid Lund.

33. *D. clavicornis* m: Subvirescens, antennis clava magna ovata, scapo ♂ valde dilatato. Long. 1 mill.

Species corpore minimo, metallico, virescenti, antennis clava ovata, acuminata, funiculo 2-articulato, scapo ♂

valde dilatato, alis longe ciliatis, pedibus pallide variegatis distincta.

Sällsynt i Skåne.

Genus *Astichus* Foerster.

Caput triangulare, genis sat longis, vertice tereti. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, funiculo 4-articulato, albo annulato, maris serratæ. Alæ ♀ pictura insigni, postcosta 4—5-setosa. Abdomen sessile conico-elongatum.

Detta slägte afviker från öfriga inom gruppen genom postcostan, som är försedd med flera borst, genom vingarnes mörka teckning samt genom antennerna, hvilka äro hvitringade hos ♀, sågade hos hannen.

1. *A. arithmeticus*: Smaragdinus, funiculi articulis 3:o et 4:o pallide testaceis, scapo subtus pedibusque cum coxis anticis testaceis. ♀ Long. 2 mill.

Caput thoracis latitudine, triangulare, smaragdinum, subpunctatum, inferne cum ore testaceum; pone oculos subangustatum, vertice sat lato, emarginato, haud acuto, ocellis magnis in triangulum fere dispositis, oculis magnis, glabris subrotundis, convexis, fere granulatis; genis sat latis, clypeo apice integro, scrobe antennali profunda ad ocellum anteriorem usque producta. Antennæ fere in linea oculari insertæ, basi parum distantes, scapo tenui subtus testaceo, pedicello nigro-æneo, funiculi articulis 4 longitudine subæqualibus, haud incrassatis, 2 primis nigris, 2 ultimis albido-testaceis, clava longa acuminata, quam præclava crassitie sua sesqui longiore, duplo longiore. Thorax oblongus, fere glaber, subtilissime punctatus, smaragdinus; pronoti collari haud discreto, mesonoti sulcis profundis; scutello longo, medio vitta læte cuprea, dorsello angusto, parvo; metathorace punctatissimo, carina

mox pone basin bifida. Alæ fere hyalinæ, fractæ, macula magna nonnihil pone medium, 8 fere referente, externe bifurcata, striga obliqua apicali et fascia medio coarctata in stigmatis basi fusco-nigris notatæ; cellula costali haud lata, postcosta setulis nigris 4—5 instructa, stigmate costa fere duplo longiore, speculo magno ad medium stigmatis extenso, radio unco parvo et metacarpo brevibus, longitudine subæqualibus. Abdomen conico-elongatum, cupreo et smaragdino fasciatum; subsessile, segmento 2:o haud magno fovea basali parva, 3—6 æqualibus, 7—8 longioribus, terebra parum exserta. Pedes minus graciles testacei, coxis posticis ovalibus, anticis cum præsterno concoloribus. Mesosternum antice punctatissimum, episternis nitidis lævibus bene discretis, sutura fere recta.

Sällsynt i Skåne. Den skall lefva parasitiskt på arter af *Cis*.

Tribus Tetrastichina.

Caput os versus parum angustatum, genis sulco distincto interdum subbuccatis sat angustis; clypeo apice plerumque denticulato; mandibulis 2-dentatis, dente basali lato subemarginato; scrobe antennali haud lata, minus determinata; vertice angusto haud acuto, ocellis plerumque in lineam curvam dispositis, sæpe sulco transverso cum oculis connexis, interdum antice linea tenui fere transversa impressa instructis; oculis integris sæpissime glabris. Antennæ sæpissime in medio faciei insertæ, scapo haud vel vix metallico, annello rarius magno, funiculo plerumque 3-articulato, clava sæpe setigera; maris sæpissime pilis longe decumbentibus ornatæ. Thorax pronoto haud parvo sed collari haud discreto; mesonoto rarissime punctatissimo, plerumque lævi vel subtilissime strigoso, scapulis discretis, sulcis interne plerumque punctis nonnullis setigeris instructo; scutello axillulis distinctis, postice 4-setoso, sutura utrinque valde angulatim flexuosa, sæpissime lineis 2 dorsalibus impressis, dorsello plerum-

que magno; metathorace brevi, lævi et carina tenui, interdum punctulato, rarissime plica instructo. Alæ amplæ, fractæ, stigmatæ costa plerumque longiore, sed parum ultra medium extenso, postcosta 1- 8-setosa, metacarpo fere nullo, radio semper distincto, clava unco sæpissime instructo. Abdomen subsessile, ovatum, elongatum vel triquetrum, terebra rarius longe exserta. Pedes haud validi, vel mediocres. Mesopleura distincta, haud minima. Corpus interdum haud metallicum, plerumque molliculum.

Denna grupp afviker från *Entedonina* genom starkare utvecklade metapleura, oftast 2 tydligt intryckta dorsal-linjer på scutellen med starkt vinkelformigt böjd sutur, skarpa sulci mesonoti och oftast ej utvecklad metacarpus, sessil abdomen, ej skarp hjessa eller collare. Från *Elachistina* skiljes den genom sessil abdomen och ringare antal leder i funiculus. Från *Eulophina* afviker den genom vinkelformigt böjd sutur på scutellen, skarpa sulci mesonoti och bruten postcosta.

Conspectus generum.

- A) Alæ metacarpo radio brevi fere longiore. Thorax punctatissimus, scutello lineis nullis dorsalibus. *Euderus*.
- B) Alæ metacarpo nullo, radio sat longo. Thorax lævis vel subtilissime strigosus, scutello sæpissime lineis dorsalibus impressis. *Tetrastichus*.

Genus *Euderus* Haliday.

Caput clypeo discreto apice mutico, linea transversa ante ocellos impressa, vertice minus angusto, genis sulco vix conspicuo. Thorax supra confertissime punctatus, scutello lineis nullis dorsalibus impressis. Alæ parum pubescentes, basi nudæ, metacarpo radio brevi fere longiore, cellula radiali linea pilosa indicata. Abdomen conico-triquetrum, terebra magis minusve exserta.

Detta slägte står nära *Omphale*, men mesonoti sulci äro djupa och skarpt marquerade, vingarnes postcosta har flera borst och

metapleura äro starkare utbildade. Från *Tetrastichus* skiljes det genom mesonoti sculptur, längre metacarpus och kortare radius.

1. *E. albitarsis*: Coeruleus, tarsis albidis, postcosta 5—8 setosa, abdomine conico, terebra parum exserta. Long. 2—3 mill.

Entedon albitarsis Zett. Ins. Lapp. 428. 14.

Caput genis buccatis, vertice sat lato, oculis ovato-rotundis, facie ante ocellos, in lineam curvam dispositos, impressione profunda subarcuata integra instructa. Antennæ infra medium faciei insertæ, nigræ, basi metallicæ, scapo lineari ocellum fere attingente, pedicello triangulari, funiculo 4-articulato, articulis crassitie et longitudine subæqualibus, clava 3-articulata, obtusa. Thorax coeruleus, supra in medio magis virescens, fere glaber, haud splendens, dense confertissime punctatus; pronoto magno, mesonoto scapulis profunde discretis, scutello postice haud marginato, setis 4 instructo, dorsello parvo; metathorace brevi, lævi, viridi, carina brevi instructo, calli fimbria parca. Alæ longæ, vitreæ, postcosta multi-setosa, metacarpo radio paullo longiore. lineis pilosis e clava radii egredientibus, superiore cellulam radialem indicante, altera apicem alæ attingente, nervo spurio etiam linea pilosa bene conspicuo. Abdomen thorace longius triquetro-conicum, sessile, postpetiolo haud magno, terebra fere metatarsi longitudine, valvula ventrali medium attingente. Pedes sat validi, subcoerulei, genubus et tibiis apice obscure ferrugineis, tarsis haud brevibus albidis. Mesosternum breve, pleuris bene discretis.

Mas differt: abdomine brevior, flagello antennarum magis piloso.

Ej sällsynt.

2. *E. caudatus* m: *Æneus*, terebra abdomine paullo longiore, tarsis albidis, posticis elongatis. ♀ Long. 3 mill.

Præcedenti alis simillimus, sed postcosta tantum 4-5-setosa, corpore æneo, subtilius punctato, abdomine valvula ventrali medium longe superante, pedibus posticis præsertim tarsis elongatis mox discedens.

Sällsynt; funnen i Lappland och på Öland.

3. *E. viridis* m: Virescens, tarsis albidis, antennis brevibus, incrassatis, terebra brevi. ♀ Long. 2 mill.

E. albitarsis statura, sed corpore minore, magis virescenti, abdomine haud compresso thorace fere brevior, antennis brevibus, flagello incrassato distinctus.

Sällsynt; funnen på Öland.

4. *E. obscurus* m: Cupreus, thorace parum nitido, alis subfumatis, nervis spuriis linea pilosa haud indicatis. ♀ Long. 2 mill.

Species a præcedentibus, faciei linea impressa ante ocellos oculos haud attingente; antennis flagello tenui, articulis haud brevibus sed sensim latioribus; capite thoraceque obscure cupreis, fere opacis, hoc sculptura præsertim scutelli lateribus substrigosa; alis levissime fumatis, postcosta parce setosa, metacarpo radio fere brevior, lineis pilosis vix conspicuis; abdomine viridi, ovato, haud compresso, terebra parum exserta, tarsis rufescentibus, genubus et tibiæ apice obscurioribus mox discedens.

Sällsynt på Öland.

Genus *Tetrastichus* Haliday.

Aprostocetus Westw. Lonchentedon Ratz. Geniocerus Ratz.

Caput genis sulco distincto, clypeo apice medio bidenticulato, ocellis plerumque in lineam curvam dispositis,

oculis glabris vel rarius pilosulis, integris, ovatis vel subrotundis, vertice angusto, sulco inter oculos et ocellos transverso sæpe distincto, linea anteoellari plerumque conspicue impressa. Antennæ sæpissime paullo infra medium faciei insertæ, scapo rarissime ocellum anteriorem superante, annello parvo sed conspicuo, rarius funiculi articulis conformi, hoc 3-articulato, clava 3-articulata, articulo ultimo minore sæpe setigero. Thorax pronoto declivi, postice præsertim lateribus setoso; mesonoto utrinque prope sulcum punctis nonnullis setiferis; scutello postice 4-setoso, sæpissime lineis 2 dorsalibus parallelis profunde impressis, dorsello sæpius magno; metathorace plerumque brevi, rarius punctulato, apice medio haud producto sed angulatim emarginato, carina sæpe, plica rarius instructo, calli fimbria sæpissime 1-4-setosa. Alæ haud fumatæ, stigmatæ costa plerumque evidenter longiore, metacarpo nullo, radio sat longo, sub angulo subacuto egrediente, clava distincta, unco conspicuo, cellula radiali haud indicata, nervo spurio inconspicuo, postcosta 1-5-setosa. Abdomen ovåle, ovatum. vel conico-triquetrum, terebra rarius longe exserta. Pedes sat validi, tibiis posticis 1-calcaratis, tarsis articulis longitudine subæqualibus, quam tibia brevioribus. Prosternum distinctum rhombeum; mesosterno brevi, pleuris bene discretis, episternis semper, epimeris sæpissime lævibus; præsternis rarius punctatissimis. Mas antennis pilis rarius exsertis, sæpissime longis adpressis ornatis, annello semper distincto, plerumque transverso.

Detta slägte, som lätt skiljes genom den slåta scutellen och vingarnes ej utvecklade metacarpus, innefattar en mängd arter, som väl borde fördelas på flera genera; men då hannarna till större delen ännu äro obekanta, så har jag ansett lämpligast att tills vidare sammanfatta dem alla under ett genus, fördelade på flera grupper. Färgen på thorax är hos de brokiga arterna variabel, till en del torde samma förhållande ega rum med extremiteterna; deremot anser jag att den metalliska färgen på thorax är constant och har derföre lagt dem till grund för sectionerna.

Hufvudet faller merendels tillhopa efter döden, så att man har svårt att se ansigtets intryckningar, hvilka måhända skulle kunna underlätta arternas karakteristik.

Sectio 1. Antennæ longe supra clypeum insertæ.

Divisio 1. Scutellum lineis dorsalibus impressis distinctis.

- A) Thorax haud metallicus, lævis, pallido-variegatus; scutello convexo; dorsello magno; metathorace lævi brevi. Alæ postcosta multisetosa, stigmatæ radio saltim duplo longiore, hoc clava crassa, sub angulo acuto egrediente. Abdomen elongatum, acuminatum, basi compresso, valvula ventrali brevi, terebra subexserta. Coxæ posticæ læves, longæ, ovali-cylindricæ. Antennæ longæ, filiformes annello ♀ magno, ♂ setis adpressis ornatae. (*Oxymorpha*).

1. *T. elongatus*: Niger, capite thoraceque flavo-variegatis, pedicello annello parum longiore; ♂ capite thoraceque nigris, pedibus basi et posticis pro parte nigris. Long. 3—5 mill.

Eulophus elongatus Foerster l. c. 41. 11.

Geniocerus macroneurus Ratz. l. c. III. 214. 60.

Species maxima generis. Caput thorace haud latius, rufescens, occipite, macula verticis, hac interdum inferne prolongata, nigris; ocellis in lineam fere transversam dispositis, sulco laterali minus conspicuo; genis subbuccatis, angustis, sulco sat profundo. Antennæ nigro-fusæ, scapo subtus pallido, ocellum anteriorem fere superante, pedicello oblongo triangulari annello vix longiore, hoc haud transverso, quam funiculi 1:o articulo longo vix angustiore sed evidenter brevior, hujus articulis 2:o et 3:o subæqualibus crassitie sua paullo longioribus, clavæ articulo 1:o fere libero, 3:o minore haud setifero. Thorax supra subconvexus; pronoto convexo declivi, haud brevi, piceo-niger, lateribus pallidis; mesonoto lævi, minus nitido, piceo-nigro, suturæ sulci late rufescenti, interdum rufo, ma-

cula anteriore nigra; scutello convexo, lineis dorsalibus haud late distantibus, rufo, fusco- 4-lineato, vel fere toto nigro; dorsello magno convexo, rufescenti, vel nigro flavo-binotato; metathorace lævi, nigro, lateribus rufescentibus, carina brevi, quam dorsello fere breviorē, calli fimbria parca. Alæ longæ, apice minus late ovato-rotundatæ, basi nudæ, nervo basali piloso. Abdomen thorace longius, elongatum, acuminatum, ventre compresso, valvula ventrali trientem haud superante, nigrum, basi magis minusve pallide variegatum, terebra crassa metatarsi longitudine. Pedes elongati, minus validi, rufescenti-testacei, coxis posticis ovali-oblongis, lævibus, fimbria nullā basi nigræ. Mesosternum læve, præsternis cum scapulis flavis haud punctatis, his macula nigra.

Mas differt: capite thoraceque nigris immaculatis, coxis omnibus, femoribus intermediis subtus, posticis ultra medium nigricantibus; antennis articulo 1:o subtus compresso, 2:o brevi, 3:o subrotundo basi dilatato et sequentibus fortiter compressis, his longis setis nigris adpressis instructis.

Ej sällsynt i Skånes bokskogar. Utkläckt ur *Cecidomyia Fagi*.

2. *T. luteus*: Pallide flavus, vitta anteriore thoracis, macula occipitis, metathoracis abdominisque ante apicem nigris, antennis annello funiculi articulo 1:o conformi. Long. 3—4 mill.

Entedon luteus Ratz. l. c. III. 209. 29.

Præcedenti simillimus, sed minor, colore pallidiore, antennarum structura mox distinctus.

Sällsynt i Skåne.

3. *T. intermedius* m: Pallide flavo et nigro-variegatus, antennis annello parvo. ♀ Long. 3—4 mill.

T. elongato simillimus, antennis pedicello quam anello duplo longiore, scutello nigro, corpore minore discedens.

Sällsyntare än föregående arter.

- B) Thorax mesonoto omnium subtilissime subrugoso-punctato, metathorace concinne punctato, plica nulla. Alæ postcosta bisetosa. Abdomen breve ovali-rotundum, postpetiolo dimidium fere occupante, terebra occulta. Antennæ ♂ pilis subexsertis ornatae. Corpus vix metallicum.

4. *T. atratulus*: Niger, vix æneo-violaceo-micans, genubus tibiis tarsisque ferrugineis. Long. 2—3 mill.

Eulophus atratulus Ness l. c. 180. 39. (forte).

Species ab affinibus capite brevi, antrorsum angustato, antennis submoniliformibus, metathorace haud brevi, punctatissimo, abdomine petiolo magis distincto, postpetiolo magno, valvula ventrali apicem abdominis fere attingente: ♂ antennis flagelli articulis transversis, parcius setis oblique erectis ornatis optime distinguenda.

Ej sällsynt i Skåne.

- C) Corpus coeruleum vel viride. Postcosta 1-setosa. Mesonotum sulco medio fere læve. Metathorax punctulatus, plica integra distincta. Abdomen breve ovato-rotundatum subacuminatum, subtus parum convexum. Antennæ ♂ dense sat longe pubescentes.

5. *T. trichops* m: Olivaceo-æneus antennis extrorsum incrassatis, oculis hirtis, scapo subtus, genubus, tibiis tarsisque ferrugineo-testaceis. Long. 2—3 mill.

Species oculis hirtis, thorace sublævi, setis seriatis juxta sulcum longis erectis, antennis flagello extrorsum incrassato, articulis bene discretis, abdomine terebra exserta; ♂ antennis scapo æneo-viridi, anello transversio,

funiculi articulis oblongis æqualibus ab omnibus mox discedens.

Temligen allmän.

6. *T. atrocoeruleus*: Viridis, vel coeruleus, antennis funiculi articulis oblongis, abdomine terebra haud exserta. Long. 2—3 mill.

Eulophus atrocoeruleus Nees l. c. 175. 29.

Eulophus Hylotomarum Ratz. l. c. I. 168. 24.

Præcedenti statura, metathorace subtiliter punctato, plica obliqua integra ad spiracula magna usque producta, metapleuris impressis, præsternis et mesosterno antice punctatis affinis; sed colore lætiore, abdomine terebra haud exserta, antennis funiculi articulis crassitie æqualibus, cylindricis, clava elongata, genubus, tarsis basin versus tibiisque rufescentibus, his posterioribus interdum medio late fuscis: ♂ antennis funiculi articulis longioribus, pilosis et pubescentibus distinctus.

Temligen allmän.

7. *T. setifer* m: Coeruleus, antennis filiformibus, clava setigera, genubus, tibiis tarsisque rufescentibus. ♀ Long. 4 mill.

Eulophus coeruleus Nees l. c. 174. 30. (forte).

T. atrocoeruleo simillimus, sed major, antennis clava longiore articulo ultimo setigero, pronoto minus convexo declivi, scutelli dorsulo postice fortius elevato-marginato, funiculi articulis 2 ultimis brevioribus, crassitie sua parum longioribus bene distinctus.

Sällsynt; funnen vid Lindholmen i Skåne.

- D) Antennæ funiculo crasso pedicello duplo latiore, ♂ scapo valde dilatato. Metathorax punctulatus, carina haud brevi.

Pedes postici calcari metatarso longiore. Abdomen ♀ globoso-ovatum. Corpus parvum, parum metallicum.

8. *T. scaposus* m: Niger, vix olivaceo-micans, genubus obscure stramineis, tibiis tarsisque fusco-testaceis. Long. 2 mill.

Species corpore nigro, vix olivaceo-micante; capite antrorsum vix angustato, sulco ocellari nullo; antennis funiculi articulo 1:o fere transversso, quam 3:o haud angustiore sed paullo brevior, clava sat magna, evidenter 3-articulata; thorace lævi, metathorace obsolete punctato, carina distincta; abdomine terebra haud exserta, valvula ventrali medium longe superante; mesosterno cum pleuris lævibus, metatarso postico brevi: ♂ antennis scapo ovali-dilatato, funiculi articulis haud longis, pilis parce longius exsertis ornatis ab affinibus optime distinguenda.

Sällsynt i medlersta Sverige.

- E) Alæ postcosta superne seta tantum 1 ante medium instructæ, radii clava tenui. Sulcus juxta ocellos nullus. Mesonotum sulco medio fere nullo, punctis setigeris juxta sulcum paucis, 2—3 instructum. Metathorax sat brevis. Valvula ventralis medium abdominis haud superans.

a) Caput inferne pallidum. Metathorax lævis.

9. *T. citrinus* m: Citrinus, parum nigro-variegatus, antennis tenuibus scapo ocellum anteriorem superante pedibusque gracilibus, alis longe ciliatis. ♀ Long. 2—3 mill.

Species corpore gracili, citrino, macula occipitali, interdum verticis, thoracis anteriore, metathorace, interdum vitta media scutelli, pectore magis minusve, abdomine ante apicem vel etiam lateribus antice nigricantibus, vix violaceo-micantibus; funiculo antennarum tenui longo, pilosello, alis apice late rotundatis, longe ciliatis,

stigmatē et radio sat longo tenuibus, abdomine haud compresso, subovali, terebra vix prominula bene distincta.

Sällsynt; funnen vid Stockholm.

10. *T. cyclogaster*: Viridis, abdominis ovalis basi late pedibus cum coxis anticis stramineis, antennis tenuibus, pilosulis, filiformibus. alis radio tenui stigmatē duplo breviorē. ♀ Long. 2 mill.

Entedon cyclogaster Ratz. l. c. I. 167. 21.

Species capite angusto, facie fere tota pallida, thorace smaragdino, lævi, subdepresso, metathorace lævi, haud brevi, abdomine ovali, subtus basique fere tota stramineo, terebra vix prominula, ventre parum convexo, pedibus stramineis, coxis posticis viridibus, femoribus posticis basi macula fusca ab affinibus optime distinguenda.

Sällsynt; funnen vid Helsingborg.

aa) Caput dimidio inferiore haud pallidum.

11. *T. subdepressus* m: Niger, vix nisi nitore pingui, thorace subdepresso, lævi, trochanteribus, femoribus apice tibiis tarsisque stramineis, radio tenui stigmatē vix duplo breviorē. ♀ Long. 2—3 mill.

Entedon leptoneurus Ratz. l. c. I. 169. (forte).

Species corpore lato, nigro, nitido, lævi, antennis fusco-testaceis, longis filiformibus, scapo ocellum superante, funiculi articulis crassitie æqualibus, sensim brevioribus, præclava crassitie sua duplo longiore; thorace lato subdepresso, lævi, setis paucis brevibus, dorsello parvo, metathorace lævi, haud brevi, abdomine ovali, terebra vix conspicua, alis stigmatē tenui, apice late rotundatis ab affinibus bene distincta.

Funnen vid Helsingborg.

12. *T. pallicornis* m: Niger, antennis testaceis, præclava rotunda, pedibus albidis, coxis maculaque femorali nigricantibus. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti thorace, abdomine lato alisque apice late rotundatis simillimus, sed antennis brevioribus, scapo ocellum vix attingente, flagello tenui, præclava fere transversa, clava ovato-acuminata, alis radio brevioribus, stigmate fere costa brevioribus pedumque colore albido certe distinctus.

Funnen i Småland.

13. *T. pedicellaris* m: Niger, pedibus stramineo-variegatis, abdomine acuminato. Long. 2 mill.

Species *T. subdepresso* colore similis et affinis, sed thorace subconvexo, alis radio longioribus, abdomine ovato-acuminato, antennis scapo brevi, subtus pedicelloque testaceis, flagello obscure testaceo, æquali, haud longo, metathorace brevioribus, trochanteribus, femorum apice tibiis tarsisque pallide flavis, genubus stramineis: ♂ antennis flagello subtestaceo, articulis subquadratis, pilis brevibus exsertis ornatis, abdomine prope basin macula obscure testacea.

Ej sällsynt vid Lund på *Salices*.

14. *T. compressiventris* m: Olivaceo-virescens, abdomine elongato, mesonoto subtilissime strigoso, convexo. Long. 2 mill.

Species a præcedentibus thorace sulco tenui olivaceo-virescenti, haud lævi cum scutello convexo, metathorace brevissimo, subpunctato, alis nervis crassioribus, obscuris, abdomine elongato, basi subtus compressa, terebra exserta, genubus testaceis, tarsis tibiisque fuscis, his anticis obscure testaceis, antennis nigro-fuscis, funiculi articulis quadratis mox discedens.

Temligen sällsynt.

F) Alæ postcosta 2-5-setosa. Mesonotum sulco medio sæpe distincto, punctis setigeris prope sulcum distinctis. Metathorax plica nulla.

b) Thorax viridis, interdum smaragdinus, saltem olivaceomicans, sulco medio sæpissime distincto. Metathorax sæpe punctatus.

c) Antennæ scapo ocellos superante, flagello longo tenui, filiformi, anello ♂ conformi. Abdomen valvula ventrali medio haud attingente, terebra brevi crassa. Caput dimidio inferiore pallido, ocellis in lineam sat curvam dispositis. Metathorax haud brevis, punctatissimus. Mesonotum haud depressum, sulco medio tenui fere obsoleto. Postcosta 3-4-setosa.

15. *T. longiscapus* m: Supra viridis, subtus pallidus, antennis scapo ♂ apicem versus subangulato-compresso. Long. 3 mill.

Species capite antrorsum parum angustatum, genis subbuccatis, facie convexa, superne et vertice punctis paucis majoribus impressis, sulco transverso ocellari distincto; antennis fuscis, scapo et pedicello subtus testaceis, clava tenui postannello brevior, præclava longa; alis longis haud vitreis, fere totis pubescentibus, stigmatum radio brevior triplo longior, apice haud late rotundatis, corpore subtus cum tegulis pedibusque pallidis, mesosterno superne metapleurisque punctulatis, macula media et episternis interdum viridibus: ♂ pectore fere toto viridi, antennis longissimis, anello sequentibus funiculi articulis conformi, setis adpressis rigidis ornatis, compressis obconicis optime distinguenda.

Sällsynt; funnen vid Stockholm.

16. *T. xanthops*: Viridis, pectore concolore, antennis ♂ scapo compresso basi latiore. Long. 3 mill.

Entedon xanthops Ratz. l. c. II. 170.

Præcedenti simillimus, antennis scapo minus elongato, alis apice latioribus, abdomine magis elongato, pectore coxisque posticis viridibus, pedibus validioribus stramineis mox discedens.

Sällsynt; funnen vid Holmeja i Skåne.

cc) Antennæ scapo ocellum anteriorem haud superante.

d) Abdomen terebra haud vel parum prominula.

e) Mesonotum haud depressum.

1) Antennæ flagello ♀ filiformi. Metathorax sæpissime punctulatus. Caput viride, antice rarius pallidum. Valvula ventralis medium haud attingens. Mesonotum sulco medio.

17. *T. Evonymellæ*: Smaragdinus, metathorace concinne punctato, linea arcuata prope spiracula, genubus, tibiis tarsisque luteis. Long. 3—4 mill.

Entedon Evonymellæ Bouché Naturg. pag. 172.

Entedon acuminatus Ratz. l. c. II. 169, 37. Tab. III. fig. 23.

Species corpore viridi, smaragdino vel cupreo micante, capite sulco ocellari profundo, facie utrinque juxta oculos concinne punctata; antennis flagello pilosulo, articulo 1:o longo, 2:o et 3:o subæqualibus fere ovalibus; mesonoto lævi, scutello convexo; metathorace sat longo, carina distincta, calli fimbria 3-4-setosa; abdomine elongato, haud compresso; alis radio et stigmate tenuibus; pedibus sat crassis, coxis posticis punctatis, trochanteribus, femorum apice, tibiis tarsisque luteis; ♂ antennis scapo haud angulatim dilatato, anello transverso et funiculi articulis longis compressis, elongato-obconicis setis rigidis adpressis ornatis, macula abdominis pellucida ab omnibus optime distinguenda.

Ej sällsynt på Skånes pilevallar.

18. *T. flavimanus* m: Viridis, antennis testaceis, scapo subtus, tegulis pedibusque cum coxis anticis stramineis. Long. 2—3 mill.

Præcedenti simillimus, pedum colore, metathorace obsoletius punctato, linea arcuata nulla prope spiracula, abdomine ovali, apice haud acuminato mox distinctus.

Funnen vid Holmeja i Skåne.

19. *T. punctiscuta* m: Viridis. trochanteribus femoribus apice late. tibiis tarsis tegulisque stramineis, metathorace subtiliter punctato, alis stigmatibus et radio tenuibus, abdomine ovali, haud compresso. Long. 2—3 mill.

T. flavimano simillimus, antennarum scapo pedumque colore tantum distinctus: ♂ *T. Evonymellæ* similis et antennarum structura affinis, abdomine viridi discedens.

Temligen sällsynt.

20. *T. crassinervis* m: Viridis. fere smaragdinus alis radio sat longo et stigmate crassis, abdomine compresso, acuminato, genubus, tibiis tarsisque stramineis. Long. 2—3 mill.

Eulophus Evonymellæ Ratz. l. c. I. 169. 27.

Species a præcedentibus, alis late rotundatis, stigmate radio vix duplo longiore, crassis, tegulis viridibus, metathorace brevioribus, obsoletius punctato, abdomine elongato-triquetro mox distincta.

Sällsynt.

21. *T. clavicornis*: Olivaceus, antennarum flagello brunneo faciei pictura pedibusque fere totis flavis. ♀ Long. 3 mill.

Entedon clavicornis Zett. Ins. Lapp. 428. 10.

Præcedentibus statura similis et affinis, corpore haud lucide viridi, facie inferne vittisque 2 flavis, pedibus concoloribus, coxis, femoribus posticis ultra medium fusco-æneis, alis nervo basali haud piloso, radio brevi stigmatæque tenuibus, abdomine haud compresso, elongato distinctus.

Finnen i Lappland.

ff) Antennæ ♀ flagello brevi, incrassato.

22. *T. brevicornis*: Viridis vel cyaneus, capite thoraceque stramineo-pictis, pedibus fere totis stramineis. Long. 2—3 mill.

Eulophus brevicornis Nees l. c. 163. 13.

Geniocerus Cccidomyiarum Ratz. l. c. III. 216. 2.

Species capite thoraceque pictura magis minusve extensa flavo-straminea, rarissime immaculatis, antennis extrorsum crassioribus, præclava transversa, clava ovato-globosa, nigris, scapo æneo; abdomine elongato-acuminato, basin versus sæpe pallide variegato, valvula ventrali medium attingente, terebra subexserta; mesonoto fere lævi haud brevi, sulco tenui, dorsello magno, metathorace sublævi, haud brevi; alis longis apice minus late rotundatis, stigmate radio fere triplo longiori, tenuibus; pedibus sat crassis stramineis, coxis basi vel totis, femoribus posticis vel omnibus macula magna viridi: ♂ antennis flagello setis rigidis nigris adpressis ornatis, annello transverso, postannello minus longo, compresso-obconico ab omnibus discedens.

Ej sällsynt i södra Sverige.

23. *T. Vinulæ*: Viridis, metathorace brevissimo, abdomine elongato-triquetro, pedibus stramineo-variegatis. Long. 2—3 mill.

Entedon Vinulae Ratz. l. c. I. 169. (forte).

Præcedenti simillimus, sed capite thoraceque brevi immaculatis, metathorace brevissimo, abdomine ventre magis compresso-carinato, pedibus obscurioribus, genubus, tarsis basin versus tibiisque stramineis, his medio fusco-æneis, mesonoto brevior, alis latius rotundatis, tegulis viridibus, radio longiore et stigmate sat crassis bene distinctus.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

24. *T. seticollis* m: Viridis, thorace brevi, setis juxta sulcum longis erectis, abdomine ovato-subacuminato. Long. 2 mill.

T. Vinulae corpore brevior affinis, sed mesonoto minus lucido, omnium subtilissime strigoso, setis ordinariis juxta sulcum scapularem et verticis longis, erectis nigris, metathorace fere adhuc brevior, alis longius ciliatis, abdomine latiore, parum compresso, tibiis posticis fuscis, tarsis obscure testaceis distinctus.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

- ee) Thorax læte cyaneus vel smaragdinus, mesonoto sulco medio fere nullo cum scutello parum convexis, hoc lineis dorsalibus distantibus. Abdomen elongato-acuminatum, terebra subexserta.

25. *T. deplanatus* m: Smaragdinus, antennis filiformibus testaceis, pedibus sat crassis cum coxis anterioribus stramineis. Long. 2—3 mill.

Species *T. flavimano* colore affinis, sed corpore supra magis depresso, antennis clava brevi, metathorace brevior, ♂ antennis structura ut in *T. nigricorni* mox distincta.

Sällsynt; funnen vid Holmeja i Skåne.

26. *T. citripes* m: Smaragdinus, pedibus luteis, coxis viridibus, antennis flagello fusco tenui. ♀ Long. 2 mill.

Præcedenti corpore depresso, metathorace haud brevi, carina distincta, dorsello haud magno, alis longe ciliatis minus late rotundatis. stigmate et radio tenuibus affinis, sed antennis flagello fusco, clava longa ovata, pedibus gracilioribus, læte luteis, tarsis fuscis, coxis viridibus mox distinctus.

Sällsynt; funnen vid Holmeja i Skåne.

27. *T. terminalis* m: Viridis vel cyaneus, pedibus parum pallide variegatis, antennis brevissimis clavatis, ♂ flagello articulis transversis, haud rigide setosis sed tantum densius longe pubescentibus. Long. 2 mill.

Entedon amethystinus Ratz. l. c. II. 170. (forte).

Species a præcedentibus antennis brevibus incrassatis, thorace minus deplanato, ante scutellum medio parce setoso; *T. Vinulæ* simillimus, sed antennis adhuc brevioribus, abdomine terebra longiore, metathorace minus brevi, tibiis fuscis vel testaceis mox distinctus.

Utkläckt ur *Cynips terminalis* från Öland.

- dd) Abdomen triquetrum, longum, terebra longe exserta. Mesonotum haud breve, subtilissime strigosum, scutello convexo, lineis dorsalibus approximatis, metathorace brevissimo, lævi. Alæ longæ, apice minus late rotundato, stigmate radio triplo longiore, tenuibus. Antennæ scapo æneo, flagello brevi, subincrassato.

28. *T. longicauda* m: Smaragdinus, pedibus citrinis, coxis et femorum macula viridibus, terebra abdomine parum brevior. Long. 2—3 mill.

Species corpore læte viridi, antennis extrorsum fusco-testaceis, clava ovata brevi, præclava transversa, mesonoto

sulco medio distincto, pedum colore, valvula ventrali medium abdominis fere attingente, terebra longa tenui mox distincta.

Sällsynt i Skåne.

29. *T. dolichurus* m: Olivaceo-viridis, genubus, tarsis basi tibiisque luteis, his medio sæpe fuscis, mesonoto sulco medio vix conspicuo, abdomine valde elongato, terebra longa. ♀ Long. 3 mill.

Eulophus longicaudatus Foerst. l. c. 42. 19. (forte).

Præcedenti simillimus, antennis minus incrassatis, clava ovato-acuminata, mesonoto obscure viridi, sulco medio haud conspicuo, abdomine magis elongato, quam terebra tenui longiore pedumque colore flavo bene distinctus.

Sällsynt; funnen på Öland.

30. *T. crassicauda* m: Olivaceus, pedibus parum pallide variegatis, terebra crassiuscula abdomine triplo brevior. ♀ Long. 2 mill.

T. dolichuro mesonoti colore et sulco obsoleto affinis, sed antennis brevioribus, pedibus obscurioribus, terebra crassa abdomine triplo brevior discedens.

Temligen sällsynt i södra Sverige.

bb) Thorax vix nisi nitore pingui, rarius obscure olivaceus, sæpe lævis.

g) Terebra longe exserta.

31. *T. caudatus*: Niger, fere æneo micans, terebra abdomine nonnihil brevior. Long. 2--3 mill.

Aprostocetus caudatus Westw. London et Edinb. Phil. Mag. II. 444. June 1833.

Eulophus tristis Nees l. c. 188. 53.

Lonchentedon longicaudatus Ratz. l. c. III. 215.

Species abdomine compresso, terebra longe exserta prioribus affinis, sed antennis flagello vix incrassato, thorace haud viridi, genubus, tibiis tarsisque luteis, terebra abdomine fere duplo brevior distincta.

Sällsynt vid Lund. Den skall leva på Bedeguar.

32. *T. ciliatus*: Niger, vix olivaceo-micans, pedibus parum variegatis. Long. 1 mill.

Eulophus ciliatus Nees l. c. 189. 54. (forte).

Præcedenti simillimus, sed duplo minor, abdomine thorace parum longiore, hoc obsolete olivaceo-micante, antennis brevioribus flagello incrassato, terebra abdomine fere triplo brevior certe distinctus.

Sällsynt; funnen på Öland.

gg) Abdomen terebra haud vel vix exserta, abdomine saltim quadruplo brevior.

h) Scutellum haud depressum, lineis dorsalibus inter se vix magis quam ab axillulis distantibus.

i) Mesonotum haud olivaceum, sulco medio nullo. Antennæ ♀ filiformes.

33. *T. varius*: Rufo-nigro et citrino-variegatus, abdomen elongato, terebra subexserta. Long. 3—4 mill

Entedon flavovarius Ratz. l. c. II. 164.

Species corpore elongato, capite thorace abdomineque rufescenti, citrino et nigro-variegatis, hoc ventre subcompresso, terebra metatarsi fere longiore, pedibus flavis, coxis posticis basi nigris; antennis fuscis subtus testaceis, scapo brevi, flagello filiformi, præclava oblonga; mesonoto lævi, sulco medio nullo, scutello convexo, dorsello

magno, metathorace haud brevi, lævi, carina distincta; alis radio haud crasso quam stigmatē tenui fere triplo breviorē: ♂ antennis scapo triente apicali dilatato-nigro, anello pedicello longiore, quam postannello evidenter breviorē, flagello setis nigris adpressis ornato, corpore minus variegato, abdomine oblongo, macula magna pellucida ab affinibus optime distinguenda.

Funnen vid Lund på *Salices*.

34. *T. inunctus*: Niger, parum oleo-micans, antennis flagello brunneo, pedibus maxima parte pallidis. Long. 3 mill.

Eulophus inunctus Nees l. c. 183. 44.

Entedon oleinus Ratz. l. c. II. 169.

Præcedenti simillimus, sed latior, abdomine minus acuminato, thorace haud maculato sed dorsello et tegulis sæpe pallidis, coxis fere totis femoribusque posticis plerumque fusco-æneis.

Ej sällsynt.

35. *T. micantulus* m: Niger oleo-micans. pedibus parum pallido-variegatis. Long. 2—3 mill.

T. inuncto statura similis et affinis, sed minor, antennis paullo brevioribus, præclava quadrata, nigris, metathorace breviorē, mesonoto magis nitido, pedibus obscurioribus: ♂ antennis structura ut in *T. vario* sed scapo nigro, abdomine immaculato.

Temligen allmän i södra Sverige.

- ii) Thorax obscure olivaceus, mesonoto sæpe sulco distincto. Pedes maxima parte nigri. Antennæ flagello breviusculo interdum incrassato, scapo haud pallido.

36. *T. brachycerus* m: Subolivaceus, antennis subincrassatis, mesonoto sulco distincto. Long. 2—3 mill.

Species statura, pedum colore, mesonoto lævi, sulco ocellari profundo, cellula costali sat lata *T. micantulo* similis et affinis, sed mesonoto obscure olivaceo-micante, antennis brevibus, præclava ♀ transversa, ♂ postannello breviter obconico, crassitie sua sesqui longiore bene distinctus.

Temligen sällsynt.

37. *T. obscuripes* n: Niger, mesonoto vix olivaceo-micante, sulco medio nullo, antennis flagello brevi, incrassato. Long. 2 mill.

Species *T. micantulo* simillima, sed antennis flagello ♀ incrassato, præclava transversa, clava ovato-acuminata, ♂ antennis brevioribus, sed flagelli articulis quam in *T. brachycero* longioribus et tenuioribus distincta.

Fuunen på Öland.

38. *T. claviger* m: Niger, mesonoto vix olivaceo-micante antennis flagello obscure testaceo, ♀ incrassato, alis radii clava sat magna. Long. vix 2 mill.

Entedon Vaginulæ Ratz. l. c. III. 213. (forte).

T. obscuripedi simillimus, sed antennis flagello in utroque sexu pallido, tibiis dilutioribus, alis radii clava majore discedens.

Fuunen vid Degebergå i Skåne.

hh) Scutellum subdepressum, lineis dorsalibus distantibus, cum sulcis mesonoti fere continuis.

39. *T. aurantiacus*: Æneo-viridis, pedibus albidis, coxis posticis viridibus, abdomine subrotundo, fascia lata aurantiaca. Long. 2 mill.

Entedon aurantiacus Ratz. l. c. III. 211. 46.

Eulophus Eurytomæ Nees l. c. 431. 406. (forte).

Species parva, antennis testaceis, scapo subtus stramineo, mesonoto brevi, lævi, sulco nullo, radio brevi, pedibus sat crassis, abdomine aurantiaco apice viridi mox discedens.

Funnen vid Helsingborg.

40. *T. planiusculus* m: Obscure olivaceus, pedibus sat crassis fere totis testaceis, antennis submoniliformibus. ♀ Long. 2 mill.

Species corpore supra olivaceo-obscuro, subdepresso, antennis flagello submoniliformi, mesonoto lævi, sulco medio nullo, metathorace brevi, dorsello parvo, abdomine ovali, haud compresso, terebra metatarso longiore ab affinis mox discedens.

Funnen vid Örtofta i Skåne.

Divisio 2. Scutellum depressum, lineis dorsalibus nullis. Metathorax brevis dorsello angusto. Terebra abdominis compressi exserta.

41. *T. facialis* m: Obscure olivaceus, antennis submoniliformibus nigris, scapo subtus pedibusque sat crassis testaceis, facie pilosa. ♀ Long. 2 mill.

Species capite pilosulo, ocellis fere in triangulum dispositis, oculis hirtis, mesonoto depresso, sulco medio nullo, scutelli lineis dorsalibus, propter sculpturam omnium subtilissime strigosam, haud conspicuis ab affinis mox discedens.

Funnen vid Lund.

42. *T. astichus* m: Obscure olivaceo-niger, scutello lævi, terebra abdomine quadruplo brevior. Long. 2 mill.

Præcedenti simillimus, sed scutello lævi, ♂ antennis flagelli articulis 1—4 sensim paullo longioribus, fere transversis rigido-setosis, pedibus ♀ fere totis pallidis ♂ coxis omnibus femoribusque posticis fusco-æneis mox discedens.

Funnen på Öland.

Sectio 2. Caput mox supra clypeum insertæ. Alæ metacarpo brevissimo.

43. T, *Metittobius* m: Picco-niger, vix æneo-micans, pedibus pallidis, antennis submoniliformibus. ♀ Long. 2 mill.

Species corpore depresso, capite lenticulari, oculis hirtulis, antennis scapo longo sat crasso, funiculo brevi, apicem versus vix incrassato, 3-articulato, clava oblique ovata, pronoto longo, scutello lineis dorsalibus cum sulcis mesonoti fere continuis, metathorace brevi, dorsello vix conspicuo, pedibus sat crassis, abdomine ovali, subtus parum convexo ab omnibus mox discedens.

Sällsynt; jag har träffat den på en lervägg vid Örtofta, der den kröp i öppningarne till boen af *Megilla*.

Anm. I. Doctor G. F. Möller har fått en art utkläckt ur *Cecidomyia Betule*, som närmast öfverensstämmer med T. *claviger*, men har vingarne i spetsen bredt afrundade, radial-klubban mindre. En annan närstående art har han erhållit ur ett galläple på *Corylus*, men båda äro svåra att karakterisera, hvarför jag endast på detta sätt velat fästa uppmärksamheten på dem.

Anm. 2. Zetterstedt har beskrifvit några arter i Insecta Lapponica, men då typexemplaren äro i sådant skick, att man ej med säkerhet kan bestämma dem, så nödgas jag lemna dem. Af de species, som han upptager under *Entedon*, höra 1) *Entedon geniculatus* till *Ormocerus* 2) *albipes*, en Pentamer nära *Cricellus* 3) *longulus* 4) *nigritulus* 5) *monilicornis*, 6) *unguicellus* 8) *clavicornis* 9) *cyanelus* 10) *albitarsis*, alla upptagna under de respectiva genera, till hvilka de höra; 11) *pubicornis* och 12) *punctellus* äro arter af *Chrysocharis* 13) *pygmaeus*, 14) *brevinervis* och 15) *æthiops* höra till *Tetrastichus*.

Tribus **Trichogrammina.**

Alæ lineis pluribus setiferis ornatæ. Pedes tarsi triarticulatis.

Af denna grupp, som innehåller flera små arter har jag endast träffat ett species, som synes höra till

Genus **Ophioneurus** Ratzeburg.

Alæ postcosta marginem alæ haud attingente, sed in medio fere sigmoideo.

Vingarnes postcosta går ej upp till framkanten, så att stigmat ej blir utbildadt, förlänges sedermera nedåt till en tydlig radius med kort clava.

100. *O. grandis* m: Niger, antennis flagello brunneo, genibus, tibiis apice tarsisque testaceis. ♂ Long. 2 mill.

Caput nigrum, subtriangulare, oculis sat magnis genis longis, ocellis in lineam curvam dispositis; vertice angusto; facie planiuscula, subglabra. Antennæ paullo infra medium faciei insertæ, scapo nigro, ocellum anteriorem attingente, pedicello transverso-triangulari, flagello brunneo haud pubescenti, crasso filiformi, articulis 1—4 ovali-cylindricis, æqualibus, clava præcedente paullo longiore. Thorax arcuato-gibbosus, niger, fere glaber, minus nitidus; pronoto brevissimo declivi; mesonoto vage subtilissime punctato, scapulis parvis sed discretis; scutello magno, postice sat fortiter punctato; metathorace brevissimo vix conspicuo. Alæ vitreæ, longæ, apice late rotundatæ, basi nudæ, seriebus pluribus setosis ornatæ, stigmate brevi, margini haud contiguo, radio sat longo, metacarpo nullo. Abdomen compressum, dorso arcuato-acuto, sessile, postpetiolo haud magno. Pedes sat validi nigri, genubus, tibiis posterioribus apice, anticis intus tarsisque testaceis.

Sällsynt; funnen vid Ringsjön i Skåne.

Explicatio tabulae.

Fig. 1. (*Halticoptera*). Caput genis buccatis, sulco genali distincto; clypeo linea arcuata superne a facie discreto, apice 2-dentato; antennis basi paullo distantibus, longe infra medium faciei insertis, scapo et pedicello conspicuis.

Fig. 2. (*Torymus*). Caput ocellis in triangulum dispositis, linea occipitali (a) completa, ad basin mandibularum usque continuata.

Fig. 3. (*Torymus*). Pronotum (1) magnum, conicum, collari haud discreto; mesonotum dorso (2) sulcis integris a scapulis (3) discreto.

Fig. 4. (*Pteromalus*). Pronotum (a) collari (1) discreto, mesonotum (2) scapulis haud discretis, sulcis nempe medium haud attingentibus.

Fig. 5. (*Isosoma*). Pronotum magnum, scapulis discretis.

Fig. 6. (*Stenomalus*). Pronoti collare (1) discretum, latera versus subdilatum; mesonotum (2) scapulis haud discretis, sulcis (a) nempe medium haud attingentibus; scutellum sutura (b) utrinque sinuata, dorsulum (3) medium occupante, axillis (4) et axillulis (5) latera formantibus; alarum tegulae (c); postscutellum angustum, dorsello (6) impressione obliqua discreto; metathoracis carina media (7) integra ad nucham (11) usque continuata, plica laterali (8) abbreviata medium haud superante, spiraculis (d) sat magnis ovali-rotundis, sulco spiraculari (9) fere usque ad acetabula (f) pedum posticorum producto, calli lateralis (10) fimbria (e) sat densa et longa.

Fig. 7. (*Seladerma*). Scutellum dorsulo (1) basi sulco impresso, postice freno (2) linea impressa discreto, axillis (4), postscutelli dorsello (3).

Fig. 8. (*Halticoptera*). Metathoracis plica (a) integra, concinne arcuata.

Fig. 9. (*Halticoptera*). Medipectoris praesterna (1) parva elongato-triangularia, mesosterni (2) epicnemidia (2a) distincta, episterna (3) et epimera (4) mesopleura formantia, metapleura (5).

Fig. 10. (*Seladerma*). Præsterna (1), mesosterni (2) episterna (3) et epimera (4), metapleura (5).

Fig. 11. (*Torymus*). Episterna (1) margine postico superne inciso, epimera (2) subtriangularia, metapleura (3).

Fig. 12. (*Halticoptera*). Abdomen segmento 1:o sive petiolo brevi, 2:o sive postpetiolo (2) maximo margine postico rotundato, 3—7 subæqualibus, 8:o acuminato.

Fig. 13. (*Ala superior*). Costa (1) ad stigma (3) extensa, metacarpo (4) quam radio (5) longiore, hoc clava (6) et unco parvo (7) distinctis; postcosta (2) ad stigma (3) adscendente, abscissa 2:a sive præstigmate inter nervum basalem (8) et stigma (3) sita; nervo cubitali (9), nervo spurio (10) e cubito egrediente; speculo sive spatio nudo (12) pone nervum sive venam basalem conspicuo.

Fig. 14. (*Ala superior*). Nervus spurius (10) e nervo sive vena basali egrediente.

Fig. 15. (*Pes anticus*). Tarsi 5-articulati, calcari magno curvato.

Fig. 16. (*Pes anticus*). Tarsi 4-articulati, calcari parvo, brevi recto.

Fig. 17. (*Pteromalus*). Mandibula basi externe sinuata, 4-dentata, dentibus acutis, apicaii magno forcipato.

Fig. 18. (*Stenomalus*). Mandibula sinistra 3-dentata, dente basali lato truncato, apicali haud forcipato.

Fig. 19. (*Diglochis*). Mandibula 4-dentata, dentibus acutis apicali paullo majore.

Fig. 20. (*Metopon*). Mandibula acute 3-dentata.

Index.

Synonymerna äro tryckta med cursiv stil.

ACROCORMUS 34.	CÆNOCREPIS 51.	<i>bimaculatus</i> 12.
semifasciatus 34.	arenicola 51.	depressus 5.
AMBLYMERUS 80.	CARATOMUS 44.	CLOSTEROCERUS
<i>amoenus</i> 74.	megacephalus 44.	<i>formosus</i> 271.
crassicornis 80.	CATOLACCUS 152.	<i>trifasciatus</i> 271
<i>mirus</i> 84.	cavigena 152.	COELOPISTHUS 162.
Pedunculi 81.	CECIDOSTIBA 92.	cephalotes 163.
squamifer 81.	collaris 93.	vitripennis 163.
ANECURE	rugifrons 92.	COLOTRECHNIDES 46.
<i>scutellaris</i> 206.	truncata 94.	COLOTRECHNUS 46.
ANOGMUS 85.	CHIROPACHIDES 30.	subcoeruleus 46.
Strobilorum 85.	CHIROPACHYS 32.	CORUNA
ASTICHUS 274.	colon 33.	<i>clavata</i> 27.
arithmeticus 274.	<i>Quadrum</i> 33.	CRATOTECHUS 219.
ARTHROLYTUS 158.	CHRYSOCHARIS 265.	æneicoxa 221.
albiscapus 159.	CHRYSOLAMPUS	Larvarum 219.
punctatus 158.	<i>coronatus</i> 20.	longicornis 221.
rugifrons 160.	<i>nigricornis</i> 21.	opaculus 221.
BÆOTOMUS 60.	<i>pallicornis</i> 19.	ungularis 222.
elongatus 62.	CIRROSPILUS 199.	CRICELLIUS 102.
plagiatus 61.	<i>Accesius</i> 190.	decipiens 103.
pyrrhogaster 62.	caudatulus 203.	CRYPTOPRYMNUS 22.
CÆNACIS 94.	elegantissimus 201.	cavigena 22.
crassicornis 98.	immaculatus 202.	CYRTOGASTER 25.
grandiclava 95.	pictus 200.	vulgaris 25.
parviclava 99.	subviolaceus 203.	DEROSTEMYS 257.
pilosella 97.	<i>Thasus</i> 200.	abruptus 273.
planiscuta 99.	unipunctus 202.	æneiscapus 267.
punctulata 96.	vittatus 201.	aurifrons 262.
spiracularis 95.	CLEONYMIDES 3.	boops 266.
squamifera 99.	CLEONYMUS 4.	chrysostomus 265.

- clavicornis 273.
 clypealis 270.
 coactus 270.
 conformis 259.
 crassiscapus 264.
 elongatus 266.
 filicornis 263.
 formosus 270.
 heterotomus 267.
 lævifrons 261.
 latipeunis 262.
 lucens 273.
 nigricrus 266.
 niveipes 265.
 obscurus 272.
 parviclava 272.
 petiolatus 264.
 pilicoxa 261.
 punctifrons 263.
 punctiscapus 264.
 punctiscuta 261.
 radialis 269.
 Salicis 268.
 scutellaris 267.
 suleiscuta 272.
 trifasciatus 271.
 varipes 269.
 versicolor 269.
 DIBRACHYS 160.
 acutus 162.
 Boucheanus 161.
 DIGLOCHIS 156.
 omnivorus 157.
 DIGLYPHIS 235.
 æneiscapus 236.
 rugifrons 236.
 DIMACHUS 50, 52.
 discolor 52.
 DINARMUS 56.
 acutus 56.
 pilosulus 57.
 DINOTUS 38.
 bidentulus 39.
 calcaratus 40.
 clypealis 40.
 Pteromalinus 40.
 DIPARA 177.
 petiolata 177.
 DIPARIDES 175.
 DIPLOLEPIS.
 megacephala 45.
 DIRHICNUS 170.
 heterotomus 171.
 magnicornis 173.
 subcoeruleus 170.
 subincrassatus 172.
 sublævis 172.
 ELACHISTINA 186.
 ELACHISTUS 191.
 æneiscapus 193.
 albiventris 187.
 cothurnatus 256.
 fusciventris 211.
 gradualis 256.
 inunctus 194.
 Lapponicus 196.
 maculatus 190.
 nigritulus 196.
 obscurus 272.
 olivaceus 196.
 opaculus 193.
 pellucens 211.
 politus 254.
 petiolatus 191.
 pulcherrimus 210.
 punctiscuta 195.
 sublævis 194.
 viridulus 195.
 ELASMINA 204.
 ELASMUS 204.
 albipennis 206.
 flabellatus 206.
 fumipennis 206.
 viridulus 205.
 ENTEDON 239.
 acuminatus 288.
 albicus 247.
 albitarsis 277.
 amthystinus 292.
 atnopterus 233.
 Cioni 246.
 cionobius 247.
 ecstalis 241.
 clavicornis 289.
 cristatus 194.
 cyanellus 245.
 cyclogaster 285.
 elongatus 246.
 Evonymellæ 288.
 fuscipennis 223.
 fuscitarsis 244.
 Larvarum 220.
 laticornis 217.
 leptoncurus 285.
 lineatus 202.
 longiventris 245.
 luteus 281.
 martialis 241.
 metatarsalis 245.
 monilicornis 228.
 nubeculatus 230.
 oleinus 295.
 Panyas 182.
 parvicar 244.
 punctatus 244.
 punctiscapus 248.
 scianeurus 215.
 squamosus 242.
 subimpressus 243.
 subovatus 243.
 tenuitarsis 243.
 Vaginulæ 296.
 Vinulæ 290.
 xanthops 287.
 ETROXYS 86, 100.
 breviusculus 101.
 elongatus 100.
 longicauda 101.
 EUDERUS 276.

- albitarsis 277.
 caudatus 277.
 obscurus 278.
 viridis 278.
 EULOPHUS 225.
 alcicornis 211.
 Anementus 210.
 Antilope 211.
 arcuatus 200.
 Argissa 194.
 Artæus 230.
 atmopterus 233.
 atratus 282.
 barbarus 226.
 bifasciatus 230.
 bifasciatus 270.
 bombycicor-
 nis 219
 brevicornis 290.
 coeruleus 283.
 dendricornis 226.
 discolor 241.
 elongatus 280.
 Eneugamus 217.
 Erse 197.
 Euedore-
 schus 219.
 Eurytomæ 297.
 flavomacula-
 tus 210.
 frontalis 213.
 fulvicollis 209.
 fumatus 216.
 fuscicornis 226.
 Gallarum 215.
 Gonippus 211.
 harmocerus 211.
 Hippias 234.
 Hylolomarum 283
 inunctus 295.
 lævissimus 232.
 Larvarum 219.
 leucarthros 234.
 lineatus 202.
 longulus 229.
 Lophyrorum 223.
 maculatus 249.
 monilicornis 228.
 pectinicornis 225.
 pennicornis 226.
 Phalænarum 220.
 pictus 200-
 plumicornis 226.
 punctifrons 231.
 punctiscuta 228.
 4-fasciatus 197.
 4-maculatus 201.
 ramicornis 219.
 rufescens 189.
 sericeicornis 217.
 6-radiatus 211.
 stramineipes 232.
 strigiscuta 228.
 subcontiguus 231.
 subeutaneus 226.
 subulatus 268.
 tabidus 269.
 Tarandus 210.
 Tarandicor-
 nis 226.
 Tischbeinii 229.
 tridentatus 227.
 tristis 293.
 versicolor 269.
 vittatus 201.
 viduus 226.
 viridulus 233.
 unipunctatus 202.
 xanthostomus 213.
 EUPLECTRUS 187.
 bicolor 187.
 læviscuta 188.
 maculiventris 188
 EUTELUS 69, 70.
 apicalis 74.
 collaris 73.
 diffinis 73.
 dilectus 74.
 elongatus 75.
 heterotomus 74.
 immaculatus 74.
 punctiger 75.
 tibialis 71.
 xanthocerus 72.
 GENIOCERUS
 macroneurus 280
 HABRITTS 54.
 brevicornis 55.
 HABROCYTUS 109.
 acutigena 117.
 albipennis 110.
 aureolus 125.
 Bedeguaris 123.
 beryllinus 112.
 Capreæ 112.
 chlorogaster 119.
 Cioni 115.
 crassinervis 118.
 dentifer 113.
 dolichurus 119.
 fasciatus 115.
 glabriculus 113.
 Hieracii 128.
 læviusculus 121.
 longicauda 122.
 obscurus 113.
 ochrocerus 114.
 parvinucha 119.
 punctipleura 122.
 Saxeseni 126.
 simulans 121.
 Trypetæ 112.
 HEMIPTARSENUS 208.
 albicoxa 210.
 fulvicollis 209.
 unguicellus 211.
 HEMITRICHUS 53.
 rufipes 54.
 HOLCÆUS 104.

- dichrous 104.
 Torymoides 106.
 HOLCOPELTE 271.
 HOMOPORUS 64.
 chlorogaster 66.
 crassiceps 66.
 crassinervis 68.
 flaviscapus 69.
 fulviventris 64.
 gibbiscuta 66.
 luniger 67.
 ICHNEUMON
 depressus 5.
 Gallarum 215.
 Larcarum 219.
 puparum 153.
 rufescens 189.
 ISOXYRTUS 131.
 dentifer 133.
 marginatus 132.
 MELITTOBIA 203.
 Osmiæ 204.
 MERAPORUS 150.
 alatus 151.
 graminicola 150.
 MERISMUS 18.
 aculeatus 21.
 clavicornis 19.
 flavicornis 20.
 megapterus 18.
 MERISUS 59. 62.
 acutangulus 64.
 splendidus 62.
 MESOPOLOBUS
 fasciiventris 78.
 METACOLUS 36.
 unifasciatus 36.
 METOPON 164, 165.
 æneiscapus 169.
 concolor 168.
 crassispina 166.
 grandiclava 168.
 punctatus 169.
 punctifrons 168.
 MICRADELUS 5.
 obscurus 6.
 MICROCENTRI 178.
 MICROLYCUS 223.
 heterocerus 224.
 MICROMELUS
 pyrrhogaster 62.
 rufomaculatus 67.
 MICROPLECTRON 222.
 fuscipennis 222.
 MIOTROPIS 197.
 quadrinotata 199.
 simplex 198.
 sulcicrista 197.
 MISCOGASTER
 Stygne 148.
 NECREMENS 234.
 leucarthros 234.
 punctifrons 235.
 OLINX 215.
 fulvicerus 216.
 Gallarum 215.
 rotundiventris 216.
 OMPHALE 268.
 Salicis 268.
 OPHIONEURUS 299.
 grandis 299.
 ORMOGERUS
 maritimus 147.
 OXYMORPHA 280.
 PACHYCREPIS 26.
 clavata 27.
 PACHYNEURON 27.
 Aphidis 30.
 formosum 28.
 gibbiscuta 29.
 grande 29.
 planiscuta 35.
 PANDELUS 35.
 flavipes 35.
 PANSTENON 175.
 assimilis 176.
 Oxylus 178.
 PERIDESMIA 150.
 PHOTISMUS 15.
 nubilosus 15.
 PICROSCYTUS 58.
 scabriculus 58.
 PLATYGERRHUS 13.
 gracilis 14.
 PLATYMESOPUS
 tibialis 71.
 PLATYNCHILUS 184.
 cuprifrons 185.
 Erichsonii 184.
 PLATYTERMUS 75.
 brevicornis 77.
 decipiens 77.
 decorus 76.
 fasciculatus 78.
 simplex 79.
 speculari 77.
 PLEUROTROPIS 248.
 bimacularis 249.
 brachycerus 257.
 brevicornis 253.
 claviger 256.
 cothurnatus 255.
 crassicornis 255.
 cribrifrons 253.
 flaviscapus 255.
 nigritarsis 251.
 nitifrons 252.
 planiventris 252.
 politus 254.
 strigiscuta 254.
 substrigosus 256.
 tetratomus 257.
 POLYCELIS 143.
 conspessa 143.
 monospila 145.
 POLYCYSTUS 26.
 scapularis 26.
 PSILONOTUS 81.
 aureolus 82.

- viridulus 83.
 PTEROLYCUS 8.
 PTEROMALUS 145, 153.
 abnormis 174.
 albipennis 110.
 aphidis 30.
 apicalis 74.
 ater 67.
 bellus 89.
 bicolor 187.
 bimaculatus 33.
 binotatus 42.
 biguttatus 43.
 Boucheanus 161.
 capitatus 95.
 cavus 161.
 cephalotes 163.
 claviger 149.
 complanatus 149.
 compressus 100.
 conspersus 143.
 cupreus 112.
 Cynphis 141.
 deplanatus 163.
 discolor 52.
 elongatus 10.
 fulviventris 64.
 futilis 61.
 Galerucca 183.
 Larvarum 91.
 Lichtensteinii 10.
 luniger 67.
 macrocephalus 45.
 maculipennis 158.
 Muscarum 91.
 Nephele 10.
 nidulans 155.
 omissus 176.
 omnivorus 157.
 patulus 159.
 pilipes 110.
 plagiatus 64.
 planiscuta 155.
 psittacinus 91.
 pulcherrimus 12.
 puparum 153.
 4-notatus 42.
 Quadrum 8.
 rufomaculatus 61.
 salinus 148.
 saltans 157.
 seladonicus 91.
 sodalis 71.
 Spinolæ 63.
 squamifer 155.
 submarginatus 156.
 subniger 58.
 Thessalus 91.
 Trochilus 78.
 varians 89.
 RHAPHITELUS 37.
 maculatus 37.
 RHOPALICUS 41.
 annellus 42.
 biguttatus 43.
 brevicornis 43.
 RHOPALOTUS 255.
 RHOPOTROCERUS 85.
 brevicornis 83.
 mirus 84.
 SECODES 270.
 SOLENOTUS 237.
 viridis 237.
 SPHEGIGASTER 20.
 aculeatus 21.
 flavicornis 20.
 muticus 22.
 truncatus 21.
 SPHEGIGASTRIDES 16.
 SPIHEX
 colon 33.
 SPINTHERUS 129.
 obscurus 129.
 STENOCERA 184.
 Derceto 185.
 Erichsonii 184.
 STENOMALUS 88.
 crassicornis 89.
 Muscarum 91.
 rugosus 90.
 subfumatus 90.
 STENOMESIUS 189.
 maculatus 189.
 pulchellus 189.
 rufescens 189.
 STINOPLUS 107.
 aureolus 109.
 militaris 107.
 SYMPIEZUS 217.
 punctipleura 218.
 sericeicornis 217.
 SYNTOMOPUS 23.
 incisus 23.
 oviceps 24.
 TELEOGMUS 212.
 arcticus 214.
 xanthostomus 213.
 TETRACAMPE 181.
 flavipes 183.
 Gallerucca 183.
 impressa 182.
 TETRACAMPINA 181.
 TRICHOGLONUS 149.
 complanatus 149.
 TRICHOGRAMMINA 299.
 TRICHOMALUS 134.
 æneicoxa 142.
 coxalis 141.
 fasciatus 139.
 frontalis 136.
 lævinucha 140.
 laticeps 138.
 pallicornis 136.
 pedicellaris 142.
 punctiger 137.
 punctinucha 134.
 rufimanus 142.
 spiracularis 139.
 subnudus 140.

TRIGONODERUS 7.
 apicalis 12.
 acuminatus 13.
 Brandtii 9.
 Lichtensteinii 10.
 pedicellaris 8.
 trifasciatus 11.
 vittiger 12.
 TETRASTICHINA 275.
 TETRASTICHUS 278.
 astichus 297.
 atratus 282.
 atrocoeruleus 283.
 aurantiacus 296.
 brachycerus 296.
 brevicornis 290.
 caudatus 293.
 ciliatus 294.
 citrinus 284.

 citripes 292.
 clavicornis 289.
 claviger 296.
 compressiventris
 286.
 crassicauda 293.
 crassinervis 289.
 cyelogaster 285.
 deplanatus 291.
 dolichurus 293.
 elongatus 280.
 Evonymellæ 288.
 facialis 297.
 flavimanus 289.
 intermedius 281.
 inunctus 295.
 longicauda 292.
 longiscapus 287.
 luteus 281.

 Melittobius 298.
 micantulus 295.
 obscuripes 296.
 pallicornis 286.
 pedicellaris 286.
 planiusculus 297.
 punctiscuta 289.
 scaposus 284.
 seticollis 291.
 setifer 283.
 subdepressus 285.
 terminalis 292.
 trichops 282.
 varius 294.
 Vinulæ 290.
 xantops 287.
 Urolepis 147.
 maritima 147.